

TRACTATUS DE MORBIS MULIERUM,

*In quo solida Theoria, praxi certiori & experientiis,
comprobata complectitur.*

A C C E D I T

Catalogus Cronologicus Medicorum, quorum scripta
de iis morbis extant.

A U C T O R E

JOANNE ASTRUC

PROF. REG. MEDIC. ET REGIS A CONSIL. MED.

*In hoc gaudeo aliquid discere, ut doceam; nec me ulla res
delectabit, licet eximia sit, & salutaris, quam mihi
uni sciturus sim. Senec. lib. i. Ep. 6.*

Gallico Sermone conscriptus nunc Latino Versus.

Hieronymi

Glaucus M.D.C.C.
Calavirani

1794



V E N E T I I S,

Typis, & impensis NICOLAI PEZZANÆ.

C I D I D C C L X I I I.

SECRET

MORRIS MULLER

La poética de la novela, y la novela de la poesía.

T I D E C A

А. И. О. Р. Я. Е.

[Faint, illegible handwritten text]

College of Arts
 Cambridge
 1771



VE ME T I S

CELSISSIMO PRINCIPI
PRÆSULI AMPLISSIMO
JOANNI BAPTISTÆ REZZONICO
CLEMENTIS XIII. P. M.

NEPOTI
PROTONOTARIO APOSTOLICO,

ac totius ditionis Ecclesiæ

ARMORUM PRÆFECTO.

D. D. D.



UI bono, CELSISSIME VIR, nos
summum honorum columnen attigisse,
aut dignitatibus decorari, vel eximius frui ingenii
facultatibus a DEO OPTIMO MAXIMO libe-
raliter concessis, cum ceteris hominibus (etsi impa-
ri for-

ri fortuna donatis) prodesse nolemus : quid enim laudabilius (modo postulantis modestia PATRONI decus , aut altitudinem non offendat) quam scientiarum , & artium cultores fovere , eosque adversa sorte interdum defatigatos humaniter substinere.

Me itaque in clientelam jam acceptum , iterum suscipere ne renuas , quaeso : verum quidquid laboris in hoc opere mihi tribui poterit , TUIS gloriosissimis auspiciis obtegi sinas , at si otium dederit , publico usui utiliora admodum condere non despero TIBI grata futura , quæ nisi MÆCENATIS æquaverint amplitudinem , totidem saltem observantia ergo TE meæ testimonia suppedita verint.

TUÆ CELSITUDINIS

XVI. Kalendas Decembris.

Humillimus, Addictissimus, Obsequent.

L. T.

J A-

J A N O P L A N C O
 PATRITIO ARIMINENSI,
 ET IN EA CIVITATE
 MEDICO PRIMARIO
 LUDOVICUS TESSARI
 S. P. D.



Uam familiaribus litteris mecum consuetudinem inire non respuisti, nunc, dum *Astruci* Eximii Viri laudes colligo, publicis testimoniis prosequi non dedignaberis.

Speciales enim Medicinæ Tractatus quanti pendeant neminem latet, cum in iis singulos morbos fusius Auctores perpendere queant, ultimasque differentias tum quo ad theoreticos, cum ad practicos canones spectat, determinare valeant. Hujus generis prostat hujusmodi ægregium opus, omnes citra partus mulierum morbos complectens, quod ceteris usque adhuc excussis amplitudine, censu, tutiori practici, atque nuperrimarum notionum numero facile præcellit, ut mendo ullo haud redargui possit.

Haud supervacaneum tamen censui nonnulla excerpere, quæ ne pro rei novitate dubium admitterent, aut aliquo modo operis existimationem offenderent, candide breviterque declarare conabor.

Fateor itaque primum etsi concinno ordine suos digerat labores, certa aliquali tamen prolixitudine pecare, quæ illos potius molestia afficere mihi suadeo, quibus libros mox est cursim pervolvere, quam iis qui pacato materies malunt animo perscrutari. Quidam vero addunt crebro nimis ipsum remediorum series in mediûm proferre, at animadvertant hujusmodi censores id institutum fuisse non ut provectiores sæpius quam par esset illas perlegerent, sed ut tyrones unicuique speciei magis idonea aptarent auxilia, atque formulas rectius subjigere valerent: ea tamen parvi duco, quæ cum eximio opere comparata vix recenseri merentur; alterum enim superest majoris momenti dubium circa novum, quod ipse ostendit vasorum genus, quod mirifice difficiliora menstruationis phenomena explicat; id tamen minime lædit theoriam, aut praxim horum morborum qui una persistunt.

Si quis unquam *Astruci* sententiæ annuere contendat, duo priora Capitula demat, quæ ad uteri structuram tantum attinent, ceteraque amplectatur, quæ praxim potissimum respiciunt: nam sedulo perpendenti apparebit præter lactea vasa nihil prorsus afferre, quæ a celebrioribus anatomicis comprobata non sint.

Plexum itaque capillarium vasorum reticuli more ex pluribus anastomosibus conflatum uteri functiones satis declarant, tum horum vasorum extremitates ad venosam naturam accedere plerique recentiorum confirmant; appendices vero venarum, ut ipse ostendit, diverso nomine modo vilorum, modo foraminum, modo cruentium macularum plures indicarunt; vasa denique lactea ab Auctore detecta, quæ catameniorum periodum præsertim, & mammarum, cum utero affinitatem mirum in modum explanant, totidem glandulæ sunt speciali figura donatæ, ad illum lacticinosum humorem secernendum a natura fabrefactæ, quas negare nemo audebit, modo cadaverum sectionibus uterum non inquirat, eaque organa nunquam reperiri posse demonstrat.

Quam ob rem cum id tentare adhuc nullus ausus sit, Auctori fidentum erit, eoque magis cum phenomenorum eorum explicationi nostra magnopere faveat sententia; de cetero vero quantum laudis in singulorum mulierum ægritudinum causis explanandis, signis enunciandis, efficacioribus remediis seligendis, omnibusque sedulo percontandis sibi promeritus sit, quæ praxim tutiorem, certioreque redunt, perlegenti facile innotabit, ut verborum lenociniis ipsum amplius extollere frustraneum videatur.

Tu igitur, Vir Præstantissime, qui de Litteraria Republica tam bene meritus es, atque innumeris poles Scientiarum notionibus, ingenio, ac auctoritate dignum opus tueri ne renuas deprecor, & quidquid hujus laboris mihi tribui poterit, qua soles humanitate libenter ferre, quod si mihi obtineri contingat, nihil optatius accidere posse arbitrabor, Vale.

Datum Venetiis XVI. Kal. Decembris 1763.

P R Æ F A T I O .



Medicina in diem progreditur, at dum ipsa profiscicitur, ejusdem consecutio difficilior evadit. Olim ad artem cum laude exercendam sufficiebat præcipuos Hyppocratis, & Galeni canones cognoscere; medicorum controversias conciliare; nomina, definitiones, atque causas morborum adparentes determinare; formulas nonnullas consuetudine vetustissima receptas, ab auctoribus depromptas memoria tenere; tandem audaciter occurrentibus difficultatibus, qualitatibus occultis adversari.

In præsentiarum ut medici nomen mereamur, uberiores, & difficiliore notiones necessariæ evadunt; oportet enim humani corporis fabricam perscrutari; partium functiones, & mæcanicas leges quibus exequuntur addiscere; earum perscrutationes prospicere quæ morbos producant, tum minimas differentias, quæ morborum ultimas species faciunt; singularum sedem, indolem, & immediatam causam investigare, deinde prognosim atque indicationes sancire quibus mederi necessum erit; omnia indagare auxilia, quæ materia medica supeditat simplicia, vel ex his composita, efficaciora seligere, quæ magis proposito scopo collineant, eaque, circumstantiis ratione habita, caute exhibere.

In earum notionum perquisitione caute incedendum erit, ne conjecturas aut hypotheses erroneas pro veritatibus admittamus, postquam enim veterum jugum exuimus nimis fortasse hanc methodum prosecuti sumus, ut medicina nunc fabulæ speciem referat, eamque nonnulli etiam contemnant: nihil enim proponere debemus, quod partium ægrotantium cognita structura non fulciatur, verum praxis obviis legibus communiter receptis, aut certis observationibus a celeberrimis medicis institutis non confirmetur, modo enim aliquam hypothesis amplecti conati simus ad difficiliora problemata explicanda, quæ passim occurrunt animadvertendum erit eam conjecturæ more esse proponendam, quam sensim prosequemur, ut tandem rei veritas elucescat.

Si hujusmodi notiones medicis omnibus potissimæ evadunt, qui laudabiliter medicam artem exercere cupiunt, eo magis ipsi indigent, qui artem docendi munere fungi sumunt, suosque labores publici juris facere malunt.

Huic duplici oneri satisfacere & ipse conor: pluribus enim ab hinc annis medicinæ scholas subsecutive Tolosæ, Monspeli, & Parisiis implevi, verum non pauca opera edidi, idcirco nemo negabit utrumque pensum persentire, quod absolvere usque adhuc sedulo satagi.

Mea

Mea itaque prima ætate anatomix diligenter incubui, & necessarias tunc cognitiones adeptus sum, quæ ad medicinam tum addiscendam cum præcipiendam conducunt, diutina vero praxi plura didici, quæ passim in morborum pertractatione eveniunt, (& sunt quotidianæ occurrionis) quæque potissimam medicinæ partem constituunt, tandem rariores historias sum perscrutatus quæ omnibus minime se offerunt (non omnibus omnia) pluresque medicos codices consului.

Vix credideritis quot pervolverim Auctores, quot inquisiverim observationes, quæ etiam si utiles evadant, nimis jam artem onerant, nonnullarum futilitatis ergo; etenim cum nihil sit recta observatione difficilior, nihil idcirco æquo censore rarius fuerit, nihilo tamen secius multi se jactant, at rudiores plerumque illas peragere conantur, ut animose erroneas audeant observationes publici juris facere.

Sane tot pervolvere libros me piguit, ut totidem Virgilium, Ennium perlegendo non tæduerit, at eo & ipse collineo utiliora in præsentiarum congerendo inter tot futilia, idque meam sustinuit patientiam.

Medicina ea cognitione deficit, qua magis eget, videlicet remediorum indolem cognoscere, quæ pro singulis morbis proponuntur, si Scriptoribus materiæ medicæ fidendum esset, remediorum quodque plures morbos compescere valent, verum dum experientias instituimus, innotuit eorum pleraque nemini mederi.

Hujus medicinæ pars utilissima nunquam elucet nisi repetitæ observationes, & a doctis medicis ingenuisque institutæ, circa simplicia medicamenta, rem declaraverint; minime sperandum erit clinicos medicos id perficere posse: plerumque enim, qui praxi magis occupantur, vel minus idonei sunt, vel otio carent, nisi enim Regis auctoritate fulciamur, atque auspiciis incassum utiles observationes digerere conabimur, celebrioribus medicis onus committendo, qui in nosocomiis sedulo effectus remediorum perscrutentur.

Regis itaque nostri pro scientiarum augmento eximia sollicitudo ipsum excitavit, ut tum Zonam torridam cum glaciale versus Astronomos mitteret, qui latitudinis gradus dimetirentur, nuper duos alios designavit quorum alter ad Septemtrionem, alter ad meridiem Veneris transitum cis discum solarem observarent, hujusmodi opera sane Regiæ munificentix digna sunt, at perficiendæ medicinæ institutum virtutum remediorum detegendarum subjectorum conservationi Augustæ Familiæ, & Sacræ ejusdem Personæ utilissimum, nondum ejusdem attentionem promeruit; sperare tamen licebit hujusmodi scrutinium cuidam jubere posse, modo ipsum excitemus.

Interim hac de causa, quod privati medici erat in præsentiarum vires omnes impendi remedia cuique morbo propria tutiora, & magis commendata attuli, tuta etiam, sed a Medicis nonnullis jactata indicavi, nonnulla etiam singularia, quæ Scriptores nonnullos proposuerunt non ad contemptionem, sed majorem rei claritatem censuravi.

Cum

Cum jamdiu perlegissem in Galliarum Collegio Tractatum quem hodie publici juris facio, operis ingenium quod mihi proposui plures exfugere potuerint. Neminem latet discipulorum voluptas in edendis Præceptorum scriptis his etiam invitis, quod multiplici ratione in hoc Tractatu potissimum expertus sum.

Etenim anno 1740. D. Massentius hodie Doctor, & Præses Facultatis Parisiensis, olim medicinæ Tyro, mihi theses obtulit e meis Lectionibus excerptas ut de iis judicium proferrem, cui libenter annui. Hujusmodi theses in publicis Scolis defendit ineunte anno 1741. D. Aragonus, qui tunc Baccalaurus renuntiabatur, sub eo Titulo, *Utrum a mutuo sanguiferorum, lactiferorumque uteri vasorum nisu menstrua purgatio?* Postquam ostendit menstruationis leges, quales Lib. I. Cap. I. II. & III. reperiuntur, nostratem se præbet.

Paullo post medicus Anglus, quem nisi per litteras initiales I. R. n. recognovi, quibus insignitur initio sui libelli, iisdem lectionibus interfuit, multum ex his & condiscipulorum consuetudine lucratus est; in Angliam vero redux codicem horum morborum excussit anno 1743. Londini in 8. sub Titulo *A Treatise on all the diseases incident to Women*, quare ipso operis fastigio ipse fatetur ea ex meis lectionibus decerpisse, quod amplius in Præfatione significat, ubi sat me laudibus extollit, quas utinam promeritus essem.

Hæc in medium protuli, ut pateret meas lectiones haud inutiles censerem. Remittite quæso hanc vanitatis speciem cum pro labore vix ultra adeptus sim; at hujusmodi aspernor blanditias, cum mihi proposuerim utilem tantum aliis evadere, eaque da causa studiis incubuerim ut ceteros instruere potis essem, *aliquid discere ut docerem*, verum ut initio operis indicavi, quas acquisivi medicas notiones prorsus contemnerem nisi aliis communicarem, *quem nullares delectabit, licet eximia sit & salutaris, quam mihi uni sciturus sim.*

Hac ratione hoc pensum digessi publicæ utilitati consulens; nihil omisi nihilque simulavi, undique veritatem exposui, adversus singulos morbos tutiora, usitiora remedia proposui, ea rejeci, quæ futilia, aut superstitiosa mihi visa sunt, at cum medicorum nonnullorum auctoritate suffulta quædam refferre coactus sim, caute animadverti fallacias, quæ in iis reperiiebantur.

Et si innumeri circa muliebres morbos tractatus prostent; plerique tamen indigestam præferunt materiem, tum theoriæ, cum praxis ratione, nemo usque adhuc a veriori uteri structura horum morborum theoriam desumpsit, vel a functionum hujus partis legibus. Ad praxim quod attinet sibi satis putarunt invicem sese exscribere, quare dum ab erronea praxi recedere tentarunt mentis imagines prosequi maluerunt, in remediis præsertim seligendis nulla habita ratione indicationibus quas natura morbi præsefert.

Hujusmodi errores cognovi iisque mederi sætegi, quod theoriæ saltem respectu obtinuisse putavi, utinam ad praxim quod attinet idem

Astruch de Morbis Mulier.

* *

bene.

benevertisset, at ut alio enunciavi, materiæ medicæ incertitudo, & specificorum remediorum exiguitas, verum ambago circa ea, quæ magis jactant, novas methodos curationis, tutioresque proponere impedierunt; utinam si dum paupertatem, & incertitudinem hujus partis ostendo, ceteri medici circa id persentirent indigentias nostras, atque auxilium pro opere præstarent.

Nonnullas animadversiones pro coronide addam.

I. In præfatione *tractatus tumorum* usum contemno formularum, quæ in medicis libris inferuntur; ideoque optimum consilium putavi eas ab hoc opere proscribere, ne ignari, aut pseudo-doctores illas citra ullam distinctionem ætatis, temperamenti, aut virium ægrotantium, perperam adhiberent.

II. Aquievi in simplicium remediorum ostensione, quæ varias implent indicationes omnium morborum, & dosium enunciatione; dein methodos proposui componendi varias remediorum formulas pro libitu, aut circumstantiarum ratione remedia seligendo.

III. Id patrando admonui quam fieri possit ea simplicius subigere; interdum enim observavi medicos nonnullos plura remedia virtute opposita simul congerere, idcirco hujusmodi praxis præter ventriculi quæ excitat incomoda, impedit quominus innotescat remedii effectus, quem prosequi debebimus.

IV. Cum doses quas infra indicavi modicæ sint, idcirco autumo eas tuto posse adultis mulieribus, modo delicatiores valde non sint, exhiberi, fortasse necessum fuerit illas augeri; at maluerim dosim intendere inefficiæ remedii ergo, quam imminuere pro nimia ejusdem activitate.

V. Cupiditas, qua gaudeo utilitatem omnibus afferre, me cogit hujusmodi tractatum Patria lingua edere, ut undique receptus esset; id tamen me valde angebat, cum de obsœnis rebus pertractare coactus essem; sed minus propudiosa verba adhibui, hoc tamen auxilium minime in *furore uterino* sat erat; ubi turpibus verbis huic morbo propriis uti coactus fui, quare in hoc capitulo tantum latinam linguam admisi.

VI. Ad hujusmodi operis calcem tandem Catalogum Cronologicum Auctorum exposui qui de morbis mulierum scripserunt, primum ut edocerentur juvenes medici de hujusmodi artis vetustate, ac de celebrioribus viris, qui subsecutive eam dilatarunt; secundum ut animadverterent hujusmodi scientiam quam nonnulli inconstantem vocarunt eadem continenter fundamenta servasse, etsi vanitas, inercimonium, consuetudo &c. eam deturpare tentaverint.

VII. Hujusmodi opus patet incompletum esse; deest enim postremus liber de gestatione, & qui eam consequuntur morbis, ad quem lectores pluries mitto, spero brevi ipsum publici juris facere, & postremam constituerit hujus operis partem, quæ separatim prostabit.

INDEX CAPITUM.

LIBER I.	D E Morbis Mulierum ex menstruatione.	Pag. 1
Caput I.	De uteri structura, appendicibus venosis, & vasis vermicularibus.	ibid.
§. I.	Descriptio uteri generalior.	ibid.
II.	Uteri specialis sanguineorum vasorum descriptio.	2
III.	Descriptio vasorum lacteorum, seu vermicularium uteri.	3
Caput II.	De menstruorum profluvio, sive de Catameniiis.	5
§. I.	Descriptio.	ibid.
II.	Causæ.	6
III.	Consecutiones.	11
IV.	Explicatio eorum, quæ catamenia respiciunt.	12
V.	Symptomata explicantur menstruis obvia.	15
VI.	Usus catameniorum.	16
Caput III.	Prima catameniorum eruptio, & antecedentium aut concomitantium symptomatum.	18
§. I.	Descriptio.	ibid.
	Eruptionis gradus primus.	ibid.
	gradus secundus.	19
	gradus tertius.	ibid.
	gradus quartus.	20
	gradus quintus.	21
	gradus complicatus.	ibid.
II.	Diagnos.	22
III.	Prognosis.	ibid.
IV.	Curatio.	23
	Remedia usitatoria primam sanguinis eruptionem promoventia.	26
Caput IV.	Catamenia suppressa, aut imminuta.	ibid.
§. I.	Descriptio.	ibid.
II.	Causæ.	27
III.	Differentiæ.	29
IV.	Symptomata.	30
V.	Diagnos.	31
VI.	Prognosis.	34
VII.	Curatio.	35
	De repentina suppressione menstruis adhuc fluentibus.	ibid.
	De suppressione, quæ persistentibus menstruis sensim eorum implicat regressum.	36
	Cautellæ in suppressionibus medendis necessarissimæ.	44
	Innocua medicamenta in suppressionibus valde commendata.	45
	Remedia minus tuta in suppressionibus evocandis usitata.	48
Caput V.	De menstruis suppressis organi vitio.	50
§. I.	Descriptio.	ibid.
II.	Causæ.	51

III.	<i>Differentia.</i>	
IV.	<i>Symptomata.</i>	54
V.	<i>Diagnofis.</i>	55
VI.	<i>Prognofis.</i>	56
VII.	<i>Curatio.</i>	57
	<i>Circa eas operationes neceffariae cautellae.</i>	ibid.
Caput VI.	<i>De difficili menftruatione, & laboriofa.</i>	59
§. I.	<i>Descriptio.</i>	61
II.	<i>Caufae.</i>	ibid.
III.	<i>Differentia.</i>	ibid.
IV.	<i>Symptomata.</i>	62
V.	<i>Diagnofis.</i>	63
VI.	<i>Prognofis.</i>	ibid.
VII.	<i>Curatio.</i>	64
	<i>Cautellae.</i>	65
Caput VII.	<i>De menftruis alio devolutis.</i>	ibid.
§. I.	<i>Descriptio.</i>	66
II.	<i>Caufae.</i>	ibid.
III.	<i>Symptomata.</i>	67
IV.	<i>Diagnofis.</i>	68
V.	<i>Prognofis.</i>	69
VI.	<i>Curatio.</i>	ibid.
Caput VIII.	<i>Chlorofis feu (les Pâles Couleurs).</i>	70
§. I.	<i>Descriptio.</i>	71
II.	<i>Caufae.</i>	ibid.
III.	<i>Symptomata.</i>	73
IV.	<i>Diagnofis.</i>	76
V.	<i>Prognofis.</i>	79
VI.	<i>Curatio.</i>	ibid.
Caput IX.	<i>De menfibus nimis, atque uteri hemorrhagia.</i>	80
§. I.	<i>Descriptio.</i>	85
II.	<i>Caufae, quae menses nimios producant.</i>	ibid.
III.	<i>Caufae, quae uteri hemorrhagiam inducant.</i>	87
IV.	<i>Differentia.</i>	88
V.	<i>Symptomata.</i>	90
VI.	<i>Diagnofis.</i>	91
VII.	<i>Prognofis.</i>	91
VIII.	<i>Curatio.</i>	94
	<i>Cafus primus de uberrima crudoris jactura, feu uteri hemorrhagia:</i>	95
	<i>Cafus fecundus de modica fanguinis jactura, feu cruento stilli-</i>	96
	<i>cidio.</i>	100
	<i>Methodus praecavendi hemorrhagiae regreffus.</i>	106
	<i>Cautellae neceffariae circa hujus morbi medellam.</i>	107
	<i>Remedia in uteri hemorrhagiis comendata: quibus utiliter, vel</i>	108
	<i>saltem innocue uti poteft.</i>	108
	<i>Remedia adverfus eundem morbum pariter commendata, futilia</i>	III
	<i>tamen, vel fufpecta.</i>	Ca-

Caput X.	<i>Fluor Albus.</i>	113
§. I.	<i>Descriptio, & Differentiæ.</i>	ibid.
II.	<i>Causæ fluoris albi generaliores.</i>	114
	<i>Causæ fluoris albi lacticiñosi.</i>	ibid.
	<i>Causæ fluoris albi lymphatici.</i>	116
III.	<i>Explicatio differentiarum albi fluoris.</i>	117
IV.	<i>Symptomata.</i>	118
V.	<i>Diagnosís.</i>	120
VI.	<i>Prognosis.</i>	124
VII.	<i>Curatio.</i>	125
	<i>Curatio fluoris albi lactei.</i>	ibid.
	<i>Curatio fluoris albi lymphatici.</i>	129
	<i>Curatio eorundem palliativa.</i>	132
	<i>Cautellæ necessariæ circa fluoris albi medellam.</i>	133
	<i>Remedia in hoc morbo commendata quibus tute in quibusdam saltem circumstantiis uti potest.</i>	134
	<i>Remedia adversus album fluorem proposita, nocua tamen, vel suspecta.</i>	135
Caput XI.	<i>De cessatione menstruorum, & fænomenis, quæ ab ea proce- dunt.</i>	139
§. I.	<i>Descriptio.</i>	ibid.
II.	<i>Causæ, & symptomata.</i>	140
	<i>Primus in hoc morbo uteri status.</i>	ibid.
	<i>Status alter.</i>	141
	<i>Tertius status.</i>	142
	<i>Status postremus.</i>	ibid.
	<i>Status uteri compositus.</i>	143
III.	<i>Diagnosís.</i>	ibid.
IV.	<i>Prognosis.</i>	145
V.	<i>Curatio.</i>	146
	<i>Cautellæ necessariæ in mulieribus pertractandis, quæ menstruatio- nem tandem ammittunt.</i>	147
Caput XII.	<i>De Μεντορραγία seu Furore uterino.</i>	148
§. I.	<i>Descriptio.</i>	ibid.
II.	<i>Causæ.</i>	150
III.	<i>Differentiæ.</i>	154
IV.	<i>Symptomata.</i>	155
V.	<i>Diagnosís.</i>	156
VI.	<i>Prognosis.</i>	157
VII.	<i>Curatio.</i>	158
VIII.	<i>Remedia quædam, quæ adversus Furorem uterinum commendan- tur.</i>	163

LIBER II.	D E morbis , qui a diversa uteri conditione dependen-	
Caput I.	<i>De uteri inflammatione .</i>	167
§. I.	<i>Descriptio , & Differentiæ .</i>	ibid.
II.	<i>Causæ .</i>	ibid.
III.	<i>Differentiarum explicatio .</i>	168
IV.	<i>Symptomata .</i>	170
V.	<i>Diagnosıs .</i>	171
VI.	<i>Prognosis .</i>	173
VII.	<i>Curatio .</i>	174
	<i>Cautellæ generales , quæ hujus inflammationis medellam respec-</i>	176
	<i>ciunt .</i>	177
	<i>Praxis a nonnullis Auctoribus proposita , infirma tamen , vel sus-</i>	179
	<i>pecta .</i>	181
Caput II.	<i>De Gangræna , seu uteri sphacelo .</i>	181
§. I.	<i>Descriptio , & Differentiæ .</i>	ibid.
II.	<i>Causæ .</i>	182
III.	<i>Differentiarum explicatio .</i>	183
IV.	<i>Symptomata .</i>	184
V.	<i>Diagnosıs .</i>	186
VI.	<i>Prognosis .</i>	187
VII.	<i>Curatio .</i>	ibid.
	<i>Remedia proposita adversus uteri Gangrænâ , quibus tute uti</i>	190
	<i>potest .</i>	192
Caput III.	<i>De Aposthemate , seu uteri abcessu .</i>	192
§. I.	<i>Descriptio , & Differentiæ .</i>	ibid.
II.	<i>Causæ .</i>	193
III.	<i>Symptomata .</i>	196
IV.	<i>Diagnosıs .</i>	197
V.	<i>Prognosis .</i>	ibid.
VI.	<i>Curatio .</i>	198
Caput IV.	<i>De uteri Ulcere .</i>	199
§. I.	<i>Descriptio .</i>	ibid.
II.	<i>Causæ .</i>	200
III.	<i>Differentiæ .</i>	ibid.
IV.	<i>Symptomata .</i>	201
V.	<i>Diagnosıs .</i>	203
VI.	<i>Prognosis .</i>	204
VII.	<i>Curatio .</i>	205
	<i>Medendi ratio , & remedia generaliora circa omnes uteri ulce-</i>	ibid.
	<i>rum species .</i>	207
	<i>Methodus idonea instantibus ulceribus , quæ prænunciant continen-</i>	
	<i>tes , aut crebri uteri dolores , vel anomalum cruoris , aut albi</i>	
	<i>fluoris effluvium .</i>	207
	<i>Tutior methodus & efficacior adversus uteri ulcus confirmatum ,</i>	ibid.
	<i>sed simplicex .</i>	
	<i>Methodus</i>	

	<i>Methodus curandi ulcera uteri Venerea .</i>	209
	<i>Curatio palliativa ulcerum uteri incurabilium .</i>	210
	<i>Remedia nonnulla proposita adversus uteri ulcera .</i>	211
Caput V.	<i>De uteri Syrrho .</i>	212
§. I.	<i>Descriptio, & Differentia .</i>	ibid.
II.	<i>Causæ .</i>	213
III.	<i>Differentiarum explicatio .</i>	214
IV.	<i>Symptomata .</i>	215
V.	<i>Diagnosıs .</i>	216
VI.	<i>Prognosis .</i>	ibid.
VII.	<i>Curatio .</i>	217
	<i>Methodus curativa .</i>	ibid.
	<i>Methodus palliativa .</i>	220
	<i>Regimen , cui studere oportet , ne syrrhus in cancrum degeneret .</i>	221
	<i>Remedia specifica, adversus uteri syrrhum .</i>	ibid.
Caput VI.	<i>De pseudo-Syrrho, seu Steatmate, & Sarcomate uteri .</i>	222
Art. I.	<i>De Steatmate , & Tumoribus uteri membrana inclusis , seu cysticis .</i>	ibid.
§. I.	<i>Descriptio, & Differentia .</i>	ibid.
II.	<i>Causæ .</i>	223
III.	<i>Symptomata .</i>	224
IV.	<i>Diagnosıs .</i>	ibid.
V.	<i>Prognosis .</i>	225
VI.	<i>Curatio .</i>	ibid.
Art. II.	<i>De uteri Sarcomate .</i>	226
§. I.	<i>Descriptio .</i>	ibid.
II.	<i>Causæ .</i>	227
III.	<i>Symptomata .</i>	ibid.
IV.	<i>Diagnosıs .</i>	228
V.	<i>Prognosis .</i>	229
VI.	<i>Curatio .</i>	ibid.
Caput VII.	<i>De uteri Cancro .</i>	230
§. I.	<i>Descriptio .</i>	ibid.
II.	<i>Differentia .</i>	231
III.	<i>Causæ .</i>	ibid.
IV.	<i>Symptomata .</i>	232
V.	<i>Diagnosıs .</i>	233
VI.	<i>Prognosis .</i>	ibid.
VII.	<i>Curatio .</i>	234
	<i>Remedia proposita adversus uteri Cancrum .</i>	236
Caput VIII.	<i>De uteri Hydrope .</i>	240
§. I.	<i>Descriptio, & Differentia .</i>	ibid.
II.	<i>Causæ Hydropis cum ascite .</i>	ibid.
III.	<i>Causæ Hydropis cum hydatidibus .</i>	442
IV.	<i>Symptomata .</i>	244
V.	<i>Diagnosıs .</i>	ibid.
VI.	<i>Prognosis .</i>	245

	VII. <i>Curatio.</i>	ibid.
Caput IX.	<i>De uteri Tympanitide.</i>	249
§. I.	<i>Descriptio.</i>	ibid.
Art. I.	<i>De Tympanitide vera, seu continenti.</i>	250
§. I.	<i>Causæ.</i>	ibid.
	II. <i>Symptomata.</i>	251
	III. <i>Diagnosıs.</i>	252
	IV. <i>Prognosis.</i>	ibid.
	V. <i>Curatio.</i>	253
Art. II.	<i>De Tympanitide vaga.</i>	254
§. I.	<i>Causæ.</i>	ibid.
	II. <i>Diagnosıs, Prognosis, & Curatio.</i>	ibid.
Art. III.	<i>De uteri expansione parietum augmento.</i>	255
Caput X.	<i>De uteri descensu.</i>	256
§. I.	<i>Descriptio, & Differentiæ.</i>	ibid.
	II. <i>Causæ.</i>	ibid.
	III. <i>Symptomata.</i>	258
	IV. <i>Diagnosıs.</i>	259
	V. <i>Prognosis.</i>	ibid.
	VI. <i>Curatio.</i>	260
Caput XI.	<i>De morbis, qui uteri descensum respiciunt.</i>	263
Art. I.	<i>De Sarcomate, aut carnea vaginæ excrescentia, ac de productione, aut prolapsu partis alicujus intimæ vaginæ membranæ.</i>	ibid.
§. I.	<i>Descriptio descensus Vaginæ.</i>	264
	II. <i>Causæ.</i>	ibid.
	III. <i>Symptomata.</i>	265
	IV. <i>Diagnosıs.</i>	ibid.
	V. <i>Prognosis.</i>	266
	VI. <i>Curatio.</i>	ibid.
Art. II.	<i>De uteri obversione in eo prolapsus statu.</i>	268
Caput XII.	<i>De morbis Ovaria, & Tubas afficientibus.</i>	ibid.
Art. I.	<i>De morbis qui ad Ovaria pertinent.</i>	ibid.
§. I.	<i>Describuntur Ovaria, eorumque morbi.</i>	ibid.
	II. <i>Causæ.</i>	270
	III. <i>Symptomata.</i>	271
	IV. <i>Diagnosıs, & Prognosis.</i>	272
	V. <i>Curatio.</i>	ibid.
Art. II.	<i>De morbis Tubas afficientibus.</i>	273
§. I.	<i>Describuntur Tubæ earumque morbi.</i>	ibid.
	II. <i>Causæ.</i>	274
	III. <i>Diagnosıs, & Prognosis.</i>	275
	IV. <i>Curatio.</i>	ibid.
Caput XIII.	<i>De passione hysterica, seu uteri suffocatione.</i>	276
§. I.	<i>Descriptio.</i>	ibid.
	II. <i>Causæ.</i>	277
	III. <i>Symptomata.</i>	281

C A P I T U M.

	<i>Quatuor Symptomata pathognomonica.</i>	xvii
	<i>Symptomata, quæ abdomen respiciunt.</i>	ibid.
	<i>quæ thoracem aggrediuntur.</i>	282
	<i>quæ caput afficiunt.</i>	283
	<i>quæ totum corpus.</i>	ibid.
IV.	<i>Diagnosıs.</i>	285
V.	<i>Prognosis.</i>	286
VI.	<i>Curatio.</i>	288
	<i>Medendi ratio intra paroxysmum.</i>	ibid.
	<i>extra paroxysmum.</i>	289
	<i>Remedia specifica, quæ adversus histericos vapores a nonnullis commendantur.</i>	292
		294



CATALOGUS

CHRONOLOGICUS

Auctorum, qui de Morbis Mulierum scripserunt.

EPOCHA PRIMAE.

			Ann. ant. C. N.	Pag.
	Hippocrates	Cous	432	300
	Aesclepiades	Bithynus	96	ibid.
			Ann. a C. N.	
Aurelius Cornelius	Celsus	Romanus	35	301
Claudius	Galenus	Pergamenus	200	ibid.
	Soranus	Ephesus	250	302
	Areteus	Cappadocus	350	ibid.
	Oribasius	Sardus	363	303
	Aetius	Mesopotamus	380	304
	Paulus	Eginetta	420	ibid.
	Moschionus		500	ibid.
	Cleopatra	Ægyptia Reg.	800	305
Theodorus	Priscianus	Latinus	800	ibid.
	Nonus	Grajus	915	ibid.

EPOCHA SECUNDA.

Johannes	Avicenna	Mahumetanus	1000	310
Haly	Setapionus	Arabus	1060	311
Abubeter	Abbas		1066	ibid.
	Rhazes	Arabus	1070	ibid.
	Constantinus	Cartagenus	1070	ibid.
	Albucasis	Mahumetan.	1085	312
	Avenzoar	Vandal. natus	1100	ibid.
	Averroës	Mahumetan.	1170	313
Nicolaus	Bertrutius	Bononiensis	1250	ibid.
	Trotula	Salernitana	1250	ibid.
		De Saxonia	1290	314
Enricus	Gordonius	Monspessulan.	1305	ibid.
Bernardus	Platearius	Salernitan.	1350	ibid.
Johannes	de Taranta	Lusitanus	1418	315
Valescus	Gatinaria	Papiensis	1440	ibid.
Marcus	Guainerius	Papiensis	1440	ibid.
Antonius				

Anto-

Antonius	Cermesonus	Patavinus	Ann. C. N.	
Johannes Michaelis	Savanarola	Patavinus	1456	316
Galleatius	de S. Sophia	Patavinus	1486	ibid.
Alexander	Benedictus	Veronensis	1490	ibid.
			1500	ibid.

E P O C H A T E R T I A .

Leonellus	de Victoriis	Faventinus	1525	321
Jafon	Pratenfis	Zelandus	1530	ibid.
Ludovicus	Bonacciolus	Florentinus	1536	ibid.
Dionysius	Fontanonus	Monspessulan.	1540	322
Nicolaus	Rocheus	Gallus	1540	ibid.
Leonhardus	Fuchsius	Rhætus	1548	ibid.
Jacobus	Rueff	Tigurinus	1554	323
Jacobus	De la Boe	Sylvius Ambianus	1554	ibid.
Johannes	Fernelius	Clarimontanus	1554	ibid.
Balduinus	Ronsæus	Gandavensis	1555	324
Johannes Baptista	Montanus	Veronensis	1555	ibid.
Petrus	Bayro	Taurinensis	1558	ibid.
Victorinus	Trincavellius	Venetus	1560	ibid.
Gulielmus	Rondeletius	Monspessulan.	1560	325
Thadæus	Dunus	Locarnensis	1565	ibid.
Johannes	VVier	Graviensis	1565	ibid.
Johannes	Guntherius	Andernachus	1570	326
Giovanni	Marinello	Veneto	1574	ibid.
Ambrosius	Paræus	Lavallensis apud Cænomanos	1575	ibid.
Johannes	Le Bon	Metropolitanus	1577	ibid.
Ludovicus	Mercatus	Vallisoletanus	1580	327
Johannes	Liebaut	Divisiensis in Sequana	1582	ibid.
Hieronymus	Mercurialis	Foroliviensis	1582	ibid.
Martinus	Akakia	Parisiensis	1583	ibid.
Felix	Platerus	Rauracus	1583	ibid.
Mauritius	Cordæus	Remus	1584	328
Albertus	Botonus	Patavinus	1585	ibid.
Gaspar	VVolphius	Tigurinus	1586	ibid.
Hieronymus	Capivacius	Patavinus	1586	329
Petrus	Forestus	Alchemarianus	1590	330
Johannis Georgius	Schenckius	Friburgensis	1590	ibid.
Alexander	Massarias	Vicentinus	1595	ibid.
Israel	Spachius	Argentinus	1597	331
Gulielmus	Baillonius	Parisinus	1600	ibid.
Rodricus	A Castro	Lusitanus	1603	332
Hercules	Saxonia	Patavinus	1603	ibid.
Emilius	Campolongus	Patavinus	1604	ibid.
Johannes	Hucher	Bellovacus	1606	ibid.
Johannes	Varandæus	Nemauciensis.	1606	323
Johannes	Heurnius	Ultrajectensis	1607	ibid.
Lazarus	Pè	Gallus	1609	ibid.
Hermanus	Corbeus	Francfortinus	1620	ibid.

			Ann. a C. N.	Pag.
Gregorius	Horstius	<i>Tergoviensis</i>	1625	334
Melchior	Sebizius	<i>Argentinus</i>	1627	ibid.
Franciscus	Ranchin	<i>Monspessulan.</i>	1627	ibid.
Johannis	Prevostus	<i>Rauracus</i>	1629	335
Michael	Doringius	<i>Uratislaviensis</i>	1630	ibid.
Claudius	Deodatus		1630	ibid.
Gulielmus	Fabritius	<i>Hildanus</i>	1630	ibid.
Daniel	Senertus	<i>Uratislaviens.</i>	1631	ibid.
Zacutus		<i>Lusitanus</i>	1640	336
Nicolaus	Fontanus	<i>Amstæledamensis</i>	1640	ibid.
Lazarus	Riverius	<i>Monspessulan.</i>	1640	ibid.

E P O C H A Q U A R T A.

Jacobus	Primerosius	<i>Burdegalensis</i>	1650	345
Petrus Michael	de Heredia	<i>Complutumanus</i>	1660	ibid.
Antonius	Meniotus	<i>Parisiensis</i>	1667	346
Franciscus	de le Boe	<i>Sylvius Hanoveniensis</i>	1667	ibid.
Thomas	Villifius	<i>Anglus</i>	1667	ibid.
Nathanael	Highmorus	<i>Oxonienfis</i>	1670	347
Marius	Meurdrach	<i>Alemanus</i>	1676	ibid.
Henricus	Celarius	<i>Helberstandiensis</i>	1677	ibid.
Paulus	Sorbeus	<i>Hispano-Belga</i>	1678	ibid.
Philippus Georgius	Grulingius	<i>Germanus</i>	1680	348
Michael	Ettemulerus	<i>Lypsiensis</i>	1682	ibid.
Thomas	Syndenhamius	<i>Anglus</i>	1682	ibid.
Johannes	Garmerus	<i>Hamburgensis</i>	1684	349
Johannes	Doleus	<i>Hassianus de Geismar</i>	1684	ibid.
Nathanael	Sprye		1685	ibid.
Gualtierus	Charleton	<i>Londinensis</i>	1686	ibid.
Johannes Nicolaus	Pfiser	<i>Germanus.</i>	1691	350
Johannes Georgius	Sommers	<i>Germus</i>	1691	ibid.
Franciscus	Mauriceaus	<i>Parisiensis</i>	1694	ibid.
Bernardus	Connor	<i>Anglus, vel Hibernus</i>	1695	ibid.
Philippus	Fravendorffer	<i>Austriacus</i>	1696	351
Chistophorus	Hellyvigs	<i>de Konigsuissen</i>	1700	ibid.
Christianus Johannes	Langius	<i>Pegaviensis</i>	1700	ibid.
Johannes	Freind	<i>Londinensis</i>	1703	ibid.
Johannes	Santorinus	<i>Venetus</i>	1705	ibid.
Hermanus	Boerhaavius	<i>Vianensis</i>	1708	352
Joannis Gabriel	Rudolphus	<i>Battavus</i>	1708	ibid.
Petrus	Fresart	<i>Leodiensis</i>	1712	ibid.
	Anonymus		1715	ibid.
Johannes Antonius	Terenzoni	<i>Pisanus</i>	1715	353
Johannes	Goldhammers		1717	ibid.
Gaspar	Schoters		1721	ibid.
Henricus	Von Sanden		1722	ibid.
Georgius Ernestus	Stallius	<i>Hallensis Battavus</i>	1724	ibid.
	Le Tellier	<i>filius Parisiensis</i>	1730	354

Anto-

INDEX CRONOLOGICUS.

xxi

			Ann. a C. N.	Pag.
Antonius Celestinus	Cocchiùs	Romanus	1730	ibid.
Johannes Augustus	Oehemens		1734	ibid.
Georgius Philippus	Nenterus	Argentinus	1735	ibid.
Fridericus	Hoffmanus	Hallensis Borruſſus	1740	355
J.	R --- n	Londinensis	1743	356
Ricardus	Mead	Londinensis	1751	ibid.
Jacobus	Lazeme	Monſpeſſulan.	1753	ibid.
Gerardus	Fitz-Gerald	Monſpeſſulan. origine Hibernus.	1758	357



I C O N E S

Explicantur quæ internam uteri faciem ostendunt.

I Psæ ex utero fuerunt effictæ mulieris nono gestationis mense disectæ, quando vasa tam vermicularia cum lactea valde conspicua erant; verum ut sensibiliores fierent ipsas bis majores delineare curarunt quam in cadavere reperierunt.

Animadverendum tamen est intimam uteri tunicam hic translucidam putari ut subtusposita vermicularia videri queant ex ea parte quæ musculari tunicæ adhærent; alias Icones duplicari necessum esset.

F I G U R A I.

Vasa nonnulla repræsentat arteriosa, & venosa per internam uteri faciem pereptantia quæ in menstruationis negotio maximam partem habent.

A Truncus arterie cum adnexis vasis capillaribus quæ postquam (sis lineam, G F) miris circumvolutionibus per uteri substantiam pereptarunt, anastomosium ope pluribus lateralibus, & intermediis ramis cum venosis capillaribus intertexuntur ramificationibus (trans lineam FG indicatis) quæ tandem in communem confluunt.

B Truncum venosum.

C Rotunda foraminula in concursu earum ramificationum locata ubi originem habent appendices venosæ quas infra explicabimus.

D Appendices venosæ, seu extremitates utriusque generis simul confluentium capillarum vasorum citra fluxum ex illa tantum parte reclusæ quæ parentem truncum respicit, ex opposita vero impervie; eæ tamen producuntur, & ex utraque parte patulæ fiunt ut perfosa intimiori uteri tunica in ejusdem cavitatem catamenia effundant.

E Vasa lactea, seu vermicularia uteri (infra explicanda) quæ genitores appendicum ramos amplectuntur ipsosque fluente sanguine constringunt, ut fusius Lib. I. Cap. I. II. & III. ostendemus.

F I G U R A II.

Vas illud ostendit lacteum (glandulam dicerem fimbriatam) ad lac uterinum fecernendam a natura fabrefactam.

A Vesicula, seu melius pelvis, est exigua quæ a novem, aut decem vermicularibus vasculis, ter, quaterve lineas oblongis lacticinosis humo-

humorem recipit, quemque menstrui tempore exuberantem per excretorium ductum in uterum effundit.

B *Vasa vermicularia quæ in pelvim nuperrime indicatam lactinosum ab ipsis liquorem secretum devehunt.*

C *Vasa capillaria lymphatica quæ ab illa pelvi liquidiorum laticis partem hauriunt, eamque amplioribus afferunt lymphaticis.*

FIGURA III.

Lacteum pariter vas repræsentat a præcedenti haud ab simile cujus vermicularia ut in statu naturali magis implexa conspiciuntur.

FIGURA IV.

Portionem effingit intimioris uteri tunicæ quæ superius expositam vasorum compagem cooperit in qua patent.

A *Appendices venosæ quales circa finem gestationis apparent, quæ tamen catameniis fluentibus exiguiore sunt, & citra menses vix conspiciuntur, ut*

B *Minima foraminula æmulentur.*



NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova

A Vendo veduto per la fede di Revisione, ed Approvazione del P. Fr. Filippo Rosa Lanzi Inquisitor General del Santo Officio di Venezia, nel Libro intitolato manoscritto *Tractatus de Morbis Mulierum*, in quo solida Theoria praxi certiori & experientiis comprobata complectitur: accedit Catalogus Cronologicus Medicorum, quorum &c. Auctore Joanne Astruc, Prof. Reg. &c. Gallico Sermone conscriptus, nunc Latino versus, non v'esser cos' alcuna contra la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a Niccolò Pezzana, che possi esser stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 30. Maggio 1763.


{ Sebastian Zustinian Refor.

{ Polo Renier Refor.

{ Alvise Valareffo Refor.

Registrato in Libro a Carte 167. al Num. 890.

Davidde Marchesini Segr.



TRACTATUS DE MORBIS MULIERUM.

LIBER PRIMUS

De morbis Mulierum, ex menstruatione

CAPUT PRIMUM.

De uteri structura, appendicibus venosis, & vasis vermicularibus.

§. I.

Descriptio uteri generalior.



Usiorem, atque completam uteri descriptionem exhibendi, neque locus hic est, nec instituti postulat ratio. Hinc quæ de situ ejusdem; quæ de figura, mole, partibus, appendicibus, & aperturis; quæ de vasis sanguineis, aut lymphaticis; quæ de nervis tandem, & tunicis Anatomici detexerunt, satis lectoribus, sive cadaverum inspectione, sive librorum evolutione, perspecta ponimus. Neminem, itaque, latere censebimus.

1. Uterum vesica, & intestino recto interjacentem pelvi contineri, ima videlicet hypogastri parte, quam ossa innominata, & sacrum componunt, cujus marginem, foetum gerens, uterus tantum superat.

2. Figura pyrum referre apice obverso in virginibus non nihil introrsum depressum, in Mulieribus pene sphericum nondum utero gestantibus.

3. Uteri latitudinem a dextera ad sinistram partem duplici circiter pollice absolvi; crassitiem ab antica ad posticam uno; longitudinem a summa, ad imam tribus, in iis quæ numquam, paullo magis in iis, quæ pepererunt.

4. Uterum virgineum, vel adultum vix amygdalum capere, citra gestationis tempus, quo unum vel duo sæpe foetus recipit.

5. Distingui utero partem supremam interne ad lumbos inclinatam, quæ latior est, & *fundus* appellatur; tum inferiorem, anterioremque pubi propinquam, quæ arctior *collum* audit.

Astruch de Morbis Mulierum.

A

6. Ute-

6. Uteri collum, quem tegit peritonæum ejus processu, vesicæ, & ossi pubis antèrius necti; intus recto intestito, & ossi sacro; ad latera cum ileis conjungi.

7. Fundum utrinque firmare quatuor ligamenta, quorum bina, e peritonæi appendicibus producta, *ligamenta lata*, seu *aliformia* solent appellari; hæc a posteriori uteri parte originem habent, nectunt ovaria, sustinentque tubas; cetera bina *ligamenta rotunda*, seu *teretia* dicta ex uteri lateribus, circa originem tubarum oriuntur, & peritonæo obiecta per annulos musculorum abdominis transeunt, & ossibus pubis extrinsecus inferuntur.

8. Uteri collum in propinqua vaginæ cavitate protundi, canis catelli rostrum effingens rima instructum, cum vagina communicanti, quam *uteri orificium* dicunt.

9. Fundum ex utraque parte tubarum extremis perfodi, quæ, in ejus cavitate patula, usibus infra enunciandis inserviunt.

10. Uteri diversis partibus arteriosas, & venosas ramificationes præbere, & recipere vasa spermatica, hypogastrica, & hæmorrhoidalia.

11. Vasorum lymphaticorum magnam copiam egredi ex utero, quæ in conglobatis inferuntur glandulis ad aortæ descendens bifurcationem sitis, a quibus lymphæ in glandulas, meseraicas transducitur, ac tandem in Piquetianam cisternam evehitur, ut lymphæ mos est.

12. Nervos accipere plurimos ab intercostalibus, & paribus spinæ, circa lumbos, & foramina ossi sacri prodeuntibus.

13. Tandem uterum triplici tunica conflari, quarum externam producit peritonæum, quod fundum, & latera uteri foris operit, at in se reversum cum partibus vicinis ejusdem adhæsiões constituit; secunda carnea, & muscularis est fibris plurimis circularibus spiralibus, longitudinalibus, transversis, & obliquis invicem interfecantibus, quæ potissimum uteri crassitudinem faciunt; tertia omnium subtilissima, carnea, sive potius tendinea scabra est, ex ea parte, quæ carneæ adhæret; altera vero facie æqualis est, & levigata, ea parte excepta, quæ orificium induit, ubi anfractus oblique transversi apparent, in quibus hydatides, seu vesiculas sphericas lymphæ saturas reperies, quas *Martinus Naboth* Medicus Lypsiensis pro ovulis foetui fovendo perperam habuit.

§. II.

Uteri specialis sanguineorum vasorum descriptio.

His explicitis reliqua sunt *duo* magni ponderis, adhuc ignota nunc specialiter perpendenda: *primum* ad conformationem attinet, & distributionem vasorum sanguineorum, quæ inter mediam, & intimam uteri tunicam repunt; *alterum* ad structuram pertinet vasorum quorundam peculiaris generis, quæ inter easdem tunicas reperiuntur, ibidemque ductuum funguntur officio, & naturam humoris secernendi ostendit.

Uteri vasa arteriosa illum pereptando, in plures ramos divisa, & subdivisa tantum augentur numero, & minuuntur diametro, ut tandem capillarium indolem assumant, quæ undique serpendo per varias uteri tunicas multiplici methodo flectunt, deflectuntque viam, majori tamen copia, & implicatiori contextu per carnosam, & nerveam reptant tunicas.

Hujusmodi arteriosæ ramificationes multiplici subdivisione pene oculos effugiunt, at sedulo perspectis, injectionis præsertim ope, observaveris, quamvis in novos canaliculos desinere cava, cylindræos, quorum structura æqualis, nonnihil amplior tamen, & patentior est ad instar priorum vasorum seu uteri venarum capillarium divisionem.

Posteriores hæ ramificationes, eo magis, atque magis implicantur postea quam sensim, sensimque simul coalitæ repetito nexu ramos efformant successive ampliores, qui tandem ad truncos venarum uteri confluunt; præter hanc directam venarum ramificationem, qua denique communem truncum aggrediuntur, laterales innumeros inter eas, & cum exilioribus arteriis anastomoses conspiciuntur, quæ injectione tumentes reticulum densissimum progignunt, per illos anfractus sanguis ab arteriis redux quaqua versus viam flectit, ut natura, multiplici hac communicatione affluentis sanguini multiplices videatur semitas parasse.

Usque adhuc in utero sanguineorum vasorum distributio, aut nihil distat ab ea ceterarum corporis partium, aut maxima vasorum, venarum præsertim, implicatione, & anastomosium frequentiori commercio tantum differt.

At quod summum discrimen parit in circulatione per uterum sanguinis, processus sunt, seu appendices quædam venarum perpendiculares, quæ cum venis unam crassitudinem retinentes intimam tunicam perfodiunt, & in interiori uteri superficie patefcunt, hæc originem habent a concursu anastomosium, ubi vasa ad angulum coeunt, confluitque cruor, sæpe etiam a lateribus hujusmodi venarum, aut anastomosium erumpunt.

Hujusmodi appendices in gravidis tantum, postremis præsertim mensibus, sensibiles fiunt, tunc per quatuor, vel quinque lineas prominent, ubi *placenta* utero adhæret, & suis processibus aptos placentæ tabulos sibi paratos intrant; Hinc ejusdem cum utero adhæfioni magnopere favent; hinc tandem per patulas extremitates inter placentæ cellulas sanguinem manant, quia venis umbilicalibus receptus ad embrionem evehitur.

Tunc appendices illæ (variā tamen crassitudinem præferrentes) ita conspicuæ fiunt, ut non solum oculis facile perspicui, verum specillo facili negotio per lumen earum usque ad venas a quibus oriuntur pervadi possint, at utero ad naturalem magnitudinem redacto, præter hoc gestationis tempus illas incassum permeare tentabimus, nam cum venis simul coarctantur ita, ut exilitatis ergo oculos penitus effugiant.

Has placentam invadentes in eam sanguinem effundere, & in utero patulas catamenia producere judicavimus; iis tamen circumstantiis exceptis ostium, earum uteri spectans, exacte claudunt, quod, quo mechanismo fiat cum ignoremus, cuique licuerit pro phænomeni explicatione, aut valvulas orificio extrinsecus applicatas, vel quod magis arridet, labiorum coeundi nixum, vel simplicem etiam fibrarum circularium constrictionem habere.

Verum enim quidquid eorum pro causa cognoveris patet sanguinem citra gestationis, aut menstruationis statum per eas appendices erumpere nequi; sanguis autem quovis alio tempore ibi affluens, aut stagnare, aut quod magis verisimile est, & legibus circulationis consonum, debet lentissime renovari, & per successivas circulationes directas, quæ in venis fit sensim, sensimque lateralibus appendicibus communicari; eodem pene modo, ac motus aquarum per fluminis alveum ripæ sinibus communicatus in iis contentum fluidum continenter removet, atque innovat.

§. III.

Descriptio vasorum lacteorum, seu vermicularium uteri.

Alterum vasorum genus per intimam uteri tunicam repit, quod tamen posterioribus gestationis mensibus ut de appendicibus indicavimus, oculis etiam facile conspicuum est.

1. Si obverteris uterum mulieris gestationis fine, aut partu defunctæ leviter internam tunicam abstergendo, ubi placenta abfuit, atque tunica magis compingitur ibi leni pressione guttulas erumpere observabis lacticinosi humoris per tubulos, sive foramina pene imperceptibilia, quos totidem ductus vasorum hujusmodi humoris secretioni paratorum esse videbis.

2. At si macerationis ope aceto peractæ uterum interiori tunica exueris, eam leviter scindendo, apparebit tunc carnea tunica undique innumeris interspersa vasculis exilibus, vermicularibus, albis, setæ crassitiem superantibus, tribus, quatuor, aut quinque lineis oblongis lacteo illo liquore repletis, quem vasa irritata, aut concisa stillant, eo similem ab utero superiori experimento fluenti.

Vascula hæc multiplici, ac varia implicatione cum ramificationibus venosis super allatis, anastomosis, sive lateralibus communicationibus mirifice intertextuntur & modo parallelo repunt tramite, modo superius, modo inferius diriguntur ad rectos angulos, vel obtusos se se interfecando, modo amplectuntur, & huc illuc deflectendo simul in spiras circumvehuntur. Verum quacumque incedant methodo ita venosis ramificationibus intime copulantur, ut simul pulposam substantiam constituent intra carneam uteri tunicam, & internam interjacentem.

Si cui haud molestum fuerit hæc vascula seccare, vel potius subtiliori cuspi de separare, facile patebunt glomi quidam e quaternis, vel quinis vasis: compositi, quæ undique in eodem puncto coeunt, ibique expansa, pelvis communis speciem referunt, tum ab hoc unionis centro porri, seu tubuli excretorii surgunt, qui obtegentem intimam uteri tunicam perforando, quem continent, lacteum humorem effundunt.

Alter hujusmodi vasorum limes prorsus impervius est, sed hoc nihil officit, quod ea vascula tum eorum extremis, cum lateribus non sint a subtilissimis pertusa ramificationibus vasorum lymphaticorum, quæ humorem in eorum cavitate detentum dum tenuior est per eorum orificia effundere valeant, vel si spissior fuerit, ut abs re sit integrum penetrare, subtiliorem partem saltem absorberi sinant.

Nemo itaque anceps erit, quod hæc vermicularia vascula gestationis tempore secretioni inserviant humoris cujusdam lacticinosi ab illo haud absimilis, quem vasa spermatica in testium virorum compage separant *sperma* dictum; clare pariter percipitur, dum ea magis turgent, illum in uteri cavitate erumpere pro alimento foetus, de quo plura infra dicenda.

Adhuc tamen in dubio hæremus, quibus usibus ea in mulieribus citra gestationem præsto sint, vel qualem humorem tunc secernant; at si conjecturis locus est, cognita economia animalis, & similis cum utero in mammis secretio iudicium satis validum suppeditant, hujusmodi humorem eadem indole polle-re illius, quem vesiculæ mammariæ separant, easdemque subire alterationes, a quibus, similia phaenomena producendo, a sympathica, hinc partium earum relatio oriri solet.

In puellis usque ad annum quartum, & decimum, tum uteri, cum mammarum liquor lymphæ est, vel saltem nonnullis chylosi moleculis parum inquinata; quapropter hi humores cum fluidissimi sint vasa lymphatica & suis hydrophilaciis eos facile quanti eo pervenerint valent exantlare, tunc enim neque mammarum vesiculæ, neque uteri vasa vermicularia ullam distentionem patiuntur, & illæ exiguæ, ac compressæ remanent, is durus compactus, ac contractus persistit.

At decimum, & quartum vitæ annum mulieribus attingentibus, corporis augmentum segnius fieri incipit, & sanguinis dispendium imminui, chyli præsertim, qui significationi materiam suppeditat, aucto enim tunc supra nutritionis opus chylo, qui redundat, cum uteri, & mammarum lymphæ sibi a-

naloga remixtus, eam continenter lacteam magis reddit, ut hujusmodi humorum uterque pro acquisita densitate difficillime vasa lymphatica valeat permeare, huic absortioni dicata; illi humores vero in iis pelvibus morantes, eas successiva collectione semper magis distendunt, ac proinde sinum inflari, ac mammam amabili sua rotunditate fororari videbis, tum uterum extendi, & inflari, quod in puellis pubertatem constituit, easque viro maturas reddit.

Hujusmodi æconomix animalis in mulieribus processus post conceptionem majorem alterationem patiuntur, tunc, rationibus infra enunciandis, uberrime chylus cum his humoribus permiscetur, & perfecte lacteos facit, impeditque quominus vasa lymphatica quoad crassiores saltem sui partem intrent, ideo coacervati magis, uteri, mammarumque substantiam augment, & copia suos reservatorios dilactando per excretiores ductus sibi pendunt viam in utero foetus nutriendo, in mammis infanti in lucem edito alendo.

Ex his facile patet vasa vermicularia in mulieribus nondum foetum gerentibus incassum inquiri, nam ubi exilitas visui non obesset, color, humorisque pelluciditas potis sunt, ut oculorum aciem effugiant; apparet enim tunc ea vascula mera lymphæ, parum lacticinosa, & translucida repleti, imo difficilimum, & impossibile pene erit tunc temporis ea a vasis lymphaticis, vel a simplicibus fibrarum filamentis distinguere, quæ utraque tunicas simul nectunt.

Hæc omnia clariora apparebunt figuras æneas conspicientibus, quas initio operis posui perbelle adhuc expositam uteri structuram referentes.

CAPUT II.

De menstruorum profluvio, sive de Catamenis.

§. I.

Descriptio.

Mulieres per certum vitæ cursum periodicæ sanguinis evacuationi per uterum sibi propriæ sunt obnoxia. Hæc lex ita communis est, ut vix centesimam reperies catamenis deficientem, citra morbum, vel conceptum.

I. Hujus evacuationis indicia quarto, vel quinto decimo ætatis anno in puellis solent supervenire, non desunt tamen, quibus citiora, vel segniora appareant.

II. Catamenia semel incepta uno quoque mense semel revertunt, id saltem magis crebrum est, & in nonnullis procul a morbo bis in unico mense, vel ter in duplici mense interdum revehuntur.

III. Istiusmodi enim evacuationis reditum patet mensis circiter revolutione absolvi, id tamen aliquam varietatem patitur, nam pluribus fluxus menstruus vigesimo septimo, aut vigesimo octavo die, aliis quinta quaque hebdomada est recidivus.

IV. Ejusdem diuturnitas inconstans valde est, raro tertium diem non attingit, vel sextum superat, ut si intra hos limites fluxus non persistat pro morbo habeatur.

V. In eo tres gradus distinguuntur initium videlicet, & incrementum; status; decrementum, & finis, qui per æqualia intervalla dividuntur, integri cursus diuturnitati proportionalia, raro enim secundum naturæ leges repente erumpunt, vel fluere sinunt catamenia.

VI. Difficillimum est in unaquaque evacuatione determinare quantum sanguinis excernatur; hoc enim in singulis subjectis, & mensibus differre solet, plerumque intra octo, aut sexdecim uncias differentia consistit, non desunt tamen, quæ absque morbo plus, minusve sanguinis amittant.

VII. Certam sapissime rationem sequuntur catamenia methodicam valde, *Astruch de Morbis Mulierum.* A 3 quæ

quæ initium, & finem eorum spectat, nihilo tamen minus in nonnullis sero definunt, quibus cito increbuerunt, & contra.

VIII. Plerumque duratio quantitati fluentis sanguinis rationem habet, animadvertitur enim unoquoque cursu, quibus uberrime etiam diutius menses fluere, & contra, sunt etiam, quibus post duplicem methodicam menstruationem, tertia superadditur diuturna magis, atque abundans.

IX. Quamvis menses sine intermissione continenter excurrant, neque iterum appareant qui semel constiterunt, reperiuntur tamen nonnullæ, quibus postquam aliquantisper fluxere, repente sistunt, ac duobus, vel tribus diebus transactis remittuntur denuo, per aliquod temporis spatium.

X. Sanguis menstrualis in sanis mulieribus optimæ crasis, & salubris est; quidquid enim de ejusdem deleteria indole, & acrimonia asserunt, ægrotantium refertur in quibus vel infectus est sanguis, vel ulcus uterum deturpat, vel cruor in eo irrupens corrumpitur; ast præter hunc triplicem casum multum erit subducendum de morboris effectibus qui menstruo sanguini tribuitur.

XI. Catamenia præcedit plerumque, & prosequitur lymphaticum effluvium, quod diutinum plus, minusve, atque uberrimum est in ratione uteri, ac temperamenti constitutionis; dantur tamen sanæ mulieres, quibus continenter rubens sanguis fluit.

XII. Utero graves posterioribus præsertim mensibus hujusmodi fluxu deficiunt, etiam si in nonnullis ad tertium usque mensem persistat, nutrices pleræque eo carent, tum laboriosæ mulieres, & rusticæ absque noxa.

XIII. Menstrua prænunciant futura, pubis, inguinum, ac lumborum dolor; pudendorum inflatio, vel rubræ papulæ; vaginæ tensio, calor, sensusque auctus; hemorrhoidum tum externarum, cum internarum tumor; mictio deinceps, & ardens; urinæ turbidæ ac mora facile corruptibiles; mammae denique duræ turgentes, & hysterica suffocationes; capitis gravedo, atque vertigo; sopor, vel pervigilium; per subsultus, tandem somni solutio, aut molesta insomnia &c. Hæc omnia prima vel secunda die pati solent mulieres ante eruptionem; raro enim per quinos dies præcedunt.

XIV. Hæc denique eruptio eadem methodo constanter revertit ad quadragesimum usque, quadragesimum quintum, vel quinquagesimum ætatis annum, donec sponte desinat, incertusque finis est ut initium fuisse ostendimus in ratione temperamenti, vitæ gestæ, morborum indolis quos passæ sunt, aut climatis quo degere solebant.

§. I I.

Causæ.

I. **Q**Uæ primum causarum indagini obijcitur difficultas locum spectat e quo sanguinem fluere soleat, alii enim ex uteri fundo, alii ex intima vaginæ tunica erumpere arbitrati sunt, utramque sententiam firmant auctoritas, & experientia; observationes tamen, quæ menstrua ex uteri cavo stilare defendunt, ita conspicua sunt, & a Claris viris instituta, ut nullum dubitationi locum superesse videatur.

I. (a) *Vesalius*, (b) *Peyerus*, (c) *Mauriceus*, (d) *Littrius*, atque (e) *Schurigius* animadvertisse affirmant sanguinem ab uteri orificio scaturire, quod perbel-le conspexerunt in illis in quibus ipse ad pudenda usque erat prolapsus, poste-

(a) *De humani corporis fabrica*. Lib. V. cap. 15. (b) *In Ephemerid. Germanic.* Dec. II. ann. 1. Observ. 84. (c) *Observations sur la grosseffe*, Observat. 96. (d) *Histoire de l'Academie Royale des Sciences Année 1729*, p. 16. (e) *Parthenologia* Sect. II. Cap. 2. §. 4.

posteriores duo addunt, neque guttulam e vulva oriri cujus interna superficies tunc facile inspicere potest.

2. (f) Spigelius ait in mulieribus catameniorum tempore diceffis reperiri internam uteri tunicam undique perfosam foraminulis fundum versus praesertim, valde conspicuis citra menstruationem vix patentibus, quae tunc cruorem effundebant.

3. (g) Mauriceus asserit in sectione mulieris cujusdam delictorum causa, adhuc fluentibus menstribus, suspensae invenisse uteri fundum exiguis grumis instersum coagulati sanguinis, & foraminula illa patentiora ibi quam circa collum quorum ora obducebat grumatus sanguis hic persistens, idque pluries animadvertit, atque suis scriptis (h) alibi defendit.

4. (i) Littrius mulieres comperit profluente sanguine obitas quarum uterus turgens & crassior erat, ibique vasa sanguifera humore quo uteri cavum irrigare debebant imbuta, tum ejusdem intimior pars undique tubulis instructa patenter sanguine repletis, quem levi pressione ipsi versabant.

5. Clarissimus Morgagnus (k) tandem repetitis observationibus ostendit in mulieribus in eo statu dissectis fundum uteri reperisse sanguineis undique maculis distinctum, e quibus vel mediocri expressione cruentas guttas elicere nihil prorsus negotii erat, quod cum in vagina pari expressionis vi tentaretur nihilominus proficiebatur; idque alibi (l) confirmat Santorini auctoritate, & auditorum suorum testimonio.

Tot enim experimentis sententiam innixam nemo etiam alias praecipuus audebit contendere ex uteri nempe fundo non e vagina menstrua profluere id rationi non solum, verum cognitis matricis usibus valde consonum videtur: nam

1. Per uterum confertissima repunt, & maxima copia vasa sanguifera, ergo ex iis menstrua prodibunt.

2. Patet ut infra clarius explicabimus hujusmodi sanguinem foetui in utero nutritionem praebere, id ergo uterus suppeditabit.

3. Videtur Lochia post partum ex iisdem fontibus stillare, ac menses citra gestationem fluunt, quod cum uteri vasa peragant, eadem ergo catamenia simul producere verisimile est.

4 Tandem sanguinis jacturae quae utero gravi jure sapissime aborti metum inducunt ex utero prodeunt, tunc enim sanguis embrionem alere ineptus evaderet, si e vagina prodiret, quare circa menstrui sanguinis originem omnia confirmant, quod observationes supra docuerunt.

Nihilo tamen minus numquam negare statuimus uno eodemque tempore haud infrequenter tum uterum, cum vaginam menstrua suppeditare; similis enim harum partium textura, una pene in his sanguinis distributio, ac summa vasorum conferentia postulant, ut sanguis in plethoricis praesertim ex utraque parte sibi aperiat vias, autumo etiam sanguinem aliquoties e sola vagina invite fluere, dum aliqua de causa ex utero erumpere impeditur; ex hoc rationem facile invenies cur nonnullos observasse (m) affirmant in dissectis sub menstruatione emortuarum cadaveribus uterum maculis cruentis, aut effluviis indiciis prorsus carere, vaginam vero sanguine refertissimam esse; ex his simul constat cur in gravidis sanguis absque noxa, vel aborti metu per trinos menses, vel integram gestationem saepe erumpat; ea tamen nihil favent contrariae sententiae,

A 4

tia,

(f) De humani corporis fabrica Lib. VIII. Cap. 20. (g) Des Maladies des Femmes grosses & accouchées Liv. I. Chapl. 10. (h) Observations sur la grossesse. Observat. 49. (i) Histoire de l'Académie Royale des Sciences Ann. 1720. p. 16. (k) Adversaria Anatomica. Advers. I. §. 33. (l) Advers. IV. §. 27. (m) Real dus Columbus Anatom. Lib. VI. Severinus Pinxus. De notis virginitatis Lib. II. Cap. 1. Carolus Piso. De morbis a colluvie serosa Sect. II. Part. II. Cap. 7. Edit. Lugduno Batava. Johannes Bohnius. Circul. Anatomic. Progymnas. 16. Gothofredus Bergerus, Physiolog. cap. 20.

tia, cum fluat tunc sanguis e sola vagina, uteri ostio perfecte clauso, qui ex hoc minime læditur.

II. Cum duplex sit vasorum genus per illum reptantium, arteriarum nempe, & venarum in dubium adhuc versamur quod eorum menstrua producat. Auctorum sententia circa hoc nondum composita sunt; plerique tamen hunc sanguinem venas subministrare autumarunt, & sane huiusmodi color subniger fuscus, ac segnities per quam guttatim stillat ut venoso sanguini mos est, valde suadent, idque maxime confirmat Lochia in Puerperis ex venis procedere, ac proinde menstruationem etiam ex iisdem derivare, unamque sternere viam.

III. Veniet inquirendum e quibus venarum fontibus procedat; verum quaestio pauci momenti erit, patente enim uteri contextu, vasorumque allata distributione, facile apparebit venosas appendices id peragere; hæ enim sunt, quæ in uteri cavo magis protenduntur, quæque interioris tunicae tellam perforant, earumque patula ostiola, ut munus fungant a circulatione diversum, a natura fuisse constituta videntur; si spectemus etiam extremitates esse venarum, ut absque laceratione valeant sibi pandere vias, quare adhuc allata satis clare ostendunt per illas appendices sanguinem menstruationis tempore esse fluxurum.

At cur conjecturis fidendum dum certas habemus observationes I. (a) Highmori, qui refert secuisse femellam fluentibus adhuc catameniiis emortuam, cujus internam uteri tunicam reperit undique orificiis venarum ibi patulis refertam.

2. (b) Vinslovii, qui uteri cavum animadvertit villis confertissimum exilibus rubro sanguine infectis.

3. (c) Spigellii, qui illos sub foraminum specie vidit valde patentium, quæ menstruo fluxui pertinere iudicavit.

4. (d) Mauricei, qui in muliere scelerum causa cruce mulctata uteri fundum intus glommiis inductum cruentibus plurimumque vasa distensa, imo ipsorum ostia coagulato sanguine turgentia ibi patula valde, comperit.

5. (e) Litrii, qui internam huiusmodi superficiem interspersam conspexit (*) conspicuis foraminulis, quæ pressione facili negotio cruorem quo erant saturata effundebant.

6. (f) Morgagni tandem, qui intrinsecus uterum descripsit cruentibus maculis distinctum mediocri pressione sanguinem manantibus.

Procul dubio itaque constat orificia Highmori; villos sanguine intrisos Vinslovii; patula foraminula Spigellii, atque Litrii; ostiola Mauricei; ac stigmata sanguine madida Morgagni; appendices illas esse a nobis descriptas, quæ clarissimis illis Anatomicis plus, minusve crassis, oblongis, patulis, aut cruore saturis apparuere pro diversa subjectorum conditione, quæ secuerunt.

Tribus hisce difficultatibus explicitis, totum menstruationis mechanismum se se expedit, extremæ enim appendices cæcales venarum uteri naturaliter contractæ, & obturatæ nequeunt catameniorum tempore in utero sanguinem versare.

nisi

(a) Corporis humani Disquisition. Anatomic. Lib. III. Part. IV. Cap. 4. (b) Exposit. Anatom. du bas-ventre pag. 754. Edit. in 4. (c) De humani corporis fabrica Lib. VIII. Cap. 2. (d) Maladies des femmes grosses, & accouchées. Liv. I. Chap. 1. Observations sur la grossesse Observ. 49. (e) Histoire de l'Académie des Sciences Ann. 1720. p. 16. (*) Littrius addit quod a reconnu ces mêmes trous de la surface interne de la matrice dans les femmes mortes pendant la grossesse, mais beaucoup plus petits, & d'où il ne sortoit au lieu de sang, qu'une liqueur blanche & laiteuse; paullo post, at infelici eventu rationem ostendere conatur, quæ huiusmodi foraminula modo arctiora, modo ampliora videantur, atque liquor ab iis erumpens diverfam naturam induat; miror enim quod celeberrimus anatomicus deceptus sit, neve contingeret, res. trous pleins de sang, quæ observavit dans la matrice des femmes mortes pendant leurs règles in gravidis ampliari quam maxime, ces trous — deux ut ipse descripsit 1701. (Histoire de l'Académie 1701. pag. 293.) at ces alia trous, e quibus tantum erumpebat une liqueur blanche, & laiteuse in gravidarum utero, Aliud fuisse foraminum genus ab eo procul diversum, quod frustra inquisivit tunc exilitatis ergo in mulieribus catameniiis fluentibus discessis, conspicuum tamen gestationis tempore, quando partes uteri omnes ampliores fiunt. (f) Adversaria Anatomica. Advers. 9. 33. & IV. 9. 17.

nisi se se extricent, & patefaciant, plenitudo, seu cruoris redundantia potissimum valet eas referare, at hujusmodi plethora duplex esse potest vel integræ æconomix animalis communis, vel uteri specialis, ideoque ut harum appendicum apertionem explicemus alterutra repletudinis species erit amplectenda.

Sane universa vasorum repletudo ad menstruorum ubertatem non parum conducit, ratio itaque, & experientia id confirmant; ex eo tamen minime arbitramur universalem redundantiam solam sufficere ad hanc sanguinis effluxionem producendam: at si recte examinemus eam sæpissime, constanter, & methodice persistere in mulieribus eronicis morbis emaciatis, aut tenui victu, vigiliis, doloribus, vel continuis cruciatibus defatigatis in quibus vix reliqua est in venis tertia sanguinis portio, qua in statu naturali turgere deberent, quo ergo nascisci hujusmodi plenitudinem, si eam pro mulierum fluxus causa haberemus.

Ad phænomeni igitur explicationem, localem, seu specialem uteri plethoram admitti conati erimus. Hæc magis consona legibus menstruationis, ac maxime ab his quæ præcedunt, aut subsequuntur eruptionem comprobata apparebit. Patet enim pudendorum tumor, tensio, & calor vaginæ; pubis, inguinum, atque lumborum dolor; hemorrhoides quæ tunc superveniunt, specialis repletionis consecutiones esse, quæ partibus communicantur propinquis.

Auctorum nonnulli autumant sine speciali exuberantia a peculiari in utero vasorum distributione penitus derivare. Docent enim sanguinem a corde per arterias recto tramite celerrime, ac uberrime descendere, minori vero copia, & serius, spectato perpendiculari vasorum positu, ad cor refluere; verum descendens aortæ diametrum ampliari magis in mulieribus, quam in hominibus, eamque in illis majorem copiam sanguinis ferre, quam in virili sexu. Animadvertunt simul arterias, venas distribui innumeras per uterum, quæ multipliciter interfecantur, & implicantur invicem, quæque per confertissimas anastomoses inter se maxime conferunt, nullam vero reperiri valvulam, neque sanguinem in venis internam uteri faciem reptantibus sustineri, nisi ab latiori tunica, & pinguedine denudata, quæ nihil obest venarum dilatationi. Hæc si admiseris erunt consequutura, sanguinem uberius ad uterum vehi atque ab eo difficilius, & minori copia recedere, ibique morari, & congeri magis inter sanguinea vascula, quorum implicatus contextus sanguinis cursum magnopere retardat, ac proinde surgentes venas inflari ac magis magisque dilatari tenaci tunica orbata, quæ eas extrinsecus tueatur, & valvulis, quæ intus sanguinem extollant; per illud tandem complexum hanc localem repletudinem oriri, quæ menstrua producere potis erit.

Nihilo secius ab hac sententia, quæ maximi momenti esse videtur multum erit subducendum, ac si sedulo ipsam perpendere lubeat; esto:

I. Amplificant nimis utilitates quas a vasorum speciali in utero distributione derivari sibi suadent; verticalis enim arteriarum, & venarum directio, atque aortæ descendens in mulieribus amplitudo, si peculiarem uteri redundantiam generare valeret, similis arteriarum directio, quæ ad pedes sanguinem devehunt, aut venarum, quæ illum ad cor revehunt, ampliatum diametrum pedes inflare deberent eo magis, quo celerior pro rectitudine esset cursus, refluxusque segnior pro longitudine tramitis, at experientia ostendit hujusmodi pedum turgentiam in mulieribus prorsus abesse, ideoque iis de causis, nec utero supervenire suadendum. Id tamen inæqualitatem producere motus affluentis, vel redeuntis sanguinis non negabimus, quæ a natura sapienter multiplici cognita via rependi solet, hincque motus sanguinis uniformis, æquusque reddi.

II. Perperam magnificiunt numerum vasorum per uterum pereptantium, eorumque plexum, anastomoses, valvularum defectum, aut tunicarum lassum contextum: hæc utero gravi potius, quam foetu carenti convenire videntur, in pueris

beribus præsertim nondum conubio vinctis in quibus matrix plerisque visceribus densa magis & compacta apparet, ejusque vasa exiliora, & constricta conspexeris.

III. Ast positis structura, ac vasorum distributione, quam in puberibus, vel jugatis adversarii arbitrati sunt, neminem ex his specialem uteri plenitudinem oriri posse videbimus, citra universalem sanguinis plethoram; mentem etiam D. Freind assequentes, qui etsi contrariam sententiam defendat in hoc nostras videtur; consequens enim esset emaciatas mulieres catameniis penitus deficere, quæ nulla peculiari afficerentur plenitudine, si ab universali esset derivanda, sed experientia aliud evincit.

IV. Verum ne hujusmodi etsi imparem renuamus hypothesim, sinamus, si lubeat, unoquoque mense hanc gigni universam plenitudinem in mulieribus menstruationi proximis; quid ex eo? in eadem ratione uterum tunc sanguine imbui? fortassis; verum id potius in utero, quam in ceteris corporis partibus vasa referare, vel periodicas excretiones promovere minime sufficeret. Oporteret itaque ad hanc confirmandam sententiam ostendere ibi sanguinem copia, atque nixu contra parietes vasorum vi sua facilius ceterarum partium renitentiam superare, sed hoc ægre sustinebimus, cerebrum porro, pulmo, epar, lienque laxiora viscera sunt, & vasibus pollent amplioribus innumeris multo sanguine turgidis, quæ facilius tument, quam ipsas uteri in puberibus, ideo in illis visceribus specialis hujusmodi facile orta plethora vasa dilatare, ac sanguinem promptius quam in utero erumpere deberet.

V. His concessis simul evidens esset statim ac menstrua sinant, eam in utero renovari, ac augeri repletudinem quotidie, vasa dein post quintum & decimum diem dimidium inflari, & duplum post vigesimum, tuncque sensibilem fieri, eademque phænomena reproduci etiamsi leviora, quæ paullo post catameniorum tempus solent apparere; observationes igitur id contendunt, nam mulieres, quæ gravedinem, tumorem, caloremque circa uterum, & vaginam prope fluxum patiuntur, nihilum prorsus persentiunt decimo, vel quinto decimo ante eruptionem, quod confirmat partialem hanc repletionem, neque celerrime ita nascisci, neque alterius universalis plethoræ consequens esse.

VI. In hac tandem hypothesi circa uteri statum nonnulla omittunt, quæ ad menstruationem explanandam opportunissima sunt; porro decipiuntur valde, nisi animadvertant partes omnes organum quodvis microcosmi componentes ad integram organi ipsius functionem patranda simul necessario conferre; nec verbum faciam de appendicibus venosis, quæ contrariæ sententiæ in eo favere prospexi, quod absque laceratione per earum patula orificia sanguinis eruptio eveniat, sed in ea opinione nullum locum habere conspexi in menstruationis negotio vasa vermicularia, quæ tamen innumera sunt, quæque per confertissima foraminula internam uteri faciem perforando sui generis humorem effundunt a summo naturæ auctore paratum, qui hujusmodi partis actionem aliquo modo foveat.

Ex iis animadversionibus consequitur:

Primo localem uteri plethoram, quæ periodice illum inflat, & catamenia producit, a nulla universali repletudine derivare.

Secundo, quod ea oriri nequeat, nisi sanguifera vasa speciali modo comprimantur, ita ut sanguinis cursus plurimum intercipiatur.

Denique, sola vasa vermicularia potissima esse ad hanc compressionem exercendam; ea enim unoquoque mense turgida fiunt, venarumque extremitates amplectuntur, easque maxime comprimunt.

Reliquum ergo erit rationem ostendere, qua hujusmodi vasa periodice intumescant; id vero naturaliter subsequitur usus illorum in superiori capite indicatis.

In his

In iis itaque, quæ pubertatem jam attigerunt lympham lacticinofam vulgari spiffiorem vafa vermicularia feperant, cujus subtiliorem partem venæ lymphaticæ attrahunt, verum feignior portio in illorum cavitatē reliqua fenfim, fenfimque menfis circiter circuitu aucta, vermicularia vafcula inflat, ac propinquos venarum processus ex hoc constringunt, impeditoque directo curfu invite laterales appendices intrat fanguis, easque extendit atque explicat, ut cruorem in utero verfare cogat.

Verum cum actioni femper æqua fit reactio, venæ a vermicularibus constrictæ illa parivi comprimi conantur; hinc contentus liquor tum preffionis cum denfitatis caufa, dum lymphatica penetrare impeditur, per excretorios ductus sibi pandit vias eodem tempore, quo venosæ appendices fanguinem madent, & duplici hoc fluxu lacticinofi humoris, & cruoris ex appendicibus prodeuntis catamenia originem ducunt.

Hoc efluvium, donec vafa vermicularia lacteo fucco, & venofi processus fanguine inaniantur, folet perdurare, tunc utrumque vaforum genus obturatur, & hac methodo lactifera illa organa fenfim humorem lacticinofum e craffiori lymphæ reftitutum fervant, quem ipfi fecernunt; eodemque circiter intervallo, fimili modo fluxum reproducent.

Ecce palam vobis fimpliciffima phænomeni explicatio uteri texturæ confona, & obfervationibus confirmata menftruorum tempore inftitutis, quæ unicuique uteri parti munus fibi proprium præbet fungendum: conftabit porro hanc fenfentiam tum fani, cum infirmi uteri mutationes omnes facillime extricare, ita ut ab omnibus ratione præditis mereatur amplecti.

§. III.

Confequutiones.

EX anteaftis igitur ftatuere licebit:

1. Sanguinem menftrum necdum ftillare ex vafis uteri per tunicarum porros, vel per fudoris, aut diaphoreſis vias erumpere; huic fimul obeft ſpiffitudo ejufdem, & copia.

2. Cruorem minime per vafa in glandulas, aut vermicularia organa irrumperere, ac per ipforum oſtiola in uteri cavitatē effundi; hujusmodi opinio demonſtrationibus caret, neque explicationem inveniremus periodici ad glandulas affluxus, quinnimo unoquoque menſe intima uteri tunica phlogofi corripereetur, ſi glandulæ lymphaticæ fanguine imbuerentur, quare hypothefim ratio non ſolum, ſed experientia etiam contendunt.

3. Sanguinem nunquam arterias, venas ſolummodo ſuppeditare; uteri etiam textura adhuc latente innotebit, tamen ex ſola craffitutine, & robore arteriarum, quæ dilatari renuunt, verum laſſitudine venarum, ceteris paribus, per iſtarum lumen cruorem facile tranfabire.

4. Non ex venarum extremis diſciſſis menſtrua fluere, ſed ex dilatatis illarum appendicibus abſque nixu ftillare; naturæ enim fuerit conſilium per vafa ſatis lata citra lacerationem id patrari, quoniam in utero innumeris reſerto vafculis ſingulis menſibus per quadraginta circiter annos ſciſſuras innumeras renovare conſpexeris, ſi pulmones breviori laſione paucis ſimul tranſciſſis vafculis citiſſime exulcerentur.

5. Cruentum hunc fluorem nullum in utero fermentum, aut in vaſibus fermentationem fovere, hujusmodi tamen ſententia anteaſto ſæculo valde recepta erat, eaque tunc veritatis ſpeciem facile obtinuiſſet; nuperrime fermenti hypothefim ægre ferunt Medici, & ad menſtrua præſertim relatam prorfus contemnunt, dum ſimplicius phænomenon cognita ſola uteri textura poſſit explicari.

6. Tan-

6. Tandem faſes Lunares nihilum in catamenia influere; ſuperiori ſane infirmior opinio, fuit quæ ignorantia olim, & ſuperſtitionis ævo, late vige-
bat, quam Cartheſiani amplexi erant, quando Phificam ad ſummum attigiffe culmen arbitrabantur.

§. I V.

Explicatio eorum, quæ catamenia reſpiciunt.

IN his perpendendis eandem methodum erimus proſequuturi qua propoſita ſunt, eo tamen ordine, ut unusquiſque numerus, numeris articulo præcedenti exaratis reſpondeat.

I. Liquor quem in impuberibus exigua copia vermicularia ſecernunt mera lymphæ eſt, ut ſupra * enuntiavimus, adeo ut omnem abſorbeant venæ lymphaticæ, nihil reliqua quæ illa organa tumefaciat, ac proinde venas comprimendo menſtrua producat. At decimo quarto ætatis anno puberibus factis mulieribus res alio ſe vertit, tunc uberius, & lacticiñoſus magis liquor ſecernitur, hincque venæ lymphaticæ impares ſunt numero, quem colligunt totidem haurire, tum pro aucta denſitate niſi tenuiorem partem ipſæ hauriunt; reſiduum in vermicularibus retentum illa expandunt ita, ut circumpoſitis venis iterum compressis primus oriatur eruptionis gradus.

Huiusmodi epocha pro ſubjectorum diverſitate varia eſt, decimo enim quarto ætatis anno menſtrua incipiunt in iis, quæ cito corporis dimenſione augeri deſinunt, & plethoricæ fiunt, vel quæ vitam ſedentariam, inertemque agere ſolent, in quibus fibra, præſertim uteri, laxa eſt, aut lubricæ cogitationes, corporis diſpoſitio, fabularum lectura, venuſtolorum conſuetudo, exempla in amoris negotio animum vexant; contra vero poſt decimum quartum apparent in illis, quæ ſerotinum habent augmentum, minus ſanguineæ ſunt, defatigatæ magis, tenuique cibo veſcuntur, tum fibris compactioribus donantur, quæque indole modèſtæ, & educatione ſunt pudicæ.

II. & III. Incaſſum catamenia expectabimus niſi vaſa vermicularia lacticiñoſa turgeant lymphæ, ut propinquas ea vi comprimant venas, quæ laterales appendices valeat aperire; patet enim id certo temporis ſpatio indigere, ut vaſa ad eum plenitudinis gradum pertingant, quod experientia docuit menſe perſolvi, adeo ut menſtrua conſtanti methodo ſemel in menſe debeant renovari.

Ea citius tamen, & crebro ſuperveniunt in iis quæ copioſe veſcuntur, minus defatigantur, latiori ſunt donatæ fibra, & vaſa imbecillia habent, quarum uterus calet facile, & ſtimolum patitur &, raro vero ſeriusque eveniunt in laborioſis, & ſobriis mulieribus utero minus compacto præditis, exilioribus reſerto vaſculis, minusque irritationi obnoxio.

IV. Eſſuvium hocce perſiſtit donec vermicularia lacteo ſucco, & appendices, venæque propinquæ ſanguine penitus exhauriantur; periodorum itaque varietates faciunt, humoris illius inopia, orificiorum latitudo per totum uterum madentium, quæ menſtruorum brevitatem producit; diuturnitatem contra gignit humoris coacervati copia, qui anguſtis oſtiolis per vices conſecutivas a nonnullis uteri partibus tantum erumpit; experientia nihilo tamen conſtat in ſanis mulieribus ſanguinis fluxum plerumque neque citra tertium, vel trans ſextum complecti diem.

V. Ut de hac re ſane iudicemus, vaſa uteri tum ſingillatim, cum complexim examinare oportebit, ſi ſingula perpendamus innotuerit unumquodque ſenſim ſenſimque pateſcieri, dein oſtia eorum ſucceſſive ampliari, donec ſummum aperitionis

ritionis gradum attingant, iterumque coarctari usque dum perfecte occludantur: Si vasorum complexum spectaveris, eorum quoddam patescit primum, inde patientium maxime augetur numerus, donec simili ratione sensim obturantur omnia; idque ostendit.

1. Tres status catamenia complecti *augmentum* nempe, *statum*, & *decrementum*.

2. Verum uniuscujusque status tempus respondere integri fluxus persistentiæ.

VI. Quantitatem pariter fluentis sanguinis unoquoque cursu determinare difficillimum erit, differentias faciunt inopia, vel copia sanguinis, venarum uteri maxime amplitudo, aut turgentia, quæ plus, minusve patulæ sunt; tum amplia appendicum orificia, quorum multa, vel pauca referantur, & diu, citoque in eo remanent statu; tandem sanguinis fluentis motus qui segnior, aut velocior existat; experientia tamen ostendit hujus plerumque quantitatis limites in sanis mulieribus intra octo, & sexdecim uncias contineri, idque absque maximi erroris indicio asserere posse.

Me non latet (a) Hipocratem statuisse hanc quantitatem ad duas heminas atticas, quæ viginti circiter uncias pendent, at comparatio vel incompleta est cum unciis nostris, vel infirma illius observatio, aut olim mulieres ab Hipocrate examinatæ nostrarum fluenti sanguine uberiores erant.

VII. In feminis sanitate præditis, quarum vasorum robur prementi sanguini modice resistit, certa vi renuunt appendices sese aperiri, eademque celerius arctantur, atque obturantur, adeo ut in iis constanti methodo menstrua percurrerent; inversa tamen ratione inter augmenti, & decrementi progressus, quod vulgarem fluxum constituit.

Hoc dupliciter in suis extremis circumstantiis variare solet dum laxior fibra est, tunc citius increfcit, seriusque fluxus evanescit, contra si fortior sit fibrarum uteri contextus, ferotinum apparet augmentum, citissimusque finis.

VIII. Hujusmodi effluvii tum copia, cum perduratio singulis mensibus plerumque æquales sunt, quoniam ceteris paribus, unum remanet per totam uteri superficiem appendicum robur, compactio, atque expansio &c., eodemque tempore eadem fuit sanguinis portio, sed hæc aliquoties discrimen pariunt dum densitate, & resistantia appendices nonnullæ inter se differunt; latioribus enim, ut se referent, unius mensis in vermicularibus lactei humoris collectio sufficeret, compactioribus vero necesse erit, ut vermicularia illis propinqua de secundo mense eo duplum turgescant, ut appendices illæ patefcant; quam ob rem in his mulieribus vicissim catamenia nunc breviora, & pauciora apparebunt ob aperitionis defectum, nunc diuturniora magis, & uberrima duplicis appendicum aperitionis ergo, eorum scilicet, quæ singulis, & secundis quoque mensibus referantur.

Non defunt in quibus contractæ valde appendices nisi de tertia mensis in vermicularibus congerie sinant aperiri; hinc in illis post duplicem cursum (b) tertius supervenit ex maximo venarum patularum numero diutinus magis, & confertissimus, id pariter confirmant mulieres de secundo vel tertio mense uberioribus catameniis præditæ, quæ necdum bene se habent, nisi affatim illud a patulis appendicibus copiosum revertat effluvium, eo enim deficiente lumborum gravedinem perferunt, quæ aliqualem plethoram indicat esse reliquam.

IX. Cum

(a) Μέτρα δ' ἐστὶ πάση γυναικὶ χωρεῖο, ἢ ὑγιάνῃ, τὰ ἐπιμηνία ἐλθόντα ὅσον κοτύλαι δύο Ἀττικαί, ἢ ὀλίγῳ πλεονα, ἢ ἐλάσσονα.

Omni mulieri, si sana sit, predecentes menses moderati sunt, qui ad duarum Atticarum heminarum mensuram, aut paullo plures, aut pauciores. Hippocr. Lib. I. De morb. Mulier. Cap. 15.

(b) Καὶ παῖς μὲν συνεχῶς καθ' ἑκάστης ὀλιγάκις τὰ καταμηνία φοιτᾷ: παρὰ μῆνα δὲ τρίτον μᾶλλον πλείσσις.

Raro singulis mensibus menstrua confertim fluunt: mense vero tertio pluribus. Aristoteles. Lib. VII. De Hist. Animal. Cap. 1.

Hoc malum (menstruatio) tricenis diebus in mulieribus existit, & trimestri spatio largius. Plinius, Hist. natural. Lib. VII. Cap. 15.

IX. Cum appendices cæcales in sanis subjectis per totum uteri ambitum æque constrictæ, ac elasticæ sint hæ vel simul, vel brevi consequutione patere deberent, constantem, & æqualem fluorem ab initio usque ad finem producendo; aliquando tamen discrimen oriri poterit ob variam appendicum compactionem per diversas uteri portiones reptantium; nonnullæ enim vermicularium defectu referantur, dum aliæ occluduntur, tunc menstrua per duas vices unico mense erumpent, quorum intervalla plus minusve diutina erunt pro diversa ratione elaterii appendicum venosarum; nam si copia compactiores numero non præexcellent earum, quæ laxiores sunt, & facile patulæ, primus periodus ubertofus & diuturnus apparebit, contra vero si compactæ appendices confertiores sint.

X. Menstruus sanguis nihil ab illo differt, qui venas replet; nisi forte paucum inficiatur succo lacteo, qui citra morbum optimæ crasis est, nullumque inquinamentum affert puro sanguini, cui est remixtus. (c) Hypocrates asserit hujusmodi sanguinem mactatæ victimæ fluenti haud absimilem esse; miremur solummodo tot Medicos, & Naturalis Historiæ (d) Cultores ridiculas deleterias proprietates ei perperam tribuisse, neminem discrimen animadvertentes inter naturalem & morbosum sanguinem in utero mora aliave de causa corruptum.

XI. Admonuimus jam menstrua tum ex venoso sanguine, cum ex lacteo vermicularium succo componi, qui humores ita remixti cum fluere incipiant simul atque desinant, lymphæ cuore continenter infecta in sanis mulieribus minime distingui potest; at si fortuito vermicularium nonnullorum expansio appendicum aperitionem præcedat vel constrictio earum illorum coarctationi succedat, vel denique vermicularia citius, quam appendices illæ aperiantur, feriusque obducantur, erunt superventura, in primo casu lymphaticum humorem sanguineum præcedere, verum prosequi, tertio denique fluente lymphæ menstrua incipere, atque desinere hujusce rei exempla frequentissima sunt.

XII. Utero adhuc graves mulieres posterioribus sex mensibus præsertim, foetui alendo dicatis, omnem lacteum humorem menstruumque sanguinem impendunt, quare nil mirum si illo deficient.

XIII. Altricibus in quibus potissimum multo lacte turgent mammæ omnis lacticinosa lymphæ ad eas evehitur, nulla, vel paucissima utero superstite pro catameniis producendis.

In laboriosis, & rusticis mulieribus, quæ viliori cibo vescuntur parum chyli fecernitur, eumque laboris ergo cito absumitur; in iis uteri lymphæ inops, vel diluta nimis, impar evadit ad menstrua excitanda, arbitror enim hanc causam sufficere ut hujusmodi mulieres sanguineo fluxu careant omnino, ut in plerisque observamus, nisi tamen specialis uteri densitas oriatur, quæ periodico fluxui non parum officiat.

XIV. Catameniorum tandem effluvium quod triginta, & quinque circiter annos persistit quadragesimo quinto, aut quinquagesimo anno sponte sistit, idque duplex simul causa producit, atque ætatis consequens necessarium videtur: primum humor lymphaticus infirma jam, aut imbecilli ventriculi actione, e tenui hinc chyli secreti copia uberrimus minus, minusque lacticinofus fecernitur, ut vermicularia dilatare impar sit, quantum opus requirit, ne sanguinis cursus in uteri venas intercipiatur; alterum, venarum fibræ & appendicum præcipue,

(c) Χωρὲς δὲ αἷμα, ὅσον ἀπὸ ἱερῆς, καὶ ταχὺ πύσσεται, ἢν ὑγιαίνῃ ἡ γυνὴ.

Prodit autem sanguis qualis e victima, & cito concresecit, si mulier sana sit. Hipp. Lib. I. De morbo. Mulier. Cap. 15.

(d) Columella, De re rustica. Lib. XI. Cap. 3.

Palladius, De re rustica. Lib. I. tit. 35.

Plinius, Histor. Naturalis. Lib. VIII. Cap. 15.

Ælianus, de animalibus. Lib. XI. Cap. 3.

Solinus, in Polyhistore, Cap. 4.

Fernelius, Physiologia. Lib. VII. Cap. 7.

cipue, ut tendineis fibris mos est, inflexibilitatem, & duritiem non levem acquirunt, quæ senio continenter increfcit ut appendices fefe expandi, explicari, aut aperiri pœnitus renuant; quare vi menstruationem producente in die imminuta, ac fimili ratione aucta refiftentia debent catamenia fenfim fenfimque imminui, frequenter cunctari, deficere aliquoties, prorfus tandem abire.

Cum diverfus fit in diverfis fubjectis fluentis fanguinis adventus, incertus pariter erit recessus; plerumque hujusmodi varietates a diverfa dependent fibrarum uteri conditione, plus, minusve refiftentium, quas a natura mulieres fortiuntur, vel aciborum qualitate, aut quantitate quibus vefcuntur, ab vitæ gerendæ methodo, mollis, aut defatigatæ, ab infirmiori, vel conftanti fanitate, quam expertæ funt, a gellationum frequentia, aut raritate cui obnoxia fuere, a climatis temperie plus, minusve callida in qua degerunt &c., evidens enim est diverfarum hujusmodi caufarum gradum multiplicem aut comparationem admodum retardare, aut promovere fenectutis irreparabilia damna.

§. V.

Symptomata explicantur in menftruis obvia.

HÆc diverfa fymptomata, quorum præcipua articulo XIII. §. 1. indicavimus, ita legibus menstruationis fuper allatis colineant, ut eo magis noftræ Theoriæ veritatem confirmari videatur.

1. Dum uterina vafa prope fluxum turgida evadunt, necesse erit novam fanguinis undam per arterias eo evectam, fpermatikas, hypogaftficas, & hæmorrhoidales &c., per laterales tandem truncos revehi, qui ovaria, tum lata & terretia ligamenta aggrediuntur, tum per tendineas, & mufculares hypogaftri partes, vaginam, anumque, pudenda undique repunt. Ita fanguinis in his partibus redundantia illic dolorofam tenfionem excitando hujusmodi in utero exuberantiæ proportionalem, pubis, inguinum, ac lumborum dolorem parit; vel offis facri ftuporem, pudendorum tumorem, aut papulas, vaginæ tenfionem, calorem, fenfumque auctum facit; denique externas, vel internas hæmorrhoides producit, &c.

2. Uterus dum menftrua appropinquantur tumet, atque calet magnopere fanguinis ergo, qui in vafis congeritur, & vefica cui fubtus adheret comprimi debet, ac calefieri, ut fimul urina ibi ftagnans, ex hoc enim urinæ ardor prodit, quo inter mingendum afficiuntur cuique tribuatur vel calori lotio communicato, vel fenfui aucto veficæ collo a proximo calente utero, vel duplici etiam huic caufæ, quæ ad hunc effectum gignendum fimul concurrat; ex eo pariter procedit frequens mingendi pruritus, vel id contractiones producant veficæ, quæ ab utero compressa amplius dilatari renuat, vel urinæ ardor collum irritans, vel adaucta fenfibilitas, quæ veficam urinæ ftimulis magis obnoxiam redat, vel triplex hujusmodi id præftet caufa.

3. Haud raro prope menses urina turbida fpiffiorque reditur, præfertim cum lymphaticum effluvium fanguineum præcedat, mictumque proinde inquinet; aliquando tamen clara excernitur, quæ paullo poft refrigerata, infecta, & craffior apparet. Hoc lymphæ laticinofa producit, quæ a turgidis vermicularibus feeparari nequit, hinc per vias fanguinis in renibus devecta veficam intrat, quod nihil officit limpida adhuc calenti urinæ; at ubi calor subtiliffimas lymphæ moleculas divifas confervat, frigore vero eorum cohæfionem fovente, fundum facile petunt, ac urina interea craffa turbida evadit; idem eluones experiuntur in quibus exuberans chylus per renes fecretus in veficam transfducitur.

4. Posita maxima e lymphæ lacteæ vermicularium repletudine, menstruis propinquis constabit facile vasa illa lymphæ repleti penitus renui, ac exuberanti lacticino humore sanguinem infici, tum continua collectione cetera pleraque serofos humores eo salutari ut urinam perspeximus, & potissimum mammarum lympham illi analogam, adeo ut illarum vesiculæ ubi hujusmodi fecernitur liquor eo maxime turgeant, ipsamque tensionem, atque tumorem inducant, quæ in juvenibus mulieribus prope menstrua in mammis apparent.

5. Tunc in plethoricis mulieribus debent partes omnes sanguine infarciri latiores præsertim, uti pulmo, cerebrum &c., vel quod ibi vasa facilius dilatari sinant, vel quod ab uteri infartu retardato in circumpositis partibus sanguinis cursus superius cruor celerrime se transferat, ab hac porro speciali pulmonum compressione suffocationes illæ creberime originem habent quæ menstruantibus mulieribus superveniunt.

6. In cerebro vero iisdem de causis sanguinis effluxus nimius pro subjectorum diversitate dissimiles præbet effectus; in quibus humores densi, & serofi, arteriarum pulsi rari, & debiles sunt, cerebri fibras graves, laxasque reperies, sopor facile oriri solet; contra vero ubi fluida, tenuia, ferventia ac sitiora conspiciuntur, tum cordis, & arteriarum pulsi celeres, crebri reperiuntur, fibræ arescunt, & insomnia producuntur.

7. Utroque casu in cerebro redundans sanguis capitis dolorem affert, hoc tamen discrimine, quod primum capitis gravedinem faciat, alterum vero distentionem potius, ac divulsionem pariat, nonnullæ enim mulierum capitis infertum patiuntur, aliæ de vibrationibus quibusdam, aut ictibus conqueruntur.

8. Uterus in nonnullis catameniorum tempore distenditur, & inflatur ita ut dolorem inducat cujus impressiones spiritus cerebrum versus depellentes mulieres delicatiori sensu præditæ dormientes, protinus spetris e somno excitentur, præsertim si, menstruo fluente, uteri colicis insultibus sint obnoxia.

9. Varia phenomena quæ catamenia præcedunt ab infartu sanguineorum vasorum omnino dependent, nam vermicularium repletio, quæ, pro eorum exilitate, sensim fit, & exigua copia, necdum sensibiles effectus producere valeret, nisi sanguinea vascula diebus eruptioni proximis maxime turgent, quando vermicularia summum jam plenitudinis gradum attigerunt, neque symptomata illa patrant, quæ a sanguineo affluxu oriri experientia docuit; primo igitur, aut secundo ante effusionem die in iis in quibus appendices vermicularium pressioni facile cedunt; ter, quaterve in illis, quarum appendices serius difficillime referantur, hæc omnia videbis.

§. VI.

Usus catameniorum.

HActenus exposita ostendunt fluxum menstrum unoquoque mense
I. Dilactare, inflare, ac rarefacere uterum, ut conceptioni magis idoneum evadat, in posterum enim apparebit, ipsum rarum, porosum esse oportere, ut seminales moleculæ illius contextum facilius subeant.

II. Verum extendere, producere, atque aptare venosas appendices ut placenta villi in ipsas inferantur, & fœtus proinde cum utero nectatur, infra poro constabit illas productas, ac placentam pervadentes fœtui præcipuum nexum cum utero suppeditare.

III. Denique explicare, & referare vermicularium ostia, venososque processus pro fœtu alendo, nam per eorum orificia patebit infantem, sanguinem, chyleumque nutritium accipere.

IV. Fo-

IV. Fovere tandem, atque augere fibrarum robur, ac flexibilitatem, ut partus bene se vertat; evidens itaque erit tunc interesse colli fibras flecti, & relaxari, fundi vero contrahi, atque arctari magis.

Clare enim patet menstruationem generationi non modo proficere, imo necessarissimam esse; naturæ porro beneficentissimus Auctor huic molestiæ feminas subiecit, ut facilius concipere, foetum alere, altumque parere valerent.

In hoc experientia rationi collineat: raro tamen, ac pene impossibile est mulieres quibus continenter desinunt, aut aliquoties catamenia suprimuntur, concipere, fructum incolumem servare, vel absque periculo parere; id commune confirmat adagium, *qui floribus carent, fructus desiderant*, quod significat feminas menstruis orbas fetum frustra expectare.

Quidam opponunt brutorum plerumque femellas menstruo deficere, hoc tamen defendere potius, quam contendere videtur catameniorum necessitatem; neque magnifacio exemplum Simiarum, aliorumque animalium, quæ hujusmodi fluxu donantur; meæ enim sententiæ maxime favet brutorum femellas omnes coïctu proximas stillicidio præditas esse lymphatico cruento, qui muliebrem menstrum perbelle æmulatur, etiam si in illis semel, vel bis in anno ipse tantum revertat, parum vel nihil sanguine infectus, qui vera catamenia constituit, unicuique animali idonea, & similes utilitates præstat, ac uberrima in mulieribus menstrua suppeditat.

Hæc explicationem præbent cur catameniis prorsus orbatae mulieres pluries tamen filios pepererunt; suspicari enim licebit auctores nonnullos, qui id observasse asserunt, parum admodum sedulos fuisse: cruenti porro fluxus defectu decepti, mulieres illas menstruis penitus carere statuerunt, ac indagare neglexerunt ipsas lacticinofo, sanguineo vix, donari fluxu, qui in ratione temperamenti, uteri constitutionis, vitæ gestæ, catameniorum munereungebatur, & brutorum more mulieres satis fecundas reddere potis erat.

Sed si intimius rem perscrutabimur, apparebit, rusticas, & laboriosas mulieres, easque omnes quibus continenter, & absque sanitatis noxa cruentum deest effluvium, quæque *viragines* dicuntur, suis tamen menstruis pollere. Id ostendit in rebus Medicis, aut Phisicis dum sedulo inquiramus continuo imminui mirabilium numerum; ac proinde constantem, & universalem menstruationis legem a natura institutam jugiter confirmari.

Nihilo tamen minus putarem floris ubertatem quam in plerisque observamus, a natura non parum aberrare; constat enim rusticas victu sobrias mulierum respectu in civitate degentium, uberrimis minus catamenis gaudere; verum qui per silvestres peragrarunt nationes referunt, mulieres nullis, vel paucissimis illuc menstruis donari: id asserit Lery (a) in *Topinamborum* regione observasse, Carletonus (b) apud *Tapujas* in Brasilia, Peclinus (c) in Groelandia; quod argumentum præstat id mulieribus naturaliter commune esse, quare illæ, quæ prima vivendi simplicitate perstiterunt, iis beneficiis frui valuerunt, quæ natura ipsis largita erat; at si mulieres nostrates, quas cultas appellant, catameniis copiosis, & molestis sunt obnoxia, mollis vitæ gerendæ methodo erit tribuendum, quæ naturæ constitutiones pervertit, atque earum calamitates multiplici ratione auget.

CAPUT III.

Prima catameniorum eruptio, & antecedentium, aut concomitantium symptomatum.

§. I.

Descriptio.

IN juvenibus mulieribus, quæ pubertati proximæ fiunt, & naturæ conatus jam persentiunt eruptionem promoventes, quinque dantur circumstantiarum gradus tum uterum ipsum cum reptantia vasa respicientes; unusquisque gradus vel simplex considerari potest, dum unicus in utero apparet; vel compositus dum plures gradus intensione, & extensione diversa simul copulantur, ut novas mutationes ibi valeant procreare, quæ novas etiam symptomatum, aut morborum species producant.

Priores hic simplices eruptionis gradus enunciare satagemus; compositos vero innumeros sufficit indicare, quorum explicatio, & curandi methodus a simplicium explanatione, & indicationibus infra proponendis facile deduci possunt.

Eruptionis gradus primus.

Tunc omnia primo sanguinis scaturientis fluxui maxime favent, tum ex parte vermicularium jam patentium, cum venosarum appendicum, quarum appendices facile, citoque lacteorum vasorum comprimentium auxilio explicantur, referantur, aut obducuntur quantum opus requirit: ex iis consequitur;

1. Menstruum fluxum procul omnem dolorem, aut molesta fœnomena incipere, vermicularium, & appendicum facili aperitione, atque occlusionem, ut menstruationis negotium placide, leniterque se vertat.

2. Catamenia ortu suo minus uberrima apparere, vel quod appendices nondum dilatentur, vel quod extremitates earum, quam par est, nondum patulæ fiant.

3. Illa serius scaturire, brevi desinere lacticinosi humoris inopia, qui segniter, minusque replet vermicularia vasa, vel appendicum rigiditate, quæ ipsas explicari, aut patefieri nonnihil impedit.

4. Hæc omnia tamen, nullo obstante fœnomeno, sexto ad summum mense ad libellam se ponere, & menstrua ubertatis periodorum, & durationis ratione æqua constanter permanere.

Hoc felici eruptionis gradu puberes juvenes tantum fruuntur.

1. Præsertim quæ procerae fuere, & optimo donatæ corporis habitu, neque prima juventute strumis, aut cronicis morbis fuerunt obnoxia.

2. Quæ hilares sunt, & sanguineo præditæ temperamento tum salubri, sed simplici vescebantur cibo, neque obstrutionibus umquam uteri, aliorumque viscerum laborarunt, in quibus a firmo ventriculo optima perfecta est digestio.

3. Quæ nisi prope decimum quintum ætatis annum fluxus indicia conspexerunt, quando uterus conditionibus omnibus pollebat eruptioni necessariis, absque quo calidis remediis, frictionibus, aut lubricis cogitationibus immature excitaretur effusio.

4. Tandem dum mammae sorores factæ indicabant uterum pari conditione gaudere, quæ potissima erat, ut facilis, & naturalis catameniorum eruptio superveniret.

Eru-

Eruptionis gradus secundus.

In hoc statu vermicularia rigida, & exilia nimis renuunt lacteo succo reple-
ri, tum uteri venæ, earumque processus compacto matricis contextu compressæ
sanguinem respuunt, quo inflari deberent. Hæc cum uteri actione comparata
ostendunt,

1. Naturæ conatus in iis mulieribus quandoque inutiles evadere, tum ver-
micularium exiguo numero, cum appendicum duritie renitentibus.

2. Hujusmodi nifus in illis neque pondere, neque tumore, aut collico ute-
ri dolore manifestari, vel ea ita lenissima evenire, ut parum, vel nihil uteri
vasculis inflatis vix sensibilis distensio appareat.

3. Plura tamen symptomata oriri, quæ vel ab exuberanti lacticiniosa lymphæ,
qua tunc sanguis saturatur, vel a cuoris redundantia in vasis ab utero redu-
cis dependent.

4. Lympham lacteam a vermicularibus repulsam cum mammarum lymphæ
haud diversa copulatam, quam maxime finem inflare, atque tendere.

5. Illam saliva remixtam ipsius actionem perturbare ita, ut vulgarem cibo-
rum gustum pervertat, ac ventriculus vilissima poscat alimenta, quod *Picam*,
aut *Malaciam* Medici vocant.

6. Eandem lympham gastricis succis copulatam eorum virtutem obtundere,
multiplicem indigestionis speciem inducere.

7. Sanguinem supra diametrum in vasis coacervatum latiora viscera, mi-
nusque resistentia tumefacere.

8. Hujusmodi infartus pulmones aggredientes, deliquia, hystericas suffocatio-
nes, ac sanguineos excreatus quandoquidem generare.

9. Seri, aut sanguinis in cerebrum redundantis copiam in ratione tenuitatis,
aut spissitudinis hujusmodi humorum plus, minusve cerebri substantiam, ejus-
demque membranas infestare, ut capitis gravedo, aut divulsio, sopor, insom-
nia, motus convulsivi, & epileptici facile oriantur.

10. Similem tandem intra tunicas, muscularem substantiam, aut adiposam
telam humorum exuberantiam spontaneas lassitudines atque die pedum, noctu
faciei tumorem excitare.

His rebus sunt obnoxie mulieres,

1. Quæ citiori corporis habitu, fibris rigidis, atque uteri compacto, exilique
contextu donatæ sunt.

2. Quæ uteri, aut viscerum hyppogastricorum obstructions passæ sunt, quæ-
que strumoso fomite sanguinem habent deturpatum, aut infantia, vel puberta-
te morbos plurimos sustinuerunt.

3. Quæ catamenis non a spontaneis naturæ conatibus excitatis, sed remedio-
rum potius violentia perperam applicitis lubricis titilamentis, lecturis obscœnis,
venustulorum consuetudine, atque impuris cogitationibus concitatis donantur.

4. Quæ tandem viliori altæ cibo, sordibus vescuntur, & melancolia corri-
piuntur molestissima, ab animi patematibus veris, vel futilibus confirmata.

Eruptionis gradus tertius.

In hoc statu vasa vermicularia explicantur, sinuntque ingressum lacticinosæ
lymphæ, eorum tamen orificia aperiri renuunt, ut periodicus fluxus exoritur,
appendices venosæ pariter, a vermicularibus compressæ, satis sanguine turgent at
earum extremitates compactæ minime referantur, ut sanguis methodice erumpat.

Evidens enim est

1. Tunc temporis puberes scœnomenis omnibus vexari, quæ præcedunt catamenia, aut illa comitantur, nam vasa tum lactea, cum uteri sanguinea simili reperiuntur constituta ratione, ac prope menstrua; quinimo illa symptomata diuturniora, atque infesta magis apparebunt, effluvii deficientia, quæ vasorum plenitudinem confirmat.

2. Vaporibus, & hystericis insultibus juvenes perturbari, & partium mirifico consensu utero jam distento, distratoque motus convulsivos excitari, ut infra de hyterismo loquuturi explicabimus.

3. Superaddi symptomata omnia, quæ in secundo eruptionis gradu sunt obvia, vel id exuberans in sanguine lymphæ producat, vel sanguinis in vasis repletudo, dum hi humores erumpi impediuntur.

4. Hujusce eruptionis gradus proprium esse venosas appendices dilatare, atque varicosas reddere diutinæ distensionis ergo, tum longa lymphæ lacticinosæ mora in vermicularibus ispissatæ firrhos in iis tumores procreare.

Hisce plerumque affectibus laborant illæ, quæ

1. Suapte natura orificiis pollent appendicum, ac vermicularium compactis magis, rigidis, atque obtectis, quæ expandi nimis renuunt.

2. Intimam uteri telam densam, spissamque habent, quæ orificia illa circumvestientem magnopere arctat.

3. Scœnomenis secundo gradu obviis per aliquod temporis spatium fuerunt obnoxia, tunc enim vermicularia, & venosæ appendices sanguinis, aut lymphæ affluxu extenduntur, dum orificia minime dilatationi cedunt.

Eruptionis gradus quartus.

Tunc vermicularia vascula lacteo humore, & venosæ appendices sanguine replentur, ut in postremo casu accidere compertum est; hoc tamen discrimen oritur, quod sanguis ex appendicibus in utero copiose erumpat dum vermicularium ostiola penitus obturata, neque minimam humoris lactei guttulam effundunt. His, adductis facile apparebit,

1. Tunc uberrima valde menstrua experiri mulieres quia turgentia vermicularia continenter venas comprimunt, coguntque sanguinem affatim per venosos processus sibi pandere viam.

2. Simili ratione diuturniora menstrua esse debere e vermicularium continua pressione in venis sanguinem retinente ut ipsarum orificia patula diutius persistant.

3. Catameniorum regressus crebriorem apparere, cum vermicularia nedum exinaniantur, ac propinquas venas constanter circumcingant, ut nuperrimo sanguinis affluxui, eruptionique facile occasionem præbeant.

4. Haud infrequenter catamenia morbose fluxus speciem tunc referre, quod prænunciabimus quoties ea uberrima, diuturniora, & creberrima valde conspexerimus.

5. His de causis mulieres plerumque laxas, graciles, ac emaciatas evadere, & constanti sæpe sanguinis inanitione laborare.

6. Lympham vero lacteam in vermicularibus retentam, cum separari impediatur in sanguinem reducem, ea omnia necessario suppeditare scœnomena secundo gradu n. 4. & 5. superallata.

7. Ibi lympham illam stagnantem continua mora ispissatam sæpe firrhos producere, quas n. 4. gradus tertii indicavimus.

8. Tandem, eorum symptomatum complexu persistente, mulieres laxitudine, ac pallore corripì, tum gustu inordinato, viscerum hyppogastri, obstructionibus,

bus, hydrope laborare, atque in ea infirmitate labi quam *Cachexiam* Medici dicunt.

Experientia didicimus id illis supervenire, quæ

1. Perperam violentioribus emenagogis usæ sunt, dum tertio laborabant eruptionis gradu, tunc enim sanguis iis concitatus remediis cogit venosas appendices aperiri, absque quo vermicularia referentur, quæ a lymphæ nullam ipsorum medicamentorum vim persentienti minime excitantur.

2. Tertio existentes gradu a vehementiori corporis exercitio laceffitæ, aut febris correptæ fuere, ut sanguis celerius per vasa percurrentes, appendices aperuisset vermicularibus adhuc obtectis.

3. Sanguine donantur acri minusque fibroso, ut tenuitatis ergo facile pervenarum extremitates effugiat, aut illas corrodendo brevem sibi aperiat viam.

Eruptionis gradus quintus.

Hujusce status effectus eorum quarti gradus inverso ordine eveniunt, videlicet maximus vermicularium numerus in utero patefcunt, & absque mora ibi confluentem lympham effundunt, appendices vero nullam a vermicularibus pressionem patientes parum vel nihil expanduntur, quare ex iis facile statui licebit.

1. Tunc mulieres venosis oclufis appendicibus rubris minime donari catameniiis, aut diluctiori tantum colore infectis patentium appendicum paucitatis ergo.

2. Diutius retardari rubri sanguinis refluxum lacticiniosi humoris defectu, qui per varios anfractus peragrando difficiliter ea congeritur copia, ut appendices valeat comprimere, & rubrum superveniat effluvium.

3. Nullam hanc menstrui inopiam inferre uteri gravedinem, tensionem, aut colicum dolorem, cum nullam supponat vel lacteorum, vel sanguineorum vasorum repletudinem, quæ id parere possit.

4. Hunc gradum jugiter albo fluore comitari ea lymphæ composito, quæ ex laxis vermicularium ostiolis erumpit: persistit ille donec orificia patula existant, intercipitur si ea per vices obducantur, ac ubertotofus plus, minusve fluor apparet in ratione facilioris aperitionis necne, vel numeri patentium vermicularium.

5. Pertinax hujusmodi humoris dispendium, præsertim si uberrimum sit, patientes emaciare, appetitum lædere; viresque debilitare ita, ut tandem cachexiam, & quæ eam consequuntur noxiam symptomata facile inducat. Hæc experiuntur quæ

1. Phlegmatico temperamento præditæ sunt aut cronicorum morborum calamitate, vel attenuantium remediorum abusu sanguine diluctiori donantur.

2. Fibris sponte laxis, & membranis ex iis contextis imbecilibus gaudent, quare intima etiam uteri tunica impar evadat quantum necesse est vermicularium orificia firmare, ne per ea sanguis elabat.

3. Postremis ante eruptionem annis titilamentis pudendorum spontaneis, vermicularium orificia tentarunt, donec sensim sensimque laxiora facta sint.

Eruptionis gradus complicatus.

Hic potissimum dependet a duorum, trium, vel quatuor simplicium graduum complexu, at cum eorum comparatio multiplex valde esse possit, difficillimum erit singulas determinare, præsertim cum ex componentium explanatione compositorum uterque facile deducatur, sufficiat enim hic animadvertere:

1. Unumquemque compositorum gradum in duo tresve &c. simplices gradus

resolvi, quod magnopere favet fenomenorum explicationi, aut morbi medellæ.

2. Sufficere etiam gradum perpendere tantum qui ceteris in compositione præcellit; nam hunc modificando præcipuum uteri defectum, summa quam habent interferatione, ceteros facile, tum morbos, cum matricis læsiones subjeceris.

§. II.

Diagnosıs.

Primum itaque Diagnosıs objectum eo collineant, ut quinos uteri status, qui prope menstruorum effusionem in mulieribus reperiuntur sedulo, agnoscamus; alterum detegere nostrum erit causas omnes, quæ hæc varietates producant, ac persistere faciant.

1. Prioris indaginis respectu naturæ eorum, quæ præcedunt catamenia, aut iis copulantur satis intimam uteri constitutionem ostendit, modo paulisper examine cunctemur.

1. Primus tunc præsens erit *eruptionis gradus* quando puberes procul dolorem, colicos affectus, aut graviora symptomata catameniis gaudere incipiunt.

2. Quando sinus in illis jam tumescit, ac sensim ipsæ menstruis orbatæ pallidæ fiunt, tum uteri tensionem, pondus, aut dolorem persentiunt, evidens est *secundum oriri eruptionis gradum*.

3. Dum mulieres nuper descriptæ menstruis deficiunt, palleſcunt, atque adeo tensionem, tumorem aut collicum uteri dolorem periodice revertentem crebre patiuntur, vel levi quandoque albo parum cruento donantur effluvio illas *tertium experiri gradum* fateberis.

4. Si puberes copioso nimis, diutino, ac frequenti sint fluxui obnoxia usque dum sanguinis amissio morbosa videatur, ac pallidæ valde, & choroticæ fiant, tunc *quartus* apparebit *eruptionis gradus*.

5. Cum tandem mulieres pro copioso, & cruento methodico fluxu, album continenter effundant, vel per intervalla interceptum, aut continuum, modo tamen æque & periodice incrementem, modo non, tunc *quintum* nancisci *eruptionis gradum* suspicari licebit.

II. *Secundo loco* venit inquirendum causas diversas uteri gradus producentes, quare indago admodum incerta est, nisi ægrotantium sedula narratione deducantur, at frequenter aut ignorantur, aut obliviscuntur, aut illa abdunt, quæ circa hanc rem lumen suppeditarent; plerumque tamen ab innata uteri textura diversi hujus ægritudinis gradus solent derivare, etiamsi in hac diagnosıs parte conjecturis potius fidere coacti simus; id tamen pauci faciendum, neque multum influit in remediorum selectum, quem patentia uteri fœnomena clare postulabant.

§. III.

Prognosis.

I. **N**aturæ valde consentaneum erit menses decimoquarto, aut subsequenti ætatis anno facile absque molestia erumpere; id optimam prænunciat fibrarum, tunicarum, atque uteri constitutionem, verum felicissimos promittit fœcunditatis eventus.

II. Contra vero infaustum erit, si mulieres primo hoc eruptionis gradu aliqua deficiant necessaria conditione, si menstrua citius, vel serius, quam par est, superveniant, si plura tunc noxia symptomata appareant, hoc non solum infirmæ uteri constitutionis certissimum indicium præbet, verum experientia constat

constat hujusmodi mulieres toto suæ vitæ curiculo pertinacioribus plerumque esse obnoxias morbis, laboriosis catameniis pollere, ac paucos, vel imbecilles foetus gerere.

III. Ex iis facile prognosis institui potest, quæ in puberibus specialem uteri conditionem spectat; prior convenientissimus est eruptionis gradus, qui omni procul fastidio sponte apparet; ceteri quatuor qui aliqua orbantur sanitatis nota, plus minusve morbofi sunt.

1. Secundus menstruorum gradus ubi tum lactifera cum sanguinea vascula humore sunt exhausta, ac patientes pallidæ fiunt, nullumque tumorem, tensionem, aut uteri dolorem perferunt, ceteris minus molestus, aut periculosus evadit, ab aliquali enim uteri densitate dependet, cui ætatis incremento facile medetur, neque ullam lacteorum vasorum obstructionem, aut sanguineorum expansionem inducit.

2. Tertius fluoris gradus binis subsequenter minus incomodus erit, nam quamvis utriusque generis vasa maxime turgeant, ac puberes uteri dolorosificationibus, aut corporis pallore corripiantur, nihilo tamen minus sponte, si paullulum cunctaberis, menstrua feliciter supervenient, naturæ conatibus excitata, neque ullam ab iis fœnomenis noxam suspicaberis, quia facile remediis obstructiones hinc ortas poteris præcavere.

3. Quartus, & quintus uteri gradus laboriosi magis ambo, & difficiles apparebunt, diversa tamen ratione de iis singillatim pronunciabimus; ille enim, dum menses uberrimi nimis diuturni persistunt, periculosus magis est; postremus, in quo continenter albus humor effunditur, recidivus magis, & pertinax videtur.

§. IV.

Medendi ratio.

Primus effusionis gradus nullum postulat remedium, omnis naturæ committitur; secundus, & tertius ad menses suppressos pertinent, quartus parum, vel nihil distat ab inordinato catameniorum fluxu, aut morbosa ex utero sanguinis jactura; postremus cum fluore albo maxime convenit, quare ne crambe repetamus, singulorum medellam subsequentibus capitibus exponemus; secundum tamen, & tertium excipiemus magis obvios, circa quos cautelas potius enunciabimus, quæ primam mensium eruptionem fovant, illas præsertim, quæ remedium exhibitionem respiciunt.

1. Cum præcipua hujus morbi causa sit nimia uteri compactio, ac vasorum potissimum utriusque generis, quæ relaxari renuunt, ideoque primum oportebit humectantibus, laxantibus, & emollientibus remediis firmum uteri contextum relaxare aliquantulum.

Si tunc cutis rigiditas, ac pulsuum elasticitas postulaverint, tum ventriculi conditio permiserit, præscribi possunt

1. Jura ex pullo gallinaceo, aut vitulo confecta, in quibus ebulliant radicum Althææ, Fragariæ, aut Cichoræ silvestris singularum unica, tum foliorum Boraginis, Buglossi, Lactucæ, ac Dentis Leonis singulorum manipulus, quibus addi potest salis Prunellæ, aut Crystalli mineralis drachma una.

2. Verum decoctiones ex similibus planctis peractæ, quibus adjungi potest uncia una vel semis syrupi violarum, portulacæ aut nymphææ.

3. Emulsionem dilutiores filtratæ, vel etiam coctæ ex semis uncia seminum Melonum mundatorum cum aqua graminis, aut hordei peractæ, addito aliquo ex syrupis superallatis.

Contra vero si pulsi imbecilles, & inæquales apparuerint, aut ventriculus refrigerantia respuerit, substitui poterit serum lactis repurgatum simplex vel plantis amaris corroborantibus remixtum, quale sunt Chamædrys, Chamæpitys, Absynthium &c. aut ferri extinctione chalybeatum; verum si opus requirat solo lactis sero per B. M. destillatio uti poterit absque plantarum additione, vel saltem refrigerantibus additis, aut leviter vulnerariis, pulsum, & sanguinis conditioni ratione habita.

In utroque porro casu tepentis aquæ fluviatilis balneo, aut semibalneo mane, & vespere, mane tamen utilius, ægram laxare oportebit, tum ex lavacro exeunti apozemata vel emulsionem magis congrue poterunt exhiberi.

II. Cum altera menstruorum segnitiei causa a sanguine densitate, aut lentore dependeat, ut ejusdem nisus contra renitentes venarum parietes impar sit per eas appendices sibi pandere vias, necesse itaque erit postquam solidorum laxantia adhibita sunt, solventia, & aperientia amplecti remedia, quæ Emmenagoga dixerunt Medici; verum a mitioribus erit incipiendum sensim sensimque ad efficaciora gradum faciendo usque dum morbi pertinacia absque noxæ metu postulaverit. Hic usitatoria gradatim proponam, & singulis dosim magis idoneam apponam.

Aqua ex rubigine chalybeata,

Vinum chalybeatum

Tartarum martiale solubile

Crocus martis aperiens

Limatura chalybis porphyrisata

Ethiops, vel crocus martis aqua paratus

Tinctura martis

Terra foliata tartari

Ethiops minerale igne paratum

Galbanum

Sagapenum

Gummi ammon.

pro potu ordinario
ad 3 IV jejuno stomacho

a gr. XXIII ad gr. XX

dosis antecedentis

a gr. XV ad gr. XX

dosis antecedentis

a guttis XXV ad gutt. XXX

a gran. XXX ad 3 5.

dosis antecedentis

a gr. VIII ad XXX

Ex iis pharmacis diversimode inter se copulatis Opiata, Bolos, Pillulas, atque Rotulas parant ægotantium gustui accomodatas, at circa hanc rem subsequens capitulum consulere poteris ubi de *catameniiis suppressis, aut iminutis* loquuturi, de iis singillatim pertractabimus.

III. Frequenter accidit, quod non modo vicissim humectantia, & laxantia, nunc aperientia, & solventia, sed simul copulata exhibeantur ut validius agant, ex. gr.

1. Decoctiones ut supra paratæ in quibus infundantur nodulo inclusæ limaturæ Chalybis aut Croci martis aperientis 3 i. vel similis dosis *Arcani duplicati*, aut salis mirabilis Glauberi, vel tartari martis aperientis gr. XX. vel tinctura martis gutt. XX. aut XXV.

2. Apozemata ex iisdem plantis parata quibus adduntur simili quantitate sal mirabile Glauberi, vel arcanum duplicatum, aut tartarum solubile martis, verum etiam terra foliata tartari, aut globus chalybeus infunditur, donec nigro colore inficiantur.

3. Serum etiam optime depuratum in quo solvantur tartari martis solubilis gr. XX., aut tincturæ chalybis gutt. XX. vel XXV.

4. Optimum sane erit consilium dummodo anni tempestas idonea sit aquas minerales ferrugineas exhibere in Gallia obvias, vel nostrates, si Italici hoc libel-

bellum pervolvere contigerit. Galliae selectiores sunt illae quae prope *Vals*, *Caransac*, *Camarets*, *Forges* &c. verum solutivae addi possunt thermarum *Vichi*, *Bourbon*, *Balaruc* &c.

IV. Haec tamen medicamenta ut efficaciora experiantur, sedulum vitae regimen ipsis conjungi debet.

1. Quare aëgris nisi optimis cibis ac facilis digestionis uti permiseris, quos ventriculus subigere valeat; depravata alimenta omnia interdices, quae appetitus inordinatus poscit, hac methodo chylus ubertofus magis secretus tum lymphæ lacteae copiam augebit, cum sanguinis densitatem corrigit.

2. Aëgras admonebis ut jejuno stomacho spatientur, tum rhedis, aquis, choreis vel ludis corpus exerceant, quibus motus sanguinis fit velocior, atque spissitudo imminuitur, tum validiori nisu cruor in uterum irrumpit.

V. In hac tandem medendi ratione caute incedendum erit, neque sequentes oblivisceris animadversiones, tibi mensium eruptioni consulenti maxime necessarias.

1. Nedum hyeme vel autumnno menstrua provocabis, tunc enim solida nimis rigida, fluida spissiora reperies, quare ver, aut aestatem deliges.

2. Naturae conatibus potius erit fidendum quae morborum medicatrix est potissima, quam remediis efficacioribus noxis plerumque, aut incertis.

3. Itaque sufficiet naturam segnem mitioribus sollicitare remediis, ac ab illa, cunctando, salutares effectus attendere, secus si vasa referari invite cogeris, molesta erunt superventura phaenomena.

4. Lenientia tantum purgantia exhiberi intererit, etiamsi ferotina videatur valetudo; nam cito convaluerint si integre, at si emetica, aut draastica fortiora adhibere opus erit, ea nisi ad rem erunt exhibenda, circa quae caput subsequens consuleris.

5. Emenagogis addi possunt remedia antistrumosa dum strumofum in sanguine fermentum suspicaberis, quod humorum densitatem intendat.

6. Dum in mensstruis medendis cunctamur, nihil erit negligendum ut ventriculus roboretur, digestio promoveatur, ac chlorosis symptomata imminuantur, ea de causa praescribi possunt modicus in prandio vini usus, in posterum aqua chalybeata, infusum rhabarbari sine igne patratum, tum decoctio vinosa absinthii, aut aquosa baccarum juniperi: exhiberi simul possunt jejuno stomacho extractum juniperi, aut cortici percuriani, vel guttae aliquot quintae essentiae absinthii aut elixiris proprietatis sine acido parati coclear unum; denique etiam elixiris proprietatis destillati *Garus* vulgo, vini tantillo aut aquae totius citri remixti similis dosis.

7. Prout aetas, & aëgrotorum opus requirant diversae, flebothomiae species usveniunt: pedum venae sectio sapissime magni momenti est, quando omnia ex parte uteri ita disposita sint, ut motum sanguinis ibi affluentis tantummodo accelerari intersit; hunc morbi gradum indicabit modica uteritensio cum pulsuum lentore, & exiguitate conjuncta; noxiam vero hanc venae sectionem experimur dum repentina in utero vasorum sanguineorum repletudine ea comprimuntur, ita ut invicem dilatari impendantur; tum brachium secare oportebit ut (a) Riverius admonet, quod indicabit pulsuum plenitudo, & frequentia, cum uteri dolorosa tensione consociata. His circumstantiis exceptis, nisi qua urgens postulaverit causa, caute erit incedendum circa hujusmodi venae sectionem incantamentiis segnioribus.

8. Connubium tandem juvenibus mulieribus comendare fas est mensstruis orbis, quibus certissima erit medella: id plerumque illa promovet, atque confirmat,

(a) Observe Cent. 1. Observa. 2.

mat; vel saltem prima gestationis occasio, aut partus rem expediunt, si prima nuptiæ impares fuissent.

Remedia usitata primam sanguinis eruptionem promoventia.

I. sequentes rotulæ frequenter usuveniunt

R. Sachar. comm. ℥ IV; ebull. 5. acq. quant. ad dimidiam syrupi spissitudinem add.

Cinamom. f: p: ℥ III

Limat. chalyb: ℥ 5.

Coquantur omnia ad conservæ consistentiam, quæ supra marmor extensa in tabellas sexdecim scindantur.

Hujusmodi unam assumant patientes mane jejuno stomacho; vel si morbus poscat alteram post meridiem, & tertiam edant quarta a prandio hora, quibus thee infusi aut pthisanæ poculum superbibant.

Earum usus quantum lubet produci potest lenitatis ergo, & cum parum alvum ciat ægras aliquoties purgare oportebit.

II. Ut drasticas omittas, sequentes rotulas cathartica virtute donatas exhibere poteris.

R. Foliorum, aut folliculorum fennæ ℥ II.

Ebull. cum aquæ Oenephero, ac decotione percolata add. sacch. comm. ℥ IV

Cinamom. f: p: ℥ 5.

Martis aper. ℥ I

Coquantur omnia ad conservæ consistentiam quæ supra marmor cinamomeo pulveri, aut saccharo conspersa in sexdecim partes scindantur.

Hæ tabellæ superallata exhibeantur methodo; excipiat tamen pomeridianum tempus, ne alvus noctu ciatur.

Hoc medicamentum modice purgare constat; quare si ipsius eccoproticam vim intendere lubeat, brevi intervallo dosim duplicate, vel fennæ quantitatem in nova præparatione augetote.

C A P U T I V.

Catamenia suppressa, aut imminuta.

§. I.

Descriptio.

Menstrua suppressa dicuntur, dum pubertatis tempore penitus absunt; imminuta vero quum uberrima minus, breviora, aut rara apparent.

Consuetudini igitur consulentes mensium suppressionem *naturalem*, non *naturalem* aut *præternaturalem* dicimus. *Naturalis* appellatur si fluxus quadragesimo quinto, aut quinquagesimo ætatis anno secundum naturæ leges sponte desistat; *Non naturalis* dicitur gravidarum, aut altricum in quibus naturæ provisione suspen-

spenditur. *Præternaturalis* in iis reperitur suppressio, in quibus citra gestationem, lactationem, aut ætatem consistentem menses desinunt; hujusmodi suppressionis species morbosa est, de qua tantum hic sermonem instituemus; nihilo fecius dum ejusdem causas proponemus, eas obiter indicabimus, quæ ceteras suppressionis species producere valent.

Catameniorum imminutio tripliciter considerari potest, in ratione videlicet ubertatis, persistentiæ, aut frequentiæ, quibus invicem menses diversimode comparabuntur, &

1. Dum fluxus inops, aut brevis, aut rarus in diversis subjectis apparet.
2. Quando triplici duplicata ratione revertit, cum nempe effluvium uberri-
mum minus citius desinat, vel minus copiosum rarius apparet, vel rarius rever-
tens citius desistat.
3. Multiplici vero ratione, dum uno eodemque subjecto simul rara, breviora,
minusque uberrima, erumpunt catamenia.

§. II.

Causæ.

M*enses suppressi.* Ex naturæ legibus superiori capite enunciatis consequuntur; omnes eorum causas referri tribus classibus, quarum *prior* vasa vermicularia respicit, quæ cum repleti renuant, propinquas venas comprimere imparia evadunt; *altera* venas uteri spectat, quæ etiam si comprimantur a circumpositis vermicularibus, nequeunt tamen satis inflari, ut a seipsis valeant referari; *postrema* ad sanguinem pertinet, qui debili nisu in venas ac appendices præsertim irrupit, neque per earum extremitates erumpere potis est: singulas nunc speciatim examinabimus.

I. Plures adsunt causæ quibus vermicularia lactea lymphæ repleti impediuntur, ut proximas venosas appendices pro mensium effusione dilatentur.

1. Si hujusmodi vasa suapte natura exigua nimis, densa, aut compacta sint, ut lymphæ ingressum respuant, possunt fane illa vel originaria hac dispositione primam implicare, aut retardare eruptionem, vel ipsam in consistentibus mulieribus penitus intercipere, quando ætatis ergo vasa maxime coarctantur, atque cum hæc vasorum dispositio nequeat per intervalla renovari, nullum locum habere potest in illis, quæ semel menstruis donatæ fuere, in quibus hæc reverti debent.

2. Si ea vasa omnia, aut ipsorum maximus numerus sit obstructionibus implicatus a lymphæ syrthorum more inspissata, aut a vasorum sanguineorum infartu compressus, ut in earum partium inflammatione evenit, aut erosus supuratione ulcerum more; hujusmodi triplex est potissima suppressionis causa.

3. Si lymphæ lacticina vel illa non intret vasa, vel pro inopia ipsa non repleat, quod accidit:

1. Dum sanguis in male-affectis aut a morbo recentibus lacteo deficit humore, qui citra molestiam tunc suppressionem pariet.

2. Dum ea lymphæ labore, venæ sectionibus, aut crebris purgationibus dissipata incompletam gignit suppressionem.

3. Dum mammas in nutricibus aggreditur, quam non naturalem suppressionem vocavimus.

4. Quando denique alio, aut continuis diarrhæis, aut hemorrhagiis disperditur, innoxiam, aut imperfectam suppressionem producendo.

4. Si lymphæ lacteæ quantum in vermicularibus colligitur, tantum in utero per eorum expansa nimis orificia stillet, vel albus persistat hujusce humoris fluor, quem vera suppressio erit subsequutura.

II. Similis extat causarum complexus venas, & venosas appendices implicans, quarum expansionem, autque productionem impedit, ut compressæ nequeant tamen referari.

1. Tunicarum resistentia densitatis ergo potissimum dilatationi officit, at id ætatis, aut conformationis consequens est, quod in puberibus tantum primæ eruptioni obnoxiiis, aut in consistentibus mulieribus jam catameniis defecturis locum habet, at nisi levissimam in iis, quæ constanti donantur fluxu, suppressionem parere valuerit.

2. Ovulorum præsentia germine gravium, quæ uteri cavitatem occupant appendicum productionem, aut aperitionem impediunt, vel id tantum sinut, ubi placenta matrici adhæret, quod non *naturalem* suppressionem gignit, gestationis propriam.

3. Uteri, tunicæ ipsius internæ præsertim, durities quæ venosas appendices amplectentes earum dilatationem implicant, ut in amplioribus uteri scirrhus accidere solet.

4. Convulsiva uteri constrictio, quæ repente venosos processus vincit, quam producunt

1. Frigus subitaneum, pedes præsertim, aut crura aggrediens.

2. Iræ impetus, aut gravis dolor.

3. Summi metus, atque inopinati valida impressio; hujusmodi plerumque est triplex causa suppressionum fluente sanguine, statim supervenientium, de quibus infra fufius, id a mechanismo motuum convulsivorum procedit ab animi patematibus, aut sympathicis affectibus, ut de hysterica passione loquuturi explicabimus.

III. Causarum respectu, quæ sanguinem ad venas uteri transvehi impediunt ea vi, qua earum extrema sese valeant referati, deduci debent.

1. A segniori sanguinis motu, ab debilioribus cordis viribus ei communicato, ut in ægrotis languidis, aut gracilioribus subjectis observamus, vel a sanguinis spissitudine, quæ cordis impulsibus, ut mos est, resistit.

2. Ab exigua cruoris copia ad uterum transducta morbo, inanitione, aut macie in corpore deficientis, vel brachii inopportuna venæ sectione, aut crebra narium hemorrhagia alio deflectentis.

3. A duplici hujusmodi causarum complexu, tum a sanguinis segnitie cum exigua copia, qui ipsius officiat affluxui.

IV. Tres ipsæ sunt suppressionis causarum classes, in quibus simpliciter vermicularia vasa, venosæ appendices, aut sanguis peccare solet; at frequenter evenit remotarum causarum ergo plures ipsarum conjungi, quod connubium laboriosas magis, & pertinaciores suppressiones producit.

Catamenia imminuta. Ea triplici ratione imminui possunt, inopia, brevitate, vel periodorum raritate.

I. Minus uberrima apparent.

1. Si vasa lactea dimidiatim repleantur, ac proinde leniter venas compriment, quare parum impeditus sanguis recto pergat tramite minime per laterales appendices deflectens *v. clas. I. causar. &c.*

2. Dum appendicum venosarum dimidium, aut minima pars tantum refertur, ut, ceteris paribus, paucissimis earum patulis cruor directum cursum prosequatur, *v. clas. II.*

3. Si minori copia atque celeritate sanguis ad uterum transferatur, ceteris paribus, fluxus tunc minus uberrimus apparebit, *v. clas. III.*

II. Catamenia minus perdurant.

1. Si lactea vasa citius exhauriantur, & a venarum compressionem desistant, qua de causa sanguis directum cursum innovat, *v. clas. I.*

2. Si

2. Si venarum appendices jam patulae sollicitae se referent, id vel angustiae orificiorum, vel laxitatis ergo eveniat; *v. clas. II.*

3. Quando sanguis ibi exigua copia accumulatur, vel quod in corpore deficiat, vel alio deflectat; *v. clas. III.*

III. Diuturnioribus intercipiuntur menstrua intrevallis.

1. Quando vermicularia fero se replent mensibus instantibus; *v. clas. I.*

2. Quando appendices diu renitentes difficillime referantur; *v. clas. II.*

3. Cum tandem sanguis deficiat, vel leniter impellatur, ut venosas appendices explicare impar evadat; *v. clas. III.*

IV. His explicitis evidens est diversas causas binas, vel trinas simul comparando facile graduum compositorum explicationem innotescere, quando menstrua inopiae, aut brevitatis causa imminuuntur, vel raritatis, & inopiae simul ratione, vel brevitatis simul, & raritatis ergo; quando menstrua tandem triplici hac de causa imminuantur; quia uno, eodemque tempore minus uberrima appareant, minus perdurent, seriusque revertant.

§. III.

Differentiae.

Observatio perbelle expositis menstruorum legibus consona confirmat, 1. Duplicem dari suppressionis speciem, quae vel fluente adhuc sanguine menses sistit, vel sensim sensimque agens eorum regressum tantum implicat.

Subita suppressio, quae fluentia intercipit menstrua a convulsiva uteri constrictione dependet in iis mulieribus, quae mensibus affectae frigori, aeris intemperiei, aut ventorum afflatibus se exposuerunt, tum frigidis sunt usae pediluviis, aut denudatis pedibus marmoreo deambularunt pavimento, vel timore, formidine, aut laetitia inopinata aggressae sunt, quae tandem vehementiori ira, aut gravi dolore sunt laceratae, *v. clas. II. n. 4.*, huiusmodi causae frigoris videlicet, & animi pathematum intensiores producunt effectus, quando mulieres iis minus assuetae, & sensibiliores sint.

Suppressio, quae gradatim fit absque quo menses perfluere desinant, quaeque tantum eorum regressum impedit, pluribus de causis producitur infra enumerandis, quae tamen facile distinguuntur segnitiei ergo qua agunt.

II. Altera datur suppressionis species, quae vel album fluorem comitem habet, qui cruoris defectum implere videtur, vel penitus eo destituitur.

Prior ea species est, in qua vasa vermicularia nimis distensa lacteae lymphae per ipsorum ostiola tantum effundunt, quantum fecernunt; *v. clas. I. n. 4.*; altera vero suppressio lacteo effluvio deficiens ceteras complectitur suppressionis species, ubi vasa vermicularia nihil lacticinosa lymphae separant, ipsa turgeant nec ne.

III. Tertia adest suppressionis differentia, vel quando menstrua silent procul uteri tensione, aut dolore, vel dum utroque, aliisque pluribus molestiis copulatur.

Ea doloris, & tensionis expers est, dum vermicularia, & venosae appendices prorsus exinaniuntur; *v. clas. I. tum clas. II. n. 1-3. verum clas. III. n. 2.*

Ea contra dolorem, & tensionem habet comitem, quando huiusmodi vasa venae praesertim maxime turgent universalem plenitudinem, & dolorosam tensionem procreando; *v. clas. II. n. 4. clas. III. n. 1.*

IV. Postrema tandem differentia est cum non modo dolor, atque tensio absint, verum quovis aliae molestiae genere mulieres libere evadant, vel cum paucissimis etiamsi corripiantur incomodis, nonnullis tamen chlorosis laborent symptomatibus.

Suppres-

Suppressio quæ dolore, ceterisque molestiis est orba, a lymphæ productur in sanguine defectu, aut mutato gressu; *v. clas. I. n. 4.*

Altera dolore, & tensione carens, verum aliquo chlorosis phænomeno affecta a præcedenti in hoc differt, quod dum vermicularia lymphæ defectu vacua persistant, hic lymphæ etiam si uberrima constrictionis maximæ ergo vermicularia nequeat penetrare; *v. clas. I. n. 1. 2.*

§. I V.

Symptomata.

Cum variæ sint suppressionum species, simili ratione varia erunt phænomena superventura, quorum præcipua exponam.

I. Si suppressio ab eo originem ducat, quod sanguis lymphæ lactea orbatus ejusdem nullam partem ad vermicularia evehat, quæ idoneam secretionem subeat, vel ipsa lymphæ alio sibi sternat viam; *v. clas. I. n. 3.*

1. Tunc mulieres de doloris, neque tensionis sensu conquerebuntur, nulla in utero turgentia superventura.

2. Nullum apparebit effluvium vacuis jam vermicularibus, & appendicibus obstrictis, nullus proinde mulieribus erit superventurus labor catameniorum defectui saltem tribuendus, cum nihil in sanguinem tunc redundet, quod evacuationem postulet.

II. Si vero suppressio non a lymphæ absentia originem agnoscat, sed ab ejusdem in vermicularibus difficili secretionem, quæ ob densissimum contextum lympham recipere respuant; *v. clas. I. n. 1. 2.*

1. Hujusmodi liquor sanguinis plethoram augebit, quia continenter in corpore increfcens nullam exitui reperiet semitam.

2. Continua collectione idem cum lymphæ mammariæ permixtus sinum inflabit.

3. Ipse lacticinosus humor saliva, aut gastrico succo remixtus ab eo haud ab-
similibus gustus, ac digestionis læsiones pariet, tum *Pica*, aut *Malaciæ* diver-
sas species gignet in ratione acrimoniæ, qua lymphæ saturatur.

4. Ex pravis cibis, aut incompleta optimorum, etiam alimentorum subactio-
ne ventriculi gravitas facile superveniet, quæ nauseas, cordis anxietates, aut
vomendi conatus provocabit.

III. Si a nimio suppressio procedat lymphæ lacticinosæ effluvio; cum ea a
vermicularibus effugiat statim ac recepta sit; *v. clas. I. n. 4.*

1. Nullum apparebit, ut supra enunciavimus, neque doloris, neque tensionis
indiciu, quia in utroque vasorum genere humorum redundantia aberit.

2. Aderit tamen lymphæ lacteæ, aut fluoris albi perfluvium plus minusve uber-
rimum, continens, aut intermittens in ratione gradus aperitionis lacteorum vasorum.

3. Hujusmodi effluvio circa pudenda simul stimulu, atque calorem exci-
tabit pro humoris fluentis majori, vel minori acrimonia.

IV. Si sanguis inflet, repleatque venas, & venosas appendices, verum sup-
pressio ab eo procedat, quod earum orificia obducta persistant; *v. clas. II. & III.*

1. In hoc casu ægræ tensionem, dolorem, atque uteri calorem persentient va-
forum plenitudini proportionalem.

2. Hujusmodi dolor intensior ita fiet quandoque ut *colicæ uterinæ* nomen me-
reatur, quod vel totam matricem, vel ipsius partem aliquam occupabit in ra-
tione sanguinis diffusionis.

3. Tensio vero, & tumor dum teretibus, latisque ligamentis, atque pudendis per-
similia vasa hinc, illinc reptantia communicantur symptomata omnia parient
intensiora immo, quæ catamenia solent prænunciare.

4. Paucis deinde transactis diebus absque sensibili humorum jactura omnia evanescent, quia lacticinosa lymphæ, per lymphaticas venas, via sibi strata, vacua vermicularia relinquet, nec amplius venas comprimens, sanguini liberam circulationem redintegrabit.

5. Id tamen minime erit expectandum, nisi lymphæ lactea liquidior sit, ut omnis lymphaticas venas intrare valeat; quotiescumque enim spissior existat, multa in vermicularibus erit superstes, quæ venas adhuc comprimendo in ratione lymphæ retentæ, symptomata omnia superallata plus minusve excitabit.

6. Diu suppressio perdurans universalem plethoram inducere potis erit, quæ thoracem aggrediens hystericas suffocationes, spirandi difficultatem, tussim, atque cordis palpitationem provocabit; cerebrum vero ut Cap. II. §. V. ostendimus, capitis gravedinem, atque divulsionem, soporem, insomnia, vel per subsultus repentinam e somno concitationem inducere valebit.

7. Si tunc sanguinis circulus in aliqua parte intercludatur, ubi vasa nonnulla reperiantur imbecillia valde, aut labefactata, sanguis sibi viam sternere potis erit, & hæmorrhagiam periodicam producere, ut menstruis, alio devolutis, facere mos est.

V. In omnibus suppressionibus ubi uterus inflatus, tensus, calentem, aut dolentem reperies vasorum per ipsum serpentium repletudinis ergo; v. clas. I. & II. integras.

1. Patientes phenomenis omnibus vexabuntur hystericæ passionis obviis causis sequenti capite enunciandis ubi speciatim de hoc morbo pertractabimus.

2. Hæc symptomata magna, longa, & frequentia plus, minusve apparebunt in ratione impressionum, quæ in utero suscitabuntur plus, minusve validæ, constantes, aut crebræ.

3. Hujusmodi impressiones sympathiæ lege infra citato loco perpendenda convulsivos motus excitabunt in gustus organo, ut anima impar evaserit ejus sensus percipere saliva nedum infirma, quod confirmat similis effectus in hoc sensorio a gravi dolore ortus.

4. Hæ impressiones pariter convulsivas excitabunt constrictiones fibrarum ventriculi, diaphragmatis, atque muscutorum abdominis, quæ etiam vacuo ventriculo vomitum suscitabunt, id experitur in renuum dolore, qui colicam nephriticam producit.

VI. Si catamenia supprimantur repente ab uteri vehementioribus motibus convulsivis. v. clas. II. n. 4.

1. Supervenient tunc validi hystericæ passionis insultus, diutini, & frequentes magis, quam in ceteris suppressionum speciebus, atque tunc nervorum impressiones fortiores, ac pertinaciores erunt, tum sanguinis in vasibus subito intercepti ratione, cum muscularium fibrarum violentis contractionis ergo.

2. His plerumque superadduntur alia plurima noxia valde phenomena a partium divulsarum diversitate oriunda, hujusmodi sunt sopor, lethargus, loquelæ quandoque abolitio, cordis palpitatio, atque hystericæ suffocationes.

3. Eorum symptomatum persistentia, aut magnitudo variare solet, prout fluxus abundaverit, nec ne, aggressu suppressionis, tum in ratione temporis, atque sollicitudinis, quibus menses susterunt, verum in ratione uteri sensibilitatis, ægrotantium ætatis, aut temperamenti sanguinei, vel plethorici differre poterit.

§. V.

Diagnos.

Nihil est facilius quam mensium repentinam suppressionem cognoscere, de qua statim ægrotantes admonent, at cum ea sensim sensimque absque sen-

sensibili causa superveniat, difficilimum est distinguere an illam conceptio producat, quæ nullam medellam poscit, vel morbus, qui medicina indiget.

Cum id conjugatis acciderit difficultas minus implicat, facile enim concepisse sibi suadent: ipsorum iudicio tamen non erit fidendum; nam fatuæ adsunt ac stultæ mulieres, quæ minime suspicantur de foetu, quem gerunt.

Maxima vero oritur difficultas cum virgines aut juvenes viduas pertractare convenerit; earum porro conditio, quæ omnem suspicionem remove debet, mehercule tamen, experientia docente, frequentem nimis venustulorum consuetudinem intra diversos sexus obviam extremos sæpe inducere vidi amicitiae effectus; quandoque possunt conceptionem ignorare, dum emenagoga poscunt; crebre tamen hæc petunt remedia, ut abortus promoveatur, & se tricis eximant.

Si medico turpe est inanibus fidere conjugatis, quæ levitatis causa fructum maturare negligunt; infame nimis, ac dolosum esset si inscients virginis, aut viduæ sceleris particeps fieret, quæ conceptum necare conantur; unica patet via, quæ omnes eludit difficultates, quam didiceris; subsequentes circa gestationis indicia, & prudentem morbi inquisitionem animadversiones perpendendo.

1. Gravidæ mulieres plerumque naturalem colorem, atque calorem conservant; at suppressione coreptæ, pallidæ, laxæ, decoloresque fiunt, huiusmodi tamen signa nisi debile præbent indicium, nam plures dantur feminae, quæ primo gestationis mense, eadem experiuntur suppressioni obvia.

2. In gravidis uteri orificium exacte clauditur non vero in morbois suppressionibus, in quibus parum, vel nihil obturatur; id sane certissimum est indicium; verum sæpe examen negligimus, aut tentare veremur, neque observatoribus tactu facile erit ultimas huius claustris differentias detegere, nisi summa ipsi polleant in obstetriciis rebus experientia.

3. Utero onusto tertium, aut quartum post mensem symptomata omnia desinent suppressionis molestiis æmula; tunc enim pro foetu alendo omnis affluens lactiginosus humor, utque sanguis consummitur, nihil in vasis exuberans. Contra vero in suppressione phænomena illa omnia augeri videbis, quæ validissimum conceptionis necne signum præbebunt, si ægrotantium historiis esset fidendum; at cum virginis suspectæ, vel callidæ mulieres valide medicis imponant, ipsos facile deceptos fuisse expertus sum.

4. Uterus tandem quarto, aut quinto mensibus transactis umbellicum versus acuminatus apparet, & levi manus pressione satis circumscribitur, foetusque inæqualis resistentia perferitur; verum leviter abdomen concutiendo, calore, motuque concitatus infans de sua existentia certiores observatorem facit, quibus rebus detectis nullum superest conceptionis dubium nubilum sit mulier necne; iis deficientibus signis a quarto, vel quinto suppressionis mense catameniorum interceptio pro morbo erit habenda, quæ porro medellam postulabit.

Cum hoc præcipuum sit veritatis indicium, quod prudens Medicus amplecti debet; ideo nisi validissimas rationes suppeditaverint ægræ, quibus suum tueatur decus, in emenagogis exhibendis, cunctari oportebit, donec idoneum tempus transactum sit, quo abdominis examine de gestatione necne certiores fieri possimus, hæc medendi methodus conjugatis mulieribus communicari facile potest, quæ prudentem inquisitionem non contemnent; iis interdum si grave aliquod supervenerit incommodum, diata aut stomachicorum, vel leniter aperientium, auxilio erit occurrendum.

Nubiles vero, aut viduas, quibus turpe suspectum nefas erit manifestare, certiores facere oportebit continenter menstruum redditui consulere, interdum innoxia stomachica remedia absorbentia, & amarotica exhibendo; quo magis de remedium frustraneis affectibus querebuntur, efficaciora cupientes, doli augebitur indicium, quare jugiter nova validiora medicamenta promittendo eadem metho-

methodo erit persistendum, donec quarto, aut quinto mense veritas penitus conspicua fiat; tunc vero caute opportuna erunt suppeditanda remedia, eandem semper medendi rationem simulando.

II. Nova exurgit difficultas illarum causa, quæ quadragesimo quinto, aut quinquagesimo ætatis anno spontanea naturæ lege menstruis carere incipiunt; tunc perperam novos fluxus promovere tentaremus, ægras potius naturæ conatibus præparare oportebit, ut totalem hanc suppressionem valeant sine morbo perferre; attamen amentes reperies feminas, quæ nondum ætate consistere sibi suadent, ut catameniis orbari debeant, & seipsas, suosque medicos sæpe decipiunt; nonnullæ etiam, quamvis omni carere menstruo cognoscant, veritatem celare, atque callidissime adstantes eludere student.

Propriæ futilitatis, atque dementiæ plerumque victimæ fiunt, quoniam dum menses irritò revocant, haud infrequenter morbosam sanguinis jacturam, aut album fluorem advocant, vel, quod magis teterrimum est, uteri inflammatione, ulcere, aut cancro corripuntur: contemptus tamen, quem sibi promeritæ erunt hujusmodi mulieres, nihil incautum excusat Medicum, qui ipsis operam præstitit. Artis politici canones has præcavere satis docent fraudes; mulierum enim adspectu, venustarum etiam si lubet, consilium petentium, de earum ætate, lævi erroris dubio, judicare poterimus; si itaque illas quadragintimum quintum circiter annum attigisse certiores facti simus, absque quo lacrimis, aut querelis commoveamus, sola stomachica diluentia, aut absorbentia erunt exhibenda, quæ tunc naturalis suppressionis phenomena imminuent, vel saltem mitiora aperientia, solventia, aut emenagoga erunt suppeditanda, quæ extremis naturæ conaminibus subveniant, si forte nondum menstrua silere debeant, vel parum agant si ea penitus sint discessura.

Tandem nonnullos post menses innotescet, si suppressio a morbo dependeat, cui emenagogis in hoc capite enunciatis occurremus, contra vero si suppressionem naturalem esse judicemus caute erit incedendum, ut consequentiis medeamur, quibus tunc pleræque sunt obnoxia; id tamen non est hic specialiter perpendendum, postremum hujus libri caput consulere poteris, ubi fusius de mensibus ætatis ergo desinentibus, deque eorum symptomatibus differemus.

III. Cum de suppressionis natura certiores facti simus, species tantum singillatim, earumque causæ producentes dignoscendæ supersunt.

1. Omnis suppressio, vel adhuc fluente sanguine repente, vel sensim, sensimque aggreditur.

Observavimus jam subitum mensium silentium convulsivas uteri contractiones facere externo frigore, tristi, vel læto animi pathemate, aut timore concitatas.

2. Ea suppressionis species, quæ sensim fit, albo fluore erit subsequutura vel ipso deficiet.

Vidimus hujusmodi suppressionem, quæ periodicum, vel continuum album fluorem comitem habet, ab laxitudine vermicularium oriri, quæ secretam lympham omnem excernunt.

3. Altera suppressionis species, quæ albo fluore destituitur, vel dolore, atque uteri tensione afficitur, vel ab eo libera evadit.

Ostendimus superius priorem albo fluxu orbatam, in qua uteri dolor, tensio, atque colica perferuntur, vitia producere uteri, cujus intima tunica, & venosæ appendices dilatari, atque aperiri renuunt, tum sanguinis vitium, qui pro spissitudine, aut inopia impar evadit, venarum orificia referare.

4. Quæque suppressio albo fluore, uteri dolore, ac tensione carens, vel nullam affert molestiam, vel sensim chlorosim producit.

Diximus jam suppressionem superallatis incomodis prorsus orbatam, a lym-

phæ defectu pendere, ac emaciatas, languidas, & defatigatas mulieres, aut altrices agredi.

5. Omnis tandem hujus morbi species in qua neque albus fluxus, neque uteri dolor, aut tensio apparet, verum plurima chlorosis producuntur scenomena, ex eo procedit, quod exuberantem lympham, nequeant densa vermicularia separare, quare eadem lympham in sanguinem redux saliva, & gastrico succo remixta necessarios eorum humorum effectus perturbare valebit.

IV. Causæ vero remotæ, quæ proximas inducunt suppressionum omnium causas, nisi ab acurata temperamenti regiminis, aut agrarum vitæ gestæ narratione innotebunt; quas assidue percontari oportebit, non modo ut remedia magis idonea seligere valeamus, verum ut necessarias diætæ, aut medendi methodi modificationes animadvertamus.

§. V I.

Prognosis.

Genericam suppressionum prognosim arduum est proponere, singularum species itaque prænunciationes exponemus.

I. Suppressio, quæ nullum conjunctum habet uteri dolorem, aut tensionem, nullamque functionum læsionem prorsus innocua experitur.

II. Quæ chlorosis phænomena, atque damna tantum ostendit plus, minusve periculosa evadit pro eorum pertinacia.

III. Suppressio, quæ albo fluore pollet pertinax erit, curatuque difficillima, & noxia plerumque; ea lentam febrem, maciem, leucophlegmatiam, hydropem, ulcus denique, & uteri cancrum inducere valet, præsertim si albus fluxus uberimus, continens, aut acris nimis evadat.

IV. Ubi uterus tumet, aut crebre dolet periculum adest ne eorum persistencia uteri inflammatio, abcessus, ulcus, aut syrrhus, vel cancer superveniat, quæ plus minusque suspicaberis consequutura, quo dolor plus minusve intensior, atque continens apparebit.

V. Diutina suppressio, quam universalis plenitudo gignit, lethargum, apoplexiam, asthma, cordis palpitationem, abdominis infartus, hydropem, atque sanguinis vomitionem producere solet, quæ magis erunt timenda si iis rebus regimen, & temperamentum plethoricum occasionem præbeant.

VI. Repentina suppressio subita, vehementiora, atque teterrima magis scenomena excitabit, tunc enim patientes improvise appoplexia, aut lethargo, hysterice suffocationibus, cordis palpitationibus, sanguinis sputu, aut vomitu facile corripientur, vel phreneticæ, aut maniacæ fient, vel a violentioribus convulsionibus, atque hysterico morbo cruciabuntur, ut non raro symptomatum vehementia intereant; quare hujusmodi speciei ergo revera asserere possimus, uterum (a) esse in mulieribus sexcentorum morborum causam.

VII. Generice loquendo suppressiones, quæ intensiores sunt, medella etiam difficiliores evadunt, nam diuturnitas earum ostendit causas producentes remedia prorsus eludere, nihilo secius Hippocrates asserit mulieres observasse suppressione laborantes, quæ non modo a sexto morbi mense, quod animadvertit etiam auctor libelli de morbis mulierum (b), verum a quarto (c), vel septimo (d)

infirm-

(a) Ea de causa Auctores voluerunt Democritum asseruisse in littera quadam Hippocrati scripta quam inter ejusdem opera reperies. Τὼν ἐν γυναικὶ μόχθων μυρίων παραιτίη μίατις. Uterum sexcentarum ærum. narum causam esse in mulieribus.

(b) Lib. I. Cap. 3.

(c) Epidem. V. circa initium.

(d) Epidem. IV. 92.

infirmi-
tatis anno convaluerunt, raro tamen id accidere autūmo, neque legem
in menstruationis negotio suppeditare posse cenſeo.

VIII. Suppreſſiones enim quo pertinaciores apparebunt, etiam pernicioſiores
erunt, difficile enim erit luctuoſas eludere infirmitates, quæ a morbi perſisten-
tia oriri ſolent.

IX. Verum ſuppreſſione perdurante ſterilitati ratio habenda eſt; me non la-
tet enim plures feminas menſtruis orbatas concepiffe, etiamſi pauca extent exem-
pla, eaque in iis animadvertantur mulieribus, in quibus etiamſi menſtrua abeſ-
ſent, uterus ſaltem bene conſtitutus reperiebatur, quod minime prædicabimus
de iis, quæ morbi cauſa menſibus carent.

X. Tandem ſi huiusmodi conceperint mulieres, decipientur valde ſi credide-
rint integro geſtationis ſpatio foetum ipſas gerere, vel ſanum ſervare poſſe,
nam vaſa tum lactea, cum ſanguinea, quæ imparia pro catameniis erant,
neque nutritionem foetui ſuppeditabunt idoneam, ut ipſe completus evadat.

§. VII.

Curatio.

Duplicem dari obſervavimus ſuppreſſionis ſpeciem, altera quæ repente fluen-
tes menſes ſiſtit, altera quæ ſenſim ſenſimque temporis progreſſu menſtrua
imminuit, eorumque reſreſſum impedit, diverſarum cauſarum, atque effectuum
ergo diverſam hæ ſuppreſſionum ſpecies poſcunt medellam, quare materia du-
plici articulo diſtingui oportebit.

De repentina ſuppreſſione menſtruis adhuc fluentibus.

I. Si ægrotantes violentioribus animi pathematibus laſſecitæ, aut formidine
commotæ fuiſſent, quietem ſpiritui reſtituere, ac morboſas removere impreſſio-
nes ſollicite curabis, quod ſi a frigore paſſo procederet, ægras prompte cale-
facere neceſſe erit.

II. In utroque caſu fas erit aliquid ſpirituofi ſubito exhibere, ut vinum cy-
prium, aquam meliſſæ ſimplicem, vel compoſitam, aquam carminum, aut flo-
rum aurantiorum, vel garum &c., naribus etiam aliquid empireuma redolens
apponere, huiusmodi ſunt ſal anglicus volatile, oleum volatile aromaticum,
vel ſpiritus urinæ, aut ſalis amoniaci &c., opportuna pariter erunt ſuffumigia, ex
plumis, pillis, corio, ungulis equinis, aut violaceis taniis combuſtis parata,
femora tandem calidis fricabis linteis.

III. Pedes luere ſaluberrimum erit, lavacro permiscendo decoctiones ex ruta,
matricaria, vel artemiſia aliſque plantis anthyſtericis conſectas.

IV. Iis pro menſtruis revocandis incaſſum adhibitis, pedes ſtatim uberrime
ſecare, idque quarta hora tranſacta renovare oportebit, præſertim ſi ſuffocatio-
nes, cordis palpitationes, capitis dolor, ſopor, convuſſio, aut hyſtericus mor-
bus vehementer perſiſterint.

V. Singulis horis exhiberi potiffimum erit unum, vel duo cyathi infuſionis
artimiſiæ, meliſſæ, matricariæ, ſalviæ, vulnerariæ elvetiorum, aut the-
ſimplicis.

VI. Pervices ægrotantes aſſumere poterunt cocleatim potionem athyſtericam,
cui idonea addatur doſis tincturæ annodynæ, quæ obtundere valeat convuſſivas
conſtrictiones, potiffimas eorum ſymptomatum cauſas; ipſa potio, ut opus requi-
rat, plus minusve erit reiteranda. Subſequens vero formula indicationem im-
plere videtur.

R. *Aquar. Artemisæ & Melissæ ana. ℥ ij. quibus dissolv. Baracis Venetæ*
℥ ss. Theriacæ veteris, ℥ j.

Add. *aq. Cinnamom. hordeatæ ℥. i.*

Tinct. anodyn. gut. xxx.

M. F. Haustus, fumendus ex cocleari.

VII. At si morbi violentia aliquid efficacioris postulaverit, sequentes pillulæ ad rem facient.

R. *Assæ fætida & Castorei ana. gr. ix.*

Salis volatilis viperarum gr. xii.

Laudani opiat gr. iii.

M. F. Massa, dividenda in pillulas æquales probe deaurandas.

Hujusmodi duo, vel tres singulis horis ingurgitare poterunt ægræ, donec novæ sensim subigantur scœnomena, quibus etiam superbibere saluberrimum erit infusio n. v. descripta.

VIII. Si ægrotans frustra reiteratis pedum venæ sectionibus diu sopore, aut violentiori convulsione laboret, quatuor, vel quinque grana tartari emetici præscribi poterunt in superallata infusione soluta; præcipua ista videtur methodus, qua cerebrum laxando, & venosas appendices reiterando suppressioni facilius mederi possit.

IX. Si menstrua iis auxiliis se restituerint, ægra jam valetudinem recuperaverit, quam confirmare tantum opus erit; at si illa, vel minime, vel imperfecte renovarentur, statim ipsa erunt idoneis revocanda remediis: circa quæ futurum articulum consulere oportebit; tamen nisi symptomata urgeant per integrum mensem cunctari posse censeo, donec statum revertatur tempus, quo magis solida medendi ratio institui conveniat.

X. Dum ægræ vehementioribus adhuc cruciantur molestiis nullum erit alimentum exhibendum, quod ventriculum gravare possit; si vero morbus diuturnus evaserit eum subministrare necesse erit, at morbo deservente addi poterunt gelatina animalis, orizorum cremor, aut recens ovorum vitellus, ita gradum faciendo ad nutrientia magis alimenta.

De suppressione, quæ persistentibus menstruis sensim eorum implicat regressum.

Hujusmodi suppressio quatuor complectitur species; prior quæ rubro destituta, albo tantum fluore pollet; altera quæ nullam vel ex parte uteri, vel ex alia quavis læsa functione molestiam conjunctam habet; tertia quæ utero indolente chlorosim tamen inducit; postrema tandem in qua patientes uteri tensione, dolore, colica, aliisque noxiis laborant symptomatibus.

Prior remedia postulat, quæ albo fluori medentur, circa quod caput infra pervolvere oportebit, ubi speciatim de albo fluore pertractabimus.

Secunda molestiis expers medelam minus implicat, attamen cum sterilitatem producat, ac diuturnitate sua uteri substantiam compingat nimis, prudentis Medici erit ipsam curare.

Vidimus jam hanc gignere lymphæ lactæ defectum, ut de emaciatis, infirmis, aut valetudinariis mulieribus constat, vel tunc oriri cum lymphæ diutinæ diarrhoeæ, crebræ hemorrhagiæ, phlebotomiæ, aut reiteratæ purgationis ergo alio errumpat, e quibus indicabuntur.

i. Sanguinis chylique augmentum per analepticam diætam ægras nutriendo, facilis

facilis digestionis alimenta, & optimæ indolis ter, quaterve renovando prandium, si id ventriculus sinat; tum cocolatium, aut crustulum vino lbero imbutum, ovum recens, aut lac exhibendo.

2. Proscribere necesse erit remedia omnia, quæ laxitudinem faciunt, uti venæ sectio, purgationes, clysteria etiam nisi majores molestiæ ipsa exposcant.

3. Evacuationes omnes interdicare a quibus sanguis vel lymphæ depauperantur, hujusmodi sunt ventris fluxus, sudor, aut ex naribus cruoris jactura.

4. Aëgras per aliquod temporis spatium cogeris sedentariam vitam gerere diu se lectulo detinendo; uno verbo spiritus, ac corporis inactione cunctari, ne humorum dispendium augeatur, ut per transpirationem fieri solet.

Tertia vero, & *quarta* suppressionis species, quæ veros morbos constituunt, efficaciora etiam postulabunt auxilia ad tres præcipuas classes redigenda; triplicem enim ex antea actis patet dari indicationem, quam implere conveniet.

I. Densum compactumque uteri contextum relaxando ejusque vasa, aut tunicas dilatando.

II. Sanguinis affluentis nisum augendo ita, ut resistentia uteri vascula ipse valeat referare.

III. Hanc aperitionem provocando crebris, successivis succussionibus, aut lenioribus convulsionibus in utero concitatis.

I. Priorem multiplex implet medendi methodus, quæ omnis tamen eodem collineat fine, eisdemque gignit effectus, at ut clare procedamus a simplicibus, & familiaribus remediis incipiemus; hujusmodi sunt:

1. Jura ex pullo gallinæ, aut vitulo confecta, herbis remixta refrigerantibus, & emollientibus, quales sunt radices Althææ, Cichorrhææ sylvestris, Buglossi, Fragariæ, aut Oxalidis, tum Folia Boraginis, Buglossi, Petroselinii, Lactucæ, Scolopendræ, & Caterach &c. quatuor etiam semina frigidiora usuvenerunt, in quibus solvatur drachma salis Prunellæ aut Crystalli Mineralis.

Apozemata refrigerantia ex decoctionibus earundem stirpium parata, quibus addi poterit semidrachma Nitri purificati, aut Crystalli mineralis cum uncia simul syrupi Capillarium, Violarum, Cichorrhææ, aut Bismalvæ.

Serum lactis probe depuratum ad uncias octo, vel decem, in quo grana viginti, aut vigintique solvantur Salis mirabilis Glauberri, vel ipsum ferri extinctione chalybeatum, cui addi potest uncia syrupi appropriati.

Aquæ minerales ferrugineæ, & vitriolicæ, quales sunt illæ quæ in Gallia reperiuntur prope Caransac, Spa, Forges, Camarets, Passy, quas haurire poterunt ægræ idonea tempestate, & præmissis vulgaribus cautelis per quinque, & decem dies, tres hebdomadas, aut integrum mensem in earum usu persistendo.

2. Opportunissima erunt clysteria refrigerantia, & emollientia ex tepenti aqua fluviali; tum ex fursis decoctione, sero clarificato, decoctione foliorum Malvæ, Althææ, Brancæ Ursinæ, Parietariæ, Mercurialis, Porri, aut Verbasci &c. tum feminibus Lini, aut frigidis quatuor, in quibus solvatur salis Prunellæ drachma, additis aceti cocleare, vel uncia una Mellis Violati, Olei Liliorum, aut Pulpæ Cassiæ.

3. Balnea, aut semibalnea tepida aquæ dulcis, aut fluviatilis quibus mane horæ, & dimidii spatium uti debet, ea duodecim, aut quindecim dies continuando, pluriesque reiterando, donec opus requirat, quibus adjungi possunt decoctiones ex superallatis plantis peractæ, vel manipuli nonnulli seminum Lini, vel frigidorum.

4. Fomenta ex duplici linteolo similibus decoctionibus imbuta & accurate expresso parata, quæ calida hippogastricæ regioni applicabis donec refrigerata per horam, & amplius pluries reiterabis.

5. Vapor quem calidæ effundunt similes decoctiones fellæ familiaris ope per horam,

horam, aut dimidium intra pudenda receptus, verum ut ille intimius penetrare valeat fellæ tubulus nectitur; animadvertendum tamen est ne hic vas immediate tangat, quo fervens continetur decoctio, nam calor ipsi communicatus facile vulvam, & vicinia læderet.

6. Brachii modica venæ sectio reiterata potissima est vasa uteri extricare, ac extendere, dum sanguinis redundantia nimium turgescunt, quod in plethoricis mulieribus sæpe sæpius evenit, ut ex uteri tensione, & dolore persistenti manifestatur, instante etiam menstruo; nunc in propatulo est (a) Riverii observatio, quæ ostendit unicum esse uteri statum in quo brachium seccare fas erit: ceteris vero suppressionum speciebus venæ sectio ex eo loco nocua erit, quod in hac re pro lege habeto.

7. Narcotica qualiâ sunt syrupus diacodii, aut Karabis, laudanum utrumque, tinctura anodyna, pillulæ cinoglossæ congrua dosi exhibita, pene specifica experiuntur auxilia in uteri convulsionibus & erethismo. Opportunissima pariter evadunt si compactio solidorum prævaleat, nam nil magis laxat fibrarum rigiditatem, quam si spirituum affluxus intercipiatur, qui tensionem magnopere auget; verum hujusmodi remedia sanguinis molleculas segregando, atque attenuando menstrua promovere valent, procul eorum sententiam, qui ea potius suppressimere defendebant.

8. Emollientes uteri injectiones vulgo *Metrenchytes* conficiuntur ex decoctionibus emollientibus plus minusque saturatis per sifonem injiciendæ, cujus tubulus inflexus in globulum definit plurimis undique foraminulis pertusum; animadvertendum porro est injectiones tepentes a naturali calore parum diversas adhibere, ne uterum ipsæ lædant cum matricis cavum debeant intrare, & ægræ positu suo horæ saltem spatium illas perferre: earum tamen usus pene obsolevit, tum quia indecens, cum difficilis evadat, aut damnum inferat, item frustraneus videtur, cum ad uterum raro pertingat.

9. Idem de pessariis emollientibus judicabimus, quæ ex plantis laxantibus coctis, & contusis patrabantur, ac in pulmentum redactis subtiliori tella involutis usuveniebant, gossipium etiam, vel aliud quidpiam cylindraceum tella indutum, & decoctione, aut succo earum similium plantarum imbutum, eidem usui cedebat, ab hoc tamen remedio hodie prudentis Medici abstinere erit.

II. Ut alteri vero indicationi satisfaciamus, solventibus, attenuantibus, ac aperientibus medicamentis uti necesse erit iis præsertim, quæ *Emenagoga* appellantur; menstrua videlicet promoventia etiam si forte hoc nondum pro inefficacia nomen sibi promerita sint; ex triplici hæc regno desumuntur, vegetabilium nempe, animalium, & mineralium, alia simplicia sunt, composita alia, ea methodice ostendam, a mitioribus incipiens, & usitatoribus, quæ * asterisco signabo, tum dosim singulorum pro unica vice, & sumendi modum indicabo.

Vegetabilia.

Radices

* *Aristolochia rotunda*

longa

* *Rubia Tinctorum*

Pulegium

Apium

(a) *Observat. Centur. I. Observat. 2.*

Apium
 * Bruscus
 Angelica
 * Asparagus
 Imperatoria
 Petro-felinum
 * Eryngium
 * Ononis
 Cyperus
 Iris
 Valeriana
 Gentiana
 Bryonia
 Cyclamen
 Elleborus niger
 Arum

a 3 S. ad 3 i pro decoct.

a 3 ii ad iv pro decoct.

a 3 S. ad 3 i. in subst.

ad 3 S. pro decoct.

a 3 i ad 3 ii in subst.

Folia

* Marubium album
 * Pulegium
 Dictamus Creticus
 Ruta
 Majorana
 * Matricaria
 * Abrotanum
 * Artemisia
 Nepeta
 * Calamintha
 Origanum
 * Tanacetum
 Melissa
 Salvia
 Ros Marinus
 Mercurialis
 * Chamædrys
 Thuyas Theophrasti

a m. S. ad i. pro decoct.

Flores

* Chamæmelum romanum
 * Matricaria
 * Melilotus
 Anthos
 Lavendula

a 3 i ad 3 iii pro decoct.

* Crocus orientalis S. p. a gr. x. ad gr. xx., vel ad p. i. pro infus.

Semina

Nigella
 Ruta
 Anifus

Sexeli Massiliae
 Daucus Creticus
 Feniculus
 Sifarum
 Levisticum
 Nasturtium
 Apium
 Cuminum

a 3 i ad 3 ii pro decoct.

a 3 S. ad 3 i. in subst.

Baccæ

* Laurus

a 3 i ab 3 ii pro decoct.

a 3 S. ad 3 i. in subst.

* Juniperus

a 3 ii ad 3 iv pro decoct.

Aromata

* Macis

a gr. x ad xv

Nux miristica

a gr. xv ad xx

* Cynammomum

a 3 S. ad 3 i.

in subst.

Cortices

* Tamariscus

a 3 i ad 3 iii pro infus.

* Capparis

a 3 S. ad 3 i. in subst.

Kina kina a 3 i in subst. ad 3. ii. in decoct.

Gummi, & Resinæ

* Myrrha

* Aloes

Opopanax

* Asa foetida

* Ammoniacum

Sagapenum

* Galbanum

a gr. vi ad 3 S. in subst.

a gr. vi ad 3 S. in subst.

Animalia

* Castoreum

* Millepedes

Testes Equini preparati

a gr. vi ad 3 S. in subst.

Mineralia

* Succinum flavum

* Borax

* Sal Ammoniacum

a 3 S. ad 3 S. in subst.

Remedia composita.

Galenica

* Aqua Menthae	}	ad ℥ i ad ℥ ii
- - - Pulegi		
* - - - Matricariae		
* - - - Artemisiae		
- - - Abrotani		
* - - - Absinthii		
* - - - Rutae		
- - - Salviae		
- - - Marubi		
- - - Rubiae tinctorum		
- - - Tanacetii	}	a ℥ i ad ℥ i cum dimid.
* Acetum Scilliticum		
* Oxymel Scillitic.		
* Syrupus Marrubi	}	a ℥ i ad ℥ i cum dimid.
- - - Calaminthae		
* - - - V. Radicum aperientium		
* - - - Artemisiae		
* - - - Hyssopi		

*Chymica**Tincturae*

* - - - Croci Orientalis	}	a gutt. vi ad gutt. xv.
* - - - Mirrhæ		
* - - - Castorei		

Salia

* - - - Tartarus Martialis	}	a ℥ i ad ℥ i
* - - - Sal admirabile Glauberii		
* - - - Arcanum duplicatum		
* - - - Terra foliata Tartari		
* <i>Præpararationes Martis aperientes.</i>		
* Crocus aperiens rore paratus	}	a gr. xv ad ℥ s.
* - - - idem Sulfure paratus		
* - - - idem Aqua simplici		

Præparaciones Mercurii parum, vel nihil catharticae

* Ethiops mineralis igne paratus	}	a gr. x. ad xviii
* - - - idem trituratione confectus		
Panacea mercurialis	}	a gr. vi ad gr. x.
Cinabaris factitia		

Hujusmodi sunt remedia in suppressionis negotio magis commendata: adhibendi modum tamen variare facile est pro morbi indole, aut ægrotantium genio;

nio; patrari enim ex liquidis poterunt decoctiones, apozemata, potiones, julepia syrupi, vel ex solidis componi, pulveres, opiata, bolli, aut rotulae &c.

1. *Jura* ex pullo conficiuntur exantherato, & excorticato, vel ex libra semisse pulmonis vitulorum, aut vervicis, vel agni jugulo sufficienti aquae quantitate coctis; prope ebullitionis vero finem radices nonnullae ad unciae dimidium, vel plantarum folia ad manipulum adduntur, radices tamen diutius quam folia sunt ebulliendae, inde percolato brodio in eo sal quoddam, aut aliqua ex chalybis aperientis preparationibus solvi potest quindecim, aut viginti dies in eorum usu persistendo.

2. Simili modo parantur *decoctiones*, seu apozemata, carnibus exceptis, quae ipsis non permiscantur, syrupi alicujus unciam addendo, eaque per idem tempus exhibebuntur, nisi identidem bis in die hauriantur.

3. In *potionum* compositione duo, vel tres aquae distillatae seliguntur ad unciae unius & semis, vel duarum unciarum dosim sumptae, vel earum defectu plantarum quarundam decoctio sumitur ad quinque unciarum circiter dosim in quibus solvantur sal quoddam idoneum, vel martis aperientis aliqua preparatio, aut pulvis ex plantis emenagogis decerpta, tum addi possunt theriaca, & confectiones hyacintina, aut alchermes, vel tincturae nonnullae quales sunt Castorei, Mirrhæ, Assæ Foetidae &c., quae praescribi possunt cocleatim singulo horae dimidio ut opus indigerit.

4. *Julapia* a potionibus nihil differunt nisi quod minus salis, aut pulveris contineant, verum syrupus aliquis superaddatur, & uno, vel duplici haustu assumantur.

5. Nisi obvii satisfaciant *syrupi* secundum artem quot lubent patrari possunt, alii plures ex saturatissimis radicibus, vel foliorum decoctionibus, ex plantis emenagogis selectioribus confectis, quae sacchari additione ad syrupi consistentiam reducuntur, ii syrupi julapiis, apozematibus, aut opiatis adjungi possunt, quae sibi praescribi lubeant.

6. *Pulveres* simpliciores sunt Galenicæ preparationes ex duabus, vel tribus simul radicibus, foliis, seminibus, corticibus, aut gummis emenagogiis electis, simul contusis peractae, quae pro unaquaque vice ad scrupulos duos, vel drachmam circiter juris, apozematis, aut vini cocleare exhibentur.

7. *Opiata* in hoc a praecedentibus differunt, quod mellis, syrupi, aut conservae auxilio massam constituent electuarium referentem, quam panis plagula involutam praescribunt, juris, vel apozematis coclear superbibendo.

8. *Bolli* ab opiatis majori duritie distant, maxima vero *pillulae* quae resinis, gummisque magis coagmentatae illis firmitate praecellunt, eaque auro obvolutae superiori methodo sumuntur.

9. *Rotulae* tandem conficiuntur, sufficientem sacchari quantitatem pulveribus remixtam idonea aqua distillata, aut decoctione coquendo ad syrupi consistentiam, quae super marmoream levigatam superficiem extensa in plures diversimode configuratas scinditur tabellas.

III. Multiplici via *tertiam* poteris indicationem implere, aperitionem videlicet venosarum apendicum promovere, vel sanguinis nisum augendo, vel uterum emenagogis succutiendo.

1. Pedum venae sectio, quae velocitatem sanguinis intendit per aortam descendens dum ipse uterus proficiscitur, certior est, promptior, minusque suspecta catamenia ciendi methodus, ea tamen revertentibus menstruis si adhibeatur, proxima jam eruptione efficacior evadet gradum impulsione sanguini addendo, quae tantum deficit ut completa oriatur effusio.

Olim substituebantur, vel cucurbitulae femori applicitae, vel cauterium popliti, at infirmæ virtutis causa hæc pene exolverunt remedia, pediluvia etiam ex plantis

plantis emenagogis parata aliquam solent utilitatem afferre, venæ sectioni tamen debiliora.

2. Clysteria pariter conferunt ex similibus stirpibus confecta, Matricaria videlicet, Artemisia, Pulejo, Salvia &c., vel ex floribus Chamameli, Meliloti, Lavendulæ &c., quibus addi possunt Mellis Mercurialis, vel Catholici duplicati uncia una, aut hieræ picræ Galeni drachmæ sex, quibus uterus comoveatur.

3. Purgantia conveniunt, nonnihil stimulantia quæ intestina convellendo uterum excitent, conflantur ex Aloes, Jalapæ, Diagridii, pulveris cornachini congrua dosi, aut Hieræ Picræ drachmis tribus circiter in bolos redactis.

4. Emetica, quæ diaphragma, & musculos abdominis convellunt ac uterum proinde secutiunt tres, vel quatuor grana (b) tartari emetici, aut grana vintiquinque pulveris ipecacuanhæ jure, vel theiformi solvendo erunt exhibenda.

5. Errhina, seu sternotatoria Scheiderianam vellicando, emeticorum more uterum pariter irritant, hujusmodi sunt folia Nicotianæ, Betonicæ, Salviæ, tum radices iridis, hellebori &c.; quæ si leniter agant addi poterit euphorbi nonnihil, pyretri, aut macropiperis.

6. Balnea, & semibalnea plantarum, fomenta regioni hypogastricæ applicata, injectiones per vaginam ad uterum evectæ, ex similibus plantis paratæ opportunissima sunt, circa quæ pervolveris quæ superius n. III. IV. & VIII. indicavimus, at parum efficacia hæc nunc experiuntur medicamenta jam obsoleta.

7. Suffumigia n. v. descripta vel humida, vel sicca esse possunt, humida perficiuntur ex vaporibus plantarum fellæ familiaris ope pudendis receptis, sicca vero ex fummo parantur, qui ex pharmacis, aut pulveribus emenagogis ustis sublimatur pari modo receptus; olim sicca hujusmodi suffumigia crebre usuveniebant ex acrioribus etiam substantiis composita, hodie pene contemnuntur detrimenti ergo, quod afferebant: humida iis substituuntur, & quidem acria, & nocua minus, quorum formulæ visitiores sunt:

R. Aquæ communis, vel Decocti cujuslibet emenagogis bullientis q. 5.
Adde spiritus salis ammoniaci pauculas guttulas
Vapor excipiat utero. Vel

R. Scoriarum Reguli antimonii q. 5.
Coque in lixivio cinerum, donec lixivium rubicundum fiat.
Vapor excipiat utero.

Si ea incassum adhibita sint, sequentibus uti poteris, dummodo agra laxum servent uterum, & dolore sint expertes.

R. Lixivii Scoriarum Reguli antimonii, de quo modo, part. IV.
Vini Malvatici part. II.

M. & affunde super silices ardentes, vel ferrum candens
Vapor utero excipiat utero. Vel

R. Scorias Martis ignitas, aut ferrum candens, affunde urinam antiquam, & foetidam.
Vapor utero excipiat utero.

8. Pessaria usitiora erant remedia pro mensibus revocandis, immo ex acrioribus coagmentabantur substantiis, raro nunc usuveniunt, vel mistiora tantum ex linteis mercurialis succo imbutis, aut ex pulveribus nigellæ, mirrhæ, mercurialis

(b) Dosis Tartaris stibiati pro adivitate infusionis variare solet, quare Regionis consuetudini, & preparationi usitatori consulere oportebit.

curialis succo, & melle coctis conflata adhibentur, interea hæc intra vaginam introducuntur, virginibus vero vulvæ tantum applicantur, & configurationis ergo *nascalia* vocantur.

9. Iis remediis omnibus tandem addi poterit motus muscularis valde proficiuus qualis est deambulatio, æquitatio, rhedæ, corheæ, atque matrimonii usus, hæc omnia tamen inutilia evadere censemus, nisi idoneo adhibeantur tempore, cum nempe eruptio instare videatur.

Cautelæ in suppressionibus medendis necessarissimæ.

I. Antequam emmenagoga exhibeantur remedia primas vias catharticis expiare, sanguinem alterantibus corrigere oportebit.

II. Verum idonea tempestate vere nempe, & autumnio menses excitabis, quando humores fluidiores, solida laxiora sunt.

III. Æstivo tempore solventium, & aperientium usum interdicendum esse tibi suadebis, ne patientes nimis ferveant; tunc temporis diluentia, & humectantia erunt adhibenda, qualia sunt balnea aquæ minerales, vel forte mitiora emenagoga.

IV. Hyeme nullis, aut debilioribus uteris medicamentis, frigus enim, quod humores inspissat, atque vasa arctat, eorum impedit effectus.

V. A lenioribus incipiens, ad validiora gradum feceris, prout illorum inefficacia cogat.

VI. Inter efficaciora menses impellentia martis præparationes magni feceris, & mercuriales superenunciatas, verum gumm. amoniac., galbanum &c., dummodo congrua dosi ad rem exhibeantur.

VII. Diluentia, & emollientia vicissim solventibus erunt substituenda, ut illis uteri vasa relaxentur, dum his sanguinis nisus intenditur, ut appendices valeat referare.

VIII. Sæpe solventia, & emenagoga diluentibus, & laxantibus conjungi poteris, tum ipsis addi narcotica, modica tamen dosi, ne soporem inducant.

IX. Modificare, aut interdicere oportebit emenagogorum usum, si uterus doleat, aut ægrè ferveant, quod constabit insomniis, siti, aut lotii calore.

X. Hæc præsertim animadvertere necesse erit in iis mulieribus, quæ bilioso donantur temperamento, & sanguine acri, ac sicco, fibrisque tensis, rigidis polent irritabilibus; in hujusmodi circumstantiis validiora remedia calorem facile, & ipsam febrem concitabunt.

XI. Similia cavebis in iis, in quibus pulmo debilis, atque gracilis apparet angustia, & compactionis ergo, tum respiratio crebra difficilis, vel tussis adest, vel in quibus parentes iisdem morbis fuerunt obnoxii.

XII. In hoc postremo casu non solum bechica, & humectantia exhibeto, verum lac asininum, aut caprinum, etiamsi istiusmodi in suppressione sit suspectus usus.

XIII. Persuadebis contrariam medendi methodum uteri, aut pulmonum inflammationem, vel ulcus facile inducere, aut vas aliquod lacerare, a quo periculosa sanguinis jactura erit consequutura.

XIV. A validioribus abstinebis, & arctioribus emenagogis quidquid de iis auctores prædicent.

XV. Majora nocumenta inferre experientia docuit pessaria, injectiones, & acria suffumigia, quæ uterum immediate aggrediuntur, hæc ex scoriis antimoni pulverifatis, & combustis, vel ex miscella calcis vivæ & urinæ conficiuntur, quæ posterior sal volatile ammoniacale præbet.

XVI. Sapienter enim circa catameniorum regressum potius cunctaberis, quam ea suspecta ratione revocare, ut omne ægras ledendi periculum absit.

XVII.

XVII. Dum in menſtruis futuris prudenter cunctamur, ſuppreſſionis ſymptomatum imminutioni erit conſulendum idonea venæ ſeſtione, repetita purgatione, & regimine potiffimum adhibitis.

XVIII. Si tunc menſtrua alio ſibi pandant viam, cum id præſertim per pulmones, aut aliud nobile viſcus fiat, emenagoga omnia erunt proſcribenda.

XIX. Remedia in hoc caſu amplecti oportebit, quæ hæmorrhagias ſiſtere valeant, de quibus infra capite ſeptimo ubi de catameniis revolutis erimus loquuturi.

XX. Tandem fruſtra remediis omnibus adhibitis, ut cum levamine menſes revertant paliativa medela erit inſtituenda, identidem venam ſecundo, ægras purgando, atque diætã modificando, tum ciborum quantitatis, cum qualitatis ratione, verum idoneis apozematibus, aut aquis mineralibus ſanguinem edulcorare fas erit, uſque dum natura aliam ſubſtituat menſibus ſemitam, ut per urinas, catharſim, ſudorem, aut inſenſibilem tranſpirationem ſæpiſſime accidit.

Innocua medicamenta in ſuppreſſionibus valde commendata.

Apud celeberrimos praxis ſcriptores plura huiusmodi reperiuntur remedia, quarum multitudo ipſa infirmam oſtendit virtutem; incalum enim tot proponerentur, ſi pauca eſſent certiffima: nonnulla hic enunciabimus, quæ porro ſuperallatis collineant indicationibus, & a nobis ſuperius quandoque jam deſcripta, in iis tamen enumerandis diſtingui debent innocua a minus tutis; quare duplicem articulum inſtituemus.

I. *Chamæmelum Romanum* ejuſdem decoctio ex florum manipulo conſecta mane jejuno ſtomacho exhibetur, per plures dies, innocuum ſed infirmum eſt remedium, quidquid de eo prædicaverint.

II. *Rubia Tinctorum* ex illa æquali ſacchari quantitate remixta pulvis fit in iis morbis commendatiſſimus, qui mane per quinque vices vino calido hauritur, verum tum utilitate, cum damno expers evadit.

III. *Artemiſia vulgaris* uſitatiffima eſt, extollunt præſertim conſervam quamdam ex tenellis ejuſdem foliis contuſis, & duplo ſacchari remixtis conſectam, jejuno ſtomaco ad drachmam exhibendam per plures dies eruptione inſtanti. (a) Zacutus aſſerit, hoc remedium proficuum magis evadere ſi uncia duæ ſuperbibantur aquæ Sabinæ, quibus per integram noctem rhabarbari drachma ſemis inſuſa fit, at Sabina pernicioſa, eſt ut ſequenti articulo oſtendam.

IV. *Lavendula* ubi hæc paſſim creſcit; ruſticæ mane ejuſdem manipulos aliquos comedunt jejuno ſtomaco tritos, & melle remixtos juſ ſuperbibendo ciceris, aut marubi albi per plures dies.

V. Ex *Calthæ*, vel *Calendulæ* floribus quædam paratur conſerva cujuſ drachmas duas ſimili methodo mane ſolent exhibere.

VI. *Ros marinus* ex florum manipulo, & *Cheiri* tribus ſimul vel quatuor pugilis fit decoctio mane ſumenda.

VII. *Ariſtolochia* cujuſ duplex ſpecies eſt longa, & rotunda præter decoctiones quas ſuppeditat, ex ea proſtrant pillulæ ſic dictæ de *Ariſtolochia* (b) *Fernelii* magnopere commendatæ.

R. Ra-

(a) Prax. admirand. Lib. II. Obſerv. 99. (b) Fernelius Meth. medendi, Lib. VIII.

R. Radicum Aristolochiæ rotundæ ℥ i.

Radicis Gentianæ, Myrrhæ electæ ana. ℥ iii.

Aloes & Cinnamomi ana. ℥ s.

Zinziberis ℥ i.

Omnia exquisitissime trita excipiantur oleo Amygdalarum dulcium recenti.
F. Massa Pillularum.

Ipse per plures dies continuari possunt ad drachmam unam cum semisse etiam jus superbibendo plantarum edulcorantium leniterque emenagogarum.

Si Rubiam tinctorum Aristolochiæ copulaveris, alias habebis pillulas potissimas illis nihil infirmiores.

R. Radic. Aristolochiæ rotundæ & Rubiæ Tinctorum ana. ℥ s.

Agarici, & Cinnamomi ana. ℥ i.

Croci oriental. pulverat. ℥ i.

Cum succo Artemisiæ. F. Massa Pillularum, cujus dosis a ℥ i ad ℥ ii & simplicius.

R. Radicum Aristolochiæ rotundæ, & Rubiæ Tinctorum ana. ℥ i. vel ℥ s.

Agarici trochiscati gr. XV. M. cum syrupo de Artemisia. F. Bolus pro una dosi.

VIII. Sanguis hirci silvestris præter alias utiles proprietates etiam menses cire valet a scrupulo uno ad drachmam semis sumptus sub forma pulveris aut boli aliqua decoctione solutus, substitui potest ille hirci cicurati, at efficax minus experitur, ideoque dosis erit duplicanda.

IX. Fermentum panificum vetus sumitur mane ad nucis juglandis volumen prope eruptionis tempus sacchari anatina quantitate commixtum, & apozemate, vel aqua emenagoga solutum; hoc magnificiunt remedium; id tamen (c) Galeni auctoritate invaluisse suspicor, qui discutiendi, & resolvendi ei perperam tribuit facultatem, quod de externo usu non de interno erit intelligendum; verum nisi utile intus sumptum innocuum saltem evadet.

X. Aloes cujus succus aqua rosarum lotus basim constituit pillularum de Aloe lota vulgo, quæ cathartica, & solventi donantur virtute. Medici nonnulli ipsas in suppressionibus revocandis valde commendant ad scrupulum unum exhibitas, quidam illis scrupulum etiam addunt pulveris sabinae, quos imitari contendo.

Succus Aloes basi cedit Hieræ picræ electuari species obvia, quam hujus ingredientis ratione ad menses ciendos (d) Galenus maxime laudat, exhibetur ipsa unius, vel duplicis drachmæ dosi simplex, vel dimidio scrupuli Castorei remixta in bolum reducta, ne amaritudine gustum offendat, ei superbibere necesse erit jus pingue, aut decoctionem idoneam, quæ illam ventriculo solvat.

Aloes succus mirrha simul, & croco compositionem intrat pillularum pestilentialium Ruffi, quare & ipsæ in suppressionibus commendantur per plures dies sumptæ ad scrupuli semis, vel duorum scrupulorum dosim.

Tandem cum elyxir proprietatis Paracelsi ex tinctura spirituosâ earundem pillularum eliciatur, atque Garrus idem sit B. M. distillatus, ideoque utiliter in men-

(c) De Simplic. Medicament. Facult. Lib. VIII. Cap. 16. n. 42.

(d) De compos. Medicam. Lib. VIII. Cap. III. Et de Curand. ratione per veng. sect. Cap. 18.

menstruis medendis ipsa usuveniunt, primum ad guttas XV. aut XX: , alterum cocleatim per plures dies idoneo fumuntur vehiculo.

XI. *Porrum*. Hyppocrates, seu auctor libelli *de natura muliebri*, commendat succo bracicæ copulatum, verum timeo ne effectus spem eludat.

XII. *Crocus Sativus*. Ejusdemque flores emenagogi sunt stomachici, & anodynici ac multiplici ratione usum habent, intrant pillulas pestilentiales elyxir proprietatis, adduntur plerisque præparationibus in hoc morbo usitatoribus, ac modica dosi infunduntur appozematibus, & theiformibus, tandem ovorum vitello per dies nonnullos a duodecim usque ad viginti drachmas exhiberi solet.

XIII. *Mercurialis* quam inter plantas emenagogas recensuimus, & pessariis fabrefaciendis cedere vidimus a (e) D. Arnaud de Villeneuve plurimi existimabatur ut sequentis compositionis basim constitueret, quam in suppressionibus medendis magni faciebat.

R. *Succi Mercurialis*, & *Mellis despumati*, ana. ʒ i.

Farinæ Nigellæ quart. S. vel q. S. ut possint confici pillulæ

Dosis a ʒ i. ad ʒ ii. per aliquot dies cum instat Catameniorum periodus.

XIV. *Mirrha* inter excellentiora, & validiora recensetur remedia menstruis evocandis idonea, quare omnis pene bolis, aut opiatis permiscetur magis obviis.

Plures extant præparationes quarum mirrha basim constituit, hujusmodi sunt trochisci mirrhæ a drachma semis ad unam, cum hastulo plantarum sumptum pillulæ Montagnanæ adhuc celebratæ.

R. *Trochiscor. de Mirrha*. ʒ i. S.

Semin. Apii, Castorei & *Corticis Cassiæ*, ana. ʒ i.

Moschi gr. x. Cum succo Apii formentur pillulæ n. xii. Capiat duas mane per aliquot dies.

Si pharmacopeas pervolveris, innotebit illas diversimode reformatas fuisse, at auctoris nomen, & vires easdem retinuisse.

XV. *Ferrum sive Chalybs* præter diversas ipsius præparationes in hac re usitatissimas reliquæ sunt duo simplicissimæ, & validissimæ quidem non contemnendæ, altera conflatur ex anatina parte limmaturæ chalybis subtiliter pulverisatæ, & foliorum calaminthæ cum sufficienti syrupi artimisiæ quantitate subacta; altera paratur ex croco martis aperientis sulphure patrato duplo cinnamomi acuti, & triplo sacchari, quibus simul commixtis pulvis conficitur, aut rotulæ mane exhibendæ per plures dies a drachmæ semis, ad drachmam unam.

XVI. *Circæ nigrum, vel rubrum* cum radice simul apii diu ebullitum, addito sub fine ebullitionis pauco croco, & cinnamomo, tum etiam butyri nonnihil similibus usibus cedit.

XVII. *Marrubium album sive Prassum*, hoc infunditur, vel ebullitur parum in sufficienti vini albi copia & loco cænæ calide hauritur, remedium optimum evadit, dubito tamen de laudibus eximiis quas medicus (f) quidam ipsi tribuit.

XVIII. *Splen bovis castrati* duplici methodo pro catameniis præparatur. Prior decoctione perficitur; splen enim recipitur integer sanus qui in frustula scinditur,

(e) Lib. de Mulier. sterilitate. Cap. 8.

(f) Boerellus Conturb. IV. Observ. 14.

ditur, ex quibus cucurbita ad medietatem repletur, hinc adduntur cinnamomi ruditer contusi uncia una, cariophyllorum uncia semis, & croci fativi drachmæ duo cum sufficiente vini albi quantitate; iis omnibus dispositis operculum bene lutatum concurbitæ nectitur. tunc per B. M. horarum viginti quatuor spatio omnia erunt ebullitura donec splen in pulvem abeat; verum refrigeratione completa jus percolatur, & ad uncias quatuor per quinque consequutivos dies instantibus menstruis ægris mane propinatur.

Alter methodus est (g) tincturam quamdam eliciendo, quam nunc ostendemus.

R. Splen Bovis in minutissimas contritum portiunculas, per aliquot dies spirituosa mirrhæ tinctura maceretur, ea vero frustula solis umbræ dein exsicato, & ex iis spiritu vini vulgari methodo tinctura eliciatur, & additis si lubeat paucis guttulis olei Angelicæ ut grata magis, & proficua evadat ad scrupulum unum idoneo soluta vehiculo per aliquot ante eruptionem dies exhibeatur.

Hæc postrema remedia a (b) Paracelso originem ducunt, qui primus ut ego autumo de Splene Bovino in menstruis utili loquutus est; tamen neque auctoritas, neque experientia illa foveant, verum si qua esset in iis remediis efficacia pharmacis potius iis admixtis, quam lieni tribueremus.

XIX. *Castoreum* liquor est pinguedinosus empireuma redolens, qui billoculari duplici animalis folliculo congeritur: utilissimum præstat auxilium tum hysterici insultibus, cum in mensibus provocandis, eum in subtilissimum pollinem redactum a granis decem ad scrupulum unum, vel in tincturam a guttis quindécim ad triginta propinatur.

Remedia minus tuta in suppressionibus evocandis usitata.

Quæ nunc enumerabimus remedia, tot sunt auctoritatibus suffulta, ut nefas videatur ea contemnere; non contendo interdum, eum id magninominis viri asferant, utilia evasisse cum ad rem exhibita fuerint, & a doctis Medicis, qui idoneas circumstantias detegere, & cautelas animadvertere conati fuerint, at, oh calamitas! indocti sunt, qui illa præscribunt haud infrequenter tum agyrtæ, & empirici omnes; quare nil mirum si in iis in quibus audacia ignorantiam æquat, tot producant perniciosos effectus.

I. *Sabinam vulgarem* primum ostendam, quæ ab auctoribus celeberrimis magnopere commendatur: hujusmodi præparationes sunt;

1. Decoctio foliorum aqua communi perfecta, simplex, vel ceteris plantis emenagogis conjuncta, hujus dosis pro unaquaque ebullitione erit manipulus semis.

2. Aqua destillata, quæ ceterarum emenagogarum stirpium usibus cedit ad unciam circiter dosim.

3. Oleum venit Sabinæ destillatum, quod opiatis, bolis, & pillulis permiscetur in suppressione usitatoribus, pro singulis vicibus tres, quatuorve guttæ dosim præstant.

4. Eadem remedia intrat plerumque Sabinæ extractum a scrupulo semis, ad scrupulum unum.

5. Syrupus Sabine hic describendus, quem Medicus quidam (i) Alemanus *Secretum singulare* appellat, quem utilissimum in sevyiori morbi statu pluries expertum esse affirmat.

R. Pn-

(g) Vid. Osvaldus Crolus in *Basilica Chimica*, pag. 305.

(h) *Archidoxorum* Lib. VII. in fine.

(i) Hieronymus Rusæus. *Observ.* 194. In *sylloge Observ. & Curation. Medicinam a VVelschig edita.*

R. *Pulegii* m. ii. S.

Artemisæ m. i. S.

Betonice & *Calaminthæ* ana. m. S.

Sabin. m. iii.

Satureiæ, *Meliss.* *Menth.* *Abrot.* ana. m. S.

Centaur. Minor. m. i.

Semin. *Anisi*, *Fenicul.* ana. ℥ iii

Radic. Petroselini, *Asparagi*, *Asari* ana. ℥ vii.

Helinici ℥ i. S.

Polypod. ℥ i. S.

Zedoariæ ℥ i. S.

Dictam. ℥ i.

Macis, & *Nucis Moschat.* ana. ℥ i.

Caryophyllor ℥ S.

Rhabarb. elect. ℥ vi.

Aquar. Betonicæ, *Pelegii*, *Artemisæ* ana. lib. ii.

Suturejæ lib. i. S. Coq. S. a. in colatura infund.

Stent per noctem, mane f. fortis expressio, & cum sacchar. S. q. coque ad Syrupi consistentiam Dosis ab ℥ S. ad ℥ i.

Suspicio tamen sæpe sæpius hujusmodi remedia perniciose evadere, nam acres, & phlogisticæ Sabine proprietates sanguinis jacturam, vomitum, & convulsionem inducunt; syrupus nihilominus nuperrime descriptus minus damni inferre posse arbitror pro ejusdem stirpis exigua dosi; at ille compositus nimis existit.

II. *Cucumis sylvestris*, seu *aspinus*, hic acris est, solvit, & alvum ciet violententer, quidam ipsum multiplici ratione in suppressionibus adhibent, quare præscribere solent, vel

1. Decoctionem ex radicis contusæ drachmis tribus confectam, vel

2. Succum ex foliis expressum, & depuratum ad drachmam unicam, vel cum dimidio, aut

3. Idem inspissatum ad extracti consistentiam, *Elaterium* vulgo, cujus dosis duo, vel tria grana non superat.

Ea decoctionibus, syrupis, bolis &c. emenagogis solent copulari, verum cum frequenter nocua experiantur, vel raro caute, vel numquam usuveniunt.

III. *Bryonia*, seu *Vitis alba*, pro catameniis revocandis ejusdem radicis ad drachmas duas ebullitæ decoctionem proponunt, vel *Feculum* bryoniæ sedimentum videlicet a succo expresso reliquum decem, aut duodecim granis exhibitum.

Pernicie ea nihil Sabine, aut Cucumeri inferiores sunt, ideoque sapientis erit, vel eorum cavere usum, vel minima uti dosi.

IV. *Dracontium majus* vel *Dracunculus*, & *Dracontium minus*, sive *Arum*; hæ plantæ acres, causticæ, urentes sunt intus proinde sumptæ damnum inferunt, neque auctores imitari suadeo, qui in hoc morbo baccas ex iis plantis decerpas, aut baccarum succum inspissatum commendant.

V. *Heleborus niger*, hujus radix mensibus medendis haud inutiliter cedit, dummodo caute adhibeatur, ejusdem frustulum sumitur drachmam equans, & in taleolas divisum, quæ malo inferuntur igne coquendo, eo cocto radix excipitur, pomumque comeditur, mane jejuno stomacho, tertio quoque die per aliquod tempus in hoc remedio persistendo, præcedentibus minus nocuum experitur, nihilo secius caute erit propinandum.

VI. *Cantharides* ab Hypocrate, vel auctore libelli de Natura Muliebri magnopere commendantur, intusque sumi quinas, postquam pedes, alæ, & caput separatæ

paratae fuerint, suadet; ipsius tamen auctoritas non valebit, earumdem infensissimum confirmare usum.

Lumbrici terrestres cantharidibus substitui poterunt, periculosi minus, & efficaces magis, a drachma semis, ad scrupulos duos.

Cicindella etiam usum habent inter emenagoga remedia & lumbricis aciores sunt, iisque cautius, & minori dosi uti tantum fas erit.

VII. *Sanguis ex menstruata muliere*, in quibusdam Alemanorum Provinciiis lin-teolum hoc sanguine intrisum aqua luere solent, quam menstrua desiderantibus propinant; (k) Medici etiam non desunt, qui hanc praxim non contemnunt, ipsosque optimos effectus expertos esse testantur; ego, tum observationem, cum ab ea derivatas consecutiones contendo; nihilo tamen minus remedium, etsi futile, atque indecens appareat, nullum tamen damnum afferre posse video, nisi ex ægra, aut ulcere correpta muliere sanguis ille fuisset desumptus.

C A P U T V.

De menstribus suppressis organi vitio.

§. I.

Descriptio.

Interdum catameniorum regressus obviis periodice indicatur fenomenis, ut si ille revera esset consecuturus; ideoque regulariter ibi affluere sanguinem constat, nulla apparente eruptione organi vitio impedita.

Triplici de causa id oriri poterit. 1. Vel membrana septi modo intra vaginam locata fluxum intercipit. 2. Vel carnea ibi nata protuberantia, quæ occludit, repletque vaginam. 3. Vel cicatrix, quæ tunicas, aut parietes vaginæ, aut pudendorum labia conglutinat, eorumque cavitatem intercludit.

I. Ea superius descripta membrana, observatione docente, positum variat; modo vaginæ orificium obducit, modo intimius penetrans uteri ostium obtegit, plerumque levis est membranacea, raro densa, compacta, & callosa reperitur.

II. Variat pariter protuberantiæ adhæsiō; intra vaginam plerumque a pudendis non multum distat, interdum prope uterum crescit, ea carnea adiposa, glandulosa, aut steatomatosa apparet plus minusve extensa.

III. Cicatrix vero modo hic totum vaginæ ambitum peragrat, nunc laxa, & superficialis, nunc firma, & constipata videtur, modo oppositos parietes per exiguum nectit spatium, modo ampliorem gignit cohæsiōem; observatione quandoque etiam didicimus labia ita coire, ut angustissimum tantummodo urinæ exitui foramen relinquant.

Diversitates hæ omnes observatione sunt susultæ, causas vero sequenti articulo indicare potissimas conabimur; in præsentiarum sufficiet animadvertere nullam ab iis nondum menstruantibus mulieres molestiam pati; postea vero, cum jam menstruationis tempus attigerint, vel alias menstruatae fuerint, si ipsis retentio supervenerit, donec initio morbi exiguus erit ad uterum sanguinis affluxus, parum erunt detrimenti passuræ, aucta tamen infarciētis cruoris copia, abdomen inflari, tendi, atque cruciari, vaginam, ac pudenda tumescere, artus

(k) Daniel Ludovicus in *Ephemerid. Natur. Curios. Germ. Decur. I. Ann. 9. & 10. Observ. 35.*
Andreas Myrrhen. *Ibid. Decur. III. Ann. 9. & 10. Observ. 215.*

artus inferiores œdematosi evadere incipient, ægræ denique corporis gravedine, tumoribus, gustus abolitione, & digestionis læsione vexari, febris tandem erratica apparebit pluribus aliis copulata cruciatibus, quæ frustra remediis efficacioribus adhibitis, hydropem, gangrenam, atque lethalem consumptionem inducere potis erit.

§. II.

Causæ.

I. **M**embrana, quæ vaginæ ingressui proxima conspicitur, ea est, quæ hy-
men appellatur in virginibus a natura fabrefacta, ut præcipuam, etsi incertam, earum integritatis notam præferat; a statu naturali in nostro casu distat, cum enim perforata naturaliter appareat, prorsus impervia nunc sistat.

Me non latet hujusce membranæ existentiam plures negasse (a) iisque illuxisse, qui hanc prædicarunt, credulos nimis anatomicos fuisse suadendo, eum plures defendisse numquam, vel morbi tantum causa in disectis cadaveribus ipsam reperisse.

At quidquid animose affirmant, qui contrariam amplectuntur sententiam, nedum imponere valebunt si iis magni nominis viris fidem facere velimus, qui hymenem detexerunt, illustraruntque, inter eos recensentur (b) Berengarius Carpus, (c) Vesalius, (d) Fallopius, (e) Coiterus, (f) Varolius, (g) Riolanus, (h) Veslingius, (i) Bartholinus, (k) pluresque alii infra enunciati celebriores decimi sexti, vel decimi septimi ævi anatomici; minus vero eorum imponere debet opinio cum nostris temporibus, a clarissimis anatomicis (l) Laurentio Heistero, (m) Friderico Ruyschio, celebratissimo (n) Morgagnio nostra secunda fortuna adhuc vivente, & (o) Jacopo VVihslorio confirmata videatur, hi omnes simul consentiunt, virginibus omnibus illam reperisse ea de causa disectis; meum visus addo testimonium, etiamsi supervacaneum censeam post tot illustres auctores, qui meam fovent sententiam.

Reliquum enim erit judicare illos, qui membranam numquam vidisse testantur, vel depudicatas tantum mulieres observasse, vel perperam preoccupatos vaginam ea prorsus obduci debere, hymenem non conspexisse, dum ipsam in

D 2

pro-

(a) Ludovicus Vassæus. Tabul. anatomic. Realdus Columbus. De re anatomic. Lib. XI. Cap. 16. Joh. Fernelius. Physiolog. Lib. I. Cap. 7. Ambroise Paré. Oeuvre. de Chirurgie. Liv. III. Chap. 34. & Liv. XXIV. Chap. 49. Franciscus Vallesius Lib. de sacra Philosophia Cap. 25. Horatius Augenus Tom. II. Epist. & Consult. Medicin. Lib. I. Severinus Pinæus. De notis virginitatis, Lib. I. Cap. 9. Andreas Laurentius. Histor. anatom. Corpor. human. Lib. VII. Cap. 12. & qu. 13. Marc. Anton. Ulmus. De utero. Sect. I. Cap. 7. Hercules Saxonia. Præceps Medicæ Lib. IV. Cap. 4. Franciscus Ranchinus. De morb. Virgin. Sect. I. Cap. 4. Nathanael Highmorus. Corpor. humani disquisit. anatom. Lib. I. Part. IV. Cap. 4. Regnerus de Graaf. De mulier. organis. 9. De Hymene; Pierre Dionis. Operat. de Chirurgie. Demonstr. 3. Jaan Palsin. Descript. des parties des Femmes, qui servent a la generation.

(b) Jacobus Berengarius Carpus, In Isagoge anatomica (c) Andreas Vesalius, de corp. hum. fabrica. Lib. V. Cap. 15. & in Epist. ad Joachimum Roelants, de radicis Chynæ usu.

(d) Gabriel Fallopius, in Observat. Anatomic. (e) Volcherus Coiterus, in bul. anatomic.

(f) Constantinus Varolius, Anatom. Lib. I. Cap. 16. (g) Johannes Riolanus, Anthropogr. Lib. I. Cap. 16. (h) Johannes Veslingius. Syntagmat. anatomic. Cap. 7. (i) Thomas Bartholinus, Anatom. Lib. I. Cap. 31. (k) Johannes VVierus Observat. Lib. I. Et de Lamiis Lib. III. Cap. 20. Archangelus Piccolominus, Prælection. anatomic. Lib. III. Cap. 5. Scip. Mercurius, delle Comare Lib. I. Cap. 2. Franciscus Plazzonus de partib. generat. Lib. II. Cap. 5. Adrianus Spigelius, de hum. corp. fabrica. Lib. VIII. Cap. 18. Melch. Sebizius, Exercit. Medic. XLVII. Dominicus Panatulus. Pentecost. V. Observ. ultim. Isbrandus de Diemerbroeck, Anatom. Lib. I. Cap. 16. Johannes Svanmerdamius, de utriusque mulier. fabrica in tabulis; Gerardus Blasius, in Observat. anatomic. Johan. Gasparus VWestphalus, Ephem. Cur. Germ. Dec. II. Ann. 8. Observ. 215. Hermannus Fridericus Theichemeyerus. Inst. Medic. legalis, & forensis. Cap. 4. (l) Laurentius Heisterus, in compend. anatom. Et Ephem. Nat. Curios. Cent. VIII. Observ. 69. (m) Fridericus Ruyschius, Thes. anatomic. III. n. 15. VI. n. 1. VII. n. 60.

(n) Johan. Baptista Morgagni, Adversaria Anatomis. I. 29. IV. 23. (o) Jacques Benigne VVin-
lovv.

propatulo habebant ; quam ob rem illam frequenter sine nomine descripserunt , quod magis verisimile est , & ab illorum observationibus deduci posse videtur .

Idcirco ne impofterum dubitationi locus relinquatur hymenem naturali ftatu describere fatagam , prout auctores , & cadaverum inspectio me docuerunt .

Hymen ex intima conflatur vaginæ tunica , quæ circa ejusdem orificium inflectitur , ejus duplicatio circum adhærens limbum refert anularem , qui latior prope anum apparet , ad latera angustior , angustiffimus superius urethram versus . Cum anulum efformet tunica , quæ internam vaginæ superficiem induit , ideoque utraque facie rugosus apparebit , anularis hæc membrana , ubi ea vaginæ orificio coheret , crassior est , cellularis ergo illic inter duplicem tunicam jacentis , quæ in margine abit , exiliorque fit hymen , ipsam componentibus laminis coalitis , ac paucis exiguis vasculis sanguineis tantum refertur . (*) In ftatu naturali in medio finditur circulari plerumque foramine ovali , oblongo , & irregulari quandoque , cujus amplitudo pro subjectis , eorumque ætate variare solet : celeberrimus Morgagnus fatetur semel hoc invenisse ostium a perpendiculari membrana divisum , idem testatur Valsalva , quod non raro accidere posse autumarunt , quare auctores hymem *Columnam virginitatis* appellari consueverunt :

Ex hac descriptione concludi potest . 1. Interdum hymenis foramen (p) unicum reperiri quale esse debet sed angustum valde . 2. Quandoque a perpendiculari columna in duas (q) divisum semitas exiguas modicæ aperitionis loco . 3. Quandoque præter priorem divisionem a perpendiculari natam caruncula , pluribus intertexi (r) orizontalibus , obliquis columnis , ut hymen cribrum referat , 4. Tandem hymenem aliquando prorsus (s) imperviam esse , ut perfecte vaginam occludat .

In Tribus prioribus casibus communicatio uteri cum vagina etiamfi difficillime peragatur , aliqua tamen ratione fieri potest ; postremo vero casu frequentioribus exemplis constat eam prorsus communicationem intercipi ; puberesquæ hoc deformantur vitio a Græcis *Ἀπρηται* appellantur ; a Latinis vero Medicis *Imperforatæ* , *Clausæ* , aut *Velatæ* , ab Italis *Coperchiate* ipsæ vocantur : Romani proprio deficiebant vocabulo , & circumlocutione illas indicabant ; quare (t) Cicero somniando vidisse mulierem affirmat , quæ *obsignatam habebat naturam* , (u) Plinius vero narrat quod Cornelia Graccorum mater *concreto genitali nata fuerat* .

Ea porro , quæ adhuc dicta sunt solam membranarum originem explicant , quæ ad vaginæ orificium locantur ubi hymen sedem habet , ibi pariter oriuntur hæ omnes vitiatæ tunice , de quibus nuper loquuti sumus , nam si qui ultra vaginæ marginem trans hymenem hujusmodi observarunt membranas , ut (x) Ruy-

Jovv. *Exposit. Anatomique* n. 653. (*) Limina hujus membranæ defloratione disruptæ carunculas mirthiformes gignunt. (p) Ambroise Paré . *OEvres de Chirurgie* . Lib. XXIV. Chap. 49. Petrus Forestus *Observat.* Lib. XXVIII. *Observat.* 55. Johannes Schenklius . *Observ. Medicinam.* Lib. IV. Obs. 97. ex *Adversarii Dryandi* . Daniel Sennertus *De Morbis Mulierum* , Part. I. Sect. I. Cap. 3. Gerardus Blasius in *Observ. Medicis rarioribus* . (q) Johannes Schmidius . *Miscell. Cur. German.* Decur. I. anno 3. *Observ.* 24. Et annis 4. & 5. *Observ.* 157. (s) Guillelmus Fabricius Hildanus . *Cent. III. Observ.* 60. (r) Antonius Benivenius . *De abditis morb. & sanat. causis* . Cap. 28. Casparus VVolphius , in *Observat.* apud Schenckium . Johannes VVierus , *De præstigiis demonum* . Lib. II. Cap. 38. Rembertus Dodonæus . *Medicinal. Observat.* Cap. 34. Bartholomæus Caprolus . *Observat. Medicar.* 23. Casparus Bauhinus . *Theatr. anatom.* Lib. I. Cap. 39. Hieronymus Fabricius *ab Aquapendente Operat. Chirurgie* Cap. 81. Guillelmus Fabricius Hildanus . *Cent. III. Obs.* 60. *exempl.* 1. & 2. Jobus à Meeckeren . *Observ. Medico-Chirurg.* Cap. 55. *Acta Eruditorum Lipsiensia* . Anno I. Septembr. Obs. 6. Johannes de Muralto M. N. Cur. Germ. Decur. II. ann. 3. Obs. 151. Cornelius Solingen . *De arte obstetricia* . Daniel Meno Matthiaz . *Observ.* 6. Francois Mauriceau , *Observat. sur la grossesse* . *Observ.* 231. (t) Cicero , *De Divinit.* Lib. II. (u) Plinius , *Histor. natur.* Lib. 7. Cap. 16. (x) Fidericus Ruysschus . *Observat. Chirurgic.* 22. , & 32. Simon Scultzius *Misc. Nov. Curios. German.* Dec. I. Ann. 3. Obs. 32.

Ruyfchius, & medicus quidam Romanus asseruere; ac prope uteri ostium, ut observatio (y) Accademiæ Parisiensis affirmat, id difficultatem augere videtur, nam præter naturam, & monstruose accidere necesse erit, quod raro tamen eveniet; illud tamen minus implicat, si animadverterimus omnem corporis cavitationem similibus læsionibus esse obnoxiam; constat enim pluries invenisse rectum intestinum septo carneo ad anum obductum, quod præternaturale videtur.

II. Carneæ excrescentiæ quæ replent, occluduntque vaginam triplicis speciei sunt.

Quandoque hujusmodi protuberantia (z) *Fungus*, seu *Champignons* appellatur, ex neglectis crescit ulceribus, hac de causa ulcera celtica, aut benigna vulvæ carneæ excrescentiæ locum præbent, quæ spongiosæ, molles, duræ, vel syrrhose fiunt; ampliores sunt, vel exiguæ; latæ vel oblongæ plus minus apparent pro ratione lymphæ retentæ, morbi pertinaciæ, aut quod occupant spatii.

Interdum hæc excrescentias (aa) producant carunculæ mirtiformes, aut vaginæ rugæ oblongatæ, vel tumor glandularum, aut cellularum (bb) adiposarum hujus organi; harum partium vero augmentum ab obstructionibus, aut callositatibus originem habet, quæ lympham morbosam retinent, in hoc casu excrescentia plerumque nervosa, glandulosa, aut pinguidinosa est, modo lata, modo angusta, modo mollis, modo dura sistit in ratione partis affectæ, aut lymphæ spissitudinis.

Tandem protuberantiæ quædam veniunt perpendendæ quæ *lupias* referunt, seu tumores duros, steatomatosos per internum vaginæ ambitum late reptantes; continenter eæ molles sunt, earumque volumen a morbi persistentia, aut lymphæ congestæ copia determinatur.

Ipsæ vero cujusve sint generis frequentius trans pudenda crescunt, quia illa magis ulcerationibus, & carunculis sunt obnoxia, ac facile intumescunt; id tamen minime impedit vaginæ intimam superficiem similibus vitiis, aut tumoribus affici posse.

III. Cicatrices postremum quæ vulvæ parietes simul conjungunt ejusdemque lumen obstruunt; ab ulceribus, aut scissuris proveniunt, quæ neque satis detergæ, neque mundatæ fuere, idem (cc) pariter parere valent cancer ex lue venerea ortum, (dd) excoriations ex urina acri infantum inter incunabula retentam, variolosæ pustulæ supuratæ, (ee) combustiones, scissuræ a vulneribus natæ, (ff) aut laboriosi partus, (gg) omnia indicatis observationibus confirmata.

Cum pudendorum labia, & vaginæ ostium magis patefiant ea ulceribus etiam, ex-

Astruch de Morbis Mulierum.

D 3

co-

(y) Memoires de l'Académie des Sciences Ann. 1705. Histoir. pag. 52.

(z) Nicolaus Tulpius. *Observat.* Lib. III. Cap. 33. Christophorus Valterus, *Schol. obstetric.* Part. II. Cap. 19. Acta Berolinensia Dec. II. Vol. V. pag. 85. Acta Bruditorum Lipsiensia Ann. 1726. Octobr. pag. 480. (aa) Antonius Benivenius, *De abditis morb. & senet. causis* Cap. 79. Johannes VVierus. *Observat.* Lib. I. Acta Curiosorum Naturæ Decur. III. An. I. *Observ.* 144. Nicolaus Tulpius, *Observat.* Lib. III. Cap. 34. Dissequi in muliere quadraginta annorum tumorem steatomorum sphericum altero parietum vaginæ lato pedunculo adhaerentem, qui duplicem pendebat libram.

(bb) Anatomici qui hymenis existentiam contendunt carunculas mirtiformes putant a primitiva conformatione originem habere. At cum in ea, sententiæ parte ita in hac decipiuntur, nam si hymenem reperieris numquam carunculas videbis, & si carunculas numquam hymenem, id confirmat carunculas marginem tantum esse concisæ hymenis, quæ diversimode inflexa in parvulas appendices, illum producit.

(cc) Antonius Benivenius. *De abditis morb. & sanat. causis.* Cap. 31. (dd) Isbrandus de Diemerbrock. *Anatom.* Lib. I. Cap. 26. Johannes Nicolaus Peclinus. *Observ. Medico-physicar.* Lib. I. Cap. 25.

(ee) Paulus de Sorbait. *Ephem. Curios Natur. Decur. I. Ann. 3. Obs.* 173. (ff) Gregorius Horstius *Operum Tom. II. Lib. IV. Observ.* 55. (gg) Marcellus Donatus. *De media historia mirab. Lib. VI. Cap. 2.* Johannes Riulanus, pater, *Art. benè medendi Sect. IV. Tract. 2. Cap. 1.* Casparus Bauhinus. *Theatr. Anatom.* Lib. I. Cap. 39. Et *De Hermaphroditis.* Lib. I. Cap. 38. Felix Platerus. *Observat.* Lib. I. pag. 258, 259. Guillelmus Fabricius. Hildanus. *Observat.* Cent. VI. Obs. 67. Johannes Riolanus, filius. *Enchirid. Anatom.* Lib. II. Cap. 37. Et *Antropograph. Lib. II. Cap. 35. pag. m. 197.* Thomas Bartolinus. *Historiar. Anatom.* Cent. II. Histor. 31. Rudolphus Jacobus Camerarius. *Misc. Nat. Curios. Herman.* Cent. IX. & X. *Observ.* 73. Johannes Conradus Beckerus. *De inculpata pueriticia* q. XVIII. & seqq.

coriationibus &c. sunt magis obnoxia, ibique facilius coalescunt vaginæ parietes, quamvis prope matricis os idem evenire possit; si quod eorum scœnomenorum illuc nansciscatur.

De cetero hujusmodi cohesio ubivis iis de causis fiat compacta, vel laxa; externa, vel profunda, plus minusve, aut extensa apparebit prout ulcera, scissuræ, aut excoriationes diversimode locatę fuerint, quod maximam concomitantium varietatem inducere potis erit.

§. III.

Differentiæ.

I. **P**rima differentia inter conformationis vitia, quę vulvam, aut vaginam respiciunt, ab ipsorum desumitur natura, quę triplicem agnoscit vitii speciem; aut membrana quę vaginam intercludit, aut natam excrescentiam, quę illam obduxit, aut parietum cohesionem, quę ipsam pariter occludit.

II. Secunda differentia a vitiorum eorum origine nanscitur; nonnulla enim ad primam nativitatis conformationem pertinent, hujusmodi sunt membranę vaginam obstruentes, alia a nativitate conspicua fiunt, ut carneę protuberantię, quę cavitatem obturant, aut cicatrices pudenda, vulvamque jungentes.

III. Tertia ducitur differentia ex natura, & numero functionum læsarum; quapropter ut recte judicemus, quinque præcipuas uteri functiones perscrutari oportebit; menstruationem videlicet, copulam, conceptionem, partum, atque urinę exitum.

1. *Menstrua* quandoque iis etiam obstantibus idoneo relicto spatio libere erumpunt, interdum lente, aut difficillime perfluunt, meatus angustię causa, alias prorsus desunt vagina penitus obturata.

2. *Matrimonii usum* ea obstacula implicant, quando vaginæ orificium investiant, minime vero si intimius vel prope uterum sint locata.

3. *Conceptioni* ea aliquo modo officiant, possibilis tamen videtur, modo uteri, cum vagina communicatio penitus non intercipiatur, aut matrimonii non impediatur usus, non desunt tamen observationes, quę in iis casibus concepisse mulieres affirmant.

4. *Partus* difficilis, diutinus, ac laboriosus redditur, quando organi vitia meatum coarctant; impossibilis vero si illum occludant, nisi intumescencia, (quod aliqua observatio docet) a gestatione orta, cicatrices illas ante (a) partum frangat, quę vaginam conglutinant, atque constringunt.

5. *Urinę exitum* minime impediri posse arbitror a vitiis intra vaginam, aut circa ejusdem orificium adnatis; citra hoc enim urethrę foramen patet, ac ob ea, quę intra vulvam adsunt incomoda rarissime sufficiens saltem implicabitur urinę (b) transitus, unicam observationem porro didici, quę hanc videtur offendere sententiam.

6. Plures alii dari possunt casus ex simplicibus compositi, quorum singularem indaginem supervacaneam censeo, cum ex simplicium notione adhuc animadversa facile innotescant.

§. IV.

(a) Gulielmus Harveus. *De partu*. Thomas Bartholinus. *Historiar. anatom.* Cent. V. Hist. 43. Franciscus Paullinus. *Ephem. Curios. Natur.* Dec. II. ann. 7. in *appendice*, Observ. 9. Dec. 7. *Mémoires de l'Académie des Sciences*, Année 1712. Hist. pag. 37.

(b) Apud Gregori. Horstium, *Operum Tom. II. Lib. IV. Observ.* 55.

§. IV.

Symptomata.

1. **C**onformationis vitia nondum menstruatis mulieribus nullum ipsis damnum inferunt, nullamque functionem lædunt.

2. Supervenientibus etiam catameniis nullo conqueruntur incommodo, eaque libere stillant, dummodo effusio penitus non intercipiatur, vel nova uterus munera non subeat, aut puberes in virginitatis, statu persistant.

3. At ipsis jugatis, ea vitia facile poterunt copulam, conceptionem, aut partum implicare, duas nempe, vel tres simul earum functionum pro loco, & vitii indole ledere.

4. Si huiusmodi vitia omnino vaginam repleant, fluxumque impedian, symptomata consequutura esse credideris primæ eruptionis propria; tunc maximam difficultatem egras pati videbis, nam fœnomena omnia periodice evenient, quæ illa indicare solent, absque quo unquam erumpant.

5. Huiusce rei suspicio augetur, cum affluens sanguis uterum inflet, distendet, atque dolentem reddat, ut huiusmodi symptomata pro uteri obstructionibus haberi videantur.

6. Abdomen tandem tumet magnopere, & sanguis utero retentus vaginam premendo intercludit ita cruoris e vulva regressum, ut œdemati speciem inducat, quæ novas suspiciones præbet.

7. Cum imi ventris tumor uteri positui respondeat, & cum eo una circumscribatur, nil mirum si frequenter egræ fetum gerere sibi suadeant.

8. In diem matricis inflatio crescens venas iliacas continenter premit quæ refluxum sanguinis retardando pedum, crurum, aut femorum œdemata necessario erunt superventura.

9. Matrice amplius dilatari impedita, ut ipsa nequeat sanguinem recipere, qui singulis mensibus uterum petit, in similibus circumstantiis ægræ versari debent, ac si menses revera supressi fuissent, ac, sicut *cap. IV.* indicavimus gustus læsione *Pica* videlicet *Malacia*, tum digestionis detrimento, nausea, atque vomitu cruciabuntur.

10. Facile porro videtur sanguinem uteri cavitate detentum circumposito calore corrumpi, cuius putrescentiæ gradus plus, minusve intensus fiat pro diversa sanguinis conditione, aut deleteria indole; quare sanguis, quem incisionum auxilio tunc uterus effundit, fetidus, corruptus, ac putrefactus pene reperitur.

11. Dolores itaque imi ventris, deturpata digestiones, atque corruptus sanguis, qui lymphæ permiscetur per vœnas uteri lymphaticas circulanti, febrilem excitat commotionem persistentem, levem tamen, & anomalis exacerbationibus obnoxiam diversarum causarum ergo, quæ intensitatem, reditumque variant, ut lentam hereticam febrem perbelle designent.

12. In iis mulieribus, aut puberibus, quæ jam menstruâ gaudent, quibus per accidens conformationis vitia superveniunt, quæ nisi secundæ aut tertiæ speciei esse poterunt, ea fœnomena omnia inducere valebunt in iis obvia suppressionibus, quæ a vaginæ, aut vulvæ completa occlusionem originem habent; illa autem celerius, intensiusque evenient, nam menses diu confirmati, & uberrimi, qui citius uterum replerunt, citissime etiam ad summum gradum superallata perducunt symptomata.

§. V.

Diagnosis.

I. **V**itia conformationis, quæ a natalibus fortita sunt, ut membranæ quæ vaginam intercipiunt in infantibus minime conspiciuntur modo vulvam non aggrediantur, quod nullo confirmatur exemplo; plerumque vaginæ defectus nisi adultis, aut jugatis mulieribus observari licuerit, quando initio menstruationis fluxus impeditur, vel quando jugatis, persistentibus mensstruis matrimonii usus implicatur.

Haud infrequenter nos latent hujusmodi incomoda etiam suppressis mensstruis vel fero percipiuntur, postquam diu suspicati erimus ægras conceptu (a) laborasse, de quo innocentes erant, vel hydropem passas fuisse, de qua nunquam conquerebantur, cum vero sint connubio junctæ interdum accidit spon-
 sos minus expertos nisi post longum tempus consummationis impedimenta agnoscere, qui verentur cuique dubitationem communicare.

Itaque quotiescumque mulieres mensstruis deficiunt etiam si periodice singulis mensibus symptomatibus vexentur mensstruis obviis, & abdomen in diem sine causa manifesta increseat, tunc suspicari licebit vitium conformationis adesse, quam ob rem si parum cunctaberis circa exteriorum imi ventris indagine, omnis difficultas evanescet; nam uterus conceptu carens tumidus tamen apparebit, sphericus, æqualis, atque mollis; verum compressus nulla commotio persentietur, quod nullum fœtum existere designat, & sola aqua, aut sanguine infarciri uterum confirmat, quare vaginæ meatum examinando omne gestationis dubium aufertur.

II. Inter vitia conformationis accidentalium excrecentiæ carnes, quæ sensim per congestionem fiunt diu latere possunt, tum in puberibus, cum in conjugatis, si intimius vaginæ adhæreant, verum cum raro amplitudinis ergo menses intercipere valeant, vel nisi post longum tempus id accadat; itaque sæpissime plures feminæ tuberculis, lupiis, aut hujusmodi protuberantiis laborantes, in hoc statu diu persistunt citra ullam hujusmodi suspicionem.

III. Res aliter se habet, si cicatrices vaginæ, aut vulvæ parietes jungant, illæ enim, a cognitis causis, scissuris videlicet, combustionibus, aut ulceribus neglectis, derivant, ut omnium hujus partis lesionum hæc facilius innotescat.

IV. Cujusve sint generis vitia illa, vel ubivis locata nihil est facilius, quam eorum existentiam, positum, aut naturam detegere, satis erit vaginam digito oblinito penetrare, aut speculo uteri, aliove instrumento uti, quibus interior vaginæ oculis subjiciatur, lactitantia hinc fœnomena ostendens, quæ tactus impar fuerat investigare.

V. Causarum vero indago frustranea videtur, nam earum cognitio parum influit in morbi prognosi, aut curatione, idcirco si cui libuerit rem intimius perscrutari hanc theoriam cum cognita morbi indole, & specie comparet, & notiones perpendat, quæ egræ valebunt suppeditare.

§. VI.

(a) Johannes Vieus De prestigiis Dæmonum lib. II. Cap. 38. Casus secundus. Bartholomæus Cæbrolus. Observ. Medic. 23. Guilielmus Fabricius Hildanus. Centur. III. Observ. 60. Exempl. 3. Johannes de Muralto. Ephemer. Cur. Natur. Dec. II. ann. 3. Observ. 151.

§. VI.

Prognosis.

PROGNOSIS versatur vel circa detrimenta, quæ organi vitia agris afferunt, vel circa difficilem medendi rationem.

I. Ea damna in mulieribus citra gestationem existentibus menstruorum suppressionem facere, atque in gravidis difficiliorem partum inducere valebunt.

1. Retensionis respectu, vidimus jam superius damna hinc derivata qualia, & quanta esse possint pro diversa suppressionis pertinacia.

Subsequuntur ex iis infensas magis evadere membranas, quæ exacte vaginam claudunt, quam eas, quæ vel aliquo sunt pertusa foramine, vel quam etiam si exiguum pandunt exeunti sanguini viam.

Verum easdem membranas vaginam penitus obtegentes majorem noxam afferre quam cætera harum partium vitia, excrescentiæ videlicet, & cicatrices, quæ absolute numquam menstrua supprimunt.

Cicatrices tandem, quæ pudenda coeunt carneis protuberantiis magis molestas esse, quia fluxuro sanguini arctiorem transitum relinquunt.

2. Circa partus expulsionem ea vitia sunt magis pertimescenda, quæ remediis subjici nequeunt.

Ideoque ceteris paribus membranæ densæ, compactæ, & callosæ, subtilioribus laxis, gracilibus, magis perniciosæ experiuntur.

Ita protuberantiæ carneæ exiles, superficiales, adiposæ, atque molles, minus detrimenti inferunt, quam crassæ, duræ, & syrrhosæ.

Tandem cicatrices laxæ, arctæ, patentes, minus ledunt, quam latæ, & compactæ.

II. Valetudini recuperandæ objicitur præsertim membranas secandi difficultas. Idcirco membranæ tenuiores, quæ facile inciduntur ad vaginæ ostium succrescentes, cito etiam convalescunt, at quæ intimius penetrant difficillime evelluntur.

Excrescentiæ vero carneæ segnius sanantur, cum haud facile ferro, aut caustico possint eradicari, præsertim si latæ, profundæ, syrrhosæ, aut ampliori basi adhærent.

Cicatrices arduum pariter erit secare, cum membranas vaginæ simul coalitas difficillimum sit separare, præsertim cum per longum, latumque vaginæ ambitum arctissime coeant.

III. Prætereundum autumo obstaculum, quod vitia conformationis urinæ exitui præbere possint; nam raro id accidere admonuimus, vel quod matrimonii usui officiant, nam præter sterilitatem, quæ apud jugatas tantum magni facienda est, ceteris nullum damnum ex iis erit superventurum.

IV. Reliqua sunt duo ab organi vitio magni ponderis consecutura, quorum primum ad excrescentias carneas pertinet, quæ sæpe dolorosæ, lancinantes, &c. raro tamen carcinomatosæ fiunt; alterum ad sanguinem attinet utero, & vagina detentum, qui eas partes comprimit ita, ut gangrenam inducat, quæ haud infrequenter evenit, modo sanguinis infarciens exitum promoveamus.

§. VII.

Curatio.

ETIAMSI hujusmodi cruciatus summam inter se affinitatem habeant diversa tamen singuli medella indigent, quæ specialem explicationem postulat.

I. Hi.

I. Hipocratis (a) praxim profecuturi escharoticis tantum, etiam efficacioribus uti deberemus, ut membranæ corrochantur, quæ vaginam investiunt, at longa experientia docuit hujusmodi methodum diutinam, laboriosam, vel perniciosam evadere, ac nostris temporibus omnes conveniunt Medici ipsis tutius, promptiusque sectione mederi.

Ægra itaque lectuli, aut sedis margine locata, manibus etiam si opus requirat, pedibusque litotomorum more vinctis, tum vulvæ labiis apertis patens hinc membrana scalpello perpendiculariter scinditur, si membrana laxa fuerit, longam incisionem sufficiet, nam latera sponte evanescent, at si ea compacta, dura nimis callosa apparuerit, oblique ea conscindere necesse erit, ut vaginæ meatus duplici hac sectione prorsus pateat.

Raro hæc incisio sanguinis jacturam inducit, vasculorum exilitatis ergo, quæ exiguo numero has membranas reptant; sapientis tamen erit adstringentia nonnulla ad manus habere, qualia sunt sanguis Draconis, bollus, aut aluminis coagulum, quibus tenues imbibuntur lemnisci vulneri superimponendi, si ulla superveniret hæmorrhagia, quod raro evenit; de cetero digerenti annodino satis erit partem oblnire ex ovorum vitello, terebinthina, e melle rosato composito, qua methodo persistendum suadeo, donec cita appareat valetudo.

In iis mulieribus, quæ diu suppressione elaborarunt, hujusmodi adnatæ membranæ extrinsecus a confluenti sanguine expulsæ prominent valde, ut scindi facile permittant, sanguis vero post inceptam sectionem erumpens incisorem sæpe implicat, quare in his casibus opportunum cenfeo fluxum sinere, donec sponte desinat, vel ægram pedibus erigere, ut vagina facilius mundata totum opus bene se vertat; his rebus peractis injectionibus vulnerarii pauco mele rosato remixtis, vaginam, uterumque detergere conveniens erit, substitui poterunt etiam magis detergentes injectiones, ex Acrimonia videlicet, Marubio, aut Aristolochia, paucove mele rosato patrata.

Quo intimius morbosæ hæ membranæ penetraverint, eo difficilior earum evulsio videbitur, tunc uteri speculo, dilatata vagina, cultro linteolo circuminducto, ut acies denudata tantum relinquatur, diligentissime operationem inire tentabimus, eoque cautius, quo intimior, & angustior erit conscindenda membrana, de cetero ut supra indicavimus erit procedendum.

II. Escharotica, quæ ad membranas evellendas parum conveniebant, minus ad excrescentias carneas eradicandas opportuna videntur cum pro crassitudine nimis resistent, neque poliporum more extirpabuntur, ne lacerationes superveniant lethales, at optimam praxim profecuturi, illas ferro tantum separabimus.

Quando illæ prominentiæ vaginæ tantum ingressum occupaverint, facile erit eas sinistra manu compressas forfice, aut cultro extirpare, sedulo tamen instrumenti gressum animadvertendo, ne sanæ lædantur partes; etenim si intimius locatæ fuerint, minus tutæ illas scindere licebit, quia neque manibus recipi, neque speculo vaginam satis distendere poterimus, ut ob loci angustiam volcellæ, aut fibulæ auxilio non indigeamus.

Scindi facile poterunt carneæ portuberantiæ, absque quo earum basis vinciat cum procul sit gravis hæmorrhagiæ metus, tamen adstringentia nonnulla, aut vitrioli frustulum quandoque ad manus habere opportunum erit, ad cohibendum sanguinem, quem interdum vas aliquod amplior effunderet, verum si colorem rubicundum, aut lividum illæ referant prominentiæ, atque suspicio adsit ab incisione uberrimam supervenire posse hæmorrhagiam, duplo vinculo ad basim arcte illas circumcingere opus erit.

Post incisionem primum sicca filamenta usveniunt, verum nimia copia perfluente

(a.) Lib. de Sterilibus. Et Lib. II. De Morbis Mulierum.

fluente sanguine erunt torundæ superimponendæ superius enunciatis adstringentibus imbutæ; postea ulcere vulgari digerenti illinito, donec supuratio imminuatur balsamo Arcæi, & paucis balsamo viridi valetudinem obtinebis; si ulcus ichorosus apparebit unguentum brunum *vulgo* erit adhibendum, quod leniter abstergat, ac si initio uberrima nimis supuratio videatur injectionibus superiori articulo indicatis uti poteris, parum addendo aquæ vulnerariæ, ac tincturæ mirrhæ.

III. Cicatrices superficiales, quæ vulvæ labia conjungunt, externam plerumque cohæsiōem gignere solent, ut specillo canaliculato per eam partem intro-misso, quæ superius, vel inferius patula relinquitur, & sinistra manu illud firmiter comprehenso prope cohæsiōis lineam facile erit altera manu cultro tuto labia separare, quibus imposterum superius indicato digerentium usu, mederi sufficiet.

Quando cicatrices profundius penetraverint, aliquem identidem tramitem relinquunt, alias nullum, 1. in primo casu enim dilatare oportebit hujusmodi meatum, at plerumque tentamen longum, ac inutile evaserit, etiamsi innocuum experiatur, dum hanc medendi rationem amplectimur, primo cicatrices laxare opus erit reiterato fomento ex plantis emollientibus, Malvæ videlicet, Althææ, aut feminum Lini &c. confecto, verum linteo, aut spongia iis decoctionibus imbuta vaginæ margini applicabitur; quando partes satis laxatæ fuerint, intro-mittere poteris radicem Gentianæ, aut spongiæ frustulum præparatum, numquam intermissis emollientibus fomentis, ac prout cicatrices magis laxabuntur amplioribus frustulis, spongiæ, aut Gentianæ uti opus erit, donec idonea fiat parietum aperitio.

2. Frustranea prorsus hujusmodi methodus videtur quando nullam cicatrices patulam relinquant viam, tunc ad chirurgica auxilia erit deveniendum, ut etiam in nuperrime allatis circumstantiis incassum tentata dilatatione, ægram enim vinculis lectulo firmare debebis, ut articulo primo demonstravimus.

Quibus cautionibus adhibitis, scalpello membranæ simul coalitæ separabuntur, quod difficilius erit peragere, quo magis intra vaginam erunt protensæ; nullum specillum requiri videbitur, si prominentiæ vaginæ marginem tantum occupaverint, necessarissimum tamen evaserit, si intimius penetraverint; apparatus, & consecutiva medella haud absimilis erunt iis, quæ poscunt dissectæ membranæ.

IV. Quando tandem membranæ, prominentiæ, seu cicatrices prope uteri ostium locatæ reperiantur, nulla adest medendi tuta ratio, neque Chirurgorum ullus audebit, in iis profundis latebris operationem inire, ubi nefas esset fanas membranas, utrumque vulnerare, a quibus teterrima scœnomena, & mors ipsa esset consecutura, quapropter naturæ morbi curationem, optatumque levamen relinquere censemus, & observatione edocti, si uterus sanguine, vel raro fœtu gravis sit, continua eorum pressione, dilatationem sperare poterimus, quæ obstacula illa evellere valeat, a quibus miserrime uterus (b) obtegatur.

Circa eas operationes necessariæ cautelæ.

I. Nulla est instituenda chirurgica medella, nisi præmissa venæ sectione, primisque viis expiatis, imo diu ægras præparare oportebit, si excrescentiæ evellendæ, aut cicatrices scindendæ fuerint; præsertim cum patientes male se habeant,

(b) Johannes Riolanus *Anthropograph.* Lib. II. Cap. 35. Stephanus Blancardus. *Collectan. Medic. Physic.* Centur. III. Obs. 56. Memoires de l'Académie des Sciences Ann. 1705. Histoire pag. 52.

beant, aut a diutina suppressione emaciatae sint, vel noxiis (c) laborent symptomatibus.

II. Si qua adsit levis vaginae coarctatio ab aliqua ibi nata cicatrice operationem cunctari oportebit praesertim si mulier fetum gerat, animadvertendum enim est an gestationis progressu, uteri rarefcentia, atque tumor valeat ipse vaginam referare, quod auctorum observationes sperare suadent.

III. Hoc naturae auxilio frustra optato postremo etiam gestationis mense absque noxa sectionem, vel amputationem inire poterimus, nam ea sero nimis instituta, vaginae inflammatio facile supervenerit, quae cavitationem arctando partum implicabit, nefas pariter erit jam propinqua fetus expulsionem operationem protrahere, ne infans incassum laboret in superando obstaculo, ac mater, & ipse laedatur.

IV. In his rebus peragendis cavendum est ne vaginae tunicae vulnerentur, si membrana enim sit incidenda, ut superior vaginae pars tueatur cui vesica adheret, tunc incurva novacula cuspide obverso incisio erit instituenda, neve ad oppositam usque inferiorem partem sectionem perducendam, ne vaginam restumque intestinum ipsa offendant.

V. In prominentiis evellendis pauci faciendum erit, si ipsarum basis non omnino scindatur, nam suppuratio sponte absolvetur, vel caustica assument, quod esset reliquum.

VI. Quando de supuratione agitur parietum vaginae, cicatricis ergo, simul cohaerentium, per eandem semitam ipsas secare oportebit, per quam coalescunt, satis enim apparet, quale detrimentum afferre possemus si latera vulnerarem; vel abraderemus ita, ut impares evaderent partus nisum absque laceratione sustinere.

VII. Ex his operationibus postremis duabus potissimum consequitur, ipsas diligentiae, temporis, & experientiae multum postulare, neque eas sollicite simul, & feliciter ad perfectam valetudinem perducere posse videtur.

VIII. Tandem haud difficile est, quod interim parietes coalescant antequam vulnus convalescant; id in simplici membranarum incisione minus timendum erit, verum in prominentium extirpatione, aut cicatricum divulsione facile eveniet; multiplici methodo huic obesse poterimus, alii spongiam oblongam intromittunt unguento Diapalmæ, aut Tusciæ, oleo amygdalarum dulcium soluto oblinitam, alii pessarium adhibent ex lino confectum similibus imbutum medicamentis, quidam tandem laminam plumbeam aptant pluribus pertusam foraminibus, iisdem linimentis madidam; Hæc medendi rationes eque omnes valent parietum cohesionem impedire, superest tantum ea crebre reiterare, atque idonea firmare tenia, vel tutius egras lectulo detinere usque dum perfecta sit valetudo, ut pessaria necessarium locum servant.

C A-

(c) Aristoteles. *De Generatione animalium*. Lib. IV. Cap. 4. Franciscus Paullinus *Miscellanea Curiosorum. Natura*. Decur. II. Anno 7. in *Append. Decad. II. Observ. 9.* Michael Pauli. *Miscell. Curiosorum. Natura*. Decur. III. Ann. 7. & 8. *Observ. 83.* Thomas Bartholinus. *Historiar. Anatomic. Centur. V. Hystor. 43.* Guillelmus Harveus. *Exercitar. de partu* pag. 518. *Mémoires de l'Académie des Sciences. Ann. 1712. pag. 37. de l'Histoire.*

CAPUT VI.

De difficili menstruatione, & laboriosa.

§. I.

Descriptio.

SAnitatis statu menses absque ulla vel saltem gravi molestia apparere, persistere, atque desinere debent; morbum porro adesse dicimus, quando difficiles sunt, aut laboriosi experiuntur, si videlicet nocua nonnulla symptomata, quę medellam poscant, eruptionem præcedant, aut ipsam comitentur.

Ea scœnomena sunt plerumque lumborum, scœmorum, atque inguinum dolor, vulvę, vaginę, aut hemorrhoidum tumor, uteri tensio, atque colici cruciatus, digestionis dein, gustusque læsiones, corporis horror, & subsultus, motus tandem convulsivi, & hysterici quandoque.

Illa tamen neque omnes mulieres eque aggrediuntur, neque omnia completim in omni subiecto eveniunt.

I. Interdum naturali, & periodico fluxu superveniente desinunt, alias sanguinis jacturam, vel incompletam eruptionem faciunt, neque uberrimam scilicet, neque persistentem.

II. Modo dolor molestiave ante eruptionis initium apparent, quę semel statuta deficient, modo inter fluendum sanguinem ea scœnomena fastidiunt egrę & fluxu absoluto absunt, modo jam eruptione peracta, per aliquod tempus supersunt.

III. In nonnullis subiectis menstrua subsequitur albus fluor, in pluribus aliis deest nullo relicto incomodo.

§. II.

Causę.

Uteri tumor, atque tensio in laboriosis mensibus, cruciatusque, quos agrę patiuntur, duo confirmant effata, *primum* quod vasa uteri sanguinea cruore valde turgeant, *alterum* quod sanguis, qui ea vasa replet segniter per appendices venosas in utero manet, quare vel sero, vel imperfecte erumpat.

Prior casus naturę valde consonus est; vasa vermicularia enim debent mensis spatio lactea turgere lymphæ, eaque semel turgida propinquas venas comprimere, qua pressione ibi detentus sanguis localem plenitudinem producat menstruis necessariam.

In *secundo* casu alias res se vertit, menstruorum enim lex postulat, quod sanguis in vasibus congestus certa quadam facilitate in utero profluat; perniciosum porro esset, & citra naturam, si ille moleste, segniter, aut imperfecte profili-
ret, hoc est, quod diutinam nimis & uberrimam plethoram producendo menses difficiles, & laboriosos redit.

Quæruntur igitur causę, quę implicare valebunt ne congestum in utero sanguinem per venosas appendicum extremitates mensis periodo ipse follicite erumpat; hæ tamen ad tres præcipuas classes reduci possunt.

I. *Prior* ad appendicum vitia pertinet, quę renuunt diu referari, aut imperfecte apperuntur, ut sanguis etiamsi ad fluxum dispositus nequeat necessaria copia, aut sollicitudine stillare.

II. *Altera* vitia respicit fluxuri sanguinis, qui impar evadit uberrime fluere, patulis etiam venosis appendicibus.

III. *Tandem* ad amborum vitiorum copulam attinet cum neque appendices aperiantur, neque ille manare valeat.

I. Pluribus de causis appendices aperitioni resistunt vel imperfecte referantur.

1. Quia illæ compactæ nimis, densæ, aut rigidæ existunt, quod locum habet in juvenibus, vel adultis nondum complectis catameniis donatis.

2. Quia interior uteri tunica, quæ extrema appendicum cingit, nervosa nimis est densa, & compacta.

3. Quia obstructions, tubercula, & syrri uterum deturpant, quæ appendices comprimendo ipsarum idoneam dilatationem impediunt.

4. Quia uterus interdum heretismo, aut convulsivis contractionibus laborans appendices coarctat ita, ut nullum, vel difficillime sanguinem effundat, hæc postrema causa, etiam si minus diutina, validior tamen experitur.

II. Sanguis intra venosas appendices cumulatus segniter, aut exigua copia triplici de causa perfluit.

1. Densitatis ergo, quæ ejusdem effusioni officit etiam si appendices sint bene constitutæ.

2. Quia lente sanguis in uterum irrumpit, debili cordis, & arteriarum impulsu, ut æquali tempore minima quantitate per appendicum orificia exeat.

3. Quia uno, eodemque tempore, & minus densus existit sanguis, & segniter irrumpit, quod duplici ratione effusionem imminuit.

III. Tandem tum appendices sero, vel pauca possunt referari, cum sanguis exigua copia, & lente fluere diversarum causarum complexus ergo, quas singillatim enuntiavimus, neque hujusmodi congeries infrequens est ut Capite IV. enuntiavimus.

Huic capiti mittimus pro singulari causarum explanatione, cum eæ communes sint, tum mensibus suppressis, cum laboriosis; ac gradu, & intensione tantum differant.

§. III.

Differentiæ.

I. **C**UM labor suppressionem non gignat, sanguis tamen in laboriosis menstruis ibi congestus, etiam si difficulter, debet tandem appendices referare; id tamen triplici ratione fieri poterit, vel prout natura postulaverit, vel altiori gradu, ut aperitio, scissura videatur, vel infimo gradu ut vix pateant.

In primo casu mensium conatus naturalem fluxum inducent, dummodo nullo sanguis inquinetur vitio.

Altero casu sanguinis jactura plus minusve uberrima apparebit in iis præsertim mulieribus, quæ uteri vasa a copioso derento sanguine varicosa facta sunt.

Tertio tamen casu fluxus vel copia, vel persistentia, vel ambo simul inops videbitur, præsertim si sanguis spissus nimis sit, segnisque.

II. Quotiescumque in hoc menstruorum genere, vel naturalis effusio vel sanguinis jactura apparebit fluxus incomoda illico desinent, nam tunc vasa penitus exhauriuntur; at imminuuntur tantum ea fœnomena, cum fluor incompletus videatur, ut in postremo casu evenit, in quo sanguinis infarctus, quamvis imminutus persistat, ut exigua copia fluor erumpens post effusionem plethoram relinquat, tum symptomata omnia confirmet, vel saltem eorum maximam partem, quæ sensim, sensimque evanescent, quando sanguis circulum perfecte recuperaverit.

III. In mensibus laboriosis, aut vasa lactea apperiantur exhauriunturque fluent sanguine, vel nunquam exinaniantur, ut lymphaticus humor cogatur, vel ibi congeri, vel per lymphaticas venas sibi pandere viam.

In primo casu menses laboriosos neque albus fluor erit consecuturus, quia lacteus humor cum cruore simul fluxerit, neque uteri tensio supererit iis vasibus tum sanguineis, cum lacteis exhaustis.

In secundo casu fluor albus post rubrum superveniet ad totalem lacteorum inanitionem perdurans, quæ modo citius, modo serius eveniet, uteri hinc tumor, atque dolor evanescent, & exinanitis vermicularibus nihil sanguinis circulus implicabitur.

In postremo tandem casu nullus præter cruoris effluvium apparebit albus fluor, quia vasa lactea non exhauriuntur, ideoque tensio diu persistet, neque desistet usque dum perfecte exinanita non sint vermicularia, quod lactei humoris resolutione post diutinum tempus fieri poterit.

§. IV.

Symptomata.

I. **F**œnomena in laboriosis mensibus obvia, ab aliqua subsequenti causa dependet.

Prima est vasorum uteri turgentia nimia, quæ vicinis partibus communicatur per lateralia ex uno nata trunca vascula, latis, terretibus ligamentis, pelvi contentis visceribus, & musculis vaginæ, vulvæ aut recti sphincteris similem plenitudinem affert; ex his procedunt matricis dolor, atque tensio, tum fœmorum, lumborum, ac renum cruciatus, vaginæ denique vulvæ, & venarum hemorrhoidalium tumor.

Secunda oritur a reduci lymphæ lacteæ, quæ saliva, & gastrico succo remixta eorum humorum puritatem deturpat, & virtutem infirmat, id *Picæ*, *Malaciæ*, & gustui depravato locum præbet, tum pravas digestiones, nauseas, vomitus, & ventris fluxum inducit, omnia a lactei floris suppressione producta.

Tertia tandem causa adest, quando dolorosa fit in utero compressio, quæ per subsequentes sympathicas commotiones infra enunciandas nascitur, & leviora hysterica passionis fœnomena adfunt, quæ interdum graviora fiunt.

II. Generice puberes his sunt magis obnoxie molestiis, quam eæ, quæ semel menstruarunt, nam tum appendices venosæ, exiguæ magis, & compactæ existunt, cum uteri interior tunica dura magis, atque densa reperitur.

III. Virgines plerumque, etiam mensibus donatæ plus ipsis laborant, quam mulieres viro subjectæ, quia in illis uteri contextus constipatus nimis apparet.

IV. Simili ratione, quæ nondum gestarunt, majorem inter menstruandum incomodum persentiunt, quam eæ, quæ pluries pepererunt, nam tum conceptu, cum partu vasa uteri omnia relaxantur, ut facile ab affluenti sanguine explicari, atque distendi finant.

§. V.

Diagnos.

I. **Æ**grotantium querelæ satis docent numerum, naturam, & fœnomenorum violentiam, quæ menstrua antecedunt, vel illa consequuntur, tum qualis sit menstruorum labor ostendunt.

II. *Ægræ* ipsæ animadvertunt si mensium fastidium, naturalis fluxus, sanguinis

nis jactura, vel incompleta effusio expediverit; si semel statuto fluxu sit desiturus labor nec ne; si menses sit subsecuturus albus fluor; tandem hoc deficiente persentiunt, si dolor, aut tensio fuerint superstites, ut qua corripiantur laboris specie nos ipsæ admoneant.

III. Innotescunt pariter, & distinguuntur diversæ menstruorum hujusmodi causæ.

1. Linteoli inspectione si illud vix sanguine inficiatur, quod catameniorum laborem a cruoris spissitudine procedere confirmat, contra vero suspicari licebit appendices venosas non humorum crasim peccare, quando linteola sanguine intrisa valde reperiuntur, atque madida.

2. Temperamenti notione si pulsi debiles, lenti, ac rari appareant, & ægra emaciata gravis existat, tunc plerumque sanguinis densitati morbus tribuitur, contra vero ab appendicum vitio solet derivare, si pulsi arietantes, frequentes, & celeres sint, patiens vero hilaris, vivida se monstret.

3. A natura, & qualitate fluentis sanguinis diagnosi desumitur; minime enim poterimus causam morbi cruoris crassitudini referre, quando fluxus celer, & uberrimus sit, facile vero ei tribuitur, si citra vulgarem ubertatem, vel copia, vel persistencia deficiat.

§. VI.

Prognosis.

I. **L**aboriosi menses suppressis mensibus minus nocui evadunt, nunquam tamen sunt pernicie expertes, experientia porro docuit multiplici ratione id accidere.

1. Pernicies desumitur a diversa præcedentium, aut concomitantium fenomenorum indole, plus minusve deleteria.

2. Ab ægrotantium ætate ut in juvenibus facilius, quam in adultis mulieribus laboriosa menstrua convalescant, in iis enim sperare licebit, vasa uteri sensim sensimque dilatari posse, donec illa confirmentur, at frustra id expectabimus in adultis.

3. Pro diversa ægræ conditione, nam jugatæ magis laborant, quam nobiles, magis vero quæ semel pepererunt, quem eæ, quæ nunquam, in illis enim vitium suspicatur a statu naturali valde diffitum, ac proinde difficilioris medelæ.

4. In ratione indolis causarum diversæ; menses autem laboriosi quos vasa labefactata gignunt, pertinaciores iis sunt, quos sanguinis peccata faciunt, quia difficilius est uteri vasa ad naturalem statum reducere, quam sanguinem repurgare.

5. Morbi vetustas quintam prognosis differentiam præbet, nam quo longeva fuerit mensium suppressio, eo mederi difficilior, diutinum porro tempus valetudini plurimum officit.

II. In genere tum laboriosa catamenia, cum incompletum effluvium absolutam plerumque suppressionem faciunt, eique propria phenomena omnia producant.

III. Menstrua laboriosa, quæ consequuntur sanguinis jacturæ, persistentem inducunt rubrum fluorem, qui pro diversa intensitate, plus minusve periculosus existimatur.

IV. Hujusmodi morbus dum fluorem album gignit interdum diu persistens noxas sibi proprias omnes producit.

V. Menses laboriosi albo fluore deficientes, qui tamen vel tensionem uteri, & tumorem comitem habent, vel diutini nimis sunt, syrrhum, aut matricis inflammationem designabunt, atque præcedentibus perniciosiores videbuntur.

VI. Quando tandem menses laboriosos naturalis consequitur fluxus, eoque con-

confirmato uteri dolor, atque tensio, tum fluor albus absunt, minus periculosi experiuntur plerumque, & facilius medentur.

§. VII.

Curatio.

Indicationes quas in menstribus laboriosis implere debemus, illas emulari videntur, quæ in suppressis catameniiis enunciatae fuere, eo itaque collineant:

1. Ad corrigendum appendicum vitium, ut molles extensibiles fiant, quæ dilatari, atque aperiri finant.

2. Ad augendum eas versus sanguinis impulsus, cruorem solvendo comovendoque.

3. Ad liberam facilemque eruptionem promovendam uterum levioribus contractionibus, atque modicis fucutionibus excitando, ut appendices facilius referari conentur.

Ea igitur sunt adhibenda simili ratione remedia, quæ nuper in menstribus suppressione proposita sunt: admonendum tamen est ipsa cautius ac minori sollicitudine præscribi, diuque eorum posse cunctari effectus minoris morbi perniciæ, & molestiæ ergo, qui omne relinquit necessarium spatium renovandi medelam si opus requirat.

Cautela.

Laboriosi fluxus similes postulant cautiones, ac suppressos menses capite quarto vidimus postulare, tantum enim hic adere censeo.

I. Menses difficiles triplici ratione terminare, seu melius triplicem morbum producere, quod prospicere oportebit, ut sedulo remediis subveniamus.

II. Si enim suspiciatur, ab imminuto unoquoque mense rubro fluxu menstrua penitus esse desitura constanter, acriterque emenagoga remedia suppeditare fas erit.

III. Si contra floris augmentum designet veram constantem cruoris jacturam esse tandem superventuram ab emenagogis saltem validioribus erit desistendum, eaque potius adhibere medicamenta, quæ modice fluxum promovent, vel saltem ipsa emenagogis addere, ut infra capite nono docebimus.

IV. Si denique hujusmodi menses consequatur albus fluor in diem increfcens, qui tandem persistere videatur, remediis uti necesse erit, in albo fluore utilibus, vel saltem ea emenagogis permiscere, quæ fusius capite decimo exponemus, ubi de fluxu albo erimus locuturi.

V. Quod si morbi pertinacia in cassum iis exhibitis auxiliis localem uterum vitium indicaverit, quod citra maximum agræ periculum auferre nefas sit, palliativa methodo cunctari tantum oportebit, quæ symptomata imminuat, donec natura menstribus defectui se assuescat.

VI. Eandem pariter diligentiam impendere conveniet, quo menstribus phenomena incomoda magis, & perniciofa evaserint, etiam si efficaciore medicina speraremus illa subicere, & tunc radicalem curationem expectando ubi opus requirat, non erit palliativa prætereunda methodus.

VII. In utroque vero hujusmodi casu ea remedia impendere opus erit, 1. quæ valeant uteri plethoram imminuere, 2. quæ alio lacteam lympham evahant, qua vermicularia nimis turgent, 3. quæ matricis sensibilitatem obtundant, & dolorosas impressiones molliant, quas plenitudo produxerat.

Talia sunt:

1. Dietæ regimen quo agræ minorem chyli copiam generent eumque tenuio-

rem fecernant, ut aptior evadat lymphaticas venas subire; eadem de causa saluberrimum erit, quod hæ mulieres muscolari motu se exerceant, qui tum menses promoveri, cum molestia accidentia compescere potis erit.

2. Reiterata identidem ex brachio venæ sectio ad copiam cruoris imminuendam, eumque ab utero revocandum.

3. Catharsis haud infrequenter erit promovenda ut humorum redundantia subducatur, mitioribus tamen purgantibus id patrabis ne intestinorum spasmodicæ contractiones incitentur.

4. Lavacra, & crysteria emollientia, annodyna, cathartica, aut anthysterica locum habent, prout uterum laxare, intestina expiare, aut hystericum morbum subjugare opus erit.

5. Decoctiones, seu apozemata diluentia diurrhœctica, aperientia &c. opportuna sunt, ut lymphæ lactea tenuior facta facilius intret vermicularia vascula, ibique ortas lymphaticas venas subeat, vel ut eorum remediorum auxilio, lymphæ exuberantis pars maxima per diurrhœsim excernatur simili ratione, ac puerperæ lac separant.

6. Tandem narcotica anthystericis remixta usuveniunt in colicis doloribus, qui præcedunt, aut comitantur laboriosos menses, tum ad uteri dolorem compescendum, cum ad hystericos effectus præoccupandos, quos dolor inducere valeret.

C A P U T V I I.

De menstruis alio devolutis.

§. I.

Descriptio.

CUM menstruorum eruptio in adultis mulieribus serotina sit vel intercepta, aut conformationis vitio labefactata menses lenti, laboriosi, difficiles, ac inopes apparebunt, uno verbo, parum vel nihil perfluent, sanguis enim ibi retentus, atque in his vasibus congestus, quamdam sibi pandit viam per quam deflectit, sive ut ajunt, *se devolvit*.

Nares plerumque, pulmo, œsophagus, & venæ hæmorrhoidales sanguini alio deflectenti semitam parare solent, quare hæmorrhagia sanguineus excreatus, aut vomitus, fluxusque hæmorrhoidalis, haud infrequenter supervenient, at nulla pene est corporis pars, quæ sanguinis exitum non sinat, ut plures observationes docuerunt.

Quandoque hujusmodi pseudo-menstrua ubertate, atque periodis naturalem fluorem emulantur, raro tamen; nam plerumque, aut manca, aut anomala sunt, vel utraque afficiuntur ratione, interdum nullum fastidium consequens habent, cum nares, vel anus sanguinem effundant, periculosa tamen & molesta evadunt catamenia quando per pulmones expuuntur, aut ventriculum egurgitantur.

Modo nullum doloris, aut tensionis defectu in utero effluviæ indicium persentitur, modo dolore, & tumore aliisque obviis symptomatibus futuros menses uterus designat, modo omnia adfunt antecedentia, & concomitantia menstruationis signa, imo aliquis apparet fluxus, qui menstrua refert, eorum tamen utilitate expers.

§. II.

Causæ.

CUM catamenia ex sanguinis in corpore defectu absint, quavis de causa ipse deficiat, nedum vasis tunc exhaustis menses alio deflecti posse persuadebis, at ii devolvuntur quando alia procul diversa causa imminuti, aut suppressi appareant; cum enim unoquoque mense sanguis copiose in corpore congeratur, ideo utero impervio alio conatur per capillarium extremitates impetum facere, forasque exire.

Ea igitur est plenitudo, quæ menses alio vertit, at hæc generalior causa est, quæ undique æque agit, neque unam partem versus potius quam alteram actionem dirigit, quare ut specialem sibi sternat viam peculiaris alicujus partis dispositio necessaria videtur, quæ ibi hujusmodi universalis causæ vim intendat; ecce vobis exponam nonnullas locales causas obvias magis, & observationibus confirmatas.

I. Proximitas partium earum cum utero in quibus menses devolvuntur, & similem vasorum structura, tum facilis utrinque communicatio, facit ut facile uteri infarctus ad alterutram partem transferantur, hac de causa imperviis matricis vasculis exuberans sanguis per hæmorrhoidales venas, aut pudendorum effugit.

II. Aggressæ partis gracilitas, vasorumque per eam reptantium exilitas facilius irrupenti cruori cedit, hac ratione haud raro per nares, aut pulmones sub hæmorrhagiæ, aut sanguinei excreatus specie menses periodice erumpunt.

III. Vitium aliquod conformationis quandoque latitans, quod vasa in aliqua parte debilitat, aut liberam impedit circulationem, sanguinem ibi speciatim evocat, citra ullam externam causam, aut nocua symptomata quæ cruorem eo dirigat.

IV. Ulcera quandoque scissuræ, excoriationes alicujus partis in causa sunt, quod redundans sanguis per latiore hanc partem novam sibi aperiat viam, veteri menstruorum impervia, ab hoc procedit quod per cutem ipsam interdum scabie deturpatam, vel excoriatione abrasam sanguis facile erumpat.

V. Percussiones enim vel contusiones capillaria nonnulla vascula lacerando tumorem alicujus partis inducunt, ubi menstruus sanguis alias impeditus affluit, quapropter procul omnem externam læsionem per simplicem contusionem pergit sanguis, quam parvi faciebamus.

VI. Sucutiones, contractiones, atque partium convulsione repentinis morbis ortæ turgida proxima vascula comprimendo, aut convellendo, ea plerumque concidunt exitumque ita catameniis parant: per nares quandoque menstruus sanguis erumpit si capitis reuma sternutationem excitaverit; per pulmones stillat quando tussis vehementia ipsi convelluntur; per oesophagum expuitur, si incompleta ciborum subactio vomitum promoveat; per hæmorrhoidalia exit tandem vasa quando ventris fluxus aut, tenesmus frequentes per alvum conatus excitat.

Ex his consequitur menses devolutos a duobus potissimum causis derivare generalis una, quæ plethora nimia est a mensium suppressione orta, altera specialis, quæ ab aliqua locali dispositione originem ducit; dum hæ duo simul concurrunt causæ, porro sanguinem citra vulgarem semitam novam sibi quærere viam videbimus, frustra vero ea expectabimus scenomena, cum ipsa simul minime copulentur, aut infirmiter agant.

De cetero mensium effusionem alio devolutam hic statuendo a sola universali plethora pendere, non ab ulla partium conformatione, nihil caput secundum of-

fendimus ubi specialem admittimus uteri structuram ad explicandum periodicum catameniorum fluxum cum hujusmodi effluvi species inter se maxime differant.

1. Menses alio devoluti nunquam supervenient nisi prævia uberrima plethora, hæc enim sufficiet absque ulla peculiari partis textura vasa disgregare, contra vero menstrua sæpe vidimus placide revertere a nulla sensibili excitata plenitudine, ut specialem uteri conformationem admittere opus sit, quæ ad hanc partem sanguinem evocet.

2. Pseudo-menses nulla methodo procedunt, neque reditus tempori, aut durationi, neque progressui, aut decremento effluvi rationem habent: nil mirum ergo si sola plethora ipsos producat, eorum enim anomalia cum causæ producentis natura perfecte confert, quæ continenter inæqualis est, atque inconstans; at periodica catamenia tum in suo regressu cum persistentia, tum incipiendi, increscendi, aut decrescendi modo uniformia magis, & methodica reperiuntur, difficile enim est solæ plethoræ methodicum effluvi tribuere, neque peculiarem uteri conformationem omittere fas erit, præsertim cum anatomicorum observationes ipsam confirment.

3. Devoluti menses tandem partium ulcera inducunt, quod annunciat a scissuris vasorum plethoræ ergo natis ipsos originem ducere, contra vero catamenia nunquam uterum exulcerant, quod ostendit nullo modo vasa uteri cogi, aut scindi ab effluenti sanguine, sed appendices venosæ naturali sua conformatione sponte aperiri.

§. III.

Symptomata.

I. **Q**uando menstrua defunt citra uteri plenitudinem, quod in primo casu suppressionis accidit, devolvuntur tunc menses absque quo tumor, tensio, aut uteri dolor, vel ullum suppressionis indicium superveniat.

II. Vasa quandoque uterina sanguine replentur, ut in secundo, aut tertio suppressionis casu, & tunc alio se vertit menstrua eruptio, eaque ab uteri dolorosa tensione, aliisque vulgaribus menstruationis symptomatibus indicatur.

III. Tandem si sanguis non solum infarciat, verum supra opus distendat uteri vasa, laboriosa catamenia supervenient, & eruptionem alio deflectentem antecedit, vel comitabitur vulgare effluvi, inops tamen valde, & impar menstruorum devolutionem impedire.

IV. Eruptionem plerumque a sanguine devoluto ortam illa scenomena antecedent, quæ suppressa menstrua solent comitari: varia tamen pro causæ producentis diversitate esse solent.

V. Cum ea varia symptomata, quæ suppressionem comitantur aut pseudo-menstrua præcedunt, a sola plethora dependeant; patet enim aliqua eruptione peracta in ratione ejusdem ubertatis genitricem plenitudinem imminui.

VI. Sane hujusmodi symptomata ad menses suppressos potius pertinent, ut interpret ipse autumat, quam ad devolutos menses: nonnulla tamen existant scenomena, quæ hos speciatim respiciunt a peculiari plethora eruptionem præcedenti nata, quæ pro loci varietate variam indolem præferent.

VII. Si enim hujusmodi effusio per nares fiat, agræ erunt tunc inflationi, calori, & capitis reumaticis affectibus continenter obnoxia.

VIII. Si per pulmones fiat, agrotantes gravabuntur, moleste lectulo detinebuntur, continua tussi, thoracis calore laborabunt; tum circa alterutrum latus aut omoplatum de dolore punctorio conquerebuntur.

IX. Si hemorrhoides fluxum patnaverint, patientes neque sedere, neque ambulare libere poterunt, circa anum cruciabuntur dolore, & stimulo efficaciori, neque citra molestiam feces excernere valebunt.

X. Si per oesofagum sanguis stillet, appetitum lædi, animumque deficere videbis; ægræ vero corripiebuntur cardialgia, nauseis, & sanguineo vomitu, alvum autem viscosas, & nigerrimas saburas pici haud absimiles excernet, quæ sanguis erit pene putrescens.

XI. Facile de ceteris judicabis scœnomenis superventurisdum eruptio per alias flectit vias, cognitis functionibus, quæ his partibus sunt assignatæ, & impressionibus perpenfis, quas tensio vasorumque turgentia excitare valebunt, vel sanguinis affluentis acrimonia, copia, aut calore investigatis.

XII. Generice quamvis partem aggrediatur frequenter evenit, 1. quod eruptio modica interdum appareat, quando pauca, & exiliora vasa labefactentur; interdum effusio quam uberrima fit ut sanguis jacturam æmuletur, quando multa vasa, & ampliora conscindantur; 2. quandoque vero brevis persistat effusio, quando vasorum scissuræ exiguæ sint, & modicæ plethoræ ergo cito desinat, tum lymphæ viscosa facile excoriationes conglutinet, contra vero diutina videtur, quando ampliores sunt lacerationes a nimia plethora ortæ, neque acris lymphæ valeat concisa vascula consolidare.

§. IV.

Diagnos.

I. **P**ROspicere facile est menstruum sanguinem alio se vertere, quando a pluribus mensibus fluxus sit interceptus in juvenibus subjectis, quæ copioso vescuntur cibo, parum agunt, aut alterutra, vel pluribus simul subsequentiis circumstantiarum solent laborare.

1. Si earum corporis pars aliqua labefactata sit, cui sanguinem recipere mos sit.

2. Si corporis peripheriam fedet, ulcus, scissura aut vetus fistula.

3. Si pars aliqua male constituta haud infrequenter suctionibus, contractionibus, aut præternaturali nisui obnoxia sit.

4. Tandem si qua hujusmodi male affecta pars diu calore, aut stimulo laboret, vel in ea tumor, & rubor conspiciantur.

II. Quando catameniorum eruptio jam sibi incongruam paravit semitam, ac periodice menstruorum more revertit, minime circa morbi indolem halucinari poterimus, nihil enim facilius erit, quam locum, speciem, gradum, violentiam, atque hujus eruptionis cetera caratheristica signa detegere.

§. V.

Prognosis.

I. **M**enses devoluti ægras levant, imminuuntque sæva suppressionis symptomata plethoram subducendo, qua de causa minus nocui evadunt suppressis mensibus.

II. Nihilo tamen minus spurii menses eandem comitem habent noxam, ac suppressi, si producentem causam spectemus, quæ una est.

III. Plerumque hujusmodi genitrix causa difficilius subjicitur in devolutis, quam in suppressis mensibus, nam in illis deficit, quæ in his adest plethora, obstacula superare potissima, quæ uteri tramitem implicant.

IV. Nunquam arduum magis fuerit, menses per naturalem uteri viam redu-

cere, nisi cum uterus nulla tensione, tumore, aut periodico dolore afficiatur, quia nulli tunc extant naturæ conatus, qui saluberrimam hanc effusionem foveant.

V. At citra hujusmodi damna a suppressione, aut suppressionum causis derivata, alia dantur mensibus devolutis propria, quæ diversa sunt pro impressionibus diversis, quæ in variis corporis partibus a plethora excitantur.

1. Pro gracilitate enim, aut nobilitate partis affectæ, nam si per pulmones, aut œsophagum menses deflectant, plus detrimenti afferent, quam si per nares, aut venas hæmorrhoidales erumpant; at hi magis nocui evadunt, quam si per cutis læsionem profiliant.

2. Pro diverso infartus gradu, qui eruptionem præcedit: itaque ceteris paribus devoluti menses, qui procul tumore, calore, dolore, ac uno verbo partis inflammatione superveniunt, minus pertimescendi videntur, quam si iis copularentur scœnomenis.

3. Pro eorum pertinacia, aut regressus diturnitate, nam qui a longo tempore deflecterunt menses, & diuturniores facti sunt, iis magis perniciosi experiuntur, qui nuper accidunt, parumque persistunt.

4. Pro ægræ conditione, atque temperamento; etenim ceteris paribus eas magis lædunt, quæ chachochimia, aut inquinato sanguine correptæ sunt, quam sanas mulieres, sanisque donatas visceribus.

5. Pro diversis consequentiis, quæ in labefactata parte relinquunt devoluti menses, plus minusve eruptio periculosa experitur, salubrius enim est nullum stillicidium, vel lymphaticum tantum consequi, quam sanguinolentum, aut purulentum effluvium.

§. V I.

Curatio.

Menses devoluti quatuor postulant indicationes; *prior* est tollere causam, atque devolutionis detrimentum; *altera* præoccupare, vel saltem moderare hanc eruptionem, donec efficaciter medendi locus relinquatur; *tertia* sanguinis acrimoniam corrigere, ac a noxiis impressionibus partes tueri, quas ipse infarcit, earumque exulcerationes sistere, *postrema* tandem est sanguinis jacturam compescere, si nimis minetur, intendi.

I. Priorem implet indicationem restitutus naturalis fluxus cui satisfaciunt remedia capite quarto proposita, modo mitiora adhibeantur, præsertim si pulmones, aut ventriculus sint labefactati, ne validioribus pharmacis attenuando, aut commovendo nimis sanguinem, hæmorrhagiæ superveniant grandiores, pertinaciores, aut lethales quandoque.

Nubilibus obvenienti morbo connubio medetur, si id circumstantiæ, & valetudinis status permiserint, nihil enim magis idoneum, atque saluberrimum erit, absque quo sanguinem remediis commoveamus ad naturalem fluxum revocandum.

II. Reiteratæ venæ sectiones secundam implent indicationem, imminuunt enim, tum quantitatem, quam nifum sanguinis eam partem versus per quam effugere consueverat; porro etiam uterum versus cruoris impulsu tolli videtur, qui menstruorum redditui favet, at cum ceteris paribus, tum ex una parte majorem vim impendat sanguis in superandis ceterarum partium obstaculis, cum uterus ad sanguinem recipiendum textura sua magis dispositus videatur, ideoque ægrotantibus a venæ sectionibus plus utilitatis, quam detrimenti expectare licebit.

Reliquum erit ut pedes plerumque secemus, quod facilius ad uterum cruorem evocabit, ut vulgaris etiam praxis docet; tum quando ad superiora evehi-

tur sanguis, cum sic ventriculum, aut hemorrhoides infarctat, nisi tamen revocandi menstrua debilis spes, aut suspicio majoris detrimenti ad partem affectam contrarium suadeat, quæ oppositæ indicationes in plethoricis præsertim subjectis interdum postulaverint ut prius brachium scindamus.

Verum cum eruptionis, atque redivisus causa sola plethora necdum sit, at acris etiam, & falsa sanguinis crasis, quæ completam implicat disruptorum vasorum cohesionem, ideoque humores edulcorare necesse erit ut valide impediat spuriam effusionis regressus, & solidorum foveatur cohesio, de his tamen rebus ad tertiam indicationem pertinentibus, quamprimum locuturi erimus.

III. Hæc tertia indicatio porro magni faciendæ est, nam maxima mensium devolutorum nocumenta ab acrimonia potissimum dependent, quæ vasorum exulcerationes in his partibus inducunt sanguinem deflectentem recipientibus iis fœnomenis humores edulcorando, ne solida abradant, mederi poterit.

Ea de causa non solum suspendere emenagoga omnia opus erit ad primam indicationem proposita, verum humectantia, diluentia, & edulcorantia erunt adhibenda, hujusmodi sunt:

1. Jura ex pullo aut vitulo confecta, cum radicibus ebullita Consolidæ, Althææ Nymphæ & raparum, & Betæ &c. aut cum foliis Boraginis Buglossi, Scolopendræ, Lactucæ, vel Alfinis, quibus dum opus sit Ranæ exenteratæ, aut Testudines terrestres addi poterunt.

2. Balnea calida ex aqua fluviali, in quibus si libuerit plantæ emollientes, aut Lini femina sint ebullita.

3. Senum lactis chalibeatum in quo infunduntur plantæ amaræ ut Chærephilum, Fumaria, Centaurea, Chamedrys &c. aliquo earundem plantarum depurati succi cocleare addito.

4. Aquæ minerales ferugineæ, quales sunt eæ de *Forges*, *Camaretz*, *Spa*, *Carancac* &c. modo thorax morbo sit expers.

5. Lac asininum, aut caprinum necessariis cautelis semel, vel bis in die sumptum, postquam ferro ignito chalibeatum fuerit, atque duo, vel tres aquæ secundæ calcis uncia additæ fuerint.

6. Dulcificantia remedia affectæ parti applicata, ut bechica, & stomachica oleosa, aut mucilaginea, si pulmo, aut ventriculus periclitentur, lotiones, & injectiones annodynæ, aut detergentes, si hemorrhoides ægrotent, errhina liquida similibus donata virtutibus, si nares his corripiantur fœnomenis.

IV. Postremæ tandem indicationi nostrum erit satisfacere quando menses alio versi completam sanguinis jacturam æmulabuntur, quæ remedia poscat; ad hoc morborum effluvium compescendum magis idonea tunc ea auxilia impendere fas erit, quæ pro mensibus nimis sistendis infra capite nono indicabimus.

C A P U T V I I I.

Chlorosis.

§. I.

Descriptio.

JUvenes puberes in quibus deest prima mensium eruptio, vel segnis, molesta, aut inops evadit; tum illæ, quæ ætate consistere incipiunt, vel imminutis, suppressis; aut laboriosis sunt obnoxia mensuris; gravidæ tandem a tertio, vel quarto gestationis mense certo quodam corripiuntur languore, quem facilius est describere, quam definire.

Vulgarium ciborum gustum amittunt, imo abhorrent, mox sordes appetunt, qui morbus (a) *Pica*, aut (b) *Malacia* vocatur; incompleta fit digestio, quam comitantur ventriculi gravedo, atque cardiagla, hasque consequuntur haud infrequenter intestinorum borborigmata, vomitus, diarrhoea, aut hyppocondriorum tensio; Quædam vero lumborum, inguinum, atque hyppogastri dolorem perferunt plus, minusve intensum per intervalla recurrentem.

Pulsus plerumque celer apparet, frequens, febrilis, atque exiguus; respiratio vero brevis, difficilis, & laboriosa observatur, imo spirandi difficultas, interdum ad oppressionem usque augetur; cordis motus intenditur, ac acceleratur ita, ut palpitationem gignat, dum ægræ præsertim musculorum actione se exercent; si cliyum enim ascendant, aut cito iter properent, tunc videbis carotidum, ac temporalium arteriarum contractiones, tum habituales corporis gravedines duplicari.

Ægrotantes vero feminæ invite somnum capiunt, desides fiunt, laxitudine corripuntur spontanea, nulla etiam ei suppeditata causa melanconicis affectibus laborant, quibus magnopere tristantur, atque societatem effugiunt.

Pedibus inflantur, atque cruribus quæ vespere cedematosa fiunt, noctu vero ad naturalem statum reducuntur, mox tumor, caput, faciem, aut palpebras aggreditur, ut circa oculos circulus lividus appareat.

Vultus tandem pallefcit, vividumque colorem amittit; ægræ albidæ, ac plumbeæ fiunt; verum ceræ, febi, aut foliorum exsiccatum flavum, aut viride-nigerrimum colorem referunt.

Hujusmodi morbus est *le pale couleur* seu ut Medicis mos est *Chlorosis*. Cum ille hodie fusc, lateque totam Europam, & Provincias Meridionales peragret, neque Græciam, vel Italiam ab eo unquam liberam evasisse credendum erit; tamen (c) Hyppocrates, (d) Gallenus, & ceteri veteres (e) Medici obiter tantum de illo mentionem fecerunt, neque speciali nomine ipsum insigniverunt, solummodo inter (f) Hyppocratis scripta ipsum *Chlorosim* appellari reperies; etenim nisi a duplici ævo Medici (g) consueverunt peculiarem morbum constituere, at varia nomenclatura confirmat olim constanti proprio nomine caruisse, quidam enim ipsum *morbum Virgineum* appellarunt, quia virgines prima eruptionis intermissione aggredi solebat; alii *Febrem albam*, aut *pallidam* dixerunt pulsum frequentiam ergo a febre lenta haud absimilis; nonnulli *Febrem amatoriam* vocarunt, quia illis obveniebat, quæ viro maturas jam esse persentiebant, aut facilius amore capiebantur; at Gallia (*) saltem communiter receptum est morbum *le pale couleur*, *pallidum* nempe, seu *sedum colorem* appellari, cum vultus pallor præcipuum sit, & essentielle symptoma, eadem de causa omnes pene recentiores Medici, qui de eo latine scripserunt, illum (h) *Chlorosim* nuncuparunt,

(a) Hanc appellationem morbum ipsa adeptæ est ob *Picæ* animalis varietatem, aut quod etiam illa sæpe hac affectione corripitur. *Paulus Ægineta*, De Re Medica. Lib. I. Cap. 1. Affectio quædam prægnantibus accidit, quæ a *pica* avicula nomen accepit. Alii tamen ob hederæ similitudinem, quæ *κίττος* Græcis vocatur, hanc affectionem *κίττος*, hoc est, *pica* appellatam esse sentiunt; nam sicut illa variis plantis, prout occurrunt, se implicare solet, ita mulieres ex *pica* laborantes varia edulia appetunt, atque ea contraria, quæ tum voluptatem, tum insuavitatem gustanti exhibent. *Aetius*, Med. Contract. Tetrab. 4. Serm. 4. Cap. 10. (b) *Plinius* qui latine scripsit certo quoddam loco appellat gustus depravationem *Gravidarum Malaciam*, Hist. natur. Lib. XXIII. Cap. 6. & alio loco *Malaciam Stomachi*. Hist. natur. Lib. XXVIII. Cap. 7. (c) Lib. de Morbis Virginum.

(d) De causis symptom. Lib. I. Cap. 7. (e) *Paulus Ægineta*, De Re Medica, Lib. I. Cap. 1. *Aetius*, Contract. Medicin. Tetrab. III. Serm. 1. Cap. 23. Et Tetrab. IV. Serm. 4. Cap. 10.

(f) Hujusmodi error inter *Varandei* scripta reperitur Lib. I. de Morb. Mulierum. Cap. 1. & ita *Senerius*, De Morb. Mulier. Part. II. sect. 3. cap. 2. atque *Riverius*, Prælex. Medic. Lib. XV. cap. 1.

(g) *Johannes Langius* inter omnes magis sedulo hunc morbum descripsit. Ann. 1559. Voyez *Epistol. Medic. Lib. I. Epistol. 21.* (*) Itali tamen ipsum communiter *Chlorosim* appellant.

(h) Græcum vocabulum *Χλωρῶσις*, color viridis simili ratione conflatur *μετεμύχρωσις*, transductio animæ, & *μεταμύρφωσις*, transformatio, ut cum hujusmodi verbi compositio *χλωρῶσις*, modificata sit, ut cetera

runt, quæ vox a Græcis derivata, *morbum* significat *ubi faciei pallor in viridem vergit*; nomen tamen hujusmodi veteres prorsus latebant, neque a Græcæ linguæ legibus unquam recte desumptum videtur.

§. II.

Causæ.

Parum perpenſis cutis textura, vaſorumque per eam reptantium diſtributione, patet a tribus potiffimum cauſis rubrum, vividumque colorem oriri.

1. Ab exilitate, & diaphanitate epidermidis tum ſuptus-poſiti reticuli Malpighiani.

2. A tenuitate, & numero capillarium vaſorum per corporis ambi tum diſtributorum.

3. A ſanguinis tandem copia, & coccineo colore, qui illa replet vaſcula.

Ex converſo itaque coloris viridi amiſſio, vultuſque pallor, ab oppoſitis cauſis originem habent.

1. In Chloriticis epidermis denſa, atque carnea apparet, ut in combustionibus, vel ceteris aliis circumſtantiis, quibus cutis areſcit.

2. Reticulum quandoque heterogeneo imbuatur colore, qui ejuſdem diaphanitatem perturbat, ut in variis iteri ſpeciebus obſervamus.

3. Vaſa ſuperficie nonnulla, ut in ſenectute, leſa, vel oblitterata ſunt.

4. Deest interdum in vaſis ſanguis innanitionis, aut maciei ergo, aut cruoris jacturæ, vel chronicorum morborum cauſa.

5. Cruor tandem, qui vaſa replet, naturali plerumque rubore caret.

Evidens enim eſt nullam ex quatuor prioribus cauſis in juvenibus præſertim mulieribus locum habere, quæ niſi ſuppreſſionis, aut ſegniorum menſium cauſa pallidæ ſiunt, nulla enim in ipsis adest epidermidis denſitas, aut opacitas, nulla vitioſa in reticulo infectio, nulla mutatio tum numero, cum exilitate vaſorum, nulla denique ſanguinis inopia, ſed a poſtrema earum cauſa pallor deduci debet a languido videlicet cruoris colore, qui ceteris paribus ecutim deturpat.

Ut plane nobis cauſæ innotefcant, quæ naturalem ſanguinis colorem pervertunt, ejuſdem elementa perſcrutari oportebit, illa præſertim, quæ coccineum præbent colorem, ut vitia ſpecialia hujus partis inveſtigare queamus; nos itaque circa hoc facilior & certior ſanguinis analyſis edocet.

1. Sanguinem ex vena recenter extractum & frigefactum in duas diverſas ſubſtantias ſeparari, quarum altera in globum coit compactum rubro colore infectum, altera liquida remanet, flavumque ſerum repræſentat, quod rubram portionem circumcingit, ac ſublevat.

2. Globulum illum in talleolos conciſum, & limpida tepentia aqua lotum coccineum colorem amittere & gelatinæ more translucidum fieri, rubram vero cruoris partem ſub pulveris ſpeciem fundum petere.

3. Tandem ſerum hujusmodi igni expoſitum, qui ovi albumen condenſare potis ſit, ſimilem referre ſpiſſitudinem, reliquum fluidum perſiſtens, flavum paulo magis & ſalſuginofum ab urina haud abſimile.

Ea itaque analyſis confirmat quatuor potiffimum eſſe admittenda ſanguinis elementa:

I. Sub-

cetera duo necelle erit Græco idiomate dari verbum *χλωρόω*, *ω*, *viridem reddo*, ex quo *χλωρόσις* originem ducat ut apud Græcos reperitur eum *μετεμψύχω*, *ω*, *animam traduco* *μεταμόρφω*, *α* *transformo* unde producantur, *μετεμψύχωσις* & *μεταμόρφωσις*.

1. Substantia quædam *gelatinosa crassior*, seu *inspissata lymphæ*, quæ solo frigore coit.
2. *Rubra substantia*, quæ in grummato sanguine cum parte gelatinosa crassiori remixta coalescit, facile tamen tepenti aqua separabilis.
3. *Gelatinosa ex rariori lymphæ & tenuiori conglata*, quæ nisi certa ignis vi concrefcit.
4. Postrema tandem *serum est urinosum* nonnihil, quod vehiculum esse videtur ceterorum componentium, duorum saltem priorum.

Cum ex quatuor his elementis secundum tantum rubrum appareat, cetera translucida aut leviter lactea remaneant, eo tantum erit tribuendus rubrus sanguinis color, quo intime inficitur cruor; nonnulli crediderint fortassis magnam esse partis rubræ rationem cum ceteris componentibus, præsertim cum æqualem coccineum, vividumque illum colorem suppeditet, at (*) certissimæ observationes docuerunt nisi decimam, aut duodecimam & minorem fortasse totius massæ constituere portionem.

Hactenus enunciata Leuvenhoecki inventis magnopere confirmantur; ipse enim microscopiorum selectissimorum ope duas substantias inter se procul diversas detexit, limpida altera & diaphana, quæ maximam constituebat partem; rubra altera cujus molleculæ æque distributæ per albam fluctuabant substantiam, hæ rubræ molleculæ totidem globuli apparebant, qui quantumvis exigui ex sex aliis minoribus globulis coagmentabantur.

Facile enim est percipere hujusmodi globulos rubrum præbere sanguini colorem, liquorem vero translucidum in quo ipsi enatant tres reliquas partes superius allatas constituere; rationem vero rubri sanguinis cum ceteris componentibus exiguum esse constat; sufficit tamen, ut integra massa undique coccinea conspiciatur.

Ex antea acta igitur analysi & observatione consequitur plus minusve cruorem coccineum imbui colore pro ubertate, aut inopia globulorum, pro multiplici eorum divisione, pro globulorum motu intestino, aut vorticoso velociori, pro aptiori configuratione & superficie rubrarum mollecularum, quæ majores rubræ lucis fasciculos reflectat, contra vero si ea omnia ex converso eveniant, cruorem pallidiorem videbis.

Necessè enim erit aliquam vel plures earum causarum locum habere ad chlorosim producendam, seu coccineum deturpandum sanguinis colorem; tribus igitur postremis causis omissis ignotis magis & incertis priores duas patentes magis examinabimus, sed ut recte de iis judicemus, atque causam cognoscamus, qua numerus imminuitur coccineorum globulorum, aut eorum retardetur motus intestinalis, originem illorum longe perpendere necessè erit.

Alimenta, quæ primam suppeditant sanguinis materiam intra ventriculum saliva, & gastrico succo imbuta, solvuntur, atque digeruntur ita, ut in pulmentum convertantur spissum, cinereum, ac subacidum, vel facile ascescibile, quod *Chymum* audit, hic intestina ingressus bile, atque succo pancreatico remixtus, novam mutationem subit per quam lacteus magis, & tenuior factus *Chyli* nomen assumit, & lactea vascula intrare valet, hujusmodi chylus majorem perfectionem acquirit, dum *Aselli* pancreas, cisternam Piquecianam, & toraci conductum lymphæ comixtus pervadit, quæ lymphæ ipsum fluidiorem, dulcioremque reddit; tandem hoc naturæ labore penitus subactus chylus per finistram subclaviam cruori permiscetur, ubi sensim, sensimque in circulo ductus, sanguinis naturam, & proprietates adipiscitur.

Chylus ex lacteis venis extractus dum microscopio inspicitur globulis conflatus

(*) Acta Eruditor. Lipsiens. Ann. 1682. Mens April.

status apparet a coccineis haud absimilibus, amplioribus tamen, & sphericis minus, minusque compactis, quorum superficies diversimode levigata omnes coloratos lucis radios reflectens alba non rubicunda patescit, majorem semper tunc perfectionem acquirit, globuli enim uberiores, exiliiores, atque spherici magis evadunt, etiam si nondum coccineis copia, tenuitate, aut rotunditate præcellant, quæ totidem qualitates adipiscuntur cum intimius sanguini permixta, coccineis prorsus similes fiunt, ex quo naturæ opus perficitur, quod *sanguificationem* appellant.

Ea plane ostendunt numerum, & tenuitatem coccineorum globulorum a tribus potissimum causis derivare, a conditione chyli in quo concreescunt, & sanguinis, qui illos perficit, verum a chyli una, & cruoris indole, a materia videlicet componente, plus minusve apta, & a causa simul efficiente, quæ complexim eorum perfectam subactionem foveant.

1. Si alimentorum subactio in ventriculo perficiatur ita, ut chylus necessariis conditionibus poleat, confertiores erunt, exigui magis, atque rotundi ejusdem globuli, quare ceteris paribus e parte sanguinis ex chylo innumeræ efformabuntur elementares spherulæ exiliiores magis, atque levigatæ, quæ vividissimum coccineum calorem præferrent, contra vero elementorum, qualitates & congeries impares erunt, si chylus digestionis vitio peccaverit.

2. Sanguis demum vulgari velocitate in circulum actus dummodo cordis, & arteriarum contractionibus necessaria vi impellatur, atque naturalem conservet motum intestinum, ceteris paribus ex parte chyli ejus molleculæ a cruore magis alcholorizatæ confertiores apparebunt, tum quassatæ magis, ac turnatæ coccineæ valde fient, contra vero imbecilliora evadent hujusmodi elementa, si iis deficiat conditionibus sanguis.

3. Tandem si tum chylus, cum sanguis ipse simul bene constituti sint eo magis globuli illi divisi, levigati, rubri conspici poterunt, contra vero si gemina causa infirmior extet.

Plures dantur causæ, quæ chyli qualitates vitare, atque sanguinis motum retardare, vel utrumque efficere valent, nil ergo mirum si vultus pallorem, qui potissimum a vitiatis globulis dependet tot valeant gignere affectus; illos tamen omnes nostrum non est hic perscrutari, eos tantum detegere fas erit, qui suppressionis, aut segnis menstruationis ergo pallorem faciunt, quam *chlorosim* vocant; idcirco eo collineat questio.

1. Admonuimus jam superius capite III. segniores menses in juvenibus gastricum succum infirmare, ac digestionem perturbare, idemque evenire in suppressis, aut imminutis Cap. IV. mensibus, vel conformationis vitio interceptis Cap. V. chlorosis igitur, in hoc triplici casu, a labefactato chylo oriri poterit, dummodo nulla alia adsit causa.

2. Vidimus pariter Cap. III. in retardatis menstruis cruorem segnius circumvehi, minusque plethoræ causa a cordis, & arteriarum viribus terri, idem supervenit suppressis, aut imminutis Cap. IV. mensibus, vel intermissis Cap. V. pallor enim in hoc triplici casu a solo oriri debet sanguinis vitio, cum quo chylus permiscetur, ceteris jam absentibus causis.

3. At in iis circumstantiis chyli simul, & sanguinis vitia copulantur, ut duplici hac de causa natus pallor intensior, seviriorque evadat; Evidens itaque erit in eo triplici casu omnis corporis ambitus faciei præsertim, quæ gracilior est, & diaphana eo colore imbui, quem cetera tria non coccinea elementa duplex nempe lymphæ species serumque suppeditare valebunt, & ea substantiæ cum album cinereum colorem, fuscum nonnihil, lacteum referant, & agrotantium cutim simili ratione deturpant, ut chloroticæ mulieres omnem prorsus venustatem amittant.

At plerumque hujusmodi humores supra statum naturalem majori bilis copia infici solent pro hepatis infartus ratione diversa, quare ægrotantium facies varias flavedinis species refert modo emortui follii, modo aurei numismatis colorem exhibet.

Tandem si infarciens bilis viridis ac poracea sit, tunc sanguis viridem aut viride-nigerrimum colorem vultui communicabit.

§. III.

Symptomata.

Chlorosis vetustior præsertim omnes pene functiones lædit, quam ob rem ut clarius incedamus in hac symptomatum congerie enumerationem prosequi necesse erit, quam in iis describendis articulo primo instituimus, idcirco ab iis initium faciendo, quæ ad læsas imi ventris functiones pertinent, ad toracis, capitis, cutisque innoxia fœnomena explicanda gradus faciemus.

1. Lacticinosus fluxus unoquoque mense in chlorosi intercipitur qui sanguinem infarciens, gastrico succo, atque saliva remixtus, eorum qualitates ita pervertit, ut vulgariæ ciborum impressiones linguam, & ventriculum afficientes maxime labefactentur, præsertim si dulcia fuerant alimenta, quæ leviter organum afficiunt, & insipida videbuntur, si illa asperum sensum excitaverant nauseosa evadent, a quibus inapetentia, gustusque depravatio, quæ hunc morbum comitantur dependent.

2. Eorum impressionum læsiones, quas lymphæ gastricæ aut salivæ vitia producant possunt ita gustum depravare, ut non solum se tedeant ægras obviorum alimentorum, verum fordes appetant, quales sunt carbones, cineres, gypsum, creta, sal, aut acetum, quia hujusmodi substantiæ, vel irritant magis gustus organum, vel corrigunt salivæ, aut gastrici succi vitia, ac perinde eam depravati appetitus speciem producant, quam *Picam*, aut *Malaciam* appellant.

3. Ea depravatio pro subjectorum circumstantiis diversis varia est, nam uno aliæ, alio alteræ sordium genere vesci adamant pro speciale a saliva, aut gastrico succo vitio adeptæ, aut ejusdem vitii intensitate diversa, eæ varietates a consuetudine etiam derivare poterunt, aut exemplo ceterarum mulierum simile laborantium vitio, quod non raro accidit.

4. Posita enim salivæ, aut stomachicæ lymphæ corruptione, aut inefficacia id tantum sufficiet, ut digestio sub optimo etiam vitæ regimine naturæ usibus impar evadat, verum vitæ regimen necessario impar esse debet, si ægræ pleræque sana alimenta contemnant, ac viliora tantum poscant, quæ neque ventriculus subigere valet, neque optimam nutritionem suppeditabunt, nil enim mirum si ex ac gemina causa, in chloroticis mulieribus digestio segnis, difficilis laboriosa, ac imperfecta nanciscatur.

5. Ab ea vero chymus, chylusque subactus in ventriculo morans ejusdem tunicas superiusque orificium irritare potis erit, tum cardialgiæ, vomitum, atque singultum excitabit, mox ad intestina transductus borborismata, colicos dolores, ac alvi fluxus inducere valebit.

6. Sanguinis spissitudo, quæ chlorosim præcedit, atque lactei humoris retentio, quæ illam comitatur, vel subsequens incompleta digestio varias secretionnes implicare, secretosque humores inspissare videbis, ex quibus viscerum obstructions oriri debent, eorum præsertim, quæ segniores succos naturaliter separant, uti hepar, pancreas, splen, atque glandulæ meseraicæ.

7. Hypochondriorum elevatio pluribus de causis superveniet.

1. Ab ventriculi intumescencia flatu turgentis, aut indigestis cibis. 2. Ab inte-

intestini colon turgentia a retento aere circa ejusdem flexionem hypocondria versus. 3. A tumore obstructi hepatis, aut lienis. 4. A sympathica diaphragmatis contractione quam ventriculi dolor excitaverat.

8. Cum diversa sit in singulis morbis uteri conditio, varia simulerunt symptomata superventura; nonnullæ enim unoquoque mense de doloribus colicis conqueruntur, nam cum omnia tunc parata sint ad menstrua cienda, vasa idcirco vermicularia lacteo humore satura venas comprimunt, atque uterum dolorosa tensione, & levi phlogosia afficiunt: incassum tamen hæc omnia eveniunt, cum venosæ appendices nihilofecius referari renuant. Si dolores prout in utero diversum occupat spatium irruens menstruus sanguis modo hypogastri regionem aggrediuntur, modo lumbos, inguina, aut femora gravant; contra vero plures dantur morbi in quibus nulla adsunt proximæ menstruationis indicia; neutiquam itaque tensionem, aut dolorem ægræ perferunt, imo per uterum libera circulatio perficitur.

9. Ex una enim parte in chlorotico morbo sanguinis copia continens augmentum acquirit, suppressionis, aut mensium segnitiei ergo, quare vasa laxi partium contextus præsertim pulmonum videlicet turgida apparebunt; ex altera vero parte in hoc morbo sanguis spissior, viscosus jugiter redditur, quia ab imperfecto, aut impuro chylo producitur, ideoque vasa replere debet, pulmonum potissimum, quæ maxime tumefacit, ac ea duplici de causa vesiculæ pulmonales compressæ a circumpositis tumidis vasculis difficillime sese explicari valent, quod brevem, ac laboriosam respirationem faciet.

10. Consequens erit necessarium in hoc statu pulmones impares esse, omnem congestum sanguinem penitus exprimere, vesiculis non satis extensis, reliquus itaque exuberans sanguis sollicitabit singulis momentis novas inspirationes, ac proinde respiratio crebrior præcepta magis fiet, quo brevior erit, ac difficilior.

11. Cum sanguis vehementius a musculis exprimatur dum majori vi contrahuntur, ut sanguis ita elicitus uberius mollia viscera infarciat, qualia pulmones sunt, ideoque quo magis ægræ se exerceant, eo turgidiores cruores ipsi evadent, quod respirationem difficiliorem, molestam, breviorum, atque præcipitem inducere valebit; id præsertim evenit, quando velocius properant, aut clivum ascendunt, ubi grandiores, & violentiores contractiones excitantur.

12. Cum sanguis vasorum pulmonalium turgentia potissimum causa difficulter a sinistro cordis ventriculo ad aortam, & a dextero ad pulmonalem arteriam transigat, consequitur porro ventriculos imperfecte evacuari, quare sistoles cum incompleta evadat, crebrior etiam, & exigua magis erit, quam in statu naturali, & qui ei respondent pulsi, exiliores, & frequentiores apparebunt.

13. Demonstravimus jam superius articulo vigesimo, musculos in chloroticis infirmiter contrahi, cor vero musculorum lege idem patiens pulsos debiliores, quam in statu naturali gignere debebit, dummodo saltem inertem ægræ vitam gerant.

14. At si illæ mox validiori corporis exercitio succutiantur, non modo pulsus crebrior evadet, quia sanguis a musculis expressus velocius in cordis ventriculos irrumpit, atque tumefacit, verum magnus atque fortior fiet, cum sanguinis copia cor replens, contractiones arteriarum vividiores, & ampliores excitaverit.

15. Cruor qui in hoc morbo per abdominis viscera, atque matricem præsentis obstructionis ergo circumvehi impeditur, caput uberius aggredi debet, atque capitis dolorem excitare in chloroticis obvium.

16. Hujusmodi vero capitis affectus vehementer augebitur modo ægræ animi pathematibus corripiantur, aut corporis exercitatione nimis concitentur, quæ

quæ sanguinis motum promovendo sanguinem magis, atque magis infarciri videbis.

17. Eadem de causa charotides arteriæ atque temporales pulsari crebrius conspicies, quia sanguis ibi copiose evehctus ampliores, validioresque contractiones excitabit.

18. In chloroticis mulieribus parum spiritus animalis fecernitur, tum exiguæ copię ergo, quam spissus sanguis cerebro suppeditat, cum difficillimæ distributionis causa, quam cruoris segnities inducit, ex iis cerebri fibras laxari videbis, spiritus ipsos a seroso sanguine serosos separari, tum fibras illas madafactas nimis molliores fieri, vero humectatis, laxatisque ceterarum partium fibris ægras pertinaciori somno corripri in composita ratione laxitudinis, & mollietiei fibrarum earum.

19. Quam ob rem morbosa hac cerebri labefactione mulieres laborantes etiam expergefactæ externis objectis quam debillime commovebuntur, ut eorum pleraque abhorrescant, societatem effugiant, ac tristitia abreptæ, stupidæ, sui que compotes non appareant.

20. Quamvis contemptio rerum omnium, quæ ætatis ratione magni facere deberent, satis huiusmodi ægras desides faciat, eo magis ipsæ tamen ignavia marcescunt pro vita sedentaria, qua magnopere delectantur; id duplex causa producit, primo fluidi nervei inopia, & per nervos ejusdem segnities, ex quibus musculorum contractiones labefactantur, secundo sanguis muscularem substantiam infarcientis resistentia, quæ ita musculos contrahi impedit, ut dolorem interdum pariat.

21. In eo morbi statu cruor pene omnis lymphæ est, serositatem refertissimus, isque a cordis, atque arteriarum pulsibus, parum quassatur; serum itaque lymphæ spissiori imperfecte remixtum facilius separari sinet, verum vasorum extremitates infarciens uberius serositatem in lymphaticas venas impellet, tandem ex lymphaticæ venæ laxæ jam, & labefactatæ difficillime serum exprimere poterunt, quod ibi persistet. Ex hoc enim causarum complexu facile concludi potest in chlorosi partes omnes serosa lymphæ infarciri, ut omnia *Leucophlegmatiam*, aut universalem œdema futurum esse prænuncient.

22. Die & vespere præsertim pedes, crura, atque femora interdum œdematosa fient; 1. Nam cruor contra leges gravitatis evehi coactus majorem lymphæ copiam ibi relinquet; 2. Verum, quia huiusmodi serosa lymphæ capillaria pertinacius obstruens difficiliter sursum tolli poterit.

23. Lectulo jacentibus ægris pro orizantali positi, tum extremitatibus, cum ceteris corporis partibus humores ad libellam se ponunt, eorumque circulatio æque facile undique perficitur, atque œdema evanescit, vultus tamen adhuc tumet, tumentque palpebræ, & oculorum vicinia, nam huiusmodi partes laxiori donatæ contextu, minus elasticæ sunt, minusque valent detentam lympham expellere.

24. Cerebrum ipsum mollietiei ratione œdemate affici posse suspicari licebit, quare ei tribui poterunt difficultas qua mane e somno excitantur, summa ad eum proclivitas donec jacent, atque stupor persistens paullo postquam ex cubili surrexerunt, usque dum positus immutatio levet, vel saltem imminuat cerebri œdema.

25. Veniunt tamen plura symptomata perpendenda, in chloroticis obvia, huiusmodi sunt inappetentia, vomitus, ventris tumor, convulsa præfocatio, atque fordium quandoque appetentia, quæ ab hysterica causa derivare videntur, atque catameniorum in utero fucussione; verum suspicionem nostram explanare omittimus, quod percipi difficile est, antequam hystericam passionem ostendamus, quam extremo Libri secundi capite explanabimus.

§. IV.

Diagnosis.

I. **M**orbi indoles facile innotescit, nam si puberes inspicias, vel mulieres pallidas, ac decolores fieri, nullo præcedente morbo, cibos respuere, fordes appetere, neque sui compotes esse &c., quarum catamenia aliunde cognoscas retardata, imminuta, aut suppressa fuisse, tuto asserere poteris illa chlorosi laborare, quæ fœnomena menstruum segnitiei, aut suppressionis ergo in diem aucta, eo magis Diagnosis confirmant.

II. Neque arduum videtur diversas causas detegere, quæ varios morbi gradus constituunt; chlorosis enim supervenit juvenibus nondum menstruantibus, etiam si puberes fuerint, quæ discrepantia catameniorum defectui tribuitur. In mulieribus viro junctis, quæ concepisse sufficiantur ad mensium suppressionem pallorem referunt, quæ gestationem consequitur. Tandem si eo laborent nobiles jam menstruant, vel jugatæ citra conceptionis suspicionem, aut viduæ, nisi menstruum inopiæ, suppressioni, aut cunctationi morbus tribuitur; vid. cap. IV. & V., quibus eorum causas perscrutati sumus; at ægræ ipsæ passionis historia non parum lucis præbere valebunt.

Interdum tamen mulieribus mentii valde interest, ut earum assertiones infidæ videantur: quot nobiles enim, aut viduæ jam fœtum gerentes potius quam crimen fateri, suadere student faciei pallorem, atque corporis laxitudinem ab interceptis, aut morbo suppressis mensibus procedere, neque illis credendum, quæ nos fallere nihili ipsis pendere affirmant; quoties enim jugatæ procul dolo gestare ignorant, atque pluribus symptomatibus laceratæ remedia poscunt, quæ ipsis sanitatem restituant; tamen prudens Medicus de proprio nomine, atque artis decore sollicitus, monitus consulat, quæ Cap. IV. Art. 5. proposuimus, quæque recenseri hic supervacaneum censemus.

III. Morbi gradus facile deteguntur; ab ægritudinis enim diuturnitate, symptomatum natura, & numero, atque functionum læsarum nobilitate plane deducuntur, quod tamen intererit perscrutari tum ad Prognosim, cum ad optimam medendi rationem instituendam.

§. V.

Prognosis.

I. **C**hlorosis plerumque morbus diutinus, & pertinax evadit, nam ut ei medeamur, catamenia provocare in iis, quæ nondum menstruarunt, vel ea restituere, aut confirmare oportet in menstruantibus mulieribus, quod utrumque difficillimum esse Cap. III. & IV. observavimus.

II. Haud infrequenter morbi vetustate ipse diuturnior, & pertinacior fit, temporis enim diuturnitate eruptionis impedimenta roborantur, atque necessariam humorum subactionem magis, atque magis implicant.

III. Felicem tamen eventum prænunciare poterimus, si semel menses apparere incipiant, etiam si inopes valde, decolores, aut inordinate revertant, tunc remediorum continuatione integram eorum restitutionem sperare fas erit.

IV. Nihilofecius cum hujusmodi morbus facile renovari possit, idcirco caute de futura valetudine pronunciabimus, sapissime enim, dum ægras convalescere autumabis, ægritudinem reintegrari videbis, vel quod obstacula nondum remota fuerint, vel quod minima de causa novum sanguinis inquinamentum regi-

regiminis vitio, animi patematibus ortum, aut tempestatis rigor morbum innovent.

V. At quantumvis difficile chlorosim mederi videatur, ipsa tamen parum damni infert, dum recens est, ac leviora sanguinis vitia producere valet, quare cum viscerum obstructions, quæ menses intercipiunt nondum universales appareant, remediorum usu ea obstacula subijcere posse suadendum erit.

VI. Contra vero inveteratus morbus periculo non vacat, experientia tamen didicimus, eum feliciter curari posse, dummodo nullum perniciosum valde symptoma comitem habeat, atque ægræ exacte Medico obediant, vitæque rectum regimen observent, quod raro tamen eveniet.

VII. Maximum tunc detrimentum patientur ægræ, si ipsæ sordida nimis poscant alimenta, libenterque edant, tunc enim *ex una* parte hujusmodi depravatus appetitus ostendit, salivam, & gastricum succum lacticinofo uteri humore in sanguinem exuberante inquinari nimis, quod vermicularia ipso valde infarciri supponit, ejusque regressum, per venosas semitas impediri, *ex altera* vero parte, sordes quas appetere non renuunt, crassiorem chylum suppeditare, qui in diem sanguinis spissitudinem augendo, obstructions parit, auget, atque numerosissimas ceteris visceribus inducit.

VIII. Perniciosissimus, atque periculosus magis morbus evadit, cum chlorosis ampliores infarctus præbeat, eoque pertimescendus, si uteri, aliorumque viscerum syrrhos, aut pulmonum tuberculos &c. gignat, vel si sanguineos excreatus, vomitus, leucophlegmatiam, abdominis, aut uteri hidropem, febres intermittentes, rebelles aut lentas ethicas producat.

IX. Tandem quæ diu chlorosi laborarunt steriles fiunt, vel difficillime, aut fero concipiunt, aut foetus per idoneum tempus gerere, eosque sanos vividosque parere impares evadunt, quod ratione infartui uteri tribuitur, qui conceptioni, aut foetus nutritioni officit, ut specialiter Libro tertio examinabimus.

X. Ab iis excipies, quæ gestationis ergo pallidæ fiunt omni detrimento expertes, quæ a tertio, vel quarto mense naturalem colorem recuperant, atque conservant, quia embrione tunc aucto ipse majori nutrimento indigens, omnem assumit lacteum humorem, cruoremque in vasibus exuberantem.

§. VI.

Curatio.

TRes sunt chlorosis species a conceptione procedentes, quæ nondum vel incomplete menstruantem puellas afficit, quæ suppressis aut valde imminutis mensibus laborantes vexat, quæ gravidas ad oritur.

I. Hac postrema nullum remedium postulat, tertio enim, vel quarto gestationis mense sponte abit, neque remediis ei obvenire necesse erit, nam menses perperam provocando abortum facile induci posset, si forte pharmaca efficacius agant; optimum enim consilium erit morbum negligere cum pallor tunc necessarium videatur gestationis symptoma omni periculo expers, vel saltem palliativa medela uti intererit, quæ hujusmodi scenomeni incommoda leviter compescat. Ea de causa

1. Egras admonere oportebit, ut optimum vitæ regimen observent, quantum ciborum depravatus gustus permiserit; igitur cavendum erit, ne nimia sordium cupidine laborent, neque tamen eas cupientibus pertinacius contendere conveniet, rationibus potius ægras admonebis, verum si rationis compotes non sint, iis potius erit indulgendum, quam acriter obsistendum, nam experientia docuit ita minus ledi.

2. Sufficit tunc digestionem promovere, atque ventriculū aliquo idoneo stomachico modica dosi sumpto roborare, circa quod ægrotantium gustui, & ventriculi viribus consulere cenſeo, uſitatoria tamen huiusmodi, quæ magis commendantur remedia ſunt, Extractum juniperi; Confectiones hiacintinæ, & alchermes; Theriaca, Oppiatum Salamonis, Rhabarbarum, aut Cortex Peruvianum, vel ejuſdem tinctura; Coralia rubra, Oculi cancrorum, atque oſtrearum teſtæ, Elixir denique proprietatis ſimplex, vel garrus, quinta eſſentia abſintii, atque aqua Carmelitarum.

3. Interdum uſuvenit blandis cliſteribus demulcentibus, alvum ciere, ſi naturalis deſit lubricitas, ita craſſa inteſtina expiando ventriculus facile ſaburris liberabitur, quandoque enim ſuſpicari licebit, quod ſordium impuritates imperfecte ſubactæ, quibus gravidæ veſcuntur in inteſtinis morantes areſcant ita, ut ſæces citra abortum expelli nequeant.

4. His de cauſis præter cliſteria interdum lenioribus purgantibus uti cogimur, ut efficacius primæ viæ repurgentur, qualia ſunt Rheum, Manna, Sal vegetabile, ſimul etiam remixta, aut pulpa Caſſiæ, ſero lactis, aut infuſo ſeminum lini ſoluta.

5. Nihil enim timendum eſt ſi mulieres primo geſtationis menſe ſæpius vomant, imo ſaluberrimum eſt ſi huiusmodi evacuatio a ſordibus ventriculū liberet, quibus gravatur, vomitus ſane tum matri, cum foetui non parum nutritionis demit, at magis intereſt, utrumque primis menſibus deficere, potius quam deleterio exuberent nutrimento.

6. Moderare tamen vomitum juvat ſi pertinax nimis, & violentus evadat, idcirco longe a prandio poſtquam vomitu evacuatus fuerit ventriculus, ac ptiſanæ, aut thei poculo lotus, exhiberi poterunt grana decem theriacæ, aut unum pillularum Cinogloſſi, aut Starkei tertia quaque hora ſumpta, donec penitus vomendi conatus compeſcantur.

7. Hanc methodum jugiter patienterque proſequi neceſſe erit initio laborioſarum geſtationum, uſque dum tertio deſinere incipiant, & quarto tandem menſe ea ſcœnomena prorſus abeant, tunc enim, aucto foetui robore, qui uberius alitur, naturalis appetitus reſtitui, ac digeſtio in mulieribus rite perfici ſolet; vultuſque vividus revertit in iis color.

II. Ceteris duabus palloris ſpeciebus, quas ſegniores, aut ſuppreſſi menſes producunt catameniorum eruptionem ſollicitando, aut revocando ſolummodo medetur. Patet enim nihil differre palloris medelam ab ea, quæ ſuppreſſionem, aut menſium ſegnitiem reſpicit, quorum morborum ipſe tantum ſymptoma videtur, quare capite quarto pervolventibus, ubi multiplex exſtat menſes ſuppreſſos medendi ratio, facile patebit, quæ pro circumſtantiis diverſis ægrotantium ætati, aut viribus, vel temperamento accomodata remedia ſeligere faſerit. Verum cautelis omnibus attendere oportebit, eodem capite articulo tertio indicatis, maximi ſane momenti, quæ hic pariter animadverſionem poſtulant.

Præter hanc tamen medendi methodum, quam eradicatoriam appellant, alteram hic quam palliativam dicunt oſtendimus, quæ morbi progreſſus imminuere, aut præoccupare valet, non omnis enim tempeſtas eradicatoriam inire curationem permittit, imo temperatioribus in quibus magis convenit, haud raro eam ſubſequentur optimi effectus, qui integram valetudinem promittant, quamobrem palliativam plerumque methodum proſequi coacti ſumus ad levandum ſaltem niſi tollendum morbum, quæ etiamſi eſſentialiter a priori non multum diſtet, ſpecialiter tamen hic explicationem meretur, &

1. Optimum vitæ regimen præſcribere, atque alimenta boni ſucci, ac facilis digeſtionis ſubminiſtrare oportebit, viliora quæ poſcunt ſtrenue interdicere,

utpote quæ morbum confirmant, atque augent, quare huic sedulo incumbere nostrum erit, præsertim cum mulieres tunc citragestationem omni periculo vacent, ægris verum suadere intra epulas vinum aqua remixtum haurire, vel parum meraci a prandio quandoque faccaro, aut nuci miristica copulati ingurgitare, ipsas vero sollicitare ut primo mane cubile relinquant, vere præsertim; denique ne melancolia corripiantur cum fociis latam consuetudinem ineant, tandem studere ut matutinis horis jejuno stomacho gradatim spatientur.

2. Si te non latuerit illas valde opprimi palpitationibus, aut pertinaciori capitis dolore magnopere laborare, præsertim cum pulsum plenitudo, aut ver, vel estas id postulent, ægras identidem flebotomizare opus erit, brachium enim secare poteris si proximè absint menstruationis indicia quamvis pedem etiam scindere liceat; at hujusmodi venæ sectio magis idonea imo necessarissima videtur, quando menstrua cito futura suspicantur.

3. Caveto venæ sectionem frequenter nimis reiterare cui substitui poterit calidum pediluvium per horam, vel bihorim unum caloris gradum continenter servando, illud praxis docuit utilitatem æquare levioris venæ sectionis, inferius sanguinem evocando, atque caput, cor, & pulmones levando.

4. Si ægræ pedum oedemate laborent in pediluvio decoctiones usuveniunt plantarum Aromaticarum, quæ sunt Rosmarinus, Thymus, Salvia, Serpillum, Majoranna &c., quibus addi poterunt duo vini sextarii, vel spiritus vini cæphori quadras, ut horum remediorum spirituofismelleculis solvatur oedema, calore vero sanguis evocetur.

5. Quantumvis sedulo vitæ incumbamus regimini ægrotantium, tamen errores, aut ventriculi vitia saburras, aut cruditates continenter producant, quæ in diem digestionem perturbant ut eas identidem purgare cogamur. Si ipse graciles sint, emaciata, lenta febre, aut phtisi corripiri videantur, composita erunt ecoprotica adhibenda ex Reo, Sale vegetabili, Pollicresto, aut manna, cassia, syrupo pomorum, aut florum persicorum conflata; at si pituitoso donentur temperamento, & oedematosa fiant, infusum locum habet folliculorum fennæ in quo soluta fuerat uncia una & semis, aut duo mannae calabrienensis præscribi pariter poterunt diagridium, pulvis cornachinus, aloes, jalapa, vel turbit, sub forma bolari.

6. Ut constantem tamen purgantia affectum præstent, stomachicis interdum uti opus erit, quæ completam digestionem confirmando chylum perficiet in sanguinem transiturum. Hic idonea reperies stomachica, quorum ægrotantium constitutioni, & morbi gradibus magis accomodata seligere poteris.

Aromata.

Cinamomum
Cassia lignea
Cortex pseudo-vvinteranus
Cherophylli
Macis
Nux miristica
Cardamomum

Quæ modica dosi, vel cibis permisceri poterunt, aut vina medicata præparari, quæ cocleatim mane jejuno stomacho hauriri licebit.

Crocus Orientalis

Vel subtiliter pulverisatus, sumitur a granis x. ad xv; vel exigua dosi theiformi infunditur jejuno stomacho mane sumendus.

Gra-

Granna.

Semina Coriandrorum
Baccæ Juniperi

} Hauriuntur sub ptisanæ, aut thei
forma.

Electuaria, & Confectiones

Theriaca
Conf. Alkermes
Conf. Hyacinthina
Oppiatum Salomonis
Extractum Juniperi

} a gr. xx. ad drachm. semis, ma-
ne jejuno stomacho sumenda
cum vini cocleare.

*Elixiria**Aquæ destillatæ, vel stomachicæ præparationes*

Elixir proprietatis sine acido
Quinta essentia absinthii
Aqua Melissæ, seu Carmelitarum
Aqua Menthæ

} a gutt. xxv ad xx cum vini co-
cleare jejuno stomacho mane
sumenda
ad unius, vel duplicis coclearis
dosim.

Elixir proprietatis, seu Garrus

} Dosis erit exiguum coclear cum
aquæ, aut vini duplo com-
mixtum

Decoctio absinthii
Vinum absinthiatum
Syrupus absinthii

} ab $\frac{3}{4}$ vi ad vii
ab $\frac{3}{4}$ iii ad iv
ad $\frac{3}{4}$ i

Gummi, aut Resinæ

Mastix
Myrrha

} a gr. x. ad xv. in substantia vel
sub forma bolari

7. Stomachicis addi poterunt mitiora aperientia Cap. iv. indicata ex iis effi-
caciore eligendo, at in genere ferrum vel chalybs utiliora suppeditant, qualia sunt,

Limatura ferri, aut chalybis por-
phrisata

} a gr. x. ad xviii., vel xx. je-
juno stomacho, confectione
hyacinthina, aut in prandio
Rhabarbaro remixta.

Crocus Martis aperiens Maii mat-
tutino rore confectus

} cum oppiatis, vel ut limatura a
xv ad xx. grana sumitur.

Crocus Martis per balneum Mariæ
confectus, seu ut vocant Ethiops
Martialis

} a gr. xv. ad xx.

Tartarum Martis solubile
Sal Martis Riverii

} sub forma bolari sumitur, aut
solutum ptisana quadam, aut
decocto a gr. xviii. ad xx.

Tinctura Martis

Globuli Chalybei

Vinum album Chalybeum superafusum videlicet, limaturæ Chalybis, aut Croco Martis aperientis

Aqua Chalybeata infusione Croci Martis ferri eruginosi, aut clavorum

a gutt. xx. ad xxv. decocti aut ptisanæ poculo infusa.

decoctionis aperientis, aut ptisanæ cratere infusi donec fluidum nigro colore inficiatur.

ab ℥ iij ad iijj mane sumendum

pro ordinario potu vino copulata

8. Aperientia remedia congrua dosi stomachicis consociando, infusa, decoctiones, apozemata, pulveres boli, oppiata &c. innumera componi poterunt simili ratione ac Cap. IV. docuimus.

9. Cum aquæ thermæ intus sumptæ una congerant utilitates omnes purgantium, aperientium, atque stomachicorum, ideo efficacissimæ in chlorosi experiuntur, si idonea tempestate vere nempe, & autumnus per longum tempus modica dosi exhibeantur, dummodo ventriculi vires permiserint, in Gallia præstantiores sunt hæc *Vichi*, *Plombieres*, *Balaruc*, *Bareges*, *Bagnères* &c.

Aquæ minerales ferrugineæ, quæ gallarum admixtione nigro inficiuntur colore Martis ergo quo saturantur, utilissimæ evadunt in chlorotico morbo, possunt enim exhiberi æstivo tempore per plures quidem dies modica tamen dosi, ipsis interdum permiscendo idoneam quantitatem Salis Policrestæ de *Seignette*, aut de *Duobus* ut cito eliminantur; hujus sensus illæ sunt *Vals*, *Caransac*, *Spa*, *Bussan*, *Forges*. Animadvertendum tamen est eas interdicerere debere quando ventriculus labe, aut artus inferiores œdemate laborent cum anasarcae metu pari ratione ut circa usum thermalium superius admonuimus.

10. Inter usitatoria remedia subsequens extat quæ præcipuas indicationes implet

℥ Limatur. Chalyb. in aqua præparat Cinnam. pulverati, ana. part. j.

Sacchari tenuissime triti, part. ij.

M. F. pulvis, cujus dosis a ℥ ss ad ℥ j.

Hujusmodi pulvis exhiberi potest mane vel instante prandio jejuno stomacho, superbibendo simplex, vel duplex poculum diluti juris, aut decoctionis plantarum aperientium.

Cum ægræ ventris stipticitate afficiantur, huic remedio bis in hebdomada grana aliquot Rhabarbari addi poterunt si ventriculus peccet; pulveris vero Cornachini, aut Hidragogii cujusdam, si pedum œdemata appareant: si auctoribus nonnullis fides habenda esset, uti specifica remedia in hoc morbo amplecti poterunt 1. Radix condita Angelicæ ad ℥ vel ℥ ss mane comesta, aut ejusdem paullo majoris dosi decoctio duplici aquæ cratere sumpta. 2. Simili ratione commendant Scorzonæræ radicis decoctum. 3. Verum sex, duodecim, aut quindecim grana Bezoaris Orientalis quidam magni faciunt cocleare soluti decoctionis plantarum illarum; at multum deest, ut laudes eximias hæc remedia mereantur, quas de iis prædicarunt, quinimo experientia didicimus ceteris vulgaribus remediis ea nihil prorsus præcellere.

12. Cum palloris fœnomena magis teterrima sint pulmonum labefactatio, aut pthisis ipsa, quæ ventriculi dolor crebra tussis humida, vel sicca, macies, insomnia, continenter prænunciant, tum motus vespertinus febrilis, aut nocturni su-

ni sudores &c. , sedulo itaque ea præoccupare fas erit , cum nonnulla eorum indicia appareant , hac de causa identidem venam seccare intererit ; primas vias cassia , manna , aut fero expiare , jura vero quandoque exhibere ex pullo , vituli rostro , ranis , aut testudinibus confecta , dein furfuricula aqua aut vituli jure cocta , & cinamommo , aut saccharo remixta proderit ; verum vespere leviora narcotica usuveniunt , qualia sunt decoctio capitem papaveris albi , syrupus diacodii ad ℥ iij vel iiij , aut pillularum Cynoglossi similis dosis , quæ molestam tussim compescant , lac denique præscribi poterit plantis bechicis , & pectoralibus destillatum , aut serum depuratum floribus Verbasci superafusum , tum lac caprinum , asininum , aut vaccinum , pro alimento si ventriculus sinat ; interdum suspendere opus erit palloris medelam , & cum ad eam revertamur caute incedendum erit idoneis bechicis aperientia temperando .

13. Universalis oedema , seu anasarca obvium pariter est atque molestum chlorosis symptoma , ut ipsum igitur præoccupemus , atque una penitus subjiciamus , erunt adhibenda 1. decocta farsæ parillæ , radicis petrocellini , decoctionibus diureticis remixta , aut mille pedibus . 2. Decoctiones diuretice ex radicibus apii , cardui , cherophilli , nasturci fontani , pinpinellæ &c. 3. Boli diuretici ex pulveribus confecti asellorum , salis admirabilis Glauberi , aut arcani duplicati , quibus adduntur syrupus ramni cathartici , aut therebintina Veneta &c. de cetero remedia quæ in chlorosi adhibentur nihil officiunt anasarchæ adversus quam simul conveniunt .

14. Neminem latet in diuturnis , & laboriosis morbis sæpe mutare remedia oportere , id tamen in hac morbi specie potissimum convenit ubi ventriculus medicamentis assuescit , quibus nova substituere necesse est , idcirco modo stomachica , modo aperientia , modo utraque sunt adhibenda , interdum purgantia iis addere opus erit , interdum humectantia , diluentia , aut demulcantia substituere , præsertim si toracem labefactari suspiciamur , tandem diuretica , & hdragoga locum habent , si oedema hydropem minetur .

15. Connubium denique optimam medelam præstat : id jam (a) Hypocrati innotebat , quod postea innumeræ observationes confirmarunt , admonendum tamen est , ut saluberrimos præbeat effectus eandem methodum prosequi interesse , quam pro corporis exercitatione n. 1. commendavimus : primum videlicet viro sensim sensimque uti , si id temperantia sinat , crebrius vero donec uterus valeat subire utilitates omnes quæ ab eo possunt derivare , atque contractiones aut scistalticas oscillationes persentiat , quas matrimonium inducere solet , lymphæ , cruoris , lacteique humoris circulationem restituendo , quæ catameniorum eruptionem perfecte revocabit .

C A P U T I X.

De mensibus nimis , atque uteri hæmorrhagia .

§. I.

Descriptio .

CUM in mulieribus sanguinis fluxus imminui , vel intercipi possit , ita ubertus nimis quandoque evadit , ut viribus officiat , novumque morbi genus constituat , eo directe oppositum , de quo Cap. IV. disseruimus .

Astruch de Morbis Mulierum .

F 3

Hu-

(a) De Morbis Virginum .

Hujusmodi dupliciter considerari potest modo fluxus quamquam immodicus aliqualem adhuc periodi speciem retinet, & *mensēs nimii* tunc ipsum appellant, modo nullam periodorum legem præferunt, imo copia, aut pertinacia vitatur, ideoque sanguinis jacturam, aut uteri hemorrhagiam vocare consueverunt, quare ambas species singillatim explicabimus, & primo

Mensēs nimii. Fluxuri sanguinis copia a tribus potissimum causis dependet, a periodo menstruorum, a fluoris persistentia, atque ubertate fluentis sanguinis, ut superius Cap. IV. perpendimus, ubi vidimus catamenia imminui eorum respectu dum raro revertuntur, cito desinunt, vel exigua quantitate fluunt; ex converso enim inferri poterit menstruorum frequens regressus, effluviū persistentia, vel ejusdem copia mensēs nimios facere.

I. Hujusmodi conditiones vel singillatim peccare possunt ideoque immodici mensēs crebri, diutini, aut uberrimi apparebunt; & *primam* constituent morbi speciem.

II. Vel binæ simul conditiones vitiantur, quare crebri, & diutini; vel diutini, & uberrimi, vel uberrimi; & crebri mensēs redibunt, atque *alteram* morbi speciem inducent.

III. Vel omnes tandem hujusmodi conditiones continenter agentes *tertiam* producere valebunt mensium nimiorum speciem.

Ne decipiamur igitur animadvertendum est, cum haud facile sit in statu naturali determinare catameniorum stadia respectu eorum diuturnitatis ac copię, quæ omnia in diversis subjectis pro ætatis, temperamenti, climatis, aut vitæ gestæ ratione variare solent, eo itaque difficilius erit hæc definire in iis, quæ nimio laborant fluxu an morbosus sit, nec ne. Quapropter superallatæ conditiones non sufficient, ut morbosus mensium status videatur, nisi nocua quædam superaddantur fœnomena, quæ illos contra naturæ leges erumpere confirmant, hujusmodi sunt, gustus depravatio, pallor, languor, lassitudo, œdema, atque universalis labefactatio.

Ut hujusmodi effluviū *sanguinis jactura* nuncupari mereatur, aut copiosum, aut diutinum valde esse debet; Quando uberrimum fluit, *uteri hemorrhagia* solet appellari; quando diuturnum magis, minus abundans tamen, Latine, (a) *Stillicidium*, aut *Ploratus uteri* vocari solet, Gallico sermone *Perte mediocre*, aut *Suintement de sang de la matrice*.

Facilius est sanguinis jacturam, quam mensēs nimios detegere, nam proculdubio omne sanguinis profluvium, tum ubertosum nimis, parumque persistens, cum modicum, diuturnum tamen inter veros morbos solent recenseri.

De cetero omnes sanguinis fluxus, qui utero gerentibus, aut puerperis superveniunt, & in partu sapissime aut abortu immodici fiunt, ad uteri hemorrhagias sane referri debent, at cum in circumstantiis diversis adorianur, quæ specialia postulant remedia, sui que generis fœnomena producant, idcirco Lectorem mittimus ad Librum Tertium, ubi singillatim de gestatione, & morbis eam consecuturis verba faciemus.

§. II.

(a) Auctores nonnulli uteri *Stillicidium* per mensium imminutionem habent, at valde decipiuntur, nam diutinum, & continens effluviū, quale est *uteri Stillicidium* vera est sanguinis jactura, etiam si modica. Aetius tale profecto cum consideravit dum primus de hoc morbo loquutus est. *Tetrehbl. IV. Serm. 4. Cap. 63.*

§. II.

Causæ, quæ menses nimios inducunt.

Id est trium morborum causam explicare, seu singillatim perscrutari, qua ratione menses, vel, 1. cito revertant: 2. nimis perdurent, aut 3. uberri-
mi nimis fluant.

I. De *mensibus crebris valde*. Si paullisper menstruationis leges examinabimus tribus de causis apparebit menses citra naturæ ordinem citissime renovari. 1. vermicularium vitio, dum citius quam par est lacteus in iis cumulatur succus; 2. appendicum venosarum faciliiori productione, atque distensione, quæ a minima vermicularium turgentia referari sinunt, cruoremque crebre effundunt. 3. Sanguinis labe qui in eas appendices nitens ipsas haud infrequenter aperiri cogit. Tres hujusmodi causæ singillatim vel complexim binæ, vel omnes simul pro diversitate remotarum causarum a quibus originem ducunt, quæque diversa ratione inter se copulatæ periodos plus, minusve breviores producant.

1. Vasa cito replentur vermicularia, atque crebre lacticinofo saturantur latice, ciborum abundantia valde nutrientium causa, quibus opulentæ vescuntur mulieres, quæ vitam otiosam inertem plerumque gerunt, quales sunt Civicæ omnes; idem Altricibus evenit, quæ citius quam par est, mammis adhuc turgentibus, lac emittere student.

2. Appendices venosæ producuntur atque extenduntur facile ideoque crebre etiam referantur vermicularium turgentia ergo, quæ molli laxaque tunica obteguntur: in iis præsertim id accidere conspiciamus, quæ graciliori donantur corporis habitu, albo fluore laborant, vel quæ uteri excoriationes passæ sunt in difficili partu, abortu, aut secundinarum extractione, vel quæ uterum ulcere habent erosum.

3. Sanguis magno nisu appendices frequenter aperiri cogit, quando in vera plethora exuberat valde pro nutritione nimia, aut inertia, vel quando rarefcit in pseudo-plethoricis mulieribus, ubi velocius circumvehitur, quod iis accidit præsertim, quæ acrioribus cibis aromaticis, sapidis aluntur, vel spirituosos hauriunt liquores, nimis se exercent, vigilant, animi vexantur patematibus, aut febre acuta laborant,

II. De *mensibus diu persistentibus*. Eorum pertinacia tribus de causis ori-
ri videtur: 1. Ex vitio vasorum lacteorum, quæ supra statum naturalem lacticinofo turgent humore, absque quo illum effundant, comprimuntque venas circumpositas: 2. Appendicum vitio, quæ dum segniter referantur lente sanguine, continenter tamen, manant; 3. Sanguinis vitio, qui continuo ibi affluens appendices distendit. Hujusmodi causæ, ut superiori articulo indicavimus se-
junctim, vel complexim agere possunt pro remotarum causarum diversitate, quarum diversa copula, plus minusve menses producit.

1. Vasa lactea diu turgida persistunt, atque vicinas premunt appendices, quia angustis suapte natura ipsa donantur orificiis, vel palloris reliquiis obstruuntur, quod lacticinofo humoris effusionem retardat; Latex enim uberimus, (v. n. 1. Art. I.) qui vermicularia continenter; replet verum ejusdem humoris spissitudo (ibidem) effluvium implicat, atque impedit valde.

2. Appendices jam apertæ difficillime obducuntur pro tunicarum laxitudine (v. n. 2. Art. III.) aut elaterii amissione (v. n. 2. Art. I.) vel quia excoriationibus labefactatæ fuerunt (ibidem)

3. Sanguis uberrime in venosas irruit appendices, quando veræ, vel spuria plethoræ causa per totum corporis ambitum redundat, (v. n. 3. Art. I.) vel

dum uteri vasculofo contextu a nimia lacteorum compressione retinetur, (v. n. 1. Art. III.) denique sanguis celeriter circumvectus in appendices pari velocitate irrupit (v. n. 3. Art. I.).

III. De *mensibus nimis uberrimis*. Ubertas tres causas agnoscit: 1. Vitium vermicularium, quæ turgidissima sunt, comprimuntque vicina vascula, atque per appendices omnem erumpere sanguinem cogunt: 2. Lata appendicum orificia, quæ pro ampliori diametro ipsum effugere sinunt: 3. Cruoris velocitatem, quæ uterum versus coccineum laticem impellens ipsum uberius fluere cogit, hic pariter ex diverso remotarum causarum connubio plus, minusve abundans gignitur effluvium.

1. Vasa lactifera tument nimis, dum eorum ostiola, vel naturaliter exigua sunt, vel palloris ergo obstructa, ut proinde, lacticinofum humorem minus valeant effundere, (v. n. 1. Art. II.) qui copia maxime illa replet, (v. n. 1. Art. I.) ac spissitudine difficillime erumpit (*ibidem*).

2. Orificia venosarum appendicum in iis laxiora sunt, in quibus circumvestientes tunicae laxæ nimis albi fluoris causa, aut aliunde labefactatæ apparent, (v. n. 2. Art. I.) vel excoriatæ fuerunt in laborioso partu, abortu, aut fœtus vel placentæ extractione (*ibidem*) vel ulcere erosæ (*ibidem*).

3. Sanguis fluit velocius, & uberius in iis, in quibus eximia cruoris copia appendices infarcit (v. n. 3. Art. II.) vel in ipsas celerius irruit (*ibidem*) vel liquatus nimis facilius erumpit, ut in omni humorum solutione accidit.

IV. Animadvertimus jam superallata enumeratione frequentiam, persistentiam, vel ubertatem effluvii *priorem* constituere ordinem mensium nimiorum, qui plerumque ab iisdem, vel affinis causis originem ducunt, quare nil mirum si interdum casu fortuito copulentur binæ earum causæ, ut *secundum* magis laboriosum ordinem efforment, vel tres simul agant, & *tertiam* producant maxime periculofam, uberrimam magis effusionis speciem; [at incassum fusiorum exhiberemus explicationem, quæ facile causarum earum comparatione innotesbit.

§. III.

Causæ, quæ uteri hæmorrhagiam producant.

Sanguinis morbosa jactura maximam, & continentem valde venosarum appendicum aperitionem supponit, quæ vel *uteri hæmorrhagiam* in copiosiori, aut *stillicidium* in diuturniori, sed modico profluvio inducere solet, ideoque hujusmodi dilatatio duplex esse poterit, vel quæ nullam continui solutionem conjunctam habet, vel quæ aliqua læditur exulceratione: examinabimus nunc singulatim ambas.

I. Appendicum dilatationes, quæ citra continui læsionem accidunt, iisdem de causis in uteri nimio profluvio producuntur, ex quibus menses nimii oriri solent; ex. gr. appendicum orificia, quæ maxime dilatari debent, quando causæ omnes (n. 1. 2. Art. III.) superius indicatæ simul concurrant, tunc fluet uberius sanguis per extensa orificia, præsertim si ipsis ceteræ jungantur causæ (n. 3. Art. III.) enunciatae, quæ veram *uteri hæmorrhagiam* perducere valebunt, a sola ortam appendicum dilatatione, plus minusve persistentem pro causarum pertinacia quæ orificia distendunt.

Modicam vero sed diuturniorem eorum orificiorum dilatationem faciet causarum congeries (n. 1. 2. Art. II.) complexim agentium; exigua tunc copia erumpens sanguis per longum tamen temporis spatium præsertim, si causæ ad-

dan-

dantur (n. 3. Art. II.) ideoque tunc habebimus a simplici orificiorum dilatatione absque continui evasione *uteri stillicidium*, seu *suintement de la matrice*.

II. Dilatationes vero cum continui solutione, aut appendicum excoriationes plures causas agnoscunt, quas tantum indicabimus, nam singulas alio nostrum erit perscrutari: hujusmodi sunt;

1. Ulcus uteri plus minusve extensum, profundum, aut foedum, quod visceris fundum, latera, aut collum intrinsecus deturpat, ab innumeris nactum causis infra *Lib. II. Cap. IV.* enunciandis.

2. Excoriationes aut scissuræ, quæ in laborioso partu, abortu, vel ante ortum discessi foetus, aut adhærentis placentæ extractione internam uteri superficiem lædunt.

3. Rhagadia, abrasiones, aut incisiones, quas in interiori uteri facie inducunt, albi fluores acriores valde, injectiones stimulant, aut distensiones, quas in violentiori partu ægræ patiuntur, læsiones tandem, quibus obstetricantes uterum sæpe lædunt.

4. Varicosæ, aut aneurismaticæ vasorum dilatationes, quæ repentinam mensium suppressionem, syrrhum, aut obstructions subsequuntur, liberam hinc circulationem intercipientes, vel quæ fungis, aut carcinomatibus succedunt, in cancro & cancrois ulceribus obviis.

Cum hæ causæ omnes simul ex alterutro vasorum genere ampliorem truncum offendant, ipsum late scindendo, aut erodendo uberrimum, tunc eveniet sanguinis effluvium, seu uteri hæmorrhagia; at modica cuoris jactura, seu uteri stillicidium tunc gignitur, cum hæ causæ segniter agant, vel leviter ampliora vasa abradant, vel exiliora tantum, atque capillaria erodant.

III. Neque præteribimus plures alias externas causas, quæ internis consociatæ valde conducunt ad sanguinis jacturas provocandas, atque augendas quotiescumque in utero superallatarum dispositionum, aut vitiorum aliquod extet, quod impar sit ullum effectum gignere; eadem causæ possunt catameniorum regressum promovere fluxum producendo, aut affluentis sanguinis quantitatem augendo, præposito jam lacteorum vasorum appendicum, aut sanguinis vitio, ecce vobis palam eorum præcipuas, quarum actionem tantum indicabimus.

1. Magnus tempestatis æstus, aut exacerbationes febrium, quæ præcedunt, aut comitantur morbillorum, aut variolarum eruptionem, vel supurationem; vigiliæ crebræ, & immodicæ, intensiora animi pathemata, uti colerha &c., in quibus circumstantiis omnibus sanguinis rarefcentia magnopere crescit, ejusdemque circuitus acceleratur, quod sanguinem duplo nisu in uterum irrumpi cogit.

2. Usus nimius balneorum, aut semibalneorum calidorum, vel pedes calefaciendi abusus, quare rarefcentia quam inferius calor inducit, velocitatem ibi, atque sanguinis copiam auget, ut uteri vasa potissimum repleantur.

3. Subita frigoris aggressio, quæ totum corpus invadit, aut inopinata terroris perceptio, gelida pluvia, quæ repente madescit &c. frigus enim ejusque universalis convulsiva constrictio, quæ tunc externum corporis ambitum adoritur sanguinem intus repellit, & internas partes, uterum præsertim tumefacit.

4. Veneris nimius usus, aut violentiora exercitia, qualia sunt deambulatio, saltus, chorea, tunc enim reiteratæ musculorum contractionem sanguinis circulum sollicitant, atque velocitatem intendunt ita, ut majori nisu ad uterum se transferat, præterquamquod Mattimonii usus, uteri fibras tonicis constrictionibus nimis excitando, propria uteri vasa referari, atque circulum ibi augeri nititur.

5. Casus, aut æquitationis, vel rhedæ secutiones & : subsultus enim quibus
tunc

tunc uterus exponitur vasa aperiunt, atque scindunt, quandoque, minima de causa aliunde superaddita.

6. Ululatus violentiores, aut declamatio, vel lectio elata voce diu continuata, crebra sternutatio, vomendi conatus &c., quæ musculos respirationis, diaphragma, aut imi ventris musculos contrahunt, frequenter, vehementerque; ac proinde agitato, comotoque utero ejusdem facile referantur, aut scinduntur vascula.

7. Intestinorum tormina diu in diarrhoeis passa, tenesmus &c. aut nifus in sublevando pondere, quod magnam producit thonicam musculorum respirationis, aut abdominis contractionem atque diaphragmatis quæ uterum premit atque aperit ejusdemque vasa discerpit.

8. Abortus, aut laboriosus partus, casus, ictus quos gravidæ interdum patiuntur, quique placentæ adhesionem debilitant &c., quare in iis circumstantiis venosæ appendices, quæ gestationis ergo dilatantur, multum sanguinis effundunt, atque per longum temporis spatium, si semel referentur, aut uterus tumidus foetus aut secundinarum præsentia obdutionem magnopere impediat, at hujusmodi morbos *Lib. III.* singulariter perscrutabimur.

9. Efficaciorum tandem emenagogorum remediorum abusus, irritantium pefariorum, vel pedum venæ sectionum &c. ad menses revocandos crebre nimis obviorum, vel quando sponte catamenia abire conantur, nam eorum remediorum actio eruptionem vehementius sollicitando, dum uteri vasa referari magis renuunt, eorum plerumque scissuras periculosas valde, & lethales interdum inducit.

§. IV.

Differentiarum explicatio.

Varietates omnes, quæ animadversione dignæ sunt, vel a diversa morbi specie, vel causarum indole diversa, vel a diverso posito quem in utero morbus occupat pendere videntur.

I. Ut jam *Articulo* primo ostendimus, differentias, quæ a morbi diversitate originem ducunt, hic reiterare licebit, &

1. Cum cruoris effluvium, quamvis uberrimum nimis atque diuturnum appareat periodorum tamen aliquam speciem referat *menses nimios* ipsum vocant, *hæmorrhagiam* vero cum nullum periodum præferat.

2. Menses nimii immodici esse possunt frequentia, perdurationis, aut fluxus ubertatis ergo, si ab unica earum causarum originem ducant, & *primus* hinc oritur mensium nimiorum *ordo*; si a binis *alter* prodit; *tertius* producitur, si tres omnes hæ causæ simul confluant.

3. Sanguinis jacturæ interdum uberrimæ sunt, breviores sunt nec ne, & tunc *uteri hæmorrhagiam* illas appellant, interdum leviores prodeunt, diuturniores tamen, quas *uteri stillicidium* nuncupari consueverunt.

II. Differentiæ, quæ pro causarum natura diversa inter se discrepant, specia-liorem hic explanationem postulant.

1. Omnis sanguinis fluxus immodicus, quem vel *menses nimios*, vel *uteri hæmorrhagiam* appellant a continui plerumque solutione, vel a simplici ad eam dispositione dependent, quod *priorem differentiam* constituit.

2. Fluxus nimius, quem gignit quedam continui labes ab uteri ulceribus scissuris, aut varicibus oriri solet, & *secundam differentiam* præbet.

3. Omne immodicum cruoris effluvium, continui læsione expers, gignitur ab appendicum, aut vermicularium vitio, vel copia, aut velocitate sanguinis aucta, atque *tertiam suppeditat differentiam*.

4. Vitia lacteorum vasorum, quæ hujusmodi morbos producere valent sunt naturalis angustia, vel accidentalis obstructio excreteriorum, qui parum vel nihil lacticinosi humoris effundunt, ideoque turgida plerumque diu retinet vermicularia.

5. Venosarum appendicum vitia quæ similes affectus gignunt, naturali, aut acquisitæ earum laxitudini tribuuntur, quare referantur facile, ac diutius in eo remanent statu.

6. Sanguinis vitia, quæ easdem calamitates pariunt a vera vel spuria vasorum plenitudine, aut aucta sanguinis velocitate derivantur, quapropter in uteri appendices, earumque orificia magno nisu cruor continenter irrumpit.

III. Tertium differentiarum genus, quod a continui solutionis positu dependet, vel locali dispositione, neque multiplex, neque magni faciendum videtur.

1. Hujusmodi affectio plerumque uteri cavitatem raro vaginam deturpat, quod patet sursum insipientibus *Cap. I.* ubi catameniorum semitas exposuimus.

2. Specialiter vero fundus, latera, aut orificium uteri afficiuntur, quare patientes de renum, umbilici, lumborum, foemorum, inguinum, aut pubis dolore sæpissime conqueruntur.

3. Si vero vaginam id foedet supra, vel infra; anterius, vel posterius locari poterit, ideoque dolorosæ impressiones, modo vesicam, modo rectum vexabunt.

§. V.

Symptomata.

1. **I**N omni morbofo sanguinis effluvio ægræ debiles plus, minusve, atque laxæ reperiuntur pro jacturæ ubertate, aut pertinacia diversa; hujusmodi scenomena necessario eveniunt a debiliore musculorum contractione, qui exigua spirituum copia irrorantur, tum a fibrarum laxitudine, quarum vasa sanguinea cruore valde depauperata ipsas alere imparia sunt.

2. Cordis & arteriarum pulsi parvi, languidi, atque segniores reperiuntur, tum sanguinis, cum spirituum defectu; *sanguinis inopia*, dum exigua copia, segniterque ad cor affluit, paucasve lentas contractiones excitare potis est; *spirituum paupertate*, qui in ratione inopis sanguinis imminuuntur, atque labefactantur ita, ut debilissimas desidesque cordis contractiones tantum gignere valeant.

3. Facies pallet dum cruor qui viridem colorem præbet nimio fluxu dissipatus cutis exiliora vascula necdum perfecte replet, verum pallor etiam si universalis sit, vultu magis conspicuus fit, quia cutis ibi gracilior subtuspositi cruoris qualitates tum sanitatis, cum morbi statu facilius ostendit.

4. Extremitates frigescent, tum quia sanguis caloris potissima causa inopiæ ergo exigua copia illic trasducitur, cum cordis lassitudinis ergo, qui segnius ibi pro majori distantia illum impellit.

5. Ægræ statim appetitum amittunt, tantumque ciborum horror, atque depravatio intenditur, quantum morbus increscit, quod duplici de causa oriri solet. 1. Quia animales spiritus lingue, aut ventriculi nerveas fibras parum irrigando eorum instrumentorum sensum imminuunt; 2. verum quia inops sanguis qui parum salivæ, aut gastrici succi suppeditat, fermenti actionem infirmat.

6. Quantumvis incumbant ægræ, tum alimentorum selectui, cum exigue copię quibus vescuntur, incompletam tamen digestionem patrant, defectu id eveniat vel paupertate gastrici succi, vel ventriculi laxitudine, qui nihilum suis contractionibus foveant fermenti actionem.

7. Pluribus de cavis ipse citissime emaciantur, 1. si parum alantur, 2. si cibos imperfecte digerant, parumque chyli proinde absorbeant, 3. si tandem con-

continuo sint obnoxie cruoris effluvio, quod majorem nutrimenti copiam disperdat, quam alimenta restituant.

8. Obstructiones haud infrequenter imi ventris accidunt, quia humores per abdominis viscera fecernendi in his persistunt debilioris cruoris impulsus, & fibrarum elaterii causa, quæ spirituum deficientia relaxantur.

9. Tandem sensim sensimque *Cachexiam* laborare incipiunt, in quo morbo plus lymphæ atque sero quam sanguine turgent vasa, & quantum cruoris disperditur, tantum feri potus restituit, hac de causa in iis in quibus pluries venam secare interfuit ultimum depromptum sanguinem serosum magis conspicies.

10. Serosa lymphæ tunc in sanguine redundans raro pura est: plerumque enim, aut chyli imperfecti admixtione quem primæ viæ subministrant, aut humorum recrementis peccat, bilis præsertim quam abdominis viscerum hepatis potissimum obstructions in sanguine retinent, ac inde *Cachexiam* ipsa intendit.

11. Tunc egre stantes, vel sedentes pedibus aut cruribus oedemate afficiuntur, tum quia sanguis difficillime citra gravitatis leges sursum tollitur, majorem feri copiam ibi relinquens, cum quia lymphæ ipsa ibi superstes lymphatica vasa infarciens revehitur difficillime, eaque mora inflat.

12. Contra vero dum ægræ lectulo detinentur inferiores artus detumescunt horizontalis positus favore, qui cruoris, atque lymphæ circulationem promovet, vultus tamen, palpebræ, aut oculorum vicinia oedematosa fiunt, cum in iis partibus maxima habeatur solidorum laxitudo, minimumque elaterium, quod lymphæ stasim fovet.

13. Morbi pertinacia oedema augetur, atque sensim, sensimque crura, femora, renes aggrediens, anasarca producit; identidem exuberans lymphæ abdomine, aut thorace effunditur, si qua ibi obstructio sistat, quam segnis lymphæ, aut sanguinis circuitus produxerit.

14. Si stantibus, vel sedentibus ægris uteri ostium ita locatum sit, ut sanguis facile erumpat, stillabit ille statim, iisdemque proprietatibus pollens, quibus ad uterum affluxerat, fluidus nempe, ruber, calidus, atque odoris expers, qualis ex vena flueret excisa, at si uteri orificium obtegatur, aut ægræ lectulo jaceant, sanguis ibi retentus figitur, grummosque parit plus, minusve extensos, duos, aut foetidos, prout sanguis ibi moratus est.

15. Hi grummi dum ex utero prodire conantur fibras irritando sistalticas excitabunt contractiones, atque uteri orificio præsertim dolorem in exitu parient, plus minusve intensum pro ut magis hæ partes inflammatae sensibiles aut dolentes fuerint pro majori vel minori ostii artactione, vel pro diversa grummorum magnitudine aut duritie.

16. Dolor quem ægræ tunc persentiunt, animi deliquia producit sympathicæ reationis ergo, quæ partium mirifico consensu cor aggrediens motum ejusdem retardat; idem evenit cum ventriculus indigestis cibis gravetur, aut intestina flatu intumescant, præterquam quod ægræ sæpe languent si respiratio gravis ipsis superveniat, vel commoveri, aut pedibus stare conentur, nam circulatio in iis circumstantiis statim intercipitur, ideoque syncopes, seu lypothimix frequentiora sunt immodici fluxus phenomena.

17. Quandoque accidit grummosum sanguinem in exitu dolore comitari vehementiori qui convulsiones aut motus convulsivos inducit; ab utero enim reductus sanguis partes omnes laceffit, quæ cum matrice sympathicam relationem habent.

18. Dum nulla continui solutione afficitur uterus, immodicum sanguinis effluviū si semel desinat, nullum vel levem album fluorem relinquit, contrarium tamen evenit si uteri læsio magnam uteri partem occupet, aut vetustior sit.

§. V I.

Diagnosıs.

Diagnosıs quatuor Articulos complectitur, quorum; 1. Naturam; 2. Species; 3. Causas; 4. Sedem morbi ostendit, quæ omnia sedulo perpendemus oportebit.

I. Circa morbi naturam mulieres sanguinis effluvio supra vulgarem fluxum uberrimo, diutino, aut frequentiori obnoxia præsertim si ex eo lassescant, ac scænomenis plerisque corripiantur superius Articulo I. indicatis, illas ægrotare testari facile possumus, & contra naturæ leges id evenire fateri.

Puellæ tantum aut juvenes sponsæ hujusmodi profluvium cum mictu sanguineo confundere poterunt, ab eo tamen diu decipi nequeunt; facile enim est; 1. Urethram a vagina distinguere, aut ex quo eorum canalium stillet cruor; 2. Verum animadvertere intererit an citra mictum, vel inter mingendum sanguis erumpat, in primo enim casu ex utero aut vagina, in postremo casu e vesica prodiret. 3. Urinam denique observando si intimius cruenta appareat ex vesica sanguinem scaturire tuto asserere poteris, si vero sanguis urina fimbriarum modo admisceatur, illum ex utero originem ducere suadebis. 4. Tandem si dubium ullum superesset ægram se decipisse ipsam percontari, verum partem affectam examinare necesse erit.

II. Neque difficile est definire varias effluviı species, quæ ab utero procedunt. Sufficit enim detegere si fluxus aliquem periodum servet quem tunc *menfes nimios* appellabis, si vero continenter effluat ipsum *uteri hæmorrhagiam* vocabis.

In primo casu satis erit ordinem indagare mensium nimiorum, prout eos §. IV. Art. I. n. 2. indicavimus.

In altero casu si cruoris effluviū maximum sit, perduret nec ne, *uteri hæmorrhagiam* ipsum audit, *stillicidium* vero *uteri* si modicum sit, sed diutinum ac pertinax valde.

III. Difficilius vero erit nos certiores fieri de diversis specierum causis, quantumvis enim de iis solliciti erimus quarum indago ad morbi curationem maxime conducit, tamen haud infrequenter conjecturis fidere coacti erimus.

1. Nihilo secius suspicari licebit aliqua continui lésione uterum affici, 1. Si effluviū contra naturam eveniat, & legitimam hæmorrhagiam emuletur: 2. Si causam adfuisse cognoscamus eam solutionem inducere potissimam: 3. Si ægræ uteri calorem, tensionem, atque dolorem persentiant: 4. Si nunquam hujusmodi morbosus fluxus penitus intercipiatur, sed album, vel rubrum aliquod stillicidium relinquat: 5. Tandem si is acer, foetidus prodeat, ac suppurationem indicet.

2. Detecta enim continui solutione parum intererit definire ejusdem speciem cum remediorum selectui id nihil faveat, quæ omnibus solutionibus æque conveniunt, scissuræ enim ipsæ sint, varices, vel excoriationes, in ulcera tandem singulæ degenerant. Verum si cui rem intimius perscrutari libuerit innotebit.

Hujusmodi continui solutiones ulcera peperisse quando earyndem latex purulentus fluxerat, vel præcedentem inflammationem, aut abcessum non rite pertractatum, aut acrem album fluorem ægræ passæ sint, vel erodentibus irritantibus nimis injectionibus uterum lacefferunt.

Excoriationes vero vel scissuras tunc in causa esse suspicabimur cum nullum adsit purulenti effluviı indicium, quinimo aliunde innotescat vehementiores ægrotas uteri divulsionem in laborioso partu aut placentæ extractione passas fuisse.

Varices denique diruptas fluxum gignere suadendum erit, quando protinus adoriatur ipse, uberrimus valde sit, & diutinam mensium suppressionem consequatur, quam uteri tumor atque gravitas comitabantur, vel si ille ab uteri syrrho procedat, qui circulum intercipiendo venas facile varicosas reddere valuisset.

3. Contra vero conjecturari oportebit nullam continui lesionem adesse, atque morbum a sanguinis copia, aut rareficientia, vel a sola vitiata vasorum dispositione derivare, quando uterus in statu reperiatur eo directe opposito n. 2. indicato, quando videlicet 1. Contra naturam fluxus menses nimios tantum gignat: 2. Nulla causa precessa sit quæ eam solutionem parere valeret: 3. De uteri calore, tensione, aut dolore necdum egrè conquestæ sint: 4. Nullum fluxus intermissio stillicidium relinquerat: 5. Vel si ullum supererit acrimonia tamen foetore, aut pure expers videatur.

4. Cum omnis absit continui solutionis suspicio, *primam* morbi causam fateri necesse erit plenitudinem esse, aut rareficientiam sanguinis, vel ejusdem velocitatem qua circumvehitur, quod facile innotabit, 1. Pulsuum observatione, quos plenos, duos, amplos, crebros, aut celeres reperiēs: 2. Faciei inspectione, quæ vivida, coccinea, atque colorata apparebit etiam instante morbo: 3. Subito optimoque venæ sectionis effectu, quæ sollicitè instituta egritudinem facile subiget.

Altera hujus affectus causa lassitudini tribuenda videtur appendicum venosarum, quæ elaterio deficientes referantur facile, difficillime coarctantur. Hujusce causæ indicia erunt: 1. Morbi perduratio, aut pertinacia, quæ venæ sectiones eludit: 2. Ægrotantis gracilis corporis habitus, qui parem uteri ejusdemque vasorum debilitatem prænunciat: 3. Fecunditas nimia per quam pluries gestando uterus facile elaterium ammittit, præsertim si prima juventute foetus gerere inceperant; 4. Albi fluoris persistētia, quæ maxime lassescit uteri contextum.

Tandem, quæ *tertia* considerari potest morbi causa rarior est, & vitium vermicularium respicit, quorum excretoria compacta nimis, & arcta menses crebros copiosos ac diuturniores reddit, continenter appendices comprimendo; ea causa in illis tantum oriri poterit, quæ diu pallore laborarunt, quæ sero vel imperfecte menstruarunt, aut iniis, quæ vermicularia obstruta habent, vel suapte natura oblecta.

IV. Parvi faciam sedem rite morbi distinguere, aut semitam inquirere, ex qua sanguis erumpat; raro enim, ita, e vagina procedit, ut hoc perscrutari pene frustraneum videatur; at si id interesse quis crederet, facile patebit ægram explorando, ut uteri tunicas vasorumque statum cognoscamus, atque uteri orificium examinare queamus, quod patulum, dilatatumque inspiciemus, quando sanguis ex utero procedat; obiectum vero, si ille e vagina tantum perfluat.

Quo ad specialem partis affectu indaginem pertinet, uteri nempe, aut vaginæ, id ægras percontando de doloris tensionis, aut caloris tramite facile dignosci poterit, nam vaginæ aut uteri partes eas affici videbis, quæ iis fenomenis respondent.

§. VII.

Prognosis.

I. **O**mnis generice sanguinis peruterum amissio cujusve sit speciei vel a quavis causa procedat, periculosa semper, & nocua valde experitur, quia gravia symptomata inducit, depravatam nempe gustum, languorem, maciem, aut finco-

syncope &c., quæ sæpe infaustas consequutiones habent, quales sunt cachexia, hydrops, consumptio &c.

II. Cruoris jacturæ quo vetustiores, eo deteriores esse solent, non solum quia earum persistencia a pertinaciori causa ipsas oriri indicat, verum quia temporis diuturnitate humorum qualitates infirmantur valde, atque uteri vasa magnopere labefactantur.

III. Idem pronunciabimus de sanguinis jacturis, quæ anibus accidunt in fausti plerumque eventui, tum quia in iis nisi a violentiori causa a vasorum nempe laceratione procedere poterunt; cum sanguinis ergo qui necessaria fluiditate, & balsamicis molleculis orbatur, quæ concisa valeant consolidare vascula, tandem ætate amisso solidorum elaterio vasa amplius claudi fluxumque sistere imparia sunt.

IV. Hæmorrhagiis difficilior, quam mensibus nimis mederi quimus, nam illæ ab continui solutione, hæ a sola appendicum dilatatione, laxitudine, aut mollitie dependent, ut facilius, sublata causa, ad naturalem statum reducantur.

V. Menses nimii *prioris ordinis*, qui ab unica causa producuntur, facilius quam ii *secundi ordinis*, convalescunt; qui duplicem causam agnoscunt, atque isti facilius quam *postremi ordinis* menses, quos triplex causa gignit.

VI. Citius promptiusque est sanguinis jacturis mederi a copia, rarefcentia, sive aucta velocitate sanguinis orti, quam iis quæ intimum pro causa cognoscunt uteri vitium, illa enim sanguinis amissio ipsa rarefcentiam, atque velocitatem subducit, vel aliquam tantum venæ sectionem postulat, at uteri lésiones continenter rebelles experiuntur.

VII. Inter varia hujusmodi vitia, quæ uteri vasa deturpant, scissuræ nempe, erosio, & ulcera, uno verbo continui solutiones difficilior sanantur, quam eorum laxitas, distentio, atonia, aut inertia, quæ nullum comitem habent continuitatis vitium, quare illæ cruoris amissiones his deteriores sunt.

VIII. Uberiores hæmorrhagiæ simplici stillicidio periculosiores evadunt in iis enim copiose, & celerrime sanguis ammittitur plura hinc, & teterrima magis scenomena producuntur; leviori quantitate vero erumpit stillicidium quod diu absque gravi nocumento perferre valent agræ.

IX. Quandoque tamen difficilior convalescunt stillicidia, quam uberrimæ uteri hæmorrhagiæ, nam ea vetustius supponunt interius uteri vitium, quod in ulcus degeneraverat curatu difficillimum, verum hæmorrhagiæ copiam potius rarefcentiam, aut celerritatem sanguinis pro causa agnoscunt, vel saltem nuperrimas scissuras facile coalescentes.

§. VIII.

Curatio.

Hujusce morbi medela tres casus complectitur. 1. Uberrimam, atque persistentem sanguinis amissionem, quæ vel repente aggreditur, vel menses nimios emulatur: 2. Veram cruoris jacturam, sed modicam etiam si pertinacem, ac diutinam valde, stillicidium nempe, quod aliquam, vel nullam periodum servat. 3. Alterius post inceptam, aut perfectam valetudinem regressum, quem præoccupare nostrum erit. Nunc igitur breviter specialem utrorumque curationem plane explicabimus.

CASUS PRIMUS.

Uteri hæmorrhagia.

CUm præceps hic sit morbus, cito idcirco eo mederi & efficaciter necesse erit, eaque de causa quatuor subsequentes indicationes implere prudenter nostrum erit, videlicet: 1. Copiam imminuere, aut velocitatem quibus sanguis in uterum irrumpit: 2. Elaterium vasorum sustinere uteri laxati nimis vel aliquo modo labefactati: 3. Narcoticis epicraticis sumptis uteri sensibilitatem obtundere, ac ab ea natas systalticas contractiones, quæ fluxum augent: 4. Temperare tandem, atque sedare sanguinis expansionem, vel nimiam saltem ejusdem fluiditatem, aut acrimoniam corrigere, si iis de causis sanguinem peccare suspicabimur; quare

1. Ægras quiescere, atque continuo lectulo detineri jubeto; inversus itaque positus magis idoneus putatur, quia uterus tunc latior est; plures Auctores etiam commendant clunes magis, quam abdomen elevare, qua ratione fluxum imminui videtur, at cito percipiemus tantummodo uteri cavitate affluentem detineri sanguinem, ibique in gummos coagmentari, qui per vices erumpunt contractili uteri vi expulsi, cujus rei mitior effectus est affluxum augere, quam ob rem potius quam hanc amplecti methodum magis idoneum videtur ægras horizontali locari positi; qui cruoris effusionem statim finit ad uterum affluentis antequam in grummos ipse coeat; vulgares culcitæ ex lana repletæ plerumque ægris molestæ evadunt, easque calefaciunt valde, neque sanguine imbibuntur illuc putrescente, salubrior itaque erit culcitram stramineam vel si eam fastidiant ex crinibus confectam adhibere, tandem non solum oportebit, quod ægrotautes cubili detineantur, verum in eo quiescant, sileant, ac si fas erit cogitationes omnes a mente removeant; certum enim est præcipites locutionis, aut animi validas commotiones, hæmorrhagias facile reduplicare, aut revocare.

2. In hoc casu venam ex brachio secare magis idoneum remedium esse experti sumus, id enim universalem sanguinis redundantiam subducendo ad uterum etiam affluxus imminuitur, contractiones vero cordis moderando illius affluxus velocitas etiam retardatur, quare dupliciter brachii venæ sectio per patulas appendices affluentis sanguinis nisum imminuit, earumque obductionem efficaciter fovet, hujus tamen remedii usum cito instituere necesse erit, antequam vasa diu distensa suum ammittant elaterium, magis enim prodesse videbis sex venæ sectiones initio morbi sollicitè peractas, quam duodecim fero, aut post longiora intervalla institutas.

Neque sectionum numerum, neque extraturi sanguinis copiam determinare facile est, circa quod ægrotantium vires, ætatem, pulsum conditionem, atque morbi gradum respicere oportet, plerumque tamen in præcipiti sanguinis jactura, quæ maximum detrimentum minatur, fas erit quarto quoque horio venam secare, vel saltem quatuor, aut quinque intra solis curriculum venæ sectiones patrare, duodecim, aut quindecim unciarum singulas, nisi quid valde obsit; subsequentibus diebus numero, aut quantitate pauciores venæ sectiones jubere poterimus, modo fluxus non nihil compescatur; verum animadverti debemus minus ægras lædi duabus supra opus venæ sectionibus institutis, quam una, sed necessaria omissa; falso enim assidentes conqueruntur de maximo ex utraque parte tum morbi, cum medelæ causa cruoris dispendio, quo jam patientes penitus interimi pertimescunt, quare prudens tunc medicus qui satis pulsum indolem noscit, iis sedulo perpensis eorum animosæ querimonias contemnat, opportuniora interdum artis auxilia præscribendo,

Olim

Olim sane minus in hoc morbo obviæ erant venæ sectiones, iisque substituebant plerumque validas (a) brachiorum, aut superiorum partium frictiones, tum arctissima digitorum (b), brachiorum, crurum, aut genuum vincula, vel cucurbitulas (c) mammis applicitas &c., ea tamen remedia patientibus valde molesta experta sunt, parumque pro valetudine restituenda efficacia, nondum tamen penitus exoleverunt, quinimo auctoritate antiquorum celeberrimorum suffulta interdum etsi frustra adhibentur, difficulter tamen sibi suaferunt Medici & nisi temporis diuturnitate cognoverunt aut melius dicam fateri ausi sunt, hujusmodi praxim etiam veterum auctoritatibus tutam venæ sectioni non præcellere tamen, ne dicerent inutilem prorsus evadere, ingenui tandem recentiores ejusdem futilitatem testari non sunt veriti, eamque contemnere absolute suadent.

3. Suapte natura sanguinis amissio neque purgantia, multoque minus emetica postulat, valde enim timendum erit quod dejectiones, aut vomendi conatus eam non intendant, ut crebre evenire solet, nihilo secius non desunt circumstantiæ, in quibus prodest ægras purgare, aut vomitum excitare, qua methodo interdum hæmorrhagias sistimus ceteris remediis rebelles. Eas tamen distinguere haud facile est, *judicium, difficile* sane; signa itaque earundem pathognomonica ostendemus ubi *cautelae in hoc morbo magis necessarias* enunciabimus; sufficiet hic animadvertere vulgaria purgantia usuvenire, qualia sunt *Manna, Cassia, sal vegetabile, aut Rheum*; tum *Tamarindorum pulpa, aut Sennæ folliculi infusi*; emeticorum vero respectu tutiora, & utiliora erunt *hypecaquannæ grana viginti, aut viginti quinque thei poculo sumpta*; at in potioribus circumstantiis quibus hæc conveniunt remedia, nisi prius venæ sectionibus vasa sufficienter depleveris non erunt propinanda.

4. Dum cruoris volumen imminuimus, atque sanguinis extractione vasa uterî explicamus, eorum appendices constringere laxas nimis, aut concisas opus erit, qua de causa adstringentia exhibebimus apozemata, aut bolos.

Hujusmodi apozemata ex decoctionibus perfici poterunt plantarum adstringentium, *Plantaginis videlicet, Borriginis, Mille Folii, Urticæ Althææ* ceterarumque hujus sensus, quas infra *Articulo subsequenti* enumerabimus; at salubrior erit earum stirpium succos depuratos apozematum modo haurire, ad trium vel quatuor unciarum dosim, cui circiter uncia additur syrupi appropriati rosarum nempe excicatorum, baccarum myrti, coraliorum, corticis granatorum, aut consolidæ majoris.

Boli vero coagmentantur ex sanguine Draconis, Terra Japonica, Mastice, Coralis Præparatis, Succino, ovorum Testis, Alumine Rupeo, Balauftis, Cortice Granatorum, Lapide hæmatite, Croco Martis adstringente &c., quorum duo vel tria seliguntur ad decem, duodecim, vel quindecim grana syrupo quoddam appropriato remixta sumenda; usitatiores tamen boli fiunt ex alumini, ac sanguinis Draconis singulorum granis quindecim sub forma bolari pauco saccharo remixtis.

Cum quarta quaque hora ægris jus propinare mos sit, ita simili intervallo inter medio tempore apozematum, aut bolorum eorum vel utriusque simul dosis si morbus urgeat exhiberi solet, bihori vero intermedio spatio semel vel bis pthysanæ nonnihil calefactæ poculum pro vehiculo præscribite.

5. Si grave opus sit, atque lethale effluvium repente sistere, juri alter vel duo pugili addi poterunt florum *Scolymi silvestris* in taleolas divisi, vel eorum defectu drachma una ventriculi hædi, vel leporis probe loti, hujusmodi re-

Astruch de Morbis Mulierum.

G

media

(a) Galenus. I. ad Glaucon. cap. 14. (b) Galenus. Ibid. Hippocrates, II. de Morb. Mulier. in Princ. Aetius, Tetralib. IV. Sermon. 4. cap. 64. Paulus Aegineta, De Re Medica Lib. 3. cap. 64. (c) Hippocrates, Sect. 5. Aphorism. 50.

media tutissima sunt, eaque in uteri hamorrhagiis valde prodesse comper-
tum est.

6. Cum in hoc morbo obtusos dolores haud infrequenter circa uteri collum
ægræ persentiant ab eruptione, mora, aut grummis sanguinis productos, iique pa-
tientes invite commoveant, atque matricis excitent violentiores subsultus, qui
ægritudinem confirmant, atque augent, idcirco magni momenti erit narcoticis
eas impressiones temperare, qua de causa pthisanæ ebollienti addi convenient
capita aliquot papaveris albi, vel apozematibus syrupperi diacodi parum, aut bolis
tinturæ cujusdam annodynæ guttæ aliquot, modificando ita dosim eorum pro æ-
grotantium viribus, ut absque sopore quiescant.

7. Patet jam non esse tunc copiose ægras nutriendas, ne alimentorum uber-
tate cito plethoram restituamus quam vanæ sectionibus subducere conamus, ex-
hiberi tantum oportunum censeo lene nutrimentum non nihil glutinosum quod
humores demulceat paresque reddat vasa consolidare; quare ægræ solo vapido
jure alentur quarta quoque hora sumpto ex pullo aut vituli frustulis confecto,
quod si densare volueris, eum radicibus Althææ aut Consolidæ majoris in ba-
cteolas divisas ebullietur, eo pariter collineant vitulorum tali, aut pisces glutinosi
exangues vel crustacei; si vero intererit effervescentiam, aut rareficientiam san-
guinis moderare, pullorum coquendorum venter seminibus repletur, mellonis
contusis, & mundatis, vel eorum uncia culinari ola infunditur, aut juri emul-
sio superadditur, quandoque tamen seminibus radices substituuntur aliquæ, aut
folia oxalidis.

8. Ægras levi hac nutritione sustinere fas erit donec morbi vigor persistat,
quo sublato largiorem dietam indulgere poteris, & loco bovis carnis aut ver-
vici, quæ acriorem succum præbent, oryzæ, vitulinæ carni addi poterunt, aut
eorum cremor, vel lentium decoctarum coclearia aliquot, gelatina etiam inter-
dum propinari potest ex carnibus patrata &c. imposterum si convalescere inci-
pant luteum ovorum jure solutum, aut integrum si lubeat absorbeant æ-
græ, vel orizarum parum aut jusculi cum pane cocti; sero tamen in hoc
properato.

9. Morbi initio vini potum interdicto pro usu leniorem subadstringentem
pthisanam exhibendo: subsequenti Articulo enumerabimus stirpes, quæ hic usu-
veniunt, sed usitatiores sunt radices Consolidæ majoris, Poligani aut Bistortæ, ve-
rum folia Plantaginis, Millefoliorum, Urticæ, Althææ &c., ex iis tamen tum ra-
dicibus cum foliis uncia est adhibenda ut levior fiat potus, facile secernatur,
eumque patientes affatim haurire queant: crebre etiam efficax experitur levior
decoctio lentici aut levissima tinctura terræ iapponicæ.

10. Hujusmodi pthisanis præcellere videntur quæ ex corticibus aurantio-
rum immaturorum, aut radice oxalidis conficiuntur, præsertim si qua hu-
morum solutionis aut rareficientiæ suspicio adsit, quapropter in iis circumstan-
tiis interdum ita proficuae sunt ut nonnulli auctores quasi totidem specifica
ipsas commendent.

11. Sæpissime evenit ægras repente animi deliquiis aut lypothimiis corripì,
quæ sane perterrere solent, idcirco promptiora quædam auxilia ad manus ha-
bere necesse est, qualia sunt acetum simplex, compositum aut theriacale, Sal
Anglicus volatilis vel aqua Carmelitarum; iis nares fricantur, ac tempora ace-
to, aut aqua Ungarica, frigida etiam aqua facies aspergitur; at his omnibus in-
cassum adhibitis exhiberi poterunt confectiones Alkermes, aut Hiacentinæ, tum
Aqua Florum aurantium solutæ, proderit etiam coclear vini Rotæ, aut Ali-
cantis, vel parum aquæ Carmelitarum, aqua fontana remixtæ.

12. Cum haud infrequenter ea animi deliquia a grummis sanguineis proce-
dant, qui uteri orificium obtegentes, ejusdem limen premunt, vel mo-
ra san-

ra sanguinis effusionem impediunt; ideo grummosum sanguinem remove cito oportebit, sedulo tamen cavendo ne uterus, ejusdemque ostium lædatur.

Plerumque proposita methodo prudenter, diligenterque instituta sanguinis jacturam sistimus ita, ut vel convalesceretantum reliquum sit, vel cruoris stillicidium superfit, de quo articulo sequenti &c., quandoque tamen evenit si uteri vasa concisa, aut erosa sint, hemorrhagiam diu sustineri remediis usitatoribus rebellem, quam ob rem sapienti Medico efficaciora auxilia adhibere fas erit etiamsi periculosa suspicentur, ea externa plerumque sunt, fomena nempe, cataplasmata, emplastra, pessaria, tum uteri injectiones, frigida pediluvia &c., de quibus attendite.

I. Inter ea infirmiores expertæ sunt fomentationes; ipsæ ex decoctionibus fiunt radicis Bistortæ, Polygoni, Burcæ Pastoris, Plantaginis, Equiseti; Rosarum Rubrarum, Baccarum Myrthi, quæ aqua veterinariorum ebulliant, hinc ex his madefacta linteola postquam expressa fuerint abdomini, pubi apponunt, interdum spongiam ebullienti aceto madidam applicant; animadvertendum est hujusmodi remedia pene frigida esse adhibenda, ne calore potius augeamus, quam specificis remediorum viribus jacturam minuamus, eidem consulto subsequendum topicorum ergo.

II. Neque his præcellent emplastra quæ lumbis, aut umbilico tantum applicare consueverunt, ut ceteris topicis spatium relinquatur; plura hujusmodi componi possunt ex adstringentium familia deprompta, at sæpissime officinalia usveniunt, *Emplastrum pro matrice*, *Emplastrum de mastice*, *Emplastrum Comitissæ*, *Emplastrum contra rupturam* &c.

III. Cataplasmata non immerito magis commendant, applicantur ipsa pubi vel ossi sacro; ea multiplici ratione patrantur, ex foliis Urticæ combustis vel araneorum telis paucis aceto tostis, aut subero pulverato, ovi luteo, & aceto rosato remixto, ex quibus pulmentum conficitur; denique terra bolaris usvenit succo plantaginis lota & aceto subacta, vel finis asini, aut veris aceto lotus; gipsum tandem arabico gummi torefacto comixtum, ac ter quaterve ovorum albuminibus in pulvem induratum magnopere commendatur.

IV. Pessaria simili ratione ac cataplasmata confici solent, verum cum proximius morbi sedi locentur, plurimi idcirco existimantur; id tamen incommodi habent, quod in utero erumpentem sanguinem repellant, ibi in grummos inspissaturum, nisi tamen brevi hoc utatur auxilio citoque removeatur.

Haud infrequenter ipsa conflari solent i. ex succis plantarum adstringentium, Plantaginis, Millefolii, Centinodæ, Urticæ, tum pulveribus balaustrorum, Gallarum, corticum granatorum omnia albumine ovi subjigendo, donec pulvem referant, quæ velo aut multiciis obducta vagina intromittitur.

2. Ex pulveribus interdum coagmentantur accaciæ veræ, mastice, sanguinis Draconis multo succo Portulacæ aut Plantaginis solutis, ut facile imbibantur gossipii grummi qui filo appensi utero apponuntur.

3. Ex fimo sui, aut asini, Plantaginis succo aut Portulacæ imbuto & mucilagine feminum Cidoniorum, aut Tragacanthæ, rosarum aqua peracta subacto, qui sub pultis forma linteo obtectus intra vaginam mittitur, certioreque ibi effectum præstare asserunt.

V. Magni facere poteris in utero injectionum effectus magis quam pessariorum; ipsæ enim morbi sedem intimius attingunt, eadem tamen de causa caute incedendum erit ipsas levioribus componendo adstringentibus, quæ matricem minime laceffant.

Tutissime fieri possunt ex decoctionibus radicum, & foliorum adstringentium, gallarum succis expresso, inter quos magis commendantur ii Plantaginis, Urticæ, Mille folii aut Consolidæ majoris, qui modo singillatim adhibentur, modo gum-

do gummi Arabico soluti, addito quandoque sanguine Draconis, aut amylo; si auctoribus fidendum sit ceteris præcellere videntur injectiones ex succo ster-
coris asinini recentis, cujus efficacia in hoc morbo pluribus experimentis com-
probatur.

VI. In quacumque tum uteri, cum ceterarum partium cruoris amissione ozi-
crati potum veteres magnopere commendarunt quamvis, in uteri hæmorrhagiis
pro summa sensibilitate, & nervoso gracili contextu eo parcius usi sint; id ta-
men hodie pene obsolevit ac ubi præceps videatur occasio modica substitui so-
let copia spiritus salis, aut vitrioli dulcificati, vel salubrius aqua Rabelii ad
gratam aciditatem usque, pthifanis super effusa, quæ magis edulcorari possunt sy-
rupis consolidæ, aut rosarum rubrarum. Hoc sæpissime efficacissimum reme-
dium reperi.

VII. Tandem frigida pediluvia ex astringentibus etiam decoctionibus patrata
comode usuveniunt; vidimus enim capite præcedenti calida pediluvia per aor-
tam descendentem, ad vasa uterina sanguinem derivare, quod fluxum valde
auget, ex converso itaque patet gelidam aquam sanguinis cursum retardando
eiusdem affluxum ad uterum imminuere simulque hæmorrhagiam non parum
compescere.

CASUS SECUNDUS.

De modica sanguinis jactura, seu cruento stillicidio.

DUplex esse potest uteri stillicidium, alterum ex se morbum constituit, alte-
rum symptomaticum est, quod hæmorrhagiæ uteri succedit, atque sensim
remediorum usum aut fluxus continuatione imminuitur.

In utroque casu brachii venæ sectiones conveniunt prout symptomata, aut æ-
grotantium vires postulaverint, minus tamen licebit sanguinis extrahere quam in
uteri hæmorrhagia, præsertim si stillicidium symptomaticum sit, ubi agræ præ-
cedenti cruoris amissione, aut institutis venæ sectionibus maxime langueant.

Uterque casus postulat ægras epicatrice purgare alvum ciendo, aut vomitum
excitando, modo nihil obsit, in iis præsertim circumstantiis, quas inferius in-
dicabimus, ubi necessarias ad hunc morbum pertinentes cautelas enunciabimus,
tutius vero in idiopathico affectu alterutram purgandi methodum seligere oport-
tebit, cum in eo plus virium supersit minusque adsit detrimenti metus, quam in
symptomatico stillicidio, in quo nuper coalitæ appendices facile referari queunt;
si primas vias expiare opus sit, magis idonea adhiberi poterunt, & ægrotantium
viribus accomodata remedia; verum si vomitum excitare conveniat, ipecacuannha
ceteris emeticis erit anteponenda modica tamen, sed sufficienti dosi.

Postquam purgatione, atque venæ sectionibus vasa depleta, & primæ viæ ex-
piatæ fuerint causas mederi nostrum erit, quæ stillicidium induxerunt, aut con-
firmant; si ab ulcere affectus, syrrho, aut uteri cancro originem ducat, iis mor-
bis propria palliativa saltem conveniunt remedia, quædam interdum læniora ad-
stringentia ad imminuendum stillicidium magis oportuna suppeditando, quæ ex
infra propositis seligere poterunt; at si a vulgaribus causis dependeat quæ ad
tres reducuntur classes: quarum: 1. Lassitudo est seu atonia appendicum ve-
nosarum, quæ laxè occluduntur: 2. Levis erosio, atque nonnullarum nuperrima
laceratio, quæ difficillime coalescit: 3. Obstructio lacteorum vasorum, quæ con-
tinerer repleta propinquas venas comprimendo earum dilatationem confirmant,
ac cruoris amissionem intendunt, remedia singulis idonea sequenti articulo enu-
merabimus.

I. Quapropter appendicum tum laxitate cum atonia. 1. Adstringentia usu-
veniunt,

veniunt, quæ hujus partis elaterium restituere easque appendices arctare potis sint; cum hæc remediorum classis confertissima sit, ideoque magis commendata hic enunciare tantum licebit; usitata* asterisco designando, etiamsi fatemur præexcellentiā eorum plerumque a præoccupatione, aut consuetudine pendere.

A N I M A L I A.

Radices.

- * Tormentilla
- * Bistorta
- * Filipendula
- * Pimpinella
- * Fragaria
- * Pentaphyllum
- Geranium Robertianum

In decoct. a ʒ β ad ʒ j
In subst. S. p. a ʒ j ad ʒ ij

Folia

- * Poligonum
- * Plantago
- * Mille folium
- * Burfa Pastoris
- Equisetum
- Pilosella
- * Pimpinella
- * Urtica alba
- Myrtus
- Pentaphyllum
- Pervinca
- Solidago Saracenica
- Pulmonaria
- Folia tenella Querci
- Pyrola
- Nummularia
- Brunella
- Betonica

In pthisan. aut decoct. a m. i. ad ij
Eorum succus expressus, depu-
ratusque a ʒ ij. ad ʒ iiij.

Flores

- * Rosæ rubræ Italicæ
- * Balaustra
- Flores Cotoneorum

In decoct. a ʒ j. ad ʒ ij.
In subst. S. p. a ʒ j. ad ʒ ij.

Fructus

- Baccæ Cupressi
- Gallæ
- Glandes, earumque calices, aut capsulæ
- Grana Coriaria

In decoct. a ʒ j. ad ʒ ij.
In subst. a ʒ j ad ʒ ij.

Astruch de Morbis Mulierum.

G 3

Baccæ

Baccæ myrti
* Cortices granatorum

Cortices aurentiorum agrestium

Pthifana conficitur, ex quatuor aurentiorum corticibus duplici aquæ cenophoro ebullitis.

Succi

* Catechu sive terra Japponica
* Mastix
* Sanguis Draconis
Acacia vera

In subst. a ʒ j ad ʒ ij.

Ligna

Santala
* Quercus
* Lentiscus

In decoct. a ʒ β. ad ʒ j.

Balsama

* Coppay
* Canadense

* Terebinthina Veneta } Sacharo remixta a gutt. iv. ad gutt. vi.
} a ʒj. ad ʒβ. cum syrapi cocleare aut ovi luteo

A N I M A L I A.

Perlæ
Spodium
* Cornu Cervi pp.
* Testæ ovorum calcinatae
* Os sepia

In subst. S. p. a ʒ j. ad ʒ ij.

M I N E R A L I A.

* Lapis Hematitidis
* Bolus Armena
* Creta Brianconia
Terra sigillata
* Succinum Flayum
Granata
* Alumen
* Coralia †

In subst. S. p. a ʒ j. ad ʒ ij.

Præ-

† Post contentiones innumeras tandem compertum est coralia producere insecta quædam, ex polyporum genere, quæ intra eorum coricem locata flores interdum referunt, quare Marsilius, & alii decepti sunt ipsa falso inter plantas enumerando. Recentiorum sententia non solum veritate, & polyporum existentia est suffulta, verum Sale ipso Alcalino V. lili, quod Coralia recenter captata analysi suppeditant, odore urinoso piscibus putrescentibus proprio, quem ipsa redolent dum aqua putrescunt, satis ostenditur animalis naturæ. Nos tamen hic consuetudini consulentes inter mineralia coralia recensuimus.

Preparationes Galenicæ.

* Aqua Plantaginis	}	ab ℥ j. ad ℥ ij. vel iij.
* - - - Bursæ Pastoris		
* - - - Mille Folii		
* - - - Rosarum		
- - - Equiseti		
* - - - Poligoni		
- - - Foliorum tenerrimorum querci - - - Ranarum		

Syrupi

* Syrupi Rosarum excicatarum	}	ab ℥ j. ad ℥ j. β.
* Baccarum Juniperi		
* Urticæ emortuæ		
* Mille folii		
* Plantaginis		
* Cidoniorum		
* Coraliorum		

Trochisci

* Succini flavi	}	a ℥ β. ad ℥ j.
Gordoni		
Terræ Japponicæ		

Preparationes Chymicæ

* Crocus Martis adstringens	}	a ℥ β. ad ℥ j.
* Tinctura Coraliorum		
* Rosarum rubrarum	}	a ℥ j. ad ℥ ij.
* Terræ Japponicæ		
* Aqua Rabelli	}	guttæ aliquot ad gratam aciditatem.

Possumus ex multiplici plantarum vel aromatorum serie ad libitum plura seligere, & idonea dosi pthyfanas, depuratos succos, apozemata, jura, julapia, potiones &c., vel bolos, oppiata, rotulas &c., conficere secundum leges *Cap. IV.* enunciatas: frequenter enim convenit remediorum formam innovare ut facilius ægrotantium gustui ipsa aptentur.

II. In appendicum venosarum erosione edulcorantia, & aglutinantia remedia opportuniora sunt, quæ nonnihil etiam adstringentia & vulneraria sint. Subsequens classis hujusmodi continet medicamenta, concinno ordine digesta, inter quæ asteriscus * usitiora designat.

V E G E T A B I L I A.

Radices

- * Symphitum majus
- * Nymphæa
- * Althæa
- * Oxalidis
- * Fragaria

In decoct. ab ʒ j. ad ʒ j ʒ.

Folia

- * Verbascum
- * Hypericum
- * Gnaphalium montanum
- * Alchimilla
- * Sanicula
- * Bugola
- * Lactuca
- * Portulaca
- * Caryophyllata
- Geranium Sanguineum
- Scabiosa

In decoct. a m. j. ad m. j. ʒ.

Semina

- * Semina frigida
- * Lactucæ
- Portulacæ

In emuls. singulorum a ʒ ij ad ʒvj
in decoct. duplum.

Succi

- * Tragacantha
- Gummi Arabicum
- * Ladanum
- * Myrrha

ad gr. x. aut xii.

Ligna

- * Lentiscus

In decoct. ad ʒ ʒ. pro singulo cœnophoro.

A N I M A L I A.

- * Spodium raspatum
- * Cornu Cervi rasp.

In decoct. a ʒj ad ʒij pro singulo cœnophoro

In subst. a ʒj ad ʒij.

Syrupi

* *Consolidę majoris*
Granatorum
Oxalidis
Limoni
Omphacii
Ribefiorum

} ab 3 j ad 3 ij.

Ex super allatis substantiis ut nuper demonstravimus sub diversa forma varia medicamenta componi possunt, decoctiones nempe, oppiata &c., animadvertendum tamen erit agglutinantibus, & vulnerariis in cassum adhibitis adstringentia addi debere ex prima remediorum classe desumpta.

III. In postremo casu ubi a chlorosi superstitem aliquam suspicamur uteri obstructionem, quę vasa lactea adhuc infarciat ac proinde sanguinis circulum intercipiat, mitiora apperientia usuveniunt Cap. VIII. indicata, ubi de chlorosi differuimus; modica tamen dosi, & adstringentibus copulata, alias augeri poterit potius quam imminui cruoris effusio.

IV. Non desunt interdum signa quę varia causarum connubia in hoc morbo indicant, erosionem videlicet & laxitudinem simul, obstructionem atque erosionem, laxitudinem & obstructionem, at quod valde deterius est erosionem una, laxitudinem ac uteri obstructionem ostendunt, in singulis his casibus enim remedia pariter copulare necesse est, quę compositis causis mederi efficaciter valeant.

V. In omnibus nuper propositis circumstantiis. 1. Topica auxilia præcedenti articulo enunciata possunt adhiberi, fomenta nempe, emplastra, cataplasmata &c. quinimo minus timoris superest calorem ex his utero communicatum stillicidium augere, copiam ac velocitatem augendo affluentis sanguinis.

2. Præter ea alterum reliquum est remedium, quod adhuc indicare prætermisimus, in hæmorrhagiis tamen caute adhibendum cum facile uterus calefaciat, verum in simplici stillicidio utilissimum evadit.

Hujusmodi sunt suffumigia, quę diversa ratione patrari possunt; simpliciora fiunt ex aceto candenti laminę super affuso; magis composita parantur ex rosarum rubrarum corollis, Balaustris, Baccis Myrti, Mastice, Karabe, Ladano &c. omnia subtiliter terrendo, & gummi tragacantha subjigendo, inde in aqua rosarum, aut plantaginis soluta trochisci efformantur, quę laminę ignitę superimponuntur. Quidam (a) Auctores inter specifica remedia ranas umbroso loco excicatas laudant, aut ungulas muli in bracteolas concisas eodem rationi igni, aut ferro candenti superimpositas.

Recipiuntur plerumque hujusmodi suffumigia per fellam familiaricam, ac cum fumus difficillime ita ad uterum pertingat, commodiustubus additur, oportebit tamen fellam elevare, ac ignem a tubo aliquantisper removeere ne tactu caleseat nimis, & uterum, aut vaginam lædat.

3. Cum uteri stillicidium hæmorrhogia minus periculosum evadat minusque urgeat, etiamsi diu persistat, ideoque largiori victui erit indulgendum, quare non solum gelatinas permiseris cornu Cervi aut carniū, verum juscula, oryzarum cremorem, fercula, ova forbilia, aut jure soluta in prandio, carniū tantummodo

(a) Mi hael Johannes Paschalius. *Methodi curandi Lib. I. Cap. 55.* q i asserit hac methodo vetustiore hæmorrhagiā curasse.

tummodo usum interdiceris, his interdum substituendo pisces assatos vel aqua parum excoctos, ægræ interim procul vino pthisanæ usu persistent sero levem narcoticum hauriendo, si difficillime somnum capiant.

4. Etiamvis frustraneum videatur ægris continuam quietem commendare, nihilo fecius violentiora exercitia ipsis interdicare fas erit, in quo sedulo incumbere convenit ut ægræ cubili, aut bisellio silentes detineantur, verum cum latitiæ æque, vel mœroris ideæ ipsis noceant, itaque ab iis erit abstinendum, connubii usum pariter intermittendo.

Ea medendi ratione, vel subjigitur ita morbus, ut lymphaticum effluvium album lacticinosum tantum, vel quasi carniū lotura cruentum fiat, quod floressus albos appellant (de quibus capite sequenti) vel penitus eradicatur, ut regressui obistere tantum reliquum sit.

C A S U S T E R T I U S.

Methodus præcavendi hæmorrhagiæ regressum.

I. **O**mnia remove fatagere debemus quæ hæmorrhagiam aut stillicidium renovare valerent, quare ægras certa vitæ methodo regere necesse erit violentiora ipsis exercitia prohibendo, quæ cito lectulo quiescant, sero expergefiant, verum ut animi pathemata compescant, neve conjugis absentia tristentur hortari debemus, unam tantum comestionem permittendo elixæ vel assatæ carnis, circa vini potum parcius indulgendum videtur, nisi parum interdum ventriculus poscat.

2. His cautelis, quæ potissimam constituunt prophylacticæ curæ partem, remedium usum addi potest, quæ meliorem in subjigendo morbo præstabunt effectum, at cum magna ex parte vel penitus sublata causa videatur, ea remedia modica dosi sat erit exhibere, mitiora etiam pariter eligendo.

3. Idcirco si inertes aut laxæ persistant venosæ appendices leviora adstringentia sub pthisanæ, aut succi depurati forma propinabis, vel bolos quibus uti poterit, usque dum catameniorum effluvium periodice absque ulla sanguinis jactura restituatur, identidem absolvitur medela sola pthisana, aut leviori decocto chinæ radicis, vel chinæ simul, & farsæ parillæ.

4. In appendicum vero erosionem demulcentium, & agglutinantium usu erit insistendum, ac præter superius indicata remedia commode usuveniunt jura pulorum, seminum frigidorum, ranarum, testudinum &c., vulnerariis quandoque remixta, qualia sunt balsamum Coppai, aut Canadense, butyro simul caiei, aut spermate ceti subacta.

5. Usum reiterare poteris mitium aperientum ubi supersint lacteorum obstructions, hujusmodi sunt decocta amara in quibus soluta fuerint grana quindecim aut viginti tartari chalybeati solubilis, tum viginti, aut vigintiquinque terræ foliatæ tartari, tandem lactis serum locum habet plantis amaris super affusum, cui similia addita sint remedia.

6. In omnibus iis circumstantiis aquæ minerales ferrugineæ utiles evadunt idonea tempestate propinata, modo parum, vel nihil purgandi vi polleant, atque modica saturentur ferri copia, cujusmodi sunt illæ de Forge, at si purgantes minus, aut ferrugineas adhibere coacti erimus, poterunt ipsæ aqua communi dilui.

7. Lactis usus in eo triplici casu opportunissimus experitur, aliqua tamen diversitate, quando enim elaterium restituere opus sit vasorum lacteorum, lac caprinum, vel nonnullorum auctoritate ovilum commendatur, modo eum ventriculus patiat; asininum valet edulcorare sanguinem, lacticinosum humorem solve-

solvere, aut vermicularia laxare; vaccinum vero magis idoneum videtur vulnerariis decoctionibus confociatum, quando nuperrimas cicatrices agglutinare interfit, vero eo simul asininum collineat.

8. Suffumigia tamen in singulis casibus conveniunt modo tepentia sint, cum unicus sit scopus appendices roborare, atque laxam uteri interiori superficiem, ideo trochisci usuveniunt ex thure, mastice, ladano, rosarum corollis, aut balauftis confecti, vel ex duobus eorum, aut tribus aqua plantaginis subactis, quæ gummi tragacanthæ auxilio in trochiscorum formam redacta utero sub fumi specie excipiuntur.

Cautelæ necessariae circa hujus morbi medelam.

I. Cum gravissima cui mederi interest indicatio sit sanguinis jacturam compescere, idcirco remedia quibus maxime fidere debemus reiterata sunt venæ sectiones, adstringentes pthisanæ cum radicibus bistortæ, symphiti corticibus granatorum, aut aurantiorum viridum &c., decoctiones terræ Japonicæ, succi depurati, plantarum adstringentium urticæ, Althææ videlicet, Plantaginis, Mille Folii &c., boli tandem ex pulveribus stipticis sanguinis Draconis præsertim, aluminis rupei ad grana singulorum quindecim quarta quoque hora sumenda.

II. Menses nimii similia postulant remedia, mitiora tamen, & aptiori dosi.

III. Cum uteri stillicidium minus periculi conjunctum habeat in remediorum usu, minus angi fas erit; imo prudentis erit interdum cunctari naturæ conatus pericrutando, ut morbi gradus rite detegere, & magis idonea remedia exhibere valeamus.

IV. Generice effluentis sanguinis copia intercipere debemus, minime tamen citius quam par est ne violentiores superveniant hysteriæ suffucationes, neve, quod deterius esset, hæmorrhagiæ præceps detensio inflammationem, aut syrhum inducat, quare suspicari licebit de crebro adstringentium usu, quibus caute Medici fidere debebunt.

V. Frigida itaque pediluvia, pessaria, aut stipticæ injectiones, nisi periculum urgeat, minus conveniunt, ac in præcipiti casu caute incedendum erit, ne promptior remediorum effectus magis quam morbus ipse ægras offendat.

VI. Idem judicare debemus de aqua Rabelliana pthisanis, aut portionibus addita, etiamsi ejusdem modica dosi numquam præcipientes effectus præstet, aut ullam perniciem inferat.

VII. Admonuimus jam calida abdomini applicare, aut vagina intromittere, nocuum esse, calore enim rationibus superius allatis sanguis ad uterum celerius transducitur; frigida tamen nimis pariter nocent, quæ sanguinem figunt, ibique morbosos infartus gignunt.

VIII. Medicorum nonnulli in uteri profluvio plumbi præparationes magnificiunt, saccharum videlicet magisterium atque liquorem Saturni, uteri injectionibus non solum, quod modica dosi minus periculosum foret, verum intus sumi jubent, quod omni contentione dignum est, ac prosequi nefas; magno itaque Boheravio in hoc parendum erit Chemia peritissimo, qui: *Saccharum Saturni ait (a), interne commendatur pro remedio salubri contra hæmoptæm, hæmorrhagiam, mictum sanguinis, gonorrhæas, fluores albos, & similia, tum etiam pro mitificante remedio contra acria sanguinis; sed numquam ausus fui facere periculum, quia felices successus haud vidi ab aliis adhibentibus natos, & quoniam novi vix dolosius haberi, tetrumque magis venenum, quam ab hoc plumbo statim*
in ce-

(a) Chimia Tom. II. Proseffu 173. in Scholio.

in cerussam redituro, ut acidum ab occurrente quacumque re inde absorbetur: hinc lethale, nec facile postea sanandum venenum corporis induitur.

IX. Quod nos magis implicat usus est emeticorum aut purgantium; hujusmodi remedia a celeberrimis praticis magnopere commendantur; quinimo mirabiles quandoque effectus præstant (a), id tamen valde incertum erit; certissimum contra esse constat eorum actione morbum augeri, neque augmenti gradum dignosci posse, haud mirum enim in iis circumstantiis *judicium difficile* esse; cum nisi longa praxi & summa artis solertia obtineatur, circa quod animadversiones nostras sequenti capite complexi sumus.

X. Evidens enim est: 1. Nedum purgantia, aut emetica in uteri hæmorrhagia convenire, nisi ventriculi aut intestinorum cruditates jacturam intendunt: 2. Has faburras confirmare non posse morbum nisi triplici ratione, aut febres excitando quæ sanguinis velocitatem accelerent; cruorem periodice inspissando quod infartum uteri augeat; intestina crispando aut velicando, quod pares in utero effectus inducit; ex iis ergo consequitur ea remedia numquam esse adhibenda nisi: 1. Cum ventriculus, aut intestina cruditatibus aut indigestis cibis graventur, quod nausæ, tormina, languor ostendunt, vel inconcinnum vitæ præcedentis regimen: 2. vel si peridioca febre corripiantur ægræ, quam comitentur periodica pulsuum concentratio, horror, tormina, aut regulares collicæ insultus.

XI. Ecce vobis limites quibus purgantia exhiberi possunt, at maxima prudentia duas alias condiciones postulat ut tutius incedamus: *Prima* est vasa venæ sectionibus deplere ut uberiores caveamus efusiones, quas ea remedia excitare possent; *altera* procul esse dolorem, aut tensionem uteri, quæ in iis casibus inflammationem parere valerent.

XII. In conditionum earum etiam confluentia numquam eundem præstare ea remedia effectum expectabimus, plerumque tamen tutius usuveniunt in simplici stillicidio, quam in uteri hæmorrhagia, cum minus pertimescenda sit hæc sanguinis irruptio; Tutius pariter in hydiopatico, quam symptomatiko stillicidio, quia minus languidæ ægræ facilius eruptionem patientur, si qua eveniet; tutius tandem in ea sanguinis jactura, quæ nullam continui solutionem comitem habet, nam integra uteri vasa magis eruptioni obsistunt quam læsa.

XIII. Cum de utilitate in hoc morbo aut pernicie purgandi certiores facti simus reliquum parum implicat; emetica enim erunt anteponenda modo cruditates adhuc ventriculum gravent, præsertim si ægræ facile vomant, purgantia vero si saburræ sint intestina ingressæ, vel quando stomacho adhuc morantibus ægræ laboriose eruptent.

XIV. Eliguntur interdum mitiora purgantia & ægrotantium viribus accommodata, epicratice plerumque primas vias expiando, emeticorum vero respectu Ipecacuannha potissima est ad viginti, xxiv, aut xxx grana, aut tartarum emeticum, vel alia antimonialia; de cetero radix illa mitius agit, solvit, atque abradit facilius ventriculi saburras, tandem tartaro emetico alvum magis ciet.

Remedia in uteri hæmorrhagis commendata, quibus utiliter, vel saltem innoxie uti potest.

Quamvis adstringentium, & agglutinantium series, quas ostendimus innumera suppeditent remedia, diversa circumstantiis omnibus opportunissima non esse præter-

(a) Hypocrates, Lib. II. de Morbis Mulier. omnesque post eum, qui de hoc morbo scripserunt.

prætermittenda censuimus nonnulla specialiter ab auctoribus commendata, quæ utilia vel tuta saltem experta sunt, hujusmodi sunt.

I. Alumen rupeum quod Adrianus (a) Helvetius, tamquam specificum remedium in omni sanguinis amissione proposuit, at in uteri hæmorrhagia potissimum paratur salis fusione argenteo præparata concleare, cui fuso subquadruplum sanguinis draconis additur, ac antequam massa indurescat, pillulæ efformantur magnitudine pisi.

Si modica appareat cruoris jactura earum pillularum drachma semis quarta quoque hora exhiberi solet cum syrupi cydoniorum cocleare, at si hæmorrhagia maxima sit, scrupuli duo aut drachma præscribi possunt pthysanam superbibendo graminis, aut infusum plantarum capillarium.

D. Helvetius hujus remedii efficaciam magnopere prædicavit, qui validos effectus vidit imo validos quandoque nimis prodire expertus est, citius enim quam par est fluxus supprimendo teterrima symptomata producit; plerumque aluminis sumpti copia ventriculum gravat, continentes anxietates inducit atque languores, alvum obstipat, ut conatus nimii necessarii sint in excernendis fecibus incassum clisteris exhibitis.

Hodie Helvetii specificum pene obsolevit, ei tamen substituitur alumen sanguine draconis, & paucis saccharo, tragacanthæ auxilio remixtum sub forma bolari, & simili intervallo bis in die exhibitum, qua methodo tutius evadit.

II. Essentia Rabelii cujus compositio in pharmacopea Parisiensi describitur ceteris stipticis præcellit, & efficacissima est cujus actionem pro libitu moderare valemus.

Vulgaris exhibendi ratio est 56. aut 57. guttas poculo, aut libris duabus aquæ symphiti radice ad gratam aciditatem superaffundendo, cui additur uncia, vel uncia cum semise syrupi granatorum, ribesiorum, aut capillarium plantarum donec gratissima citreæ potionis species conficiatur.

Ejusdem ciatus quinque vel sex unciarum quarta quaque hora propinatur in uberiori fluxu, qui si modicus sit dua vel tria pocula pro singula die sufficient, aut semel in simplici stillicidio.

Hoc remedium nec ventriculum lædit, nec intestina costipat, si essentia deesset, spiritus vitrioli dulcificatus substitui poterit, qui simili ratione sumptus eosdem præstabit effectus.

III. Succus (b) expressus ex fimo asinino aut suillo rite depuratus utilis (c) censetur quotidie quatuor drachmarum dosi ter haustus, æqualis copia remixtus syrupi coraliorum, rosarum exicatarum, aut baccarum myrti parum aqua totius citri aromatizatus; interdum diluitur cum aquæ plantaginis uncia, vel alterius similis, tum ex eodem succo syrupus conficitur, qui simili methodo sumitur, tandem ex fimo catoplasmata coagmentantur, quæ hypogastricæ regioni quandoque applicantur.

IV. Radix filipendulæ, (d) cortex radicum mori albæ (e) testa ovorum (f) calcinata, epidermis (g) pedum anseris exsiccata, utraque remedia quasi totidem specifica commendata reperies, quæ ad drachmam hauriuntur aqua vel succo plantarum adstringentium prius soluta.

V. Ovi vitelum crudum vel leviter coctum vini rubri cocleare, aut aquæ plantaginis distillatæ haustum lenissimum, tutissimumque remedium suppeditat,

(a) *Traité des Pertes de sang.*, Paris 1697. in 8. (b) Roderic, a Castro *De Morb. Mulier. Lib. I. Cap. 3.* & alii passim. (c) Johannes Schmidt. *Ephemerid. Medico-Physicar. Decur. I. ann. IX. & X. Observat. 56.* (d) Mercatus *De Morbis Mulier. Lib. I. Cap. 8.* (e) Idem, *ibid.* (f) Riverius, *Cent. IV. Observ. 86.* Raimundus Fortis, in *Consult. & Respons. Medic.* (g) Joh. Actamannus, in *Praxi Chimiatica.* Raim Fortis ubi supra.

rat, quod per plures dies ingurgitare poterunt agræ utiliter præsertim in uteri stillicidio.

VI. Gummi (*b*) arabici drachma aquæ plantaginis vel alterius stirpis simili virtute donatæ uncia soluta mane jejuno stomacho sumpta non parum prodest, hoc remedium aque ac superallatum ex glutinantium classe desumitur, & in uteri stillicidio a leviori excoriatione orto convenit.

VII. Flores (*i*) nucis decidui ombroso loco exsiccati ac in pulverem redacti eo collineant vini rubri cocleare per aliquot dies propinati.

VIII. Remedium quod tot laudibus extollit (*k*) Forestus quasi secretum mirabile, ab Helideo summo Clinico Bononiensi præceptori suo adeptum. Ipsum ita paratur.

Turtur sumitur modice pinguis, postquam plumis exutus, atque exenteratus fuerit, ipse paucio vino, ac aqua rosarum luitur, venter vero mastice ruditer contusi uncia repletur, & veru transfusus, dum inassatur, butyri loco aceto rosato irroratur, sedulo dein adeps colligitur; asato vero turture, olla recenti, & vernice intus obducta ipse imponitur, lutatoque vase in furno ad siccitatem comburitur donec pulvis fieri possit.

Forestus admonet per plures dies exhibendum esse coclear unum hujusmodi in aqua plantaginis aut quavis alia decoctione adstringenti, interdum agras circa renes, pubim atque inguina illa pinguedine fricando, at si hujusce remedii virtuti fidendum esset mastice potius quam ejusdem præparationi effectus tribuendus videtur, cum parum vel nihil a præparatione eos pendere censeam.

IX. Subsequens decoctio quam (*l*) Septalius proponit ut potissimum, atque arcanum remedium experientiis comprobatum hic locum habet.

Cortices sumuntur trium aurantiorum viridium in bracteas concisi, & cum libris septem aquæ ad tertiam partis consumptionem ebulliuntur, residuum filtratur, cujus uncia octo aut novem quotidie mane exhibentur. Septalius animadvertit ejusdem decoctionis virtutem augeri si ebullitionis fine addatur pilosellæ manipulum, aut pluries ferrum ignitum in ipsa extinguitur, potissimum itaque remedium esse testatur in morbo uteri effluvio, modo ille continui læsione non laboret.

X. Inter topica remedia (*m*) Solenandrus cataplasma quodam magnificat, quod primo morbi aggressu sanguinis jacturam sistit, vel vetustiore etiam, aut pertinacior, atque (*n*) Riverii, Etmul. (*o*) aliorumque celeberrimorum practitorum (*p*) auctoritate fulcitur, eumque tali pacto componitur.

R. Gipsi \mathfrak{s} . p. \mathfrak{ss} i.

Gummi Arabici torefacti \mathfrak{s} . p. \mathfrak{z} X.

Albuminum ovorum quassatorum n. V. aut VI.

Misce, & sub cataplasmatibus forma umbellico, & lumbis applicito, & multo gossypio obducito.

Quanti pendeat hujusmodi remedium prætereo, at cum extrinsece tantum usveniat, neque ullum detrimentum comitem habeat; imo necessarium quandoque in uteri profluvio videatur, quare ipsum enunciare non prætermisi.

XI. Demum stanni calx in mensibus nimis aut immodico fluxu intus sumpta pauca rosarum aqua remixta quandoque exhibetur mane videlicet jejuno stomacho

(*b*) Mercatus, ubi supra. (*i*) Solenander in Consil. Medicinal. (*k*) Observat. Lib. XXVIII. Observat. 10. (*l*) Animadv. & Caut. Lib. VII. Cent. 145. (*m*) In Consil. Medic. (*n*) Præseos. Medica Lib. XV. Cap. 3. (*o*) De Morb. Mulier Cap. 1. (*p*) Timæus von Guldenkhlee, Lib. IV. Cap. 9.

macho ad grana x. xv. aut xviii. per dies aliquot continuata; Cum hoc remedium ventriculum nihil laceffat ut vulgaribus adstringentibus fieri solet exiguae stipticitatis ergo, ideoque usum adstringentibus tutiorem judico, eundemque nullam induxisse noxam quidam mihi asseruit amicus.

Eodem in hysterica passione uti suadent circa quod eo lectorem mittimus ubi speciatim de hoc morbo loquuturi erimus, ac de stanneorum nostram exponemus sententiam, quæ tanti existimant.

*Remedia adversus eundem morbum pariter commendata,
futilia tamen, vel suspecta.*

Nulla magis veterum Medicorum remedia fulciuntur, quam cucurbitulæ mammis appensæ, quare Hypocrates his verbis asserit (q): *Mulieri si placet menstrua sistere, cucurbitulam quam magnam ad mammas appone*: (r) Galenus idem consentit hodie tamen prorsus obsoluerunt, me enim latet quem edant effectum cum iis nondum uti vidissem, verum suadeo ex brachio venæ sectionem cucurbitulis valde præcellere.

II. (s) Forestus, (t) Majernus, (u) Artamanus ossa humana calcinata commendant, imo secundum Majernum ad albedinem torefacta ad drachmam ipsa propinantur in vini rubri cyato diluta, aut aquæ plantaginis, verum præter horrorem quem horum remediorum habere solemus parandi methodus, potius aperientia redere ossa quam adstringentia mihi videtur.

III. Franciscus (x) Feyenus antiquus professor Monspeffulanus proponit spongiam pice liquida imbutam, ac intra ollam furno ad siccitatem tostam, ut ex ea pulvim fieri valeamus; hujus pulveris grana xii, aut xv sufficienti quantitate succi plantaginis soluta tum intus exhibet, cum injectionibus addit, eaque in uteri hæmorrhagiis utilissima evasisse testatur, at ille pulvis diureticus est, ac proinde emenagogus, nefas ergo erit pro sistendo immodico fluxu ipsum adhibere.

Idem pronunciare poterimus de colophonio, quod (y) Solenandrus laudat, succo plantaginis dilutum ad drachmæ dosim sumptum; fatetur enim ægram certo a quarta dosi valetudinem recuperaturam esse, *id fiat quater, ait, & erit curata infallenter Deo dante.*

IV. Riverius (z) ejusdem Universitatis professor meritissimus indubitanter asserit spicam nardi pulverisatam simili dosi in liquore idoneo solutam optimum præstasse remedium, apparet enim *Observat. 32. Centur. 2.* eo aliis copulato adstringentibus utiliter usum esse, plurimi sane existimo Riverii in rebus Clinicis solertiam, at sua pace valde id evenisse dubito; odor enim, atque sapor aromatici indicant remedium attenuare ac aperire, auctorum etiam plerorumque opinionem si amplectamur, qui menses ipsa evocare potius docuerunt.

V. Neque majorem laudem meretur tinctura antipthifica Etmulvi quam auctor idoneo vehiculo (aa) solutam ad guttas xii, xv. xviii. exhibebat, ejusdem parandi ratio hæc est (bb).

¶ Sac-

(q) *Self. V. Aphor. 50.* (r) *In Comment. in hunc Aphorism.* (s) *Observ. Lib. xxviii. Observ. 10.*
(t) *Praxis Medic. Lib. III.* (u) *In Praxi Chimiatica.* (x) *Practic. Medicin. Lib. iv. Cap. 58.*
(y) *In Consiliis Medicinalibus.* (z) *Praxeos Medice Lib. xv. Cap. 3.* (aa) *De Morb. Mulier. Cap. 1.* (bb) *Vid. Etmullerum in Comment. in Schrod. & in Morelli Method. Cap. de Tincturis.*

℥ Sacchari Saturnini,
 & Vitrioli Martis, ana. ℥ j.
 Spiritus vini rectificati, ℥ viij.
 Repone in loco frigido, donec rubescat spiritus.

Saccharum Saturni quod compositionem intrat satis obest ut nullus Medicorum quavis sit auctoritate suffultam illam amplecti debeat, animadversiones nostras ad trutinam advocare poteris superius pag. 107. expositas ubi Saturni usum perscrutati sumus.

VI. Minus nocuus expertus est pulvis sperniolæ crolii quem hic (dd) ostendam, de cuius virtute anceps valde hærerem

℥ Myrrhæ electæ & Thuris masculi ana. ℥ ij.
 Croci triti ℥ ss.
 Terantur, & misceantur omnia
 Pulvis ex aqua spermatis ranarum per saccum resoluta imbibatur vigesies vel trigesies, ita tamen ut semper prius exsicceetur
 Tandem adde Camphoræ ℥ iij.
 Pulvis servetur ad usum, cujus dosis ad ij. vel iij. in aqua Artemisiæ vel in vehiculo quovis idoneo.

Prima hujusce formulæ inspectione patet perperam thus & crocum seligisse emenagoga quidem pharmaca, & camphoram attenuanti facultate præditam ad uteri hæmorrhagiam sistendam, quare inutile non solum, verum perniciosum hoc remedium puto, ac si identidem detrimento expers fuit id tenuiori dosi tribuendum censeo.

VII. Medicus quidam (ee) Alemanus smaragdorum pulvim ad grana octo sumi jubebat ac in desperatis cruoris amissionibus profuisse valde testatur, idem prædicant de turchesiis dupla dosi sumptis, at tum de cupri facultate smaragdis inhærenti, cum de ossium calcinatorum efficacia quibus, (*) turchesiæ referuntur maxime dubito

VIII. Usneam (**) ad scrupulum unum intus sumptam non contemno, minus tamen commendo, quam Medicus quidam (ff) Alemanus qui pro specifico, atque potissimo habuit remedio, ut sequentem compositionem ex ea patraret.

℥ Usneæ pulverisatæ, & Eboris fossilis seu Coraliorum, cum spermate ranarum recenter collecto præparatorum, ana. ℥ j.
 Apii confecti, gr. j.
 Cum syrupo idoneo f. Pillulæ parvæ foliato auro obductæ, quæ alternis diebus cum emulsione aliqua ex seminibus quatuor frigidis cum aqua spermatis ranarum prius recenter parata, circa decubitum sumantur.
 Idem

(dd) In Basilica Chimica. (ee) Daniel Crugerus, in Ephemer. Curios. Natur. Germ. Dec. 11. Ann. 5. Observ. 24. (*) Petrus Borel Medicus de Castro, & Accademicus Parisiensis Primus ostendit, Anno 1664. Turchesias Ossa esse putrefacta, atque Calcinata, Vide Antiquites de la Ville de Castres, Liv. II. Chap. 12. Et la Description du Cabinet de l'Auteur, in ejusdem libri fine. Dominus Reamurius idem postea demonstravit. Vide les Memoires de l'Academie Royale des Sciences, année 1715. pag. 174.

(**) Arabes omnes Musci species usneas vocant: vide Matthiæ Commentaria in Dioscorid. Cap. 20. & Dodonæ. Stirp. Hist. Pempt. 3. Lib. 5. Cap. 13. at hujusmodi vocabulum nisi eam musci speciem apud nos significat circa Ossa, & Cranium Umanum adnatam dum per diuturnum tempus pluviarum, frigori aut radiis Solaribus illa exposita fuerunt, quibus valde emolita, atque terreis moleculis imbuta, necessarium huic plantæ nutritionem valent suppeditare.

(ff) Martin Bernhard. a Bernitz, in Ephemer. Curios. Natur. German. Decur. 1. Ann. 2. Observ. 55.

Idem auctor pulverem proposuit ex Usneæ, fimi æquini, & Sperniolæ anatina dosi peractum, quo flocci ex gossipio aut lana gummi simul arabici auxilio imitur, qui pessariorum modo vagina intromittuntur neque inutiliter.

IX. Quasi totidem veteris credulitatis, atque superstitionis reliquiae sunt auxilia a nonnullis medicis recentioribus etiam commendata adversus uteri profluvia. Convalescere igitur ægras defendunt si ipsæ cadaver (gg) tangant, si sub assillas (hh) aut prope scrobiculum buffonem exsiccatum gestent, si proprii effusi sanguinis chalybeo cocleari torefacti guttas (ii) aliquot cum ovi luteo hauriant, vel novem stercoreis (kk) muris pillulas auratas comedant, si indusium (ll) ferant quo diu vir sit usus, si corpus circumvestiant (mm) musco repenti terrestri Matth. seu musco terrestri clavato C. B. P. vel Helleborastro, (nn) apud Gallos pied. de grisson aut (oo) Helleboro vero; adde tandem serici (pp) coccinei Kerme præsertim infecti minutim concisi drachmam, ovi luteo hauriendam, quod postremum remedium non erit prorsus floccifaciendum; at cetera antecedentia penitus contemnenda videntur, nisi horror interdum quem ipsa excitant motum aliquantisper sanguinis imminuerent, atque ita paullulum hæmorrhagiam sistere valerent.

CAPUT X.

Fluor albus.

§. I.

Descriptio, & Differentia.

PRæter uteri hæmorrhagiam, de qua adhuc loquuti sumus, alteri fluoris generi lacteo, albo, vel lymphatico sunt mulieres obnoxiae. Hujusmodi effluvium interdum uberrimum, interdum modicum, modo continens, modo intermittens est Latine *Fluxus muliebris*, aut *Fruor albus* appellatur, Gallice *Flueurs*, vulgo *Fleurs blanches*, aut *Perte en blanc*.

Raro hic morbus virgines aggreditur, non desunt tamen exempla earum respectu quæ diu chlorosim laborarunt, plerumque tamen eo corripuntur mulieres, quæ pluries pepererunt, quæ laboriosos partus passæ sunt, aut abortum, demum ætate consistentes, quæque infirmam valetudinem gerunt, aut inconcinnum vitæ regimen ducunt.

Hujusmodi ægritudo modo mensium suppressionem, modo non comitem habet, verum in utroque casu modo persistit modo intermittit albus fluor.

Hic qui citra suppressionem intermittens evadit aliquot dies plerumque catameniorum eruptionem præcedit, eaque instanti augetur, ac proficiente sanguine perdurat etiamsi tunc distingui nequeat, patet denuo fluxu cruento desinente in diem imminui post decem, aut decem & octo dies penitus abire, utrum citius aut serius pro subjectorum diversitate simili ratione revertere.

Astruch de Morbis Mulierum.

H

Con-

(gg) Vitus Riedlinus, *Lin. Medic. Ann. 5. Febr. Observ. 20.* (hh) Daniel Crugerus, *ubi supra.* Ephem. Curios. Natur. German. Decurs. Ann. VI. & VII. in Append. Tit. 2. Fascic. 2. Medic. Cn. ffelianorum
(ii) Joh. Hartman. *In Praxi Chymiatrica.* (kk) Raimundus Joh. Fortis, *in Consult. & Resp. Medicis.* (ll) Ettmuller, *de Morbis Mulier. Cap. 1.* Johannes-Fredericus Helvetius, *in Diribito-Medico*, pag. 117. Hic credulus valde sibi suadebat penitus menses intercipi ut necdum revertant: Sed metuendum, ait, ne exinde in tantum supprimantur menses, ut nunquam amplius in posterum fluant.
(mm) Martin. Bernhard. a Benitz. *Ephem. Curios. Natur. Germ. Decur. I. Ann. 2. Obs. 52.*
(nn) Renealmus. *Observ. 21.* (oo) Johann. Harthaman, *in Praxi Chymiatrica.* Ettmuller. *de Morbo Mulierum*, Cap. 1. (pp) Ephem. Curios. Germ. Decur. III. Ann. 1. & x. Observ. 235.

Continens vero albus fluor eadem methodo prope menstrua increfcit, iis definentibus imminuitur donec vulgarem gradum recuperet; numquam tamen penitus deficit quinimo fimili ordine intenditur.

Quando ille intermittens eft cum menfium fuppreffione, catameniorum periodum plerumque æmulatur, quorum vices gerere videtur, perduratio etiam a menfium haud abfimilis eft etiamfi nonnihil diuturnior.

Tandem in menfium fuppreffione continens hujusmodi fluor varietatibus valde obnoxius eft, modo aggreffu aut perduratione menfibus refpondet, modo nullum periodum fervat quod interdum obfervatur in intermittente albo fluore quem fuppreffio menfium comitatur.

Hæc totidem funt albi floris fpecies, aliæ cum menftruorum fuppreffione; aliæ ipfa expertes; continentes aliæ; aliæ intermittentes; quædam periodice intermittunt; nonnullæ intermittendo nullum periodum confervant; at aliæ fupersunt differentiæ, quæ a natura, colore, atque proprietatibus fluentis laticis defumuntur.

1. *Ab humoris natura*; nam ipfe modo ferosus, purus, lymphaticus eft, modo albus, fpiffus, lacticinofus apparet, quam ob rem alter lymphaticus, lacticinofus alter fluor vocari foleat. Postrema hujusmodi fpecies tres alias completitur, quæ gradu inter fe differunt; prior humorem præbet lac colore atque opacitate referentem, altera feri fpeciem oftendit, humorem nempe dilutum magis, album minus, magisque translucidum, tertia tandem laticem præftat diaphanum fane, fed mucilagineum magis, atque denfum ab aqua furfuris haud abfimile.

2. *Ab humoris profilientis colore*; qui varias conftituit floris fpecies prout fluor albus erit, fufcus, cinereus, flavus, viridis, aut quafi carniū lotura rubefcens.

3. *Ab humoris qualitate*; quæ tres fpecies gignit, quæ odore & acrimonia experta eft, quæ acris & corrodens experitur, quæ male olet.

§. I I.

Cauſæ.

HUjusce humoris diverſitates quas adhuc recenſuimus ſufficiunt ut duplicem ſpeciem albi floris inſtituamus, quarum una fluorem lacticinofum præbet; altera prorsus lymphaticum. In priori caſu noſtrum erit perſcrutari ſuccum lacteum a vermicularibus ſecretum, in altero caſu puram lympham qualis per lymphatica uteri vaſa circumvehitur, quare facile erit judicare: 1. Flores albos lacticinofos ab eo procedere quod lacteus uteri liquor antequam in vermicularibus colligatur pro eruptione faciendâ continenter ſtillet; 2. Lymphaticos vero fluores gignere liquidiorē lympham, quæ a propriis vaſis profiliens in utero cadit, forasque erumpit, ſunt procul hæc diſtinctæ ægritudines, quas sæpe Medici confundunt, etiamſi ſejunctim eas pertractare conveniat.

Cauſæ floris albi lacticinofi.

Lacticinofum fluidum, quod in utero vermicularia ſecernunt, atque ibi menſis ſpatio congeſtum catamenia fovere debet iis fluentibus ſolummodo ſtillando ut periodicus fiat menſium curſus, quem *Capite I.* explicavimus, nequit ipſum guttatim effluere, ac proinde album inducere fluorem niſi: 1. Uberratis ergo vaſa eo repleta referari cogat: 2. Nimia fluiditatis ergo per appendicum orificia etiamſi rite firmata ipſum effugiat: 3. Vaſa vel nimis laxa ſint, vel facile paten-

patentia ut minima vi eorum ostia dilatare valeat, speciatim igitur has diversas causas perscrutabimur.

I. Succus lacteus qui pro chyli exuberantia in vermicularibus abundat, parietes vasorum premit atque aperiri cogit in iis præsertim mulieribus,

1. Quæ uberius edunt, cibisque vescuntur valde nutrientibus, qui multum chylum suppeditant

2. Quæ parum se exercent vitamque desidem gerunt, aut sedentariam parumque chyli ammittunt.

3. Quæ in puerperio lac fugarunt, vel cito nimis foetum alere desisterunt, ex quo chylus ad mammas evehi assuetus ad uterum transit.

In albo fluore ab hoc *primo* causarum ordine procedenti humor erumpens albus, spissus, lacteus prorsus apparet, nam mutato loco verissimum lac est redundans.

II. Succus lacteus, qui pro nimia fluiditate per extremitates etiam si arctas vasorum effugit, feri tenuitatem pro causa agnoscit, inque iis reperitur.

1. Quæ phlegmatico ac pituitoso temperamento donantur aut aquam continuo potant.

2. Quæ sanguinem habent a lenta febre, aut alia morboſa causa solutum.

3. Quæ longo remediorum aperientium usu humores nimis attenuarunt.

In hoc *secundo* casu fluor clarus, mucilaginosus extat ab aqua nondissimilis, multæ ferositatis ergo qua diluitur.

III. Orificia lateorum vasorum seu vermicularium vel nimis, vel facile patent, idcirco contentum humorem cito effundunt in iis,

1. Quæ suapte natura debiles, & graciles sunt, in quibus vasa omnia, uteri præsertim, conformationis ergo laxa, tenuia, aut patula nimis sunt ut facile referari queant.

2. Quæ vermicularia eorumque orificia emollita nimis habent ab ipso succo lacteo multiplici de causa valde seroso.

3. Quæ intima uteri tunica quæ ea orificia obtegit donantur laxa nimis ob frequentes laboriosos vel immaturos partus debilitata.

4. Quæ uterum libidinoso tactu, aut pellicatu sunt nimis laceſcitæ, ut crebre vermicularia exprimendo ipsa tandem, eorumque orificia penitus elaterio orbentur.

In hoc *postremo* casu fluor plerumque medium locum tenet inter mucilaginosum, & lacteum effluvium, ex una parte lacticinoſo minus densus, albus, atque lateus apparet; spissior tamen mucilagineo, albidior, aut magis lacticinoſus, æmulatur enim multa aqua lac dilutum aut serum imperfecte depuratum.

Uſque adhuc de simplici lacticinoſo fluxu diſſeruimus qui ab una triplici causa dependet, a copia nempe feri illius a tenuitate, tum ab inertia vermicularium, *primamque* ita floris albi *classem* in hac specie constituimus.

At facile innotebit dari poſſe fluores qui duas simul earum causarum copiam videlicet, & tenuitatem; tenuitatem, atque inertiam; inertiam tandem, atque succi ubertatem pro causa recognoscant, & *secundam* in hac specie constituemus albi floris *classem*.

Accidit tamen copulari interdum tres eas causas, copiam nempe, tenuitatem atque inertiam, at ecce vobis palam *tertiam* huiusmodi floris *classem*.

Frustra putarem in albo fluore diversa causarum connubia determinare quæ fluores producere valerent ex secunda & postrema simul classe compositos, satis erit prioris causas rite indagare, iisque affines, ut speciales ortas comparationes facile detegamus.

Causæ fluoris albi lymphatici.

Lympha quæ per vasa lymphatica interna uteri facie reptantia circumagitur nequit in utero effundi, ac proinde lymphaticum fluorem parere nisi duplici sequenti de causa: 1. Quando in iis vasis detenta ibi œdematis speciem gignat donec trans uteri tunicas sibi pandat viam: 2. vel cum aliqua ex parte sint propria labefactata vasa ut lymphæ exitum facile finant; id evenit dum uterus aliqua continui solutione læditur, & ambas nunc causas singillatim examinabimus.

I. Lympha in vasis retenta per tunicarum hiatus exitum petit, atque in uterum irrumpit, si

1. Maximus habeatur uteri descensus qui producendo, implicando, aut lacefendo tunicas vasa comprimat lymphatica, ut inde lymphæ circuitus interceptiatur.

2. Si obstructions tubercula, syrrhi aut carcinomata in uteri substantia exoriantur, quæ circulum lymphæ impediunt.

3. Si tumores adsint, infartus, aut durities, quæ glandulas lymphaticas obstruant ubi lymphatica vasa confluunt ab utero redeuntia, hujusmodi sunt glandulæ omnes lymphaticæ, hypogastri præsertim, quæ ad Iliacarum bifurcationem locantur, quod refluxum inhibet lymphæ, eamque in propriis vasis coarcevari cogit.

Ea obstacula a sanguinis spissitudine, atque lymphæ oriri possunt vulgari de causa producta, vel crebrius a morbo vario variolarum, scorbuti, strumarum, aut carcinomatis fomite; eademque de causa plerumque hujusmodi fluoris species illas ægritudines comitatur, vetustiones præsertim.

II. Vasa uteri labefactantur eorumque scissuræ, lymphæ jacturæ occasionem præbent, quando

1. Vasa illa lymphatica moranti lymphæ turgida nimis sponte sibi aliquam sternit viam, quod plerumque diuturnioris, aut uberius plethoræ consequens est.

2. Quando interna uteri tunica excoriationibus aut scissuris læditur ut lymphæ erumpenti semitam aperiat; id tamen citra lymphaticorum labem evenire potest.

Causæ continui solutionis eorum lymphaticorum vasorum eadem sunt, quæ sanguinea vascula erodunt, de quibus fusius capite præcedenti differuimus, vel saltem gradu differunt, cum major vis in corrodingis requiratur sanguineis vasis, quam lymphaticis.

Quod superius de diverso classium lactei cruoris connubio loquuti sumus, idem hic intelligi debet lymphatici fluoris respectu: nam

1. Hujusmodi fluores simplices esse possunt ab unica causa procedentes, lymphæ videlicet stillicidio, aut vasorum labe

2. Vel componi possunt ex duabus simul illarum causarum quod haud infrequenter earum affinitatis ergo accidere solet.

Tandem pro coronide addam sæpe evenire, quod tamen difficillime decerni potest, lacticinosum fluorem lymphatico copulari, quorum conubium fluorem gignit partim lymphaticum, partim lacticinosum, seu melius dicam lacticinonoso-lymphaticum.

§. III.

Explicatio differentiarum albi fluoris.

P*rima differentia*. Fluor albus vel aliquam vel nullam mensium suppressio-
nem comitem habet.

1. In albo fluore tunc menses sistunt, quando ille lactiginosus sit uberrimus, & secundi vel tertii ordinis cognatus; exinaniantur enim vermicularia antequam propinquas venas comprimi valeant, ut sanguis exprimatur qui catamenia producit; suppressio vero in lymphatico fluxu evenit, quando diuturnior sit, abundans, atque egras lace scat, ut inanitionis statum inducat directe oppositum plenitudini ad menstrua cienda necessariae, denique in utroque casu suppressio numquam completa fit, nisi per varios prius diminutionis gradus transacta fuerit.

2. Absit mensium suppressio quando fluor huiusmodi prioris ordinis tantum & lactiginosus sit, vel recens lymphaticus, in primo casu enim vermicularia nisi supervacaneum humorem effundunt multum in iis reliquum ad menses evocandos sufficiens, in secundo vero casu nondum languent egrè ut impares evadant menstrua parere, morbi tamen pertinacia interdum post successivam diminutionem aberrant tandem catamenia.

Secunda differentia. Fluor albus vel continens, vel intermittens est.

1. Ille secundi vel tertii ordinis lactiginosus plerumque continens est, praesertim in tenuitate humoris, aut laxitudine orificiorum vermicularium, quae ipsum continent, lymphaticus pariter persistit positus vasorum labe, aut scissura.

2. Fluor contra prioris ordinis lacteus semper intermittens experitur quia vasa exuberantem tantum humorem effundunt, verum huiusmodi secundi etiam vel tertii ordinis intermittens apparet, quando modicè humorum tenuitatis atque vasorum laxitudinis ergo nequeat lactiginosus succus nisi a magna redundantia sibi pandere viam, quod per vices accidit; patet enim intermittentes flores continentes fieri posse, & contra.

Tertia differentia. Albi fluoris continuum effluvium, aut variabile est, & incremento obnoxium, aut unum persistit.

1. Quotiescumque penitus lacteo humore non exinaniantur vermicularia, constans ille album effluvium augeri valebit, reliquum vero novam congeriem laticis inducet, qui per intervalla profiliet; lymphaticus pariter fluxus variat, imminuitur enim dum alio erumpit lympa, augetur dum regiminis vitio, aut exercitatione nimia omnis ad uterum transducitur.

2. Flores albi lactei & continentes procul augmento aequè profluunt, si quantum laticis ad uterum affluit, totidem erumpat vasis prorsus exhaustis: lymphatici denique uniformes sunt cum nulla adsit vitæ regiminis exercitii, evacuationum aut sex rerum non naturalium perversio.

Quarta differentia. Fluoris albi utriusque incrementum modo periodum servat, modo nullam.

1. Huiusmodi periodicum augmentum ostenditur quando lacteus sit fluor, qui ex successiva fiat lactiginosi humoris congerie ut menstruorum leges emuletur.

2. Illud vero incrementum a periodo aberrat in lymphatico fluxu si accidentales tantum causas recognoscat; quinimo in lactiginoso aberrabit quando huiusmodi causæ validius agant.

Quinta differentia. Intermittentis fluoris regressus modo periodici sunt, modo non;

1. Si periodum servant, quando lactiginosum intermittat effluvium, quoniam

regulares regressus pro causa agnoscunt lactei humoris copiam quæ vermicularia per equa intervalla referari cogit, dum singulis mensibus laticis illius innovatur congeries; ideoque tunc modo non officiant accidentales causæ lacticinosum, fluxum paucis ante catamenia diebus revertere observabis, & idoneo transfusus erumpat; imminuitur tandem sensim sensimque prout vermicularia evanescunt, imo prorsus definit usque dum nova repletionem redux fiat, nisi casu fortuito aliqua obveniat causa, quæ periodum intercipiat.

2. Irregulares prodeunt regressus dum lymphaticus erumpit fluxus quia ab accidentalibus causis originem duxit. Vid. *Differentia tertia*. Quandoque lacticinosi floris etiam obvertuntur periodi si qua extranea causa ordinem pervertat.

Sexta differentia. Hujusmodi fluores diversimode colorantur interdum albi fiunt, & lac, serum, aut aquam furfuris referunt, simplicem interdum aquam æmulantur, tandem flavi, lutei, aurei, aut citrei coloris conspiciuntur, virides interdum, fusci, vel rubicundi.

1. Albi prodeunt fluores lac, serumque æmulantes, quando lacticinosi sint, ac prioris, secundi, aut tertii ordinis, minime deturpato lacteo naturali colore.

2. Aquæ limpiditatem ostendunt si eos pura lymphæ producat.

3. Lutei apparent quando bilis admistione plus minusque densæ aut coloratæ inficiuntur, vel cruentis guttulis deturpantur, prioris scænomeni ratio factis patet, alterum explicaturus exemplum propono, flavi in peripneumonia scæreatus, cujus croceus color a sanguine potius intimius remixto quam a bile procedit.

4. Virides prodeunt si ipsis addita bilis, poracea valde sit, vel illi pure faturentur, quod pravum colorem suppeditent.

5. Loturam carni æmulantur, vel roseum colorem pro diversa admisti sanguinis copia ejusque intima copula.

Septima differentia. Identidem albi fluores inodori sunt & acrimonia expertes, modo acerrimi, corrodescentes, aut male olentes.

1. Acrimonia omni orbantur, modo lacteus succus, aut lymphæ neque bilem, neve pus conjunctum habeat, illumque laticem purus sanguis gignat in utero non moraturum.

2. Contra vero acres rodentes sunt in triplici opposito casu; quando humores deturpantur bile, aut pure, vel a salino acrimonioso sanguine procedant, vel diu in utero morantes ibi facile rarefiant, aut putrescant.

3. In similibus tandem circumstantiis scitum plerumque redolent.

§. IV.

Symptomata.

I. **F**loris albi effluvium sanguinem depauperat, eoque magis quo uberius diuturnum, atque vetustius erit, ex quibus macies, pallor, in ratione magnitudinis, aut pertinaciæ morbi nascuntur.

II. Prout sanguis imminuitur, fibræ laxantur musculares exinanitis, quæ per eas reptant vasculis, tum animalibus spiritibus deficientibus, quos minori copia tunc cerebrum fecernit, quod vires prostat atque appetitum lædit.

III. Imminuto cruoris volumine minorem suppeditant salivam parotides atque ceteræ faucium glandulæ, ejusque labefactatur actio; exigua vero ad papillas nerveas affluentium spirituum copia illas inertes reddit sensumque delit, quare inapetentia, atque gustus depravatio erunt superventura.

IV. Iisdem de causis gastrico succo deficiente ventriculi fibræ robur amittent

tent spirituum inopiæ ergo, quare alimentorum subactio segnis, atque incompleta fiet.

V. Albus fluor electam demit chyli, atque lymphæ partem quæ sanguinem refocillare deberet, ideoque ab inopi, atque seroso chylo *cachexiam* facile procedet.

VI. Eadem causæ quæ ceteros musculos debilitant cordis contractiones imminuunt *vid. numer. II.* Sanguis enim infirmiori cordis vi impulsus segniter ad extremitates corporis affluet, segnius etiam ad secretoria organa quæ ab extremis arteriarum originem ducunt, at hi humores ab imperfecto chylo orti cum densiores evadant in propriis receptaculis stagnare, atque magis inspissari debent, quod plerorumque viscerum infartus, tum glandularum lymphaticarum obstructions producit.

VII. Viscerum infartus, atque obstructions modo grandiores sint sanguinis cursum intercipient, glandulæ vero obstructæ lymphæ gressum impediunt; priori enim de causa lymphæ in vasis retenta uberius in lymphaticas hinc natas venas transire debet, altera de causa illuc transducta lymphæ difficillime ad sanguinem revehi poterit, utraque demum de causa serosa cruoris lymphæ pro diverso corporis positu in diversis partibus cumulabitur, artus itaque infarci-ri videbis stantibus, vel sedantibus ægris, faciem vero, oculos, palpebras iis decumbentibus.

VIII. Deleteria indoles chyli quem primæ viæ suppeditant, atque depravati humores quos obstructa viscera secernunt sanguinem sensim sensimque deturpare debent, eique tandem acrimoniæ vitium communicare, ut tandem serosa nata *cachexia acrimoniosa*, aut *muriatica* fiat.

IX. Quamobrem fluores omnes hujusmodi etiam si prius mitiorem indolem præferant acriores facti, & corrodescentes vaginam tandem, pudenda præsertim excoriabunt, atque ulceribus deturpabunt.

X. Simili ratione ii mitiores fluores cum deteriores fiant, uteri internam superficiem laceffunt, atque phlogosim inducunt plus minusve insensam, atque dolentem, uteri proinde dolor ac tensio nascuntur, tum lumbi, renes, inguina, atque pubes dolebunt pro diversitate partis affectæ.

XI. Superallata symptomata n. ix. & x. eo graviora supervenient prout acrioris, & perversæ indolis fluores erumpent, verum bilioso magis ægrotantes temperamento donatæ sint, aut incongruum ducant vitæ regimen.

XII. In his circumstantiis cruoris vitium quotidie auctum; purulenta humorum conditio, quæ uterum deturpat, & ipsum sanguinem; continentes uteri dolores; pravus chylus, quem primæ viæ præstant, lentam febrem tandem excitabunt, exarcebatibus obnoxiam modicam primum, quæ tamen in diem increfcescens morbum intendere potis erit.

XIII. Illa mechanica causa, quæ vesicam in ictu contrahit, uterum una constringit ideoque ibi affluentes lacteus, atque lymphaticus humores uno eodemque tempore cum lotio simul foras erumpere decernes, eorum miscella prius in uretra peracta, quapropter in mulieribus albo fluore correptis urinæ spissæ conspiciuntur densæ & filamentis aut flosculis purulentis foedatæ, eoque magis quo fluor uberius, lactinosus, aut purulentus fuerat.

XIV. Floribus albis obnoxia mulieres steriles plerumque evadunt; si vero concipient vel immaturos foetus edunt, vel languidos aut imbecilles pariunt; at cum nosci oporteat conditiones conceptioni, gestationi, atque embrionis nutritioni necessarias, itaque ad *Lib. III.* lectorem mittimus, ubi hæc fusius pertractabimus.

XV. Eadem de causa *Lib. II.* pervolvite, ubi de ulceribus, hydrope, atque uteri descensu loquuturi erimus, quæ a fluoribus albis nasciscuntur.

§. V.

Diagnosis.

Mulieres haud infrequenter verentur morbum fateri, ut in summo morbi progressu tantum auxilium poscant, imo quandoque plures circumstantias prætermittant, quæ melius indolem, speciem, atque causam ægritudinis ostenderent.

Idcirco haud facile certiores fieri possumus ipsas albo fluore laborare; mox postquam diu in eas inquirimus testantur, albo fluxu foedari seroso, atque uberimo citra calorem, aut urentem dolorem, eumque neque urinæ ardore comitari, neque veneris usum implicare, verum circa menses augeri trans imminui modo periodice revertere, modo non; interdum continentem variationibus quamplurimis obnoxium apparere.

Nihilo tamen minus crebre confunduntur hujusmodi fluxus cum ceteris fluoribus, qui ex eodem fonte profiliunt, etiamsi diversam naturam & causam agnoscant, hujusmodi sunt qui ex uteri ulcere, gonorrhea benigna, aut virulenta procedunt, quos distinguere necessarissimum est.

I. Nobis invicem veniunt distinguenda hujusmodi effluvia, *vel* quando albi fluores recensiores sunt, *vel* vetustiores.

In *priori* casu id est facilius; nam

1. Recentis fluxus latex nihil purulenti habet, pure tamen deturpatur, quod ulcus gignit.

2. Recens fluor, odore, & acrimonia expers est, aut parum vitatur, purulentus vero ascescit, atque scitum redolet.

3. In illo parum, vel nihil caloris, aut doloris adest, attamen calet vehementer, atque dolet uterus, in purulento fluxu.

4. Verum in albo recenti fluore febris abest, excitatur tamen plerumque dum ille pure inficitur.

5. Tandem purulentum fluxum præcedunt inflammationis accessus aut ulceris indicia, minime vero nuperrimum.

In *altero* casu fluores vetustiores eadem signa prænunciant quamvis diagnosis difficilior evadat; plerumque enim accidit in his febrem lentam, dolorem, aut calorem adesse, verum fluentem laticem foetidum, acrem atque purulentum, aut puri affinem esse, quinimo vetustiores fluores signa omnia complectuntur, quæ purulentum fluxum respiciunt, quare frustraneum videtur hunc a veteri fluxu distinguere, præsertim cum experti simus diuturniores albi fluores, & antiqui in chacheticis subjectis potissimum, etiamsi diverso gradu, & spatio purulentos tandem fieri.

Interdum distingui debent albi fluores a gonorrhea benigna, quæ tres casus complectitur, quando recens est; quando antiqua in gonorrheam degenerans virulentam, & continentem; vel tandem quando albo fluore copulatur, præcedat, aut succedat.

In *priori* casu dum recens est, ac proinde inflammationem comitem habet gonorrhea benigna, facile innotescit.

1. Albus fluor nedum calet, ipsa tamen calefcit.

2. In eo neque vagina, neque vulva inflammantur, in illa alterutra inflammatione læditur.

3. Dein albo fluore correptæ mulieres procul dolore virum cognoscunt, minime vero, quæ benigna gonorrhea vexantur.

4. In

4. In illo tandem fluore circa lumbos de dolore conqueruntur ægræ plus minusve intenso, minime tamen in gonorrhea benigna.

In *secundo* casu quando benigna syphilis in gonorrheam persistentem degenerat, haud facilis erit diagnosi, modo subsequenter signis non innotescat.

1. Tunc catameniorum eruptio persistit gonorrhea nondum decrecente, verum fluores sistunt, aut imminuuntur menstruo desinente.

2. Gonorrheam continentem præcedunt syphilidis benignæ, recentis signa pathognomica, atque inflammatio, quæ omnia absunt in albo fluxu.

3. Demum gonorrheæ effluvium modicum apparet, uberrimum tamen in albo fluore.

4. Gonorrhea tamen coitu communicatur, fluores vero albi viro innocui sunt, aut leves excoriationes tantum pariunt.

In *postremo* casu in connubio nempe benignæ syphilidis cum albo fluore, vel 1. gonorrhea albo fluori succedit, & tunc facile erit antequam superveniant unum ab altero per propria signa initio hujusce Articuli enunciata distinguere, verum gonorrhea illa designabitur urinæ ardore, calore, phlogosi, atque partis inflammatione, tum dolore in actu venereo.

2. Si denique fluor gonorrheæ succedat, quod tamen raro evenire solet, tunc perquam facillimum erit primum syphilidem nosci benignam, verum propriis pathognomonicis signis natum fluorem detegere.

III. Signa adhuc exposita sufficerent ut distingueremus album fluxum a gonorrhea benigna continenti aut virulenta, si ægrotantium historiis fidendum esset, at ægræ quandoque levioris caloris ergo syphilidem latent, interdum ea symptomata quamvis vehementiora inscitia ergo animadvertere nesciunt, vel ipsa parvi faciunt, ut sæpissime sub silentio prætereant, quæ in diem eveniunt, aut accidere observent, ne fluxus mutationibus detectis proprios errores detegantur; in iis casibus ne in maxima versetur incertitudine, in qua ignorantia, aut fraus illarum nos impellerunt, verum conspiciamus fluxus indolem de quo conqueruntur, gonorrheæ itaque, aut albo fluori ipsum referre debeamus, oportebit.

1. Fluxum humorem pendere qui plerumque parum ponderat in continenti gonorrhea, maxime in albo fluore, isque uberrimus erumpit, at fateri fas erit si modicus sit gonorrheam tutum designare, nam albi fluores interdum erumpunt qui syphilide parum uberiores sunt.

2. In hoc postremo casu ægras obstetricare oportebit, ut triplicem sedem benignæ syphilidis, ac proinde continentis gonorrheæ investigemus. 1. Prostratæ se ostendunt ex quibus virus stillat supremam versus vulvæ partem per orificia lacunarum Graffi ad latera urethræ locatæ: 2. Glandulæ vero covuperianæ se prodeunt interna vulvæ parte sitæ perineum versus, aut circa ostium vaginæ ex quibus gonorrhea circa anum, aut limen vulvæ fluit: 3. Glandulæ tandem vaginæ, quæ virum in ipso vaginæ ductu fundunt per vulvam erumpens.

In eo duplici casu si ægrotantium inspectione certiores fieri volumus syphilidem adesse materiam ex lacunis aut glandulis covuperi exire observabimus, denique ipsam superius, inferius, aut interius vagina cumulari; contra vero asserere possumus fluore albo tantum laborare mulieres quando extremitates eorum canalium minime læsæ aut pure scedate apparent.

3. Verumtamen in postremo casu difficillimum erit fluorem album a vagina syphilide distinguere cum hæc æque ac ille a vaginæ fundo profiliant, quare reliquum erit ægras expendere, aut conjuges, qui si suspicionis causam præbeant, remedia antivenerea erunt exhibenda, quæ albo fluori æque idonea sunt, vel saltem innocua: hujusmodi praxis cito veritatem ostendet, verum gonorrhea hac methodo penitus aberrabit fluor persistet, at si incomplete a morbo convalescant ægræ, gonorrheam fluore albo copulari fateberis.

IV. Nedum implicaremur si haberemus circa id quoddam pathognomonicum signum ut plures (a) Medici prædicarunt, quod syphilidem a fluore albo perbelle distingueret, si iis fidendum esset, sufficeret in ægras inquirere an fluor mensibus fluentibus persistat nec ne; in primo casu semper syphilidem adesse, in altero tantum album fluorem testantur.

Supervacaneum enim censuimus hic auctorum loca exhibere qui id pro certo habuerunt, iisque nomine suptus indicatis vobis ipsos pervolvere relinquo, verba tantum Baglivi (b) referre licebit, qui sola sui auctoritate hujusmodi iudicii certitudinem jactat, at ejusdem exemplum tyrones potius admonebit ne Auctoris effatis nimis fideant, cui in ancipiti valde casu mos erat definire.

Fluor albus uterinus, ait, gonorrhea gallica adeo similibus comitantur symptomatis, ut quisque medicorum fere semper decipiatur in illorum diagnosi, præsertim cum mulierculæ verecundia perfusæ gonorrheam per impurum scortum contractam fluoribus uterinis mentiantur; ne succedant impostero hæc incomoda dabo signum infallibile tales morbos ad invicem distinguendi. Pete a muliere an superveniente menstruo sanguinis fluxu perseveret quoque eodem tempore fluor ille albæ materiæ, si dicat quod sic significato eidem quod morbus a quo divexatur sit gonorrhea gallica, si vero durante menstruatione fluor albus evanescat, & eadem finita denuo regrediatur, procerto habeas mulierem fluore uterino laborare: cetera signa fallunt, hoc vero constans est, & mulierum dolum aperte deludit.

At Baglivi pace qui hanc sententiam strenue defendit nullum est eo magis erroneum signum, nam 1. Albi floris eruptio necdum desistit catameniis fluentibus, etiamsi nos lateat cruoris ergo quo permiscetur; 2. Idem accidere solet in syphilide, quæ ex glandulis intimioribus vaginæ prodit ut ex sanguinis admistione impossibile sit hoc inutile signum distinguere: 3. Addo tandem frustraneum esse & incertum in ea gonorrhea, quam glandulæ covuperianæ, aut prostatæ faciunt; nam menstrua tunc totum cruore vulvæ ambitum inficiunt, ut fluxum laticis illius conspici impediunt.

V. Demum quid interesset hujus morbi diagnosim perscrutari si cum Pitcarnio prorsus inutilis evaderet, supervacaneum enim ipse docuit esse syphilidem a fluore albo distinguere, cum utrumque antivenerea postulet remedia: Non opus est, (c) ait, distinguere inter fluorem muliebrem gallicum, & non gallicum, cum raro (secus ac in viris) possit fluor albus tolli, etiamsi virulentus non sit, nisi remediis sui gallicæ propriis.

Ea de causa Pitcarnius album fluorem sæpissime Mercurio dulci, Cinabari, Guviaco, & Sarfa parilla curavit, at ea methodus erronea est, & praxis nocua experitur; ratio satis confirmat pauperum usuyenire remedia antivenerea in morbo ea lue prorsus experte, quod experientia pariter fulcitur.

Diagnosis specierum. Semel detecto morbo species distinguere necesse erit, cui linteola fluxu madida valde favent, si ea sedulo inspexerimus.

I. Fluor prorsus lacticinosus erit si fluxa materies densa, ac ponderosa apparuerit, atque linteo concrescens ipsum minime penetraverit, verum ad primum, secundum, aut tertium lacticinosi humoris ordinem pertinet prout ille plus minusve albus apparebit, aut aquam furfuris referat.

Lymphaticus erit modo parum, vel nihil pendeat, serosus sit, atque eo facile linteum imbuatur.

II. Lin-

(a) Johannes Fernelius, *Patholog. Lib. vi. cap. 16.* Jo: Liebault, *De la santé, fécondité & maladies des femmes. Lib. ii. cap. 86.* Ludovicus Mercatus, *De aff. & ion. Mulier. Lib. i. cap. 15.* Rodericus a Castro, *De Morbis Mulierum. Lib. i. cap. 14.* Lazare Pè, *Maladies des Femmes, Liv. ii. cap. 36.* Jacobus Primerosius, *de Morbis Mulierum.* Francisc. Mauriceau, *Malad. des Femmes grosses. Traité Anatomique des Parties des Femmes qui servent à la génération, cap. 6.* Gualtherus Charleton, *De Causis Catameniorum & uteri Rheumatismo, cap. 8.* Petrus Fresart, *Emmolog. cap. 10.*

(b) Praxos, *Lib. ii. cap. 8. Art. 3.* (c) *Elementor. Medicin. Cap. 27.*

II. Linteola illa denique observando innotebit cito, an fluor albus, luteus, viridis, aut ruber erumpat, tum ipsa odorem atque deleteriam, vel benignam morbi indolem ostendent.

III. Ægræ vero ipsæ nos admonere poterunt quo fluxus acrimoniæ gradu poleat, si carnes excoriat vel alias lædat, aut si iis sit scœnomenis experts.

IV. Ipse tandem animadvertere valebunt si fluor intermittat, aut persistat, si intermissio periodica sit nec ne, si persistentia ejusdem variet, aut aberrationes ullam periodum fervent.

Diagnosis causarum. Hæc tertium respicit diagnosticæ articulum causasque respicit pro diversis albi floris speciebus prorsus diversas.

I. Si fluor lacteus profiliat, lac serum aut aquam furfuris referens redundantia lacticinosis humoris tantum tribuitur; hujusmodi effusio generice pro causa agnoscit copiam, ac fluiditatem humoris illius, tum vasorum laxitudinem, quæ in singulis specialibus circumstantiis variare solent, ideoque

1. Quando lacticinosis humor spissus, albus, late haud absimilis circa menses erumpit a sola ipse copia procedit, præsertim si patientes obesæ sint, multum comedant, parum se exerceant, vel lac cito nimis post altum fœtum fugaverint.

2. Si humor ille valde dilutus sit, serum referat, continenter efluat, id ubertati, atque tenuitati laticis illius tribuendum videtur, etiamsi laxitudo interdum orificiorum vermicularium id parere valeat.

3. Fluorem mucilagineum qui aquam ex furfure coctam æmulatur prope menstrua fluentem nimia gignit humoris liquiditas, vel simul vermicularium laxitas.

4. Quando postremus hujusmodi latex continens est, a nimia tantum humoris fluiditate, aut laxitudine dependet vasorum, quibus congeritur.

II. Lymphaticum albi floris effluvium profilianti lymphæ tribuitur, quæ per porros tunicarum exiit turgentium vasculorum, aut per eorum scissuras erumpit a morbi generali causa productas, quare

1. Si egrè uteri descensu laborent tuberculis, obstructionibus, syrrho vel cancro, tum glandulosa lymphæ reducis receptacula in ipsis obstructa syrrhosa, aut dura reperiantur &c., quæ omnia tamen recentissima sint, albus fluor simplici lymphæ per tunicarum hiatus madori tribuendus videtur, præsertim si parcius erumpat.

2. Contra vero modo certiores fieri possimus, hujusmodi causas, vel aliquam earum vestitiorem originem agnoscere, aut pertinaciorem suspicari licebit, vasa diu aut nimis repleta jam abrasa fuisse, ac tunc eruptionem ab effusione procedere, præsertim cum uberrima appareat.

3. Nullum superest circa vasorum læsionem dubium, verum ab humoris effusione fluorem pendere, quando aliunde cognoscamus intimam uteri tunicam distractam fuisse, erosam, aut ulcere foedatam.

III. Tandem a quacumque albi fluores causa procedant eorum color, odor, acrimonia satis internam uteri conditionem ostendunt.

1. Etenim cum humor ex lacteo, aut lymphatico genere albus, inodorus, dilutus, aut insipidus profiliat, uterum nulla tunc fateberis continui solutione lædi, vel si qua adsit nuperrimam esse, nondum pure refertam.

2. Contra luteus, viridis, aut cruentus hujusmodi humor indicat acrem etiam, & corrodentem esse, verum aliquam dari scissuram, vetustioremo, si pus, aut ulcus gignat.

3. Tandem prout magis vitatur fluens hujusmodi liquor, eo male olet, acer evadit, atque uteri ulcus profundum, pertinax, & periculosum magis creat.

§. V I.

Prognosis.

I. **G**enerice. 1. Albus fluor molestissimus morbus est, qui mulieres coitui, aut conjugis blanditiis impares reddit.

2. Periculosus experitur teterrimorum symptomatum ergo, quæ ipse parit, qualia sunt sterilitas, languor, cachexia, macies, inappetentia, obstructio, œdema, descensus demum, atque uteri ulcus.

3. Hic morbus diutinus plerumque, atque pertinax est, cui difficillime medemur, præsertim in male-affectis, ac cacheticis subjectis, quorum sanguis deturpatur, ac, modo uterus imbecillis sit erosus, aut obstructus, nisi cum vita abit.

4. Albus fluor neque incommodus, neque periculosus, aut curatu dicissimus evadit, modo copiosus nimis, aut continens non erumpat, eique facile medetur, præsertim si modicus sit, & per longa intervalla recurat.

5. Raro tandem ipse mortem infert, etiamsi continens, aut uberrimus sit, modo tamen hydropem, ethicam febrem, ulcus, syrrhum, aut uteri cancerum non inducat.

II. Specialiter. 1. Fluores lacticulosi minus infensi sunt, atque lymphaticis facilius curantur, cum ii nullum conjunctum habeant uteri vitium, ad vasorum lassitudinem tantum, cui mederi facile quit, lymphatici contra obstaculis intenduntur in utero obviis, quæ lymphæ cursum intercipiunt, quibus haud facile est auxilium ferre, aut ulceribus originem debent, quæ difficillime agglutinantur.

2. Inter lacticulosos fluxus, qui simplex est, prorsus lacteus ceteris facilius convalescit quia nullum organi vitium adest, prosequitur pseudolacteus, quem producit plerumque humoris illius tenuitas nimia, quæ tamen facile corrigi poterit, tertius mucilagineus venit ab aqua furfuris non dissimilis, qui præter nimiam fluiditatem lassitudinem supponit vasorum uteri lacteorum.

3. Qualemcumque indolem præferant albi fluores, eorum facilius curantur, qui aliquam intermissionem ostendunt, difficiliter continentes; in illis enim vel abest, vel minima est vasorum imbecillitas; non ita vero in his in quibus continenter persistit.

4. Quo enim diuturniores intermissiones erunt, & breve effluvium, eo facilius morbus aberrabit; contra vero continentes fluores, & uberrimi remediorum virtutem eludunt.

5. Lymphaticorum fluorum respectu qui ab exuberanti lymphâ nasciscuntur, per vasorum hiatus invite erumpenti, iis mitiores sunt, & citius convalescunt, quam si ab erosione eorum vasorum procedant, nam in hoc postremo casu continui solutio, etiamsi levissima, valde molesta experitur.

6. At a quavi desumantur specie lymphatici fluores, eo periculosiores evadunt, quo uberiores sunt, & incrementis obnoxii crebrioribus, & diuturnioribus; evidens enim est, tunc causas producentes, vel generaliores esse, & totum uterum respicere, vel graviores saltem si partem aliquam tantum offendant.

III. Ceteris paribus. 1. Albus fluor, acer, corrodens, foetens magis teterrimus erit, atque pertinacior, quam si ipse odore, aut acrimonia careat, ille enim proximum ulcus minatur, aut ipsum supponit.

2. Flavum hujusmodi effluvium viride, aut cruentum pertinax est, aut infensum magis, quam albicans, cum illud acrior sit magisque corrosivum.

3. Mitior erit recens quam vetus fluxus, cum in eo liceat suspicari uteri internam faciem diu scissuris lædi.

4. Hu-

4. Hujusmodi humoris jacturæ, quæ matricis dolorem comitem habent iis deteriores evadunt, quæ dolore sunt expertes, dolor enim inflammationem, ulcus, aut futurum cancerum indicat, cujus suspicio abest in uteri fluore indolente.

5. Juvenes mulieres plerumque facilius convalescunt, quam ætate consistentes, cum eæ dulciori donatæ sint humorum crassi, fibrarumque robur uteri præsertim adhuc conservent, vel facile recuperent, istæ vero acriori sanguine poleant, ut uteri laxitudo difficilius corrigi valeamus.

IV. Prorsus incurabiles esse experti sumus. 1. Veteres albos fluxus in mulieribus præsertim, quæ graciles sunt, ætate consistunt, aut cachexia cruciantur.

2. Eosque fluores, quos syrrhus, ulcus, aut cancer gignunt, aut in eorum alterutrum ipsos degenerasse cognovimus.

3. Quos doloribus uteri lancinantibus comitantur, cum ii præsens, aut proximum indicent uteri carcinoma.

4. Quos tandem lentam febrem, marasum, anasarcam, aut insanabilem hydropem parere posse vidimus.

V. In singulis iis casibus, 1. Albi floris eruptionem necdum sistere fas erit nisi prius ægras idoneis remediis præpararemus, quæ inquinamenta humorum eliminant, cruoremque demulceant, optimamque digestionem restituant.

2. Verum excepto simplici lacteo fluore, quia sola redundantia procedit, non sunt fluores ii repente cohibendi, ne partem ipsi nobiliorem invadant.

3. Iis denique mederi nefas erit etiamsi id sperare liceret, si ipsi vetustiores sint, vel male affectas, cacheticas, ætate consistentes mulieres vexent, ne in pejus incidant, at sat erit palliativa methodo incedere.

4. In ceteris laboriosis casibus eandem medendi rationem profecuturi erimus multum obtinentes, si interdum ægræ facilius morbum patiantur.

§. VII.

Curatio.

CUM duplex sit floris species altera lacticinosa, lymphatici altera, quæ duplicem ægritudinem constituit, duplicem pariter, atque diversam medelam postulabit, quam sejunctim pertractabimus, addita utriusque palliativa medendi methodo, modo eradicativa non obtineatur, vel ægrotantium vires ipsam innui renuant.

Curatio floris albi lactei.

Tres causæ lacteum fluorem faciunt, lacticinosa humoris ubertas, tenuitas nimia, aut lacteorum vasorum lassitudo.

I. Si lacteus liquor tantum copia peccet, ut propria vasa infarciat nimis, eorumque orificia citius, quam par est aperiri cogat, tunc subsequencia opportunissima erunt auxilia, &

1. Idoneum vitæ regimen præscribere, uberiores cibos, & succulentos, aut nutrientes nimis interdiceret, verum ægras admonere, ut crebre se exercent, neve diu lectulo quiescant potissimum videtur.

2. Venæ sectiones utilissimæ evadunt, utpote quæ sanguinis, ceterorumque humorum volumen imminuunt, brachium præsertim secando ut cruor ab utero revelatur.

3. Ægras purgare convenit, ut deorsum tendat exuberans chylus, atque una per lotium aut sudorem eliminentur, qui in sanguine superessent delecterii humores.

4. Eadem de causa vomitum excitare interdum fas erit, modo ægrotantium constitutio, aut ventriculi, vel pulmonis conditiones non obsint.

5. Clisteria quotidie ex decoctionibus radicis Aristolochiæ, foliorum Artemisiæ, Mercurialis, Cammamelli, Melliloti, Matricariæ &c., utilissima sunt, quibus addi poterit uncia una olei Anisorum, aut Lauri ut carminativa fiant, vel si ipsa cathartica volueris, pulpa cassiæ addi oportebit, aut tamarindorum, vel foliorum Sennæ duplex drachma.

6. Tandem si morbus persistat, diuretica, aut diaphoretica præscribi poterunt, quæ per urinam, aut sudorem exuberantem lacticinosum humorem expellant, vel saltem solventia, & aperientia usuvenient, quæ hujusmodi laticem attenuando valeat ipse uteri vermicularia transabire, atque in venas lymphaticas irrumperè, quæ ibi originem habent, vulgarem lymphæ circuitum hinc profecuturus.

II. Si lacteus humor fluidior sit ut sensim sensimque per orificia vasorum effugiat citra morbosam eorum laxitudinem potissimum erit ipsum subsequenter remediis inspissare, quare opportunissima erunt.

1. Alimenta nutrientia, incrassantia, ut furfuricula, cremor orizorum, ferculum, furfur &c. lacte amigdalorum cocta.

2. Lac asininum bis, aut semel quotidie, aut vaccinum mane, & vespere, aut pro integro alimento sumptum modo ventriculus sinat optimum censetur.

3. Pthisanarum usus, earum tamen quæ valeant sanguinis moleculas condensare, qualis est pthisana Bismalvæ, Nymphææ, aut Symphiti radicis &c. utilis evadit.

4. Verum modicus narcoticorum usus ut ægræ facile somnum capiant, quod valde conducit, ad cruorem ceterosque humores inspissandos.

5. Absorbentium, aut adstringentium usus prodest, de quibus infra *Articulo sequenti* locuturi erimus, inter eos tamen mitiora minusque stiptica seligendo.

III. Si orificia vasorum lateorum patefiant nimis, ut lacteum humorem non valeant retinere ibi affluentem, robur ipsis restituere necesse erit ea constipando, roborando, aut constringendo subsequenter auxiliis adhibitis.

Quare *primum* ut elasterium vasorum restituamus, conveniunt

1. Balnea, & hypocausta aquarum thermalium, bittuminosarum, aut sulphurearum.

2. Circa renes aquarum earum, lumbos aut os sacrum effusio, quæ plus minusve reiteratur pro diversis aquarum proprietatibus.

3. Injections ex iisdem aquis, aut suffumigia per idoneum instrumentum utero intromissa.

4. Earumdem aquarum internus usus ea dosi, atque diuturnitate præscribitur quæ qualitatibus, & effectibus magis convenire videntur.

5. Subdorifera qualia sunt viperarum decocta per decem quindecim, aut viginti dies continuata, aut pthisanæ, vel decoctiones ex guajaco, saxaphras, china radice, aut falsa-parilla confectæ per totidem & ultra tempus commode usuveniunt.

6. Diuretica, decoctiones videlicet, aut pthisanæ ex radicibus Api, Eringii, Anonidis &c., cui addi poterunt mille-pedes, Arcanum duplicatum, usque dum morbus requirat opportuna videntur.

7. Speciatim vero decoctio Afari, aut Api, quam magnopere Galenus (a) commendavit, cum Boetii uxorem diu albo fluore correptam sanaret; inter diuretica recensetur, neque inutiliter fortassis.

Ut *secundam* indicationem impleamus videlicet arctandi orificia vasorum lacteorum, vel vulneraria leviter adstringentia adhiberi poterunt, quæ sensim, sensimque ipsa constriquant, vel validiora adstringentia, quæ penitus illa arctent.

1. Vulneraria, leviter simul adstringentia sunt,

Ra-

(a) Lib. de Præcognit. ad Posthumum. cap. 8.

Radices.

Sigillum Beatæ Mariæ
Symphitum

} in pthif. vel decoct. ab ʒß ad ʒj.

Folia

Bugola
* Sanicula
* Bellis flore albo
Mentha
Salvia
* Argentina
* Alchimilla
Virga aurea
* Marubium
Calamintha
* Pulegium
Rosmarinus
Pyrola
* Sclarea vulgaris
Nummularia

} In pthifan. aut decoct. &c. a m. ʒ.
ad m. j.

Succi

* Mastix
* Ladanium
* Myrrha

} S. p. a ʒß ad ʒj. vel ʒjß.

Ligna

Lentiscus
Juniperus

} in decoct. ad ʒj.
in subst. S. p. a ʒj. ad ʒij.

Balsama

* Peruvianum siccum vel liquidum
Tolutanum
* Copaiba
* Canadense

} ad gutt. iv. ad x. cum saccharo si-
mul aut duplici syrapi cocleare.

* Terebinthina } a ʒj. ad ʒß. cum ovi luteo.

2. Adstringentia validiora sunt.

V E G E T A B I L I A.

Radices

- * Bistorta
- * Tormentilla
- * Filipendula
- Sigillum Salomonis
- Pimpinella
- Quinque Folium

} in decoct. ab ℥j. ad ℥jss.

Folia

- Plantago
- * Lamium, seu Galeopsis
- * Mille folium
- * Herniaria
- * Bursa Pastoris
- * Equisetum
- Thalictrum

} in decoct. a m.℥. ad m.ij.
succus depuratus ad ℥ij.

Flores

- * Balausta
- * Rosæ rubræ nostrates
- Bedoguar

} in decoct. ad ℥ss; In subst. S.p. ad ℥ij.

Fructus

- Glandes cum capsulis
- * Gallæ
- * Semina coriaria
- Dactila
- Capsulæ Coryllorum

} Dosis antecedentium

Succi

- * Sanguis Draconis
- * Mastix
- Acacia vera
- * Catechu

} in subst. S. p. a ℥ss. ad ℥ss.
in decoct. duplum.

Ligna, & Cortices

- Santala
- Suber combustum

} in decoct. ad ℥
in subst. S. p. a ℥ss. ad ℥j.

ANIMALIA.

* Os sepia

Testa ovorum

* Hebur pulv.

S. p. a ʒss. ad ʒss.

MINERALIA.

* Coralia præparata

* Succinum

* Terra sigillata

Osteocola

* Alumen rupeum

S. p. a ʒss. ad ʒj.

Præparationes

Syrupus Granatorum

Coraliorum

Rosarum rubrarum

Rosarum exsiccatarum

Symphiti

Urticæ

ad ʒj. vel ij.

Aque

Alkimillæ

Argentinae

Millæ folii

Urticæ mortuæ

Foliorum

Dosis antecedentium.

Eorum remediorum delectu, & congrua dosi prout ægrotantibus magis arridit pthifanæ, apozemata, jura, potiones, julapia, boli, opiata, pulveres, rotulæ, parantur ut *Lib. I. cap. iv.* docuimus.

IV. Tandem si causæ lactei fluoris duæ invicem, vel tres simul copulentur, tunc remedia singularibus speciebus idonea componi debent, ut medela morbi compositioni respondeat.

Curatio fluoris albi lymphatici.

Lymphatici fluores pro causa agnoscunt vel lymphæ per vasorum hyatus eruptionem, vel effusionem ejusdem propriis erosis, aut concisis vasculis; ex una enim parte effugit lymphæ, quia ibi morans vasa replet nimis, & illam expriment uteri descensus, ganglia, tubercula, syrrihi, atque obstructions; ex altera vero parte lymphæ effunditur excoriationum ergo, quæ internam uteri faciem deturpant, ac proinde pleraque ibi reptantia lymphatica vascula; quare albo fluori lymphatico medenti tria veniunt perpendenda; 1. Uteri descensus; 2. Obstructions, tubercula, ganglia, atque uteri syrrihus; 3. Scissuræ, excoriationes,

Astruch de Morbis Mulierum.

nes, atque erosiones, tum internæ uteri superficiei, cum lymphaticorum, quæ per eam distribuuntur.

I. Quando albi fluores lymphatici sunt uteri descensus causa, remedia conveniunt adversus hunc morbum *Lib. II. Cap. X.* indicata; interim pessarium circulare adhibetur, quod uterum sustineat, haud infrequenter enim morbi vetustate eradicatoria curatione incassum tentata ad nocuos effectus imminuendos, novosque teterrimos impediendos pessarium gestare continenter conatæ erunt.

II. Si hujusmodi morbi species ab obstructionibus, tuberculis, gangliis, aut syrrho dependeat, utiliter exhibentur diluentia, & aperientia simul, vel sejunctim prout morbi gradus, aut ægrarum conditio postulaverint; diluentia *sequenti Articulo* ostendam, ubi de palliativa medendi ratione disserturi erimus; aperientia vero, & solventia, de quibus jam *Cap. IV. & VIII.* verba fecimus, ubi de mensibus suppressis, hic usitatoria proponam, ac inter

V E G E T A B I L I A.

1. Radices

- * Rubia Tinctorum
- * Asparagus
- * Eryngium
- * Anonis
- * Bruscus

} ab ʒj. ad ʒ ij.

- * Lapathum acutum

} ab ʒβ. ad ʒj.

Folia

- * Cichorea Silvestris
- * Pimpinella
- * Cetrach
- * Agrimonia
- * Nasturcium aquaticum
- * Cherophillum

} a m.j. ad m.ij.

A N I M A L I A.

- * Mille pedes.

} num. xx. vel xxx.

Salia

- * Sal admirabile Glauberi
- * Arcanum duplicatum

} a ʒβ. ad ʒj.

Ex quibus pthisanæ, apozemata, jura patrantur, quæ congerunt proprietates, utilitatesque omnes simul diluentium, & solventium magis ad hoc delectis idoneis radicibus, foliis, aut salibus.

2. *Gummi, aut Resina*

- * Gummi Ammoniacum
- Opoponax
- * Galbanum
- Sagapenum
- Bdellium

} a gr. iv. ad x.

3. *Preparationes Martiales*

- * Crocus Martis aperiens
- * Erugo Ferri porphirifata
- * Crocus Martis aqua paratus, seu Ethiops Martis
- * Sal Martis Riverii

} a gr. xij. ad xxiv.

- * Flores seu spuma Martis } a gr. viij. ad xvj.

4. *Preparationes Mercuriales, quæ non purgant*

- * Ethiops mineralis igne paratus } a gr. xv. ad xx.
- * Cinabaris artificialis } a gr. iv. ad viij.

5. A N I M A L I A.

- Pulvis Afellorum } a ðj. ad ðij.

Ex his duabus vel tribus selectis pulveres, boli, opiata, aut pillulæ coagmen-
tantur, quæ apozematibus superius descriptis, aut decoctionibus consociari
possunt.

III. Quando fluores albi lymphatici a scissuris procedant internæ uteri faciei,
aut lymphaticorum per ea reptantium, aglutinantia statim usum habent, nutrien-
tia, farinacea, aut vulneraria, quæ partes consolident erosas, aut cicatrifent
concisas.

1. Remedia aglutinantia sunt

Radices

- * Althæa
- * Symphyti majoris
- * Nymphæa

} ad unciam

Folia

- * Verbascum
- * Portulaca
- * Lactuca
- * Borrago
- Cymbalaria

} a m. j. ad ij.

Ex illis pariter pthifanę, jura, apozemata conflantur, quibus, addi possunt cornua cervi, hebur ad uncia femis circiter dosim.

2. Nutrientia farinacea sunt

Oryza

Jusculum ex Furfuricula Hordei, aut Avennę confectum

Hordeum perlatum

Furfur, vel Furfuricula triticea

Vermiculi ex massa exculenti

Sagou †

Quibus primis curationis diebus aluntur egrę, in posterum usuveniunt jura ex piscibus, ranis, limacibus, testudinibus &c. paratis modo intersit validius sanguinem demulcere, aut incrassare,

3. Succi concreti

Ladanum

Hypocistis

Acacia

* Sanguis Draconis

} a gr. x. ad xx.

Gummi, aut Resinae

* Gummi Arabicus

* Tragacantha

Karabe

} a gr. xv. ad xxx.

ii bolos præstant, opiata, pillulas, decoctionibus jungendas &c.

Vulneraria vero hic pariter idonea descripsimus jam superius pag. 27. In sequentibus, quę recensere supervacaneum judico.

IV. Tandem cum plures, vel omnes simul lymphatici floris species copulentur, etiam remedia diversa simul jungi oportebit ut circa lactei floris medellam admonuimus.

Curatio eorundem palliativa.

Observavimus jam §. VI. Art. IV. & V. casus quos potius præterire, quam curare debemus, etiam si valetudo esset speranda; palliativa ergo medendi ratio sufficiet, ut morbi impetum compescamus, teterrimosque effectus retardemus: qua de causa

1. Optimum vitę regimen ægris præscribi nostrum erit, juscula tantum, oryzam, aut ferculum ex furfuricula exhibendo, parum carniū elixarum, vel assatarum permittendo, minuta algulas aromatis paratas interdicens, tum vini usum, nisi parum ad ventriculi robur fulciendum requiratur.

2. Crebre ægras purgare lenientibus, cassia videlicet, tamarindis, rhabarbaro, manna, vel syrupis pommorum, cicoreę compositę, aut florum persicorum.

3. In-

† Sagou ex Indis Orientalibus exportatur midulla est Palmę cujusdam Toda Panna dictę; arborem proceam per longum conscindunt, & midullam separant uberrimam, eamque conterunt in mortario donec in pulvem redigant, vel ipsam aqua diluunt atque filtrant; ex sedimento condensato rotulę efformantur, aut pulveres; hoc levissimum, atque edulcorantem cibum præstat; paratur miscella juris, aut lacti, pro libitu.

3. Interdum brachia secare opportunum videtur, si egrę juvenes sint, menstruis laborent, pulsi turgeant, aut uterus, vel abdomen doleat.

4. Denique humectantia diu demulcentia, atque diluentia remedia continuo exhibere necesse erit, qualia sunt.

Decocta Pulli, Vituli, Ranarum, cum herbis refrigerantibus, Borragine, Lactuca, Petroffelino, Parietaria &c., in subjectis præsertim gracilibus, & emaciatiss propinanda sunt, in phlegmaticis nonnulla addendo cancri fluviatilia.

Apozemata ex radicibus Consolidæ, Althææ, Oxalidis, foliis Lactucæ, Portulacæ, Verbasci, quibus addi poterit pro singulis vicibus uncia, vel uncia & semis syrupi Violarum, Bismalvæ, aut Symphiti radices.

Serum depuratum, & chalybeatum, cum cocleare succi depurati Cherofilii, Lammii, Mille-folii, & uncia una aque secundæ calcis.

Lac Asininum, aut Caprinum semel vel bis in die sumptum, aut Vaccinum pro integro alimento, modo ventriculus sinat.

Balnea, aut semibalnea tepentia, modo pectoris conditio usum permittat.

Aquæ tandem minerales ferrugineæ mitiores tamen, & modica copia haustæ, diu continuatæ, quales sunt illæ de *Forges*, *Passy*, & *Spa*.

Inter ea remedia decocta, apozemata, & serum hyeme magis conveniunt; vere lac & autumnus; æstivo tempore vero balnea, & aquæ thermales usuveniunt, nihil officit tamen, quod ea modo occasio urgeat, ceteris tempestatibus adhiberi queant.

5. Si opus requirat leviora narcotica exhibentur, qualia sunt decoctio capitum papaverum, tum syrupus diacodii, vel Karabis ad drachmas iij, vel iv., Ladanum liquidum ad guttas x. xij., aut xv., vel solidum ad granum j. Pillulæ denique Cynoglossi Starkey ad gr. iv., vel v. aucta pro circumstantiis dosi.

6. Pudendorum loctiones pluries in die reiteratæ profunt, ex levioris decoctione radices Althææ, aut foliorum Verbasci, Cherophylli &c., cum pauxillo aque secundæ calcis, aut aque cujusdam vulnerariæ non spirituosæ; injectiones pariter semel saltem in die conducunt ex decoctione Althææ, Hordei, aut sero depurato.

7. Interdicere oportet matrimonii usum, quantum libido sinat, tum exercitia nimia ambulationis, equitationis, aut rhedæ; vitam sedentariam, aut quietem præcipiendo.

8. Aëgris denique suadere, quod brachiis cauteria apponere non renuant, præsertim si phlegmatico, & pituitoso donentur temperamento, cachexia laborent, aut ætate consistant; hujusmodi remedium plerumque utilissimum evadit, at sane fœdum est, & molestum, ut ipsum raro ægræ pati valeant.

Cautelæ necessariæ circa hujus morbi medelam.

I. Necdum albi floris medelam innuere debemus, nisi prius diluentibus remediis, ac demulcentibus sanguinem expiarem, ut in palliativa methodo ostendimus.

II. Eoque magis insistendum in præparandis ægrotantibus, quo fluor, vetustior, & acrior, ægræ vero cacheticæ magis appareant.

III. Proposita remedia diluentia, humectantia, & demulcentia animose præscribi possunt, modo opus requirat, cum neque citius quam par est valeant fluorem sistere, aut uterum laceßere.

IV. Contra vero caute incedemus circa aperientium aut vulnerariorum, at-

que adstringentium usum, etiamsi illa morbus poscat, cum facile possint, fluorem interciperere, aut uteri inflammationem gignere.

V. Ut carybdim evitemus opportunissimum videtur diluentia aperientibus, humectantia adstringentibus, demulcentia vulnerariis consociari.

VI. Immo potissimum erit remediorum eorum vires nonnihil interdum compescere narcoticorum usu, ut uterus præsertim tueatur.

VII. Præterquamquod ab iis prorsus abstinere debemus, modo uterum calefieri, aut dolore cruciari cognoscamus.

VIII. Patet enim tunc proscriptas esse injectiones adstringentes nimis, ut illæ quæ patrari possunt ex corticibus Granatorum, Balaustris, Rosis rubris, Alumine, lapide medicamento Crolli, Pulvere de Verny, aut sanguine Draconis.

IX. Suffumigia, ad summum concedi poterunt, ex floribus Salviæ, Menthæ, Mille-folii, aut Mastice, Ladano, Gummi Juniperi, Succino luteo, modo in sola uteri laxitudine, & modica dosi adhibeantur, verum tepentia tantum introducantur, ne matricem offendant.

X. Tandem nondum valetudinem jactabimus a sola fluoris absentia, verum cunctari paullisper oportebit, donec in menstruantibus mulieribus, catamenia concinno ordine restituantur, vel in anibus citra ullum nocuum symptoma sanitas confirmetur, neve alio laticem delexisse innotescat.

*Remedia in albo fluore commendata, quibus tute in quibusdam
saltem circumstantiis uti potest.*

I. Drachma Semis, vel una Terebinthinæ Venetæ, sub formabolari, Rei scrupulo remixta, ei superbibendo poculum tepentis pthisanæ; hoc remedium per dies decem, aut quindecim continuatum, alvum ciet blande, atque uteri vasa confortat; eumque Riverius (a) magnificat.

II. Syrupus fimi Asinini, paratur ex manipulis quatuor ejusdem infusis sextario circiter aquæ rosarum, infusum percolatur, & addita æquali sacchari copia syrupus conficitur, cujus dosis uncia est, per pluries dies haurienda; istiusmodi remedium superius jam enuntiavimus in uteri hæmorrhagia, verum Balonius, (b) quasi mirabile secretum, ipsum in albo fluore commendat.

III. Levis decoctio ex uncia parata nucum pinearum, cum nucleis contusarum, & anatina parte corticis quercus pro potu quotidiano interdum præscribitur; hoc remedium virtutes jungit aglutinantium, & adstringentium, verum Dominicus Panarolus (c) experientiis suffultus illum magnopere exaltat, quod experiri facile est.

IV. Caro bubula fummo exsiccata & subtiliter pulverisata, verum in exiguo vini rubri meraci cyato soluta ad drachmæ circiter dosim mane jejuno stomacho per plures dies comeditur; remedium Foresti (d) auctoritate comprobatur, at lenissimum præbet adstringens, quod nullum superat ceterorum adstringentium.

V. Decoctio foliorum quercus ad quinque, vel sex unciarum dosim, cum drachma simul coaguli lepusculi, per decem dies mane sumpta, pariter commendatur; illam Mercurialis (e) laudat, & sane haud parum constipat.

VI. Decoctum sudoriferum Guaici, Chinæ radice, aut Sarsæ-Parillæ, vel utrorumque simul prodesse testantur ejusdem poculo mane, & vespere sumpto, purgat etiam si folliculi Sennæ, aut osamarindi addantur idonea dosi.

Nul-

(a) Centur. 1. Observ. 46.

(b) Comment. ad Histor. 11. Lib. 11. Conciliorum.

(c) Observ. 48. Pentecost. 2.

(d) Lib. XXVIII. Observ. 16. in Schol.

(e) De Morbis Mulier. Lib. IV. cap. 7.

Nullum magis a duplici ævo Auctores commendant etiamſi confundant, ni fallor, album fluorem cum virulento, in quo convenire poterit, modo agræ ſint obefæ, & pituitofæ, minime vero in ſimplici albo fluore niſi in circumſtantiis §. VI. Art. III. n. 5. pag. 125. indicatis.

VII. Decoction Saponariæ, quæ ebullitione peragitur trium manipulorum huiusmodi ſtirpis, duorum Filipendulæ, & unius Cymbalarie, cum libris novem aquæ fontis ad tertiæ partis conſumptionem, reſidui mane jejuno ſtomacho duplex poculum exhibetur.

Hoc remedium celebravit Empiricus eximius Johannes Zapata (f), a Septu-lio (g) laudatus; at illud in gonorrhœa gallica tantum uſum habet quæ continens fiat; verum ad hunc morbum videtur referri Domini Zapata effatum, præſertim cum David Spleiff (h), qui hoc opusculum latine vertit, atque commentavit id intelligat.

VIII. Millii decoction, vulgo *Decoction d'Ambroise*, pro potu quotidiano per plures dies propinata uſuvenit, leviter diaphoretica eſt, aut diuretica, ac in vaſorum lacteorum mollitie non inutilis, in quibus circumſtantiis veriſimile eſt ipſam Mercurialem (i) proficua expertum eſſe.

IX. Drachmam ſemis, aut unam conſervæ (k) *Lamii*, mane jejuno ſtomacho comestam prodeſſe ajunt, ex floribus, ejuſdem theiformi ſuperbibendo. Rajus (l) in albo fluore ipſam laudat, fateor & ipſe urticam inermen elacterium lacteorum nonnihil reſtituere quod in uteri albo fluore sæpiſſime deſideratur.

X. Tinctura Myrrhæ, Spiritu Vini, & Tartaro extracta ad guttas decem, aut duodecim idoneo vehiculo propinata, aut ſub forma bolari exhibita magni (m) Boheravi laudes promerita eſt, at efficacior evadit, ſi cum aqua Rabbelli eliciatur, ſicut nos in (n) Tractatu de Morbis Venereis docuimus.

XI. Lactis vaccini, dempto cremore, chalybeati uncia ſex, aut ſeptem, cum uncis quatuor ſucci depurati Naſturci aquatici, mane jejuno ſtomacho per tres hebdomadas, aut menſem debitis cautelis adhibitis ingurgitata non parum auxilii præſtant; hoc remedium uno eodemque tempore demulcens eſt, ac diureticum valet tum acrimoniam lactei humoris corrigere, cum vermicularium laxitatem tollere.

XII. Pulvis radicis filipendulæ in unico cyato decoctionis *Pastinacæ ſylveſtris tenui foliæ*, C. B. P. uſuvenit, quam laudant Simon de (o) Paullis in veteri, & pertinaciori fluore, tum Needhamus, & Hermanus Corbeus Raio (p) teſte.

XIII. Tandem decoctionem oſtendemus florum melliloti, cujus poculum quotidie mane ſumi poterit; illam propoſuit medicus (q) quidam Alemanus, quam fateor ignorare, an magis tutam, vel inefficacem experiri.

Remedia adverſus eundem morbum propoſita nocua tamen, vel ſuſpecta.

I. Auctores nonnulli per plures dies mane jejuno ſtomacho camphoræ (r) drachmam

I 4

(f) Li Maraviglioſi Secreti di Medicina e Chirurgia. Cap. 9.
(g) Animadv. Lib. VII. Animadv. 215. (h) Sub titulo de Mirabili, ſive Secreta Medico-Chirurgica, ex Italico idiomate in Latinum verſa. Ulmæ, 1696. in 8. (i) De Morbis Mulierum Lib. IV. cap. 7. (k) Joh. Bauhinus, Hiſtor. Plantar. Lib. XXVIII. cap. 119.
(l) In Catalogo Plantarum Angliæ. (m) Chem. Proceſſu. 57. (n) De Morbis Venereis. Lib. IV. Cap. 12. pag. 534. Edit. ſecunda. (o) In quadripart. Bitanico. (p) Hiſtor. Plantar. Tom. I.
(q) Johannes Michaelis, in not. in Schroderum. (r) VVolfgangus Hoferus, Hercul. Med. Lib. VII. Cap. 1. Joh. Liebault, De la ſantè, ſeconditè & Maladies des Femmes. Liv. II. Cap. 35.

mam femis, aut Nucis (f) Muscatæ dimidium exhibebant, idcirco alterutram solvebant in unciis circiter duabus aquæ Rosarum, aut Nymphææ destillatæ.

At caute huic fidendum est; remedia enim spirituosæ aromatica, valde attenuantia antequam adhibeantur, sedulo perscrutari debemus, præsertim cum in sola lacteorum laxitudine locum habeant, idcirco in mulieribus pingui corporis habitu, & pituitoso temperamento præditis pariori tamen dosi exhiberi queunt.

II. Neque tantum existimo fæculam Bryoniæ, quam Medicus quidam (t), Alemanus præscribit ad drachmam sequenti ratione paratam.

℞ Fæculæ Bryoniæ ℥j.

Seminis Papaveris albi ℥ij.

Myrrhæ ℥j.ß

Cum Saccharo in aqua Cerasorum nigrorum soluto f. Rotulæ.

Fæcula hujusmodi valde emenagoga est, uterum laceffit nimis ac proinde perniciosos ibi cruoris affluxus inducit, & inflammationem ipsam tunc potissimum, cum frustra menses revocare tentamus, quod crebre evenit in vetustioribus albis fluoribus.

III. Iis rigidiorum censuram meretur Aquæ Esculapi nomine proposita, a Medico (u), vel potius Empirico Hispano, qui non levem tamen tunc temporis famam abripuit, ea tali pacto paratur, cucurbita ænea stanno intus oblinita, aceto modice repletur, cui superimponitur plumbeum operculum, ac vulgari methodo, acetum destillatur; fluens liquor qui dulcis est, & aureo colore nitens aquam præstat de qua sermonem innuimus, quam mane jejuno stomacho ad uncias duas, vel tres Zapata præscribit, per aliquot dies, eamque summis laudibus extollit adversus plures morbos, ubiores tamen albos fluores præsertim, & pertinaciores.

Attendite tamen hujusmodi remedium valde suspectum esse, neque tuto exhiberi posse, nam re ipsa acetum est destillatum, & dulcificatum plumbeis moleculis ex operculo abrafis, quibus est saturum, iis enim erit tribuenda aquæ hujusmodi efficacia, at ipsæ Saturni particulæ remedii contemptum indicant, modo cunctemur paullisper circa ea, quæ superius pag. 107. enunciavimus, damnum videlicet, quod intus sumptæ solutiones afferunt, aut præparationes Saturni.

IV. Meum esse censeo de quibusdam remediis hic mentionem facere, quæ adversus fluorem album commendata in Dissertatione quadam reperi quæ accedit tractatui sub iis verbis edito, *Suite de la Description des Maladies Vénériennes*, mihiq; licere, circa ea animum pandere; cum opusculum enim Regis auspiciis fulciatur, idcirco facile Tyrones, aut minus seduli Medici decipi possent veritatis specie, ne illos admonerem quanti hæc pendeant remedia, quorum primum arcanum nunc vobis ostendam.

Repleto, ipse ait, vas fictile uncia una sublimati corrosivi, & novem simul Limaturæ Chalybis, materiam in cella subterranea reponite, eam quotidie idoneo instrumento aggitando donec in pulvem convertatur, quæ lebetes aqua pleno ebulliat, verum Chalybeo cocleari super cartam bibulam affundito, ut pulvis ab aqua perbelle secernatur, qui exsiccabitur, & per tres, vel quatuor dies

(f) Hieronymus Reusnerus. *Observ.* I. I.

(t) Gothofredus Samuel Polifius, *Myrrholog. Sect. IV. Cap. 135. Artic. 3.*

(u) Giovan Battista Zapata. *Li Maravigliosi Secreti di Medicina & Chirurgia, Cap. 13.*

dies ad sex, aut septem grana, cum quinque simul, vel sex grani scamonii Alep-
pensis interdum exhibebitur cum iusculi cocleare prope prandium, aut cenam;
si quæ pulverem respuant boli conflentur confectionis Hamecope; solvit valde,
purgat blande per duas, vel tres vices alvum ciendo.

Facile est perspicere in ea compositione maximam partem sublimati, ferri li-
matura intime copulari, ut pulvis ille supra cartam residuus ex utriusque ana-
tina parte coagmentetur, quare pro singula sex, aut septem granorum dosi, tres
vel quatuor grana circiter sublimati exhibebuntur.

V. Alterum quod commendat arcanum nocuum magis censetur, *ceterorum
enim remediorum*, quibus, Auctor, per viginti annorum spatium usus erat, in hu-
jusmodi morbi, fluoris albi curatione non sanatione, hoc potissimum, asserit, re-
perisse

R. Sublimat. corosis 3ß.
Præcipitat. rubr. 3ß.
Mercur. dulc. gr. xvij.
Mercur. viv. 3ß.

his rite comistis Mercurio vivo nempe, & sublimato primum, ut hujus causti-
ca vis magis compescatur, adduntur infra præcipitatum, & Mercurius dulcis,
denuo conterantur omnia addendo

R. Testæ perlar.
Cinammomi S. p. à 3ß.
Scamon. Alleppens. 3 v.

& miscella perfecte peracta cum syrapi cydoniorum sufficienti quantitate fiant
boli cujus dosis erit a gr. xxv. ad xxxvj.

Si hujusmodi boli secundum artis canones rite parati fuerant pro singulo-
rum xxxvj granorum dosi xxij haberi debent syrapi grana, residuum xiv. grano-
rum conflari debebit ex grano j & $\frac{1}{2}$ sublimati, & grani $\frac{2}{3}$ tum Mercurii
dulcis cum præcipitatis rubri, verum ex granis $v\frac{1}{2}$ Mercurii vivi & xij $\frac{1}{2}$ Scamo-
nii; dubito magnopere additione Mercurii fluentis sublimatum, atque præcipi-
tatum posse satis dulcificari, ut tutus evadat eorum usus.

VI. Intendit vero auctor eorum actionem sequenti syrupo cathartico alternis
diebus sumendo

R. Agaric. vegetabil.
Folior. Senn. à 3vj.

ebulliant cum libris circiter tribus aque fontis ad tertiæ consumptionem, verum

R. Aqu. vit. ℥ij.
Sacchar. ℥j.
Scamon. Alepp. 3vj.

misce, & ignis ope continuo agitando donec avolet spiritus vini, inde igne
sublato frigescat liquor, qui per manicam Hippocratis percolatus cum superiori
infusione copulabitur, cujus dosis sex, aut octo coclearia non excedet.

Revera Auctor parvi facit efficaciam Scamonii, nam ad grana xij, & $\frac{1}{2}$
bolos

bolos pro singula dosi intrat, verum nunc exhibet octo coclearia, seu uncias iv. syrupi, quæ copia calculo peracto tinctura saturari debet xxviij, aut xxx granorum Scamonii præter decoctionem agarici, & fennæ, quæ non levem compositionis partem constituunt; puto enim ex centenis mulieribus duas vix reperiri, quæ valerent actionem perferre hujusmodi remedii, præsertim cum a morbo labefactatæ fuissent quod crebre evenit in albi floris pertinacia.

VII. At multum superest, Auctor enim compositionis subsequenti, usum iis addere suadet.

R. Hyuscyam. recent. } cum radicibus ana. ℥vj.
 Ling. canin.
 Folior. Nicotian. ℥iv.
 Vin. alb. ℥xxxx.

ebulliant omnia per horas quinque vel sex percolato liquore adde

R. Ob. Oliv. recent. ℥xxx.

ebulliant denuo donec amplius vinum, aut oleum non fremant, tunc remoto igne, & liquore frigefacto ipse ad usum fervetur, exhibentur enim prius boli n. v. alternis diebus, verum dosi syrupi n. vj., & interjectis diebus hujusmodi liquoris coclear sumendum est eumque frequenter reiterare optimum censet.

Videtur enim auctorem inter medicinalia magis suspecta congeisse; usui enim interno sublimati corrosivi, quod nemo præscribi auderet arctam addit decoctionem hyuscyami, & nicotianæ, plantarum videlicet, quarum efficaciam adhuc novam putant.

VIII. In ea dissertatione epistola reperitur litterati cujusdam viri silentio prætereundi, quem dicunt physicam, & anatomem coluisse, eandem sententiam amplectentem: defendit iste adversus strumas specificum esse sublimatum, at ne a via recedamus in albo fluore pariter commendat injectiones lactis Mercurii methodo pharmacopææ Batheanæ parati, docet sane deflegmari cum uncis (x) quatuor liquoris singulam drachmam sublimati, verum asserit ad miraculum citissime fluorem sisti.

Methodus Batheana est, solvere drachmas sex sublimati corrosivi cum uncis duodecim Aquæ Fummaræ, ut singulæ drachmæ Mercurii, uncia duæ aquæ respondeant, quare duplum sublimati continet hujusmodi præparatio, quam ea Auctoris anonimi, at Batheus de lactis mercurialis usu obmutuit, lectori tantum suadet ea animadvertere, quæ alias de aqua mercurialis locutus est, ubi ipsam valde commendat adversus faciei tubercula, maculas, pustulas, iis verbis. *Ad faciei ruborem pustulas &c., curandas certissima aqua*, de usu vero interno neque verbum facit, verum externi usus respectu admonet leviter affectas partes tangere statim linteo illas lambendo, *tange loco sæpe cum guttula minutissima statim exsiccando cum linteo &c.*, animadvertendum tamen est hujusmodi aquam componi ex duplici tantum drachma sublimati corrosivi, in libra una emulsionis decoctæ radicis liliorum soluta, quare illa duplo mitior evadit lacte anonimi; Batheus itaque, quem non latebat aquæ hujusmodi indoles, cosmeticorum more extrinsecus tantum ipsam præscribebat, & modica dosi partes affectas obliniendo, & solícite exsiccando, ne sanam cutem laderet; qua ergo ratione fulcitur anonimus? qui etiamsi perperam Batheum sit profecutus, ausus est hujusmodi reme-

(x) Batheus duas uncias impendit pro singula drachma sublimati pro suo lacte Mercuriali conficiendo.

remedium intus exhibere, tum vaginæ plenas injectiones solutionis corrosivi mercuriali illa præparatione duplo efficaciores præcipere, ubi partium gracilitate, & sensibilitate summa tantum periculi adest.

IX. Dominus (2) Morganus Medicus Anglus asserit tincturam Cantharidum cum decoctione simul Guaici haustam in recenti fluore utilissimam evasisse, at in vetustiori mercurialia esse potissima.

A plerisque Auctoribus sane hujusmodi tinctura in gonorrhea gallica proposita fuit, ut in Tractatu de Morbis Venereis ostendimus *Tom. I. pag. 272. 499. Editio Gallica*. Verum ea de causa putarem Morganum remedium proposuisse in albo fluore, quia ipse confunderet hujusmodi morbum cum virulento fluxu ut intelligendum videtur dum mercurialibus uti consuevit in veteri albo fluore; sed, hoc vero, dupliciter ille deceptus est, primum nullam intersyphilidem, & album fluorem differentiam statuit; alterum autumat in utroque casu tincturam Cantharidum convenire, quod utrumque falsum est: observavimus enim superalato tractatu ipsam in gonorrhea virulenta suspectam esse, atque nocuam, quod magis suadendum in albo fluore, in quo mercurialia prorsus futilia sunt, aut infensa experiuntur.

CAPUT XI.

De cessatione menstruorum, & sænomenis quæ ab ea procedunt.

§. I.

Descriptio.

Menses quæ certo ætatis tempore incipiunt certo etiam naturæ lege desinunt, cum diversum sit primæ eruptionis initium, varius pariter finis erit, idque pro diversis subjectis, temperamentis, regionibus, aut ætatibus &c., generice tamen mulieres mensibus deficere incipiunt 45., aut 50. vitæ anno.

Interdum menstrua repente sistunt citra ullum diminutionis indicium, quod tamen raro accidit, quandoque sensim sensimque desinunt; menses enim immi- nuuntur, nonnihil serius revertunt, modo deficiunt, semel vel bis antequam restituantur penitus tandem abeunt, aberrationes illæ quando breves sunt, quando sex menses, aut unum vel duplicem annum perdurant.

In nonnullis mulieribus menses alienantur citra ullum incommodum, vel le- vem tantum comitem habent, cui consulere frustraneum videtur, in aliis eor- um amissio hystericas suffocationes inducit vehementiores interdum, in aliis hæmorrhagiæ superveniunt diutine persistentes lethales, in aliis denique fluor albus est reliquus pene incurabilis.

Quædam vero desinentibus mensibus per vices sunt pluribus sænomenorum eorum obnoxie, diversimode confociatis, modo suffocationibus, & lethali hæ- morrhagia laborant, modo cruoris simul, & albi laticis jactura, modo vaporibus, & albo fluore corripuntur; nonnullæ tandem alterutro eorum alternatim vexantur, vel utrisque uno eodemque tempore cruciantur.

§. II.

(2) *The Mechanical practice of physick. Lond. 1735. in 8. Vid. Essais & Observations de Médecine de la Société d'Edimbourg, latine versum a D. Demours, Medicinæ Doctore, Tom. IV. pag. 629.*

§. I I.

Causæ, & Symptomata.

Communis lex est fibrarum animalium elasticarum, quod progrediente ætate indurescant, & breviores fiant, ea de causa quo ingravescit ætas, vividum amittimus, atque rubicundum faciei colorem, tum carniū mollitiem, eadem causa rugas parit, cutim coltipat, atque corneam quasi redit, uno verbo ea prænuncia sunt, atque concomitantia tardæ senectutis.

Uteri fibræ atque tunicæ vasorum per eum reptantium iisdem sunt obnoxie scænomenis, verum etsi generalior hæc abesset causa uteri saltem respectu admittenda videretur, mammarum exemplo, quæ cum utero summam affinitatem habent, tum structuræ, cum functionum ergo, quæ, ut jam enunciavimus 45. aut 50. circiter anno deprimuntur, atque valde arrescunt.

Id enim pro certo haberi potest, quod illud tempus versus uterum arctari atque prorsus occludi debeat, vasa vero lactea deprimi, aut constipari ut imparia evadant, quod ipsis mos erat humorem lacticinosum recipere, venosas deinde appendices constringi, ut amplius referari nequeat, vel pro cruore ibi affluente recipiendo, vel pro illo in uteri cavitate effundendo, quod idem cadit, ac totum deficeret organum menstruationis, quale superius *Cap. II.* descripsimus.

Quapropter mensium amisio necessarium videtur ætatis consequens esse, quod nostrum non est avertere, sed a mutationibus, tunc in vasis vermicularibus ortis, & appendicibus venosis dependet, etiamsi hujusmodi aberrationes innumeræ sint ac diversimode in diversis circumstantiis aggredi possint, ut facile patet ex varietate scænomenorum, quæ in diversis subjectis mensium abolitionem antecedunt, aut succedunt, nihilo tamen minus ad quatuor classes præcipuas referri possunt, quare

Primus in hoc morbo uteri status.

In hoc stadio vasa lactea aut nihil, aut parum referantur, neve sinunt affluentis lactei humoris ingressum, eoque parum vel nihil replentur, parum nihilque propinquas venas comprimunt, ut sanguis recipiatur; appendices vero ex una parte parum extensæ inopis sanguinis ergo, ex altera vero parte compactæ nimis fibrarum rigiditatis causa menses retardant, imminuuntque donec tandem abeant.

Tunc 1. Interdum periodus subsistit imminuta fluoris copia; periodus persistit quia vermicularia adhuc dilatantur aliquantisper singulis mensibus, tantumque cruoris recipiunt ut periodicum conservent effluvium, at appendices magis compactæ aperiri renuunt, aut imperfecte referantur ut paucum hinc sanguinis effundant.

2. Interdum ex converso copia servatur diu menstrui fluxus diuturniori tamen periodo; ubertas enim effluvii persistit quia appendices adhuc moles sunt, aperiri sinunt, cruoremque recipiunt pro vulgari fluoris diuturnitate necessarium, & periodus diutius magis fit, lacteorum ergo, quæ pro adepta rigiditate difficilius seriusque succo lacteo imbibuntur.

3. Quandoque menses imminuuntur, & periodi una remonentur quod antecedentia confirmat, difficultatem nempe qua lactea vasa compacta nimis dilatantur, & venosæ referantur appendices.

4. Nonnullæ mulieres in quibus menstrua depauperantur, imminutio per gradus

duos sensim, sensimque æqua apparet, in aliis sine lege aberrant; in primo casu una eademque ratione constipatio tum lacteorum, cum appendicum progreditur, atque sanguis uniformem motum conservat, in altero vero casu inæqualiter arescunt vasa illa aliqua extranea de causa, aut pro irregulari sanguinis cursu.

5. In aliquibus mulieribus catameniorum abolitio ad sex menses, unicum, vel duplicem annum protrahitur cum tantum temporis requiratur, ut vasa aperiantur, quod plerumque accidit in phlegmaticis subjectis aut sanguineis, verum id salubrius est ut natura perferat facilius ita mensium defectum.

6. In aliis celerius desistunt repente valde, quia vascula illa citius occluduntur; id in mulieribus evenit bilioso aut melancolico temperamento præditis, quod frequenter tamen teterrimos effectus gignit, inopinatæ exuberantiæ cruoris ergo alio deflectentis, qui per uterum erumpere adhuc deberet.

7. Quando menstrua absunt ex proportionali simul æquali & uniformi lacteorum & appendicum occlusionem nullum consequitur nocuum symptoma, vel ad summum supersunt 1. aliqua gustus depravatio, aut fordium appetentia quando lacteus succus in sanguine redundans saliva aut gastrico latice permiscetur: 2. vel aliqua præfocatio, aut capitis gravedo quando redundans sanguis pulmonem, aut caput adoritur.

Hæc eveniunt iis quæ uterum bene constitutum habent omni vitio expertem

Quæ æquali gaudent tunicarum fibrarumque uteri robore;

Quæ menses amittunt secundum naturæ leges citra ullam externam morbosam, aut repentinam causam;

Quæ tandem lactea vasa, & appendices occludi experiuntur a sola aucta fibrarum rigiditate, idque fieri placide, & proportionaliter.

Status alter.

In hoc stadio vasa lactea adhuc mollia sinunt ingressum lactei humoris, tamen comprimunt proximas venas atque sanguinem retardando ipsum cogunt appendices intrare, verum orificia eorum vasorum tum appendicum compacta nimis aperiri negant, quare frustra vasa inflantur, neque menses apparent etiam si omnia disposita videantur.

Tunc 1. Mulieres persentiunt instantium catameniorum molestiam ut ipsa revera essent eruptura cum etsi incassum omnia ad hoc in utero parata sint.

2. Incomoda quæ præcedunt menstrua aut iis succedunt diuturniora, & pertinaciora experiuntur, imo vehementiora quandoque, quam in statu naturali cum vasa, quæ depleri nequeunt, diu turgeant, ac magis interdum quam circa mensium instans effluvium.

3. Dum impressiones tunc utero obviæ grandiores fiunt, & vividiores, vapores sane hystericos excitant, vel ea saltem fœnomena inducunt, quæ ad eos vapores pertinent; huiusmodi sunt faciei repentinus calor, colorve per breves sudores evanescentes, suffocationes convulsivæ diaphragmatis, contractiones, intestinorum borborigmata, risus inconcinus tandem, aut fletus.

4. Ea fœnomena sensim imminuuntur, debilitantur gradatim atque rariora fiunt cum vasa illa lactea vel appendices in diem constipentur, minusque sinant ingressum humorum, qui proinde leviolem plethoram gignunt, nihilominus ea unum frequenter, aut duos annos perdurant invita tamen natura nec procul molestiis.

Huiusmodi secundum stadium ad eas plerumque mulieres attinet quæ orificia uteri vasorum parietibus densiora, & compactiora habent.

Quæ

Quæ interna donantur uteri tunica, dura nimis, tendinea, ut vasa omnia maxime constringat, quæ proxime obtegit.

Illæ vero præsertim, quæ nondum utero gestarunt, aut raro, in quibus vasa lactea, & venosæ appendices minus dilatata fuerunt in eo compactionis statu persistentes.

Tertius status.

In hoc lactea vasa cum mollia adhuc sint dilactari sinunt, lacteoque humore replentur, necdum tamen exauriuntur cum compacta eorum orificia referari renuant, quare ipsa turgida nimis propinquas venas comprimunt, in iis circulationem intercipiunt, atque in appendices sanguinem devehunt, easque pandunt, quod sanguinis jacturam modo majorem, modo minorem inducit.

Tunc 1. hæmorrhagia habitualis est, atque pertinax quia vasa lactea adhuc plena venas premunt continenter, ac in appendices venosas sanguinem defleunt, coguntque illas patulas morari.

2. Sanguinis jactura non solum persistit periodice, vero singulis mensibus duplicatur, cum vasa vermicularia prope menstruorum tempus, turgeant magis, magisque premant proximas venas, cruoremque ibi detineant, atque majori proinde copia effundant.

3. Tensio solidorum, tunicarum præsertim uteri, quam excitat vasorum in utero inflatio, vapores hystericos frequenter inducit superiori statu secundo, num. tertio enunciatis.

4. Etiam si pertinaces sint hujusmodi sanguinis jacturæ, sponte tamen desinunt quando vasa sensim, sensimque arctantur, lacteum humorem respuunt, neve amplius venas comprimunt, aut aperiri cogunt.

5. At Mensium amissio haud raro album fluorem relinquit lymphaticum qui a levioribus excoriationibus procedit extremitatum appendicum venosarum jam constrictarum, ex quibus lymphæ perfluit donec perfecte aglutinata fuerint.

6. Interdum hujusmodi sanguinis amissiones in ulcera degenerant, erosionum causa extremitatum venosarum, quæ marcescunt, & pure foedantur acriori, & corrode.

Super allata fœnomena facile iis accidere solent, quæ appendicibus donantur, & vasis lacteis laxioribus;

Illis vero quæ in utero suapte natura imbecilliores portiones habent, ubi venæ varicosæ factæ sunt.

Iis quæ pluries utero gestarunt vel partus passæ sunt diutinos, laboriosos, aut difficiles, in quibus appendices crebre laxatæ, aut erosæ fuerunt, aut uterus inequaliter labefactatus fuit, ubi placenta adhæsit.

Tandem illis, quæ in primo aut secundo casu nuper allato imprudenter pedes secarunt perperam mensium revocandorum causa.

Status postremus.

In hoc postremo casu uteri vermicularia lacteum humorem adhuc recipiunt, quantumque affluit totidem effundunt per orificia, quæ patula facile persistunt, idcirco illa neque inflantur, neque venas comprimunt, sanguinem intercipiunt, seu in appendices devehunt, neve eas referari cogunt, uno verbo eruptionem mensium minime fovant.

Tunc 1. Mulieres rubro fluxu deficiunt verum albo continenter laborant menstruorum tempore periodice incrementi, cum tunc uberius fiat laticis illius secretio.

2. Vasa non tumescunt, neque uteri tunica læcessuntur, ideoque patientes sunt.

sunt vaporibus expertes, verum persistenti albo fluore, languore, macie, & marasmo laborant.

3. Quandoque affectio in ulcus uteri degenerat quando humoris lactei continua effusione relaxantur nimis, dein corroduntur orificia lacteorum, atque ipsa interna tunicarum matricis facies leditur, in iis præsertim, in quibus acer humor affluit, & corrosivus.

4. Denique modo mulieres sanæ sint & sedulo curatæ plerumque sensim sensimque sponte aberrat hoc album morbosum effluvium prout in diem vasa illa constipantur.

Mulieres ille crebre ad hunc statum pertinent, quæ phlegmaticæ sunt, & pituitosæ, quæ fluoribus albis obnoxie sunt & diu lassis orificiis vasorum præditæ.

Quæ uteri ejusque intimæ tunicæ contextu laxiori donantur, id sponte eveniat, vel gestationis causa.

Ille tandem quæ perperam aperientibus hæmenagogis menses revocare tentarunt abeuntes.

Status uteri compositus.

Simplicibus illis mensium abolitionibus usque dum explicatis aliæ plures compositæ species adduntur ex priorum connubio trium saltem nuperrimorum quæ simul eodem tempore atque ineadem ægrotante occurrunt, diversam tamen uteri sedem afficientes, quare post simplicium explanationem mensium sistentium compositionem ejusque præcipua scœnomena enuntiabimus.

Idcirco 1. Dum secundus, & tertius status simul agunt, ægræ vaporibus simul corripientur, & uteri hæmorrhagia.

2. In confluentia secundi & quarti vaporibus simul & albo laticinoso fluori erunt obnoxie.

3. Quando tertius status quarto copulatur, mulieres tum sanguinis cum lactei & lymphatici humoris jactura vexabantur, quam haud facile distingui poterit, præsertim si copiosum sit cruentum effluvium, modo eo interdum non deficiat.

4. Tandem in utrorumque concursu quod raro evenit, etsi non impossibile, ægræ vaporibus cruciantur hæmorrhagia & simul albo fluore.

Componuntur ii diversi morbi gradus quando causæ simplices species producentes simul agant, laceessantque diversas uteri partes, simplicium tamen causas perscrutando compositarum facile quot, & quales oriri poterunt innotebit.

§. III.

Diagnosis.

I. **D**agnosis definientium menstruorum eo collineat, ut amissionem distinguamus ab ætate procedentem ab ea quæ suppressio, aut gestatio pariunt.

1. Ea a suppressione distinguitur 1. Ex eo quod naturalis mensium defectus 45. vel 50. anno tantum occurrat, morbosa vero suppressio quovis alio tempore evenire possit: 2. Verum salutaris amissio numquam repente aggreditur, sed sensim sensimque per vices confirmatur, suppressio tamen plerumque statim adoritur: 3. dein naturalis mensium abolitio levioribus symptomatis solummodo comitatur, suppressionem vero teterrima scœnomena consequuntur.

Modo mulieres ætatem fateri non vereantur, atque signa illa pleraque saltem

con-

concurrant, eaque sedulo scrutemur, facile erit naturam, & causam abeuntium menstruorum detegere, at parum in dubio habebimus, nam ab unico, aut duplici mense, quæ erunt consecutura satis ostendent, an naturæ legibus referri debeant, quæ mensium defectum poscunt, vel morbosis causis, quæ citra naturæ ordinem menses intercipient.

2. Haud facile tamen est naturalem distinguere catameniorum amissionem, ab ea quæ a gestatione procedit; decipiuntur enim sapissime mulierculæ, nam cum natis deficient, eosque cupiant vehementer 45. etiam vel 50. ætatis anno omnes gestationi tribuunt mensium imminutiones, quæ totalem prænunciant eorum silentium; contra vero quæ plures foetus ediderunt menstruis defecturis identidem veram conceptionem referunt.

Neminem latet mulieres ciborum gustum amittere, extraneis cogitationibus, conturbari, cordis angustiis, atque vomendi conatibus cruciari primis, quibus foetum gerunt mensibus, sinum vero inflari atque tendi, abdomen contra deprimi ac constringi, ut eorum pleraque eveniat in repentina mensium suppressione, & laboriosa obvia, quæ dubitationem nostram confirmabunt, quare modo nobis illudere non velimus huiusmodi ambago prorsus evanuerit a quarto vel quinto mense dum vel foetum convelli in utero ægræ persentient, vel hoc signo deficiente naturali mensium cessationi suppressio tuto referri poterit.

In utroque casu enim huiusmodi incertitudo, aut cunctatio ægris nullum detrimentum inferre poterit; catameniorum igitur abolitio vel nullum postulat remedium, vel aliquam tantum ex brachio venam incidere, aut stomachica exhibere, quæ æque gestationi conveniunt; suppressionis vero respectu, quæ plerumque efficacioribus remediis indiget purgantibus videlicet, & aperientibus procul damno circa eorum præscriptionem cunctabimur nonnihil, donec veritas elucescat.

II. Diagnosin diversarum specierum definentis menstrui simplicis, vel compositi ægrotantes inquirendo facile noscitur;

1. In priori igitur specie quæ naturæ magis consona est, tumor, tensio, atque dolor uteri absunt, neque ullum consequitur grave symptoma præter leve aliquod palloris, aut plethoræ.

2. Secunda species adest, quando mensium periodus adhuc persistens, verum uteri tumor, tensio, dolor &c. tum plura palloris phenomena ægras vexant, atque hystericæ accedunt passionis incomoda.

3. Tertia dignoscitur dum uteri hæmorrhagiæ periodice supersunt, quæ vero continentes fiunt, aut comites habent hystericos vapores, gustus depravationem, atque mensium aberrationes.

4. Quarta species extat quando mulieres albo fluore corripitur perspicimus continenti, pertinaciori & periodice incrementi, quo neglecto languor, aut marasmus augetur.

5. Tandem compositæ species innotebunt symptomatum indagine quæ ad simplices pertinent nuper indicatas, ut earum vario connubio novæ plures ori possint.

III. Diagnosin diversarum uteri conditionum, eorumque vasorum ab indole deducitur singularum specierum cessationis propositarum, quare

In prima specie æque vasa lactea, & venosæ appendices occluduntur respuuntque ingressum lacticinosa lymphæ, atque cruoris.

In altera specie vasa lactea referantur, & appendices; illa ad lacteum humorem recipiendum, istæ ad sanguinem hauriendum, utrorumque tamen orificia compacta nimis renuent detentum laticem effundere.

In tertia idem evenit ac in secunda specie ostendimus, præter appendicum aperitionem, a quibus copiose sanguis in utero erumpit.

In postrema demum specie lactea vasa penitus referantur, ut omnis erumpat lactiginosus liquor, atque continens producat albus morbosus fluor.

In compositis denique catameniorum amissionibus natura & qualitas symptomatum satis indicant conditiones vasorum lacteorum appendicum, atque uteri totius.

§. IV.

Prognosis.

I. **M**enstruorum cessatio circa 45. vel 50. annum naturæ conatus seu melius consequens corporis totius & uteri præsertim constitutionis necessarium videtur, quare prorsus innocua, aut periculosa evadit modo citius quam par est non eveniat, & sævioribus scænomenis non comitetur.

II. Mensium abolitio morbosæ est, quæ 30. 35. aut 40. annum versus supervenit, mox 45. aut 50. anno periculosa est, si repentina de causa metus, doloris, aut abortus ergo occurrat.

In hoc casu periculum adest tum quia suspicari licebit vasa uteri, & appendices inæqualiter refferari, cum ratione lactei humoris qui immatura æque, ac naturali cessatione exuberans sæva symptomata afferre potest.

III. Hujusmodi affectio molesta evadit quando hystericos vapores hæmorrhagiam, aut album persistentem fluorem gignit, verum uteri infartum, syrrhum, cancrum, aut ulcus minetur; in singulis his casibus periculi mensuram faciunt concomitantium symptomatum indoles, numerus, vehementia, quæ rectam prognosim definire valde implicant.

IV. A scænomenis cuique speciei propriis singularis quarumcumque prognosis deduci poterit, idcirco

1. In prima mensium abolitione cum ex parte uteri nihil detrimenti accidat, verum ad pallorem, aut leviozem plethoram pauca superventura scænomena attingant, quibus mederi facile erit, neque vaporibus, vehementioribus saltem, ægræ laborent, ideo ea periculo vacat, aut parum pertimescenda videtur.

2. Cum in secundo casu omnia adsint symptomata palloris, atque plethoræ verum grandiores hysterici insultus, qui valde perterreant, superveniant, tum uteri hæmorrhagiæ; aut abundans album effluvium suspicetur, cum etiam infartus pertinaciores, atque uteri obstructions esse reliquas, idcirco hujusmodi species præcedenti valde periculosior censetur.

3. In tertia vero specie pallore, plethora, & vaporibus cruciantur ægræ quæ cum diuturniores fiant, in utero syrrhos, atque obstructionem parere valebunt; verum ipsæ continenti laborant hæmorrhagia e qua valde lacescunt, tum frequenter ulcus, aut cancer inducitur, hæc enim præcedentibus magis nocua experitur.

4. In quarta hujus affectionis specie albus continens fluor, atque pertinax maciem, ethicam febrem, ulcus atque cancrum uteri minatur; ut in hac summum periculum adesse videatur.

5. Compositarum speciarum respectu prognosis derivabitur ab indole, numero, ac symptomatum violentia, quæ eas comitatur, aut a morbis consequuturis.

§. V.

Curatio.

Illa scœnomena eandem hic medendi rationem postulant, quæ in ceteris aliis casibus postulaverant, quare consulere poteritis *Cap. VIII. Lib. II. ubi De Hysterica Passione & Vaporibus &c.* sermonem faciemus. Ut eos vapores compescatis ad secundam speciem pertinentes, fas erit pervolvere *Cap. IX. Lib. I. ubi de hemorrhagia, atque mensibus nimis* pertractatur, ut sanguinis jacturam cohibere discatis. *Cap. X. vero* perlegere vestrum erit *Lib. I. ubi de albo fluore* loquitur ut illum qui tertiam speciem cessationis respicit subijciatis necessariis interdum cautelis adhibitis.

Quare hujus capituli materiam ad primam menstruorum cessationis speciem pertinere constat, ut præoccupare valeamus scœnomena mulieribus superventura, quæ menstruum fluxum amittere incipiunt, aut ea compescere protinus dum modica sunt ne morbos inducant, præsertim cum ea leviora palloris, aut plethoræ scœnomena esse videantur.

Statim ac mulieres modo prudenter incedere velint cognoscant proxime catamenia esse abitura, debent de propria valetudine sollicitas esse, eoque magis attendendum erit quo sanguinis, aut uteri conditiones id minentur, hac de causa

1. Haud infrequenter venam secare intererit per integrum, aut duplicem annum ut sanguinis exuberantia vasorumque turgentia imminuantur; quæ ex brachio instituuntur venæ sectiones, salubriores existimantur, ut sanguis ab utero revelatur; haud facile est determinare numerum, aut copiam, nam quædam singulis mensibus hoc remedio egent, aliæ in duplici mense tantum, at plerumque tertio aut secundo quoque mense prout temperamentum, aut vitæ regimen possant, venæ sectio reiteratur.

2. Optima vitæ gerendæ methodus præscribi debet, tum copiæ, cum qualitatis alimentorum ratione; quantitatis respectu, ut minus comedant, ac minorem tum sanguinis, cum humoris lactei quantitatem adspiciantur; qualitatis respectu, ut alimenta leviora, aquea, parum nutrientia ingurgitent, quæ sanguinem chylumque dilutiorem suppeditent, minusque aptum vasa uteri infarcire.

3. Identidem ægras purgare necesse erit lenientibus nempe, tamarindis, manna, cassia, rhabarbaro, sale vegetabili aut ebsonensi &c. ut primæ viæ expientur, & per alvum exuberans chylus eliminetur, qui in sanguine lactei humoris redundantiam gignit.

4. Ipsi præcipito quotidie simpliciora remedia cum aqua tepenti, aut decoctione Artemisæ Matricariæ aut melliloti &c. quibus addi poterunt uncia duæ olei amigdalorum dulcium, aut uncia una Diachatolici, vel aqua dosi pulpæ cassiæ, modo venter arefcat, verum si ægra flatibus crucietur addi potest uncia una olei Laurei, vel clister intromittere ex baccis Laurinis paratum.

5. Quotidie, aut frequenter diuretica mitiora præscribi debent, ut per lotium lacteus humor erumpat; opportuna videntur infusiones capillarium, thei, salviæ, melissæ & vulnerariæ Elveticæ, aut decoctiones leviores cherophilii, matricariæ, aut artemisæ; eadem virtute pollent aquæ minerales refrigerantes & diureticiæ De Forges, aut Passi.

6. Efficaciora quandoque diuretica usuveniunt si ea vehementiora symptomata possant; quare iis infusionibus, aut decoctionibus adjungi possunt 3 j. vel

vel 3 j. ꝑ. quotidie falis admirab. Glaub. aut Arcan. duplic. falis Prunell. & thartar. vitriol. , vel eas infusiones super affundi xx. asellis in pulvem re-
dactis.

Tandem si hysterici vapores crebriores sint , & infensi , ægris coclearia aliquot erunt exhibenda potionum antehystericarum quæ componuntur ex aqua distillata nucum viridium , cereforum nigrorum , aut florum tilliæ , quibus adduntur pro singulis quatuor unciiis guttæ viginti , aut triginta tincturæ mirrhæ cum simili dosi Castorei , vel grana aliquot assæ foetidæ in ipsis solvi , aut guttas tincturæ annodynæ permisceri poterunt , si vapores vehementiores sint , & convulsionibus , aut convulsivis motibus comitentur.

Cautelæ necessariae in mulieribus pertrañandis , quæ menstruationem tandem amittunt .

I. Quotidie pedes secare prætereundum erit in mensium vera ammissione ; tunc enim venæ sectiones ramificationibus aortæ descendentes sanguinem attrahunt , qui uteri vasa infarcit , uterum ipsum inflat atque tendit , tum hysterici affectus symptomata auget , & hæmorrhagias uteri haud infrequenter inducit.

II. Eadem de causa emenagoga omnia veniunt proscribenda , solventia , aperientia aut aquæ thermæ &c. nam sollicitè caveri debet ne desinentes menses invite revocemus , cum ab hac methodo recedamus potius quam juvare , plerumque ægras lædimus , morbus ingravescit , & uteri hæmorrhagiæ nanciscuntur haud facile curabiles.

III. Non sufficit nutritionem demere , verum ut jam admonuimus nutrientia magis alimenta interdiceret oportebit quæ chylum pinguiorem , aut spissiorum producunt , hujusmodi sunt , caro bubula aut vervicis , perdix , cremor orizarum spissior , juscula densiora , extracta , lac aut percolatum.

IV. Ex eodem principio deducitur sanguinem calefacientia , aut rarefacientia esse interdicens ne uteri eorumque vasorum respectu similes effectus plethoræ edant , pariter prohibenda erunt tunc temporis pervigilia , animi pathemata , exercitia violentiora , spirituosum potum , vinum ipsum saltem largiori dosi , caffè etiam & cocolatum vanilla præsertim remixtum.

V. Cum matrimonii usus uteri fibras ejusque tunicas valde laceffat sanguinis cursus implicando ut ipsum cogat intra vasa atque venosas appendices retineri , verum contra orificia vasorum niti ; ideoque crebrior saltem coitus nocuus videtur in desinentibus menstruis , præsertim si laboriosi sint aut sanguinis jacturam comitem habeant.

VI. Si mulieres alicui cronico morbo sint obnoxie , cujusque generis sit valde timendum est ne ipse circa hoc tempus augeatur , quod animadvertere fas erit ne ægræ comoveantur nimis , remedia facilius hauriant necessaria , & regimen observent , quod tunc opportunum censebimus.

VII. Generice suspicari licebit mensium amissionem prompte a natura patrari modo fœnomeni expers sit , ut in bene constitutis mulieribus , in quibus uterus suum elaterium servat , conspici solet ; at in ultima catameniorum laboriosa eruptione quæ aliquo fœviori symptomate comitatur prodest ipsam sensim sensimque & segniter fieri ut vasa uteri valeant æque constipari , & natura mensium deficientiæ assuescat , de cetero nihil agere debemus ut naturæ conatus sollicitentur , aut vasa uteri cito nimis occludantur , quod irregulariter fit , & ibi sanguinis affluxus parit.

VIII. Quando in menstruorum cessatione plures copulantur circumstantiæ eveniunt quandoque sanguinis jacturæ , quandoque albi fluores , modo uteri infartus , modo colici dolores aut vapores ; perpendere igitur nostrum erit causas ,

fas, atque detrimenta ab iis scœnomenis orta, eaque vel singillatim subijcere a vehementiori gradum faciendo, & periculofiori, vel omnes simulcompefcere, diversa remedia si fas erit copulando singulis speciatim idonea.

IX. Tandem parum fidendum est fluxui catameniorum qui post 50. annum persistit, vidi enim mulieres trans hanc ætatem mensibus polere jactantes quasi juvenes essent, at re sedulo pertractata reperi has putatas eruptiones verum morbum constituere ab ulcere aut uteri infartu, varicibus dependentem, imo pleræque mulierum quæ sibi diu mensibus gaudere suadent plerumque in cancrum, aut ulcus desinunt.

Dantur etiam puberes, quæ nono, aut decimo ætatis anno catameniis pollere periodice revertentibus affirmant, at id crebre consequens est vitii uteri alicujus aut vaginæ cui venæ sectionibus aut decoctionibus refrigerantibus, sero, lacte asinino & semibalneo mederi oportet. Sane verum est quantumvis natura variare videatur in speciali earum circumstantiarum scrutinio, verum tamen est ipsam constantem esse in legibus fanciendis, essentialibus æconomix animalis.

C A P U T XII.

De Furore uterino.

Seu Μητροπαρία,

Furor Uterinus morbi genus est spurcum & propudiosum: Sed commode cadit, quod raro obvenit; attamen non ita raro, ut e Muliebrium Morborum numero expungi possit, aut a Medico, qui eosdem explicandos suscepit, debeat omitti, seu a plerisque factitatum video, ut mox indicabitur. Ipse quidem officii mei esse duxi de illo differere, sed cum puduerit de obscœnis gallice dicere, satius visum est latino sermone uti, (a) in quo vocabula & tolerabilius se habent, & accepta jam usu sunt, cum in omni fere Medicorum volumine tractentur.

§. I.

Descriptio.

FUROR Uterinus, græcæ Μητροπαρία, derepente numquam invadit, sed per fallentia incrementa lentis passibus ingreditur, eo, qui sequitur, ordine.

I. Incidit aliquando, ut Virgines viro jam maturæ, si quem amasium perditæ ament, quo potiri non detur; ut Puellæ palestræ venereæ assuectæ, a qua arcentur invitæ; ut mulieres nuptæ, quæ frigido vel senî conjunctæ sunt; ut juniores Viduæ, quæ marito valido, & ad opus non segnî, quo cum confueverant, sunt orbata, libidinose cogitent alte, fortiter, frequenter, continuo, præsertim si in libidinem proclives sint natura, quam proclivitatem intendant magis in dies, legendo milesias fabulas, quæ non teneros tantum, sed etiam lascivos amores spirant & edocent; cantitando versus fescenninos; colloquendo sæpissime de rebus venereis cum sodalibus; petuleis digitis se se contrectando, aut se contrectari patiando; aurem præbendo facilem viro-
tis,

(a) Celsus, de re medica, Lib. VI. Cap. 18.

tis, illecebris; in cibos adhibendo edulia falsa, piperata, acria, fumo indurata; vino meraciore, liquoribus spirituosius, potu Coffe, Chocolata utendo vel potius abutendo; quæ singula, aucta sanguinis acrimonia; veneris cupiditatem inflammant.

Ea quidem in principio levia, sed si pergant, paullatim ingravescent. Manent in eadem cogitatione perpetuo defixæ, a qua nolunt se dimoveri; id unum cogitant, in eo totæ sunt; cetera nec vident, nec curant; tristes, meditabundæ, silent vel mustitant; libidinem qua æstuant, caute dissimulantes, & contegentes, quoad ejus facere possunt. At si forte quis venustus adolescens, imo si vir qualiscumque occurrat, lascivientibus oculis illum cupide spectant, & si quid dixerit blanditiarum, ut communis fert usus, avide auscultant, lætæ arident, gestiunt, prævertunt serio quæ joco dicta sunt, & non tantum faciles, imo etiam paratas ultro sese præbent.

II. Quæ jam nimia est, gliscit tamen in dies egritudo; effrænata & furiosa veneris cupiditate, quasi æstro, percitæ, pudicitia immemores, inconsiderate multa garriunt, quæ libidinem qua flagrant, aperte produnt, & deposita omni verecundia, impotenti animo, obvios quovis, notos ignotosve ad opus provocant, sollicitant verbis flagitiosis & turpibus. Si cunctentur, pelliciunt voce, gestu, & si pertinacius renuant, probris illos insectantur alta voce, & quantum valent, conantur pugnis impetere.

III. Hucusque tamen morbus, quantumlibet gravis, intra melancholici delirii fines se continet, sed brevi in apertam maniam erumpit. Amentes vociferantur, absurda deblaterant, nutu, gestu, sermone circumstantium libidinem tentant, imo quandoque ut pelliciant efficacius, succinctæ se nudas exhibent; in reluctantes vel segnes insiliunt furibundæ, aperte delirant de multis, si non de omnibus. Adsunt vero simul symptomata omnia, quæ maniam comitari solent, agrypnia, anorexia, fervor totius corporis, frigoris tolerantia, sitis defectus dum æstuant, pigrities alvi, urinæ spissæ, paucae, croceæ, lutulentæ, &c.

Cave tamen putes hæc omnia in omnibus, & eodem modo concurrere; singula in singulis varie variant, pro temperie, & indole nativa, pro educatione qua informatæ sunt, pro morbi vehementia, ita ut hæc affectio sibi semper constans & sui similis, in eo quod essentielle est, [in ceteris omnibus] dispar sit, & dissimilis.

Morbus ille, utcumque rarus, frequentius tamen occurrat in regionibus calidioribus, ubi intensior est causarum energia, a quibus inducitur; ideoque mirari subit (b) Hypocratem, Galenum, Celsum, Aretæum, Oribasium, Paullum Æginetam, qui in Græcia, & Italia, Medicinam tractaverunt, de eo alte silere. Sed mirationem majorem facit taciturnitas Medicorum, qui inter nos ante renatas literas floruerunt, eorum præsertim, qui in climate calidiore, ubi morbus ille debuit olim, ut hodie, vulgatiore esse, (c) nempe Arnaldi de Villanova, Valesci de Taranta, Bernardi, Gordonii, Gullielmi Rondeletii inter Narbonenses; Antonii Guainerii, & Alexandri Benedicti (d) inter Italos, a quibus, dum ceteros morbos muliebres explicant, morbus ille consulto prætermittitur esse videtur, quasi nolissent de affectu dicere, cujus Antiquiores mentionem nullam fecissent.

Astruch de Morbis Mulierum.

K 3

Sora-

(b) Adducitur tamen ex Hypocrate & ex Galeno locus unus & alter, quibus, si benigne accipiantur morbus verbo indicari vel perstringi videtur. (c) Illi omnes inter cetera deliriorum genera, de Amore infano Virorum in Mulieres mentionem faciunt, specialibus capitulis; sed ne ipsi quidem de Furore uterino inter muliebres, quos explicant. (d) Mirum profecto Alex. Benedictum de Furore uterino silere suo loco inter Morbos Muliebres, cum ipse Observationem unam referat feminae ab utero furentis, Lib. I. Cap. 28. de Insania, pag. m. 49.

Soranus, Medicus Græcus, qui sub Trajano principe floruit, Galeno paullo antiquior, solus est, quem sciam, qui de Furore uterino expresse dixerit. Intercederunt quidem illius scripta, sed Ætius, fatetur ab eo depromptum esse *Caput 74. Libri XVI. Operis sui de Contracta ex Veteribus Medicina*, in quo de affectione illa diserte quæstio est. Illud autem Ætii caput inscriptum quidem *De Furore uterino*, sed cum hæc inscriptio Jani Cornarii sit, qui Ætium latine reddidit, & cujus interpretatio Basileæ prodiit apud Frobenium, anno 1535., placuit Græcos fontes adire, ut certo nossem, quo genuino vocabulo Ætius, vel potius Soranus ipsius, quem exscripsit, morbum græce nominasset, in quo provinciam suscepi difficilem, & opinione operosior. Nam opus Ætii libros continet sexdecim, quorum octo tantum priores apud Aldum & Asulanum Venetiis in fol. græce editi sunt, anno 1535. Reliqui octo posteriores latent adhuc inediti. Sed opportune mihi succurrit in Bibliotheca regia locupletissima quatuor esse integra Græca Ætii exemplaria manuscripta; nec mora, illa pervolutavi diligenter, unde mihi constiti caput illud ab Ætio inscribi *πρὸς τῆς Μητρομανίας*.

Eodem quoque vocabulo uti memini, tum Nicolaum Myrepsum, Alexandrinum, apud quem prostrat Antidotus (e) quem valere ait contra *Metromaniam* quo nomine *Furorem uterinum* intelligi extra dubium est; tum apud Zonaram, Historicum Græcum, qui narrat *Annalium Tom. III. pag. 23. Eusebiam, uxorem Constantii Imperatoris, filii Constantini Magni, forma quidem celebrem, sed ob maritum calamitosam, cum natura, tum morbis mollem, & ad venerem segniorem, unde paulatim contabescens ante Constantium decessit, nullo unquam fœtu edito, & ut quidam dicunt, uterino Furore percita mortua est; καὶ μητρομανίας νοσήματι περι-πεσῖσα ἐξέλιπε*.

Sunt alia quædam ejusdem morbi nomina. Sic a (f) Moschione, Medico Græco recentiore, sed incertæ ætatis, (g) *Satyriasis* appellatur. Sic a nonnullis Recentioribus dicitur *Nymphomania*, quasi dicas *Maniam Clitoridis*, cui olim *Nympha*, nomen fuit; vel *Erotomania*, hoc est, *Mania amoris*; sed a vocabulis istiusmodi abstinēbimus, quoniam non sunt communi usu recepta.

§. II.

Causæ.

PAtet attendenti in Furore ūterino duos morbos conjungi, effrænatam, & vesanam veneris cupiditatem, quæ ab uteri vitio; & delirium initio melancholicum, & deinceps maniacum, quod a vitio cerebri dependet. Si ambo concurrant, aderit Furor uterinus, de quo quæstio est; si defecerit alterutrum, erit vel effrænata coeundi cupiditas sine delirio, vel melancholia aut mania simplex sine vesano veneris desiderio. Proinde ad explicandam Furoris uterini naturam, ordine dicendum est.

1. De effrænata veneris cupiditate simplici.
2. De eadem conjuncta cum delirio melancholico.
3. Demum, de eadem, cum in maniam abit.

Primo Effrænata veneris cupiditas inducitur vividior & fortior succussione organorum, quæ sunt in feminis sedes voluptatis venereæ, haud dispari modo, quo fames aut sitis intensa oritur a validiore impressione ventriculi aut faucium tunicis illata.

Orga-

(e) De Antidotis *Seç. I. Cap. 218.* (f) De affectibus muliebribus, *Cap. 128.*

(g) Nomine minus idoneo, & detorto a consimili virorum affectu.

Organa autem, quæ in feminis voluptati venereæ excitandæ a natura destinantur, plurima sunt.

1. Clitoris, quæ omnium consensu exquisitissima est voluptatis fedes, unde vulgo dicitur *amoris dulcedo*.

2. Tota vaginæ amplitudo, quantum patet, maxime tamen pars ejusdem antica, quæ cum vulva connectitur, & angustissima est.

3. Facies interna ipsiusmet uteri, quæ & ipsa voluptatem sentit, & ad venerem sollicitat, perinde ac in fame & siti intensiore certum est ventriculum e-surire & sitire. Quæ autem de uteri sensu dicimus, possunt inde confirmari quod in animantibus cesset venerea cupiditas, ubi primum utero gerunt; hebescat tunc saltem in feminis, imminuto scilicet uteri sensu.

4. Debent etiam inter organa, quæ veneri favent, recenseri vasa cuncta, quæ secernendo femini vacant in feminis, quippe quæ & ipsa in consortium voluptatis veniunt. Ea autem sunt.

1. Prostrata, qui in feminis urethram ambit, & duobus ostiis seu *lacunis* ad lactera urethræ in partem vulvæ superiorem, subter clitoridem, secretum humorem ubertim profundit.

2. Glandulæ Cowperianæ, quæ in perineo, isthmi instar, inter anum & vulvam intercedente sitæ sunt, & juxta caruncularum myrtiformium radice binoductu patefcunt ad vaginæ principium.

3. Glandulæ plurimæ, solitariae, vel racematim congestæ, quibus vaginæ facies consita est, unde humorem subviscidum femini analogum excerni certum est.

4. Lacunæ variæ, cæcæ, per faciem vaginæ dispersæ, unde depluit humor limpidus & subviscidus, sed paucus.

5. Demum, oscula varia excretoria per internam uteri faciem distributa, e quibus prolicitur in actu venereo humor non paucus, subpinguis, quo uterica-vitas madet.

His præsuppositis, quæ in dubium venire non possunt, consequens est feminas posse vividioribus organorum impressionibus percelli, atque adeo ad venerem magis inflammari tribus de causis.

1. Si succussiones, quæ debent memoratis organis imprimi ad movendum in feminis veneris sensum & desiderium, validiores sint.

2. Si dispositio peculiaris organorum ad excipiendas illas succussiones necessaria ita intendatur, ut excipiantur vividius.

3. Demum, si concursu simultaneo utriusque causæ, & motiones inferantur organis validiores, & ab iisdem excipiantur vividius, unde debent veneris sensus & cupiditas augeri in ratione duplicata.

I. Succussiones, quibus in feminis accenditur veneris desiderium, ad tria revocari possunt.

1. Ad affrictus organorum sæpe memoratorum, blandos, certi gradus & certæ speciei, quibus titillantur.

2. Ad punctiunculas lenes, grataeque, quibus stimulantur.

3. Ad morfiunculas blandas, certæ & determinatæ intensiōis, quibus vellantur. Qualis autem gradus, qualisve species harumce motionum esse debeat, ut sensus venereus inde sequatur, nulla certa ratione definiri potest. Id unum liquido constat differre illas a motionibus aliis earundem partium, quibus dolor inducitur, ut motiones ventriculo & faucibus illatae ad famem & sitim, discrepant a motionibus earundem partium, a quibus dolor.

Jam vero affrictus muliebrium hic locum non habent, quia fiunt a causis extrinsecis, quæ Furorem uterinum non producant; ac proinde in duas alias causas oportet tantum inquirere, punctiunculas scilicet & morfiunculas, quæ eodem

dem proxime recidunt, & quæ inducuntur a femine vel feminali humore depluentibus in vulvam, vaginam, uterum, & illarum partium cavitates perludentibus.

Illæ autem punctiunculæ five morfiunculæ vividiores sunt, atque adeo ad venerem fortius excitulant.

1. Si semen & feminales humores quantitate abundant.

2. Si acrimonia peccent.

3. Si simul abundant copia, & peccent acrimonia.

1. Abundant autem copia, si sanguis ipse, unde scaturiunt, abundet in corpore, ut in feminis.

Quæ laute & opipare vivunt, & edulia jusculeta, polytropa in cibos adhibent. In genere, ait S. Hieronymus, (a) quodcunque cupediarum genus, omnisque ventris saturitas seminarium est veneri amoris.

Quæ mollem & sedentariam vitam vivunt, unde parcior transpiratio, qua sanguinis quantitas non satis exauritur.

Quæ habent organa secernendo semini a natura destinata, ampliora & patientiora ex conformatione nativa, unde uberior illius humoris secretio.

Demum, quæ ex frequenti cum viris consuetudine, & iteratis muliebrium titillationibus, uberiore gaudent seminis proventu. Sic nemini non notum est iterata suctione lac in mammis, & repetito ptyalismo salivam in glandulis salivalibus copiosius secerni.

2. Semen peccat acrimonia præternaturali in feminis.

Quæ sunt temperamenti biliosi, atra-bilarii, & quarum sanguis acer, muriticus, ammoniacalis semen ejusdem conditionis subministrat.

Quæ vescuntur cibis salitis, piperatis, fumo induratis, acrioribus; quæ vinum meracius aut liquores spirituosos bibunt; quæ sese prolunt cocholata aut decocto caffè, quæ singula sunt veneris irritamenta.

Quæ sanguinis fervorem & acrimoniam intendunt vigiliis diutius protractis, aut animi pathematis vehementioribus, quibus sanguis exardescit.

3. Fit concursus utriusque seminis vitii, nempe copię & acrimonię, quoties concurrunt causę a quibus utrumque solet induci, quas quidem, si non omnes, at saltem plerasque non raro concurrere posse manifestum est ex affinitate, quam inter se habent.

II. Dispositio peculiaris, qua organa quælibet ad vividius excipiendas succussiones illatas comparantur, in tribus consistit.

1. In tenuitate & exilitate fibrillarum nervearum, quibus fit, ut ceteris paribus, facilius, celerius, fortius succutiantur:

2. In tensione majore earundem fibrillarum, quæ, ceteris paribus, idem præstat:

3. In simultaneo concursu tum exilitatis, cum tensionis majoris fibrillarum nervearum, unde fit ut earundem oscillatio, ceteris paribus, facilior, celerior, fortior sit in duplicata ratione.

1. Nervę autem muliebrium fibrillę exiliores sunt.

Ex primigenia conformatione; sic constat organa quædam in his sensu gaudere acutiore, quam in aliis subjectis; imo vero in eodem subjecto partes esse quasdam, quæ præ aliis sentiant acutius.

Ex iteratione sæpe repetita prægressarum succussionum, ut in illis quæ frequenti veneris usui vel muliebrium fricationi dudum assuetę sunt, unde fibrę nerveę flexibiliores & vibratiliores fiunt; quemadmodum in instrumentis musicis compertum est fides sive chordas, quæ sæpius pulsatę sunt, acutius sonare.

2. Fibrę eedem magis tensę sunt, unde vibrantur fortius,

A na-

(a) In Epistolam ad Furiam.

A nativa conformatione. Inde repetenda est diversa sentiendi facultas in diversis organis; sic videt ille acutius, audit alter liquidius.

Ab exarescentia, quæ accidit in feminis, quarum loci natura vel morbo sicciore sunt.

Ab inflammatione phlogode muliebrium, qua fibrillæ nerveæ distrahuntur validius. Inducitur autem illa tensio phlogodes vel ab erethismo, in quem fibræ uteri aguntur iteratis punctiōibus & vellicationibus, quas semen acrius infert, vel a catameniis instantibus, maxime si diutius morentur & subsistant.

3. Demum, fibræ illæ nerveæ exiliores sunt & simul nimis tensæ, quoties concurrunt, si non omnes, saltem aliquæ ex causis quas memoravimus; & debent illæ sæpius concurrere propter affinitatem. Quoties autem fit ille concursus, toties inde futurum est ut sensus rei veneræ intendatur in ratione duplicata tum nimie exilitatis, tum majoris tensionis fibrillarum nervearum.

III. Porro tandem, si contingat duas causas hætenus recensitas, quarum altera a feminis copia vel acrimonia, altera a nimia fibrillarum exilitate vel tensione dependet, una concurrere, ut plerumque solent, quoniam affines sunt, fiet inde ut *hinc* femine acriore & copiosiore nerveæ muliebrium fibrillæ fortius laceffantur; & *illinc* simul motiones, quæ illis inferuntur, excipiantur vividius, quia, cum sint exiliores & nimium tensæ, magis vibratiles sunt; unde consequens est fore ut veneris sensus cupiditasque intendatur in ratione duplicata utriusque causæ.

Secundo. Hætenus de effrænata in venerem propensione diximus, qualis in *primo* morbi stadio, quæ tamen Furorem uterinum non facit, nisi superveniat delirium, saltem melancholicum, de quo jam dicendum, sed paucis.

Itaque 1. Ægrotæ, utcumque veneris cupiditate ardeant, quamdiu sui compotes sunt, ex naturalia dissonantia seu heterochronia fibrarum cerebri, quibus in mente refricantur ideæ tum subjecti, tum attributi huiusce propositionis, *libidini obsequi nec honestum, nec licitum est*, id verum esse omni asseveratione affirmant, neque ab ea opinione dimoventur unquam, quantumvis æstuent libidinis ardore.

2. Sed iteratis ac frequentissimis fibrarum illarum succussionibus, quæ simul fiunt, accidit tamen, ut fibræ accessu mutuo ad eundem tonum perveniant, & ex dissonis consonæ, seu quod eodem recidit, ex heterochronis evadant isochronæ, unde ægræ mutata opinione, jam sibi suadeant *libidini obsequi haud turpe esse*, & inde *delirium melancholicum*, quod *secundum morbi stadium* constituit.

3. In principio tamen, præternaturalis illa fibrarum consonantia morbo inducta, sibi non constat perpetuo, sed varie variat diversis de causis, si veneris cupiditas hebescat; si somni quiete præcípites fibrarum motiones compescantur; si anodynorum usu fibræ relaxentur; si fervor nimius sanguinis tepescat; si ægræ monitis, objurgationibus, imo verberibus ad officium revocatæ resipiscant, unde est quod delirium melancholicum in illo morbi stadio plerumque mutabile sit, vehementia & intensione, & pariter mutabilia quoque ægræ dicta, factaque.

Tertio. Sed omnia in deterius ruunt in *tertio* morbi stadio, in quo

1. Quidem, ut morbi diuturnitate, inter se tono perfecte mutantur fibræ, quæ representant ideas subjecti & attributi propositionis allatæ, sic illæ tono quoque mutantur simul cum aliis fibris non paucis, quibus excitantur ideæ variegatæ, quæ ad venerem pertinent, ita ut jam consonent cum fibris multis, quibuscum dissonabant antea, unde egræ debent ex illa fibrarum mutatione affirmare, quæ negabant, & negare, quæ affirmabant, & hinc delirium varium & multiplex, cui Furor brevi quoque accedet, quippe egræ, a recta ratione deviat,

vię, & vehementiore spirituum motu concitate in omnes impetum facient furiate, quos omnes vident sibi adversari, atque inde *Delirium* vere *Maniacum*.

2. Notandum tamen in Mania, quę Furorem uterinum facit, delirium tametsi latius pateat, quam melancholicum, non esse universale, sed circa pauciora aliquot objecta versari, quę ad res venereas pertinent, ut modo dicebamus, unde prima mali labes, quod Manię uterinę non proprium est, sed convenit in omnem Maniam *deuteropathicam*, quę delirium melancholicum consequitur; contra quam accidit in Mania *protopatica*, in qua delirium multo latius patet. Sed hęc indicasse sufficiat, quę fusius & dilucidius explicabuntur in Tractatu *de Morbis Capitis*, quem brevi edituros esse speramus, si Deus vitam & otium dederit.

§. III.

Differentiæ.

QUamquam Furor uterinus morbus sit natura satis sibi constans, suas tamen patitur differentias, non essentielles quidem, sed quas tamen oportet præcognitas habere ad pleniorē morbi notitiā.

Itaque Furor uterinus.

I. Distinguitur ratione status, sive stadii:

1. In *Incipientem*, in quo immodica quidem salacitas adest, sed quam egrę, adhuc sui compotes & turpitudinis conscię quam abhorrent, fortiter reprimunt, vel caute contegunt.

2. In *Confirmatum* cum delirio melancholico, in quo invalescente morbo, salacitas ita effrenata est, ut egrę jam delirę, deposita verecundia, si sui copia ultro non offerunt, at saltem se ad opus parata esse satis significant gestu, lascivia, viva voce.

3. In *Deploratum* cum delirio maniaco, in quo morbus in Maniam erumpit, hoc est, in delirium magis universale cum furore, atque adeo in quo, deposita omni pudore, egrę, impotenti animo, plane vecordes viros quoscunque ad concumbendum sollicitant & urgent, & si renuant, in illo insiliunt furibundę.

II. Distinguitur ratione causę in Furorem:

1. Qui a *vitio seminis fibrillarum*, copiosioris vel acrioris, vel acrioris simul, & copiosioris, unde aucta in venerem stimulatio.

2. Qui a *vitio fibrillarum* nervearum mulieribus intextarum, quę solito vibratiliores sunt ob exilitatem, vel ob tensionem, vel ob tensionem simul & exilitatem, unde vividior sensus venerei perceptio.

3. Demum, qui a *vitio* tum *seminis*, tum *muliebrium*, in quo omnia sunt magis intensa in ratione duplicata causarum simplicium.

III. Distinguitur ratione symptomatum, quę superveniunt:

1. In Furorem *uterinum sine delirio*, qualis est in primo stadio, dum incipit.

2. In Furorem *uterinum cum delirio melancholico*, qualis est in secundo stadio, sive confirmatus.

3. In Furorem *uterinum cum delirio maniaco*, qualis est in stadio tertio, jam deploratus.

§. IV.

Symptomata.

Symptomata Furoris uterini diversa sunt pro diverso morbi stadio, sed cuncta ex proposita theoria facili negotio deducuntur, ceu totidem confectionaria.

I. In primo stadio,

1. Aegræ sentiunt invite se flagrare libidine, sed sibi probe conscię turpe & probrosum esse desiderii istiusmodi obsequi, herent anxie, solitarie, segetes, mestę, meditabundę, tacite.

2. Si nihilominus obscenis cogitationibus perpetuo defixę obtusius afficiuntur ab aliis quibuscumque sensationibus, a fame etiam & siti, & inde est quod illę nec esuriant, nec sitiant, quantacumque sit esuriendi & sitiendi causa.

3. Imo vero tam vivida est illa de rebus venereis meditatio, qua perpetuo detinentur, ut fibrę cerebri, quibus illarum rerum ideę refricantur, fortiter tensę sine intermissione oscillent, ex quo fit ut illę præter naturam vigilantes sint.

4. Interim turpitudinis suę conscię, & adhuc dum mentis integre cupiditatem qua æstuant, conantur continere, vel caute contegere.

5. At vero si incederit sermo procacior, si quid blanditiarum audiant, si se illecebris tentari putent, animi impotentes male tecta desideria cito manifestant.

6. Solet tamen in illo stadio morbus inducias interdum habere, quas adhibita remedia, aeris vel tempestatis mutatio, dięta accuratior, critica quædam evacuatio producant, & in quibus egrotę consideratius se gerunt, & videntur resipiscere, quamquam raro perfecte; sed dilucidis illis intervallis nimium non fidendum, quippe quibus morbus recidivus brevi succedat, priore peior, & intensior.

II. In secundo stadio,

1. Invalescente morbo, incipiunt tono ita perverti, ut supradictum est, fibrę cerebri, quę rebus venereis refricandis natura destinatę sunt, ut cum egrę certo conscirent antea *licitum non esse libidini se dedere*, jam ex errore novo, quod est principium delirii melancholici, hæreant ancipites, & interdum mente consistere videantur, insanam cupiditatem reprimendo; interdum vero deposita verecundia, libidini conentur obsequi, obvios quoscumque procaciter alliciendo, vel aperte rogando.

Si qua spes eis effulgeat fore ut adipiscantur quod cupide desiderant, hilares garriunt, blandiuntur, quos detinent, ut properent, postulant, rogant, errore ductę quo tunc cęcantur. At si sentiant spe sua se deludi, mærentes & querulę recedunt mustitando.

3. Verum omnia in dies magis ingravescent, & naturalis fibrarum tonus ita tandem pervertitur, ut illarum dissonantia abeat in perfectam consonantiam, atque adeo ægrę tunc firmam sibi persuasionem inducant *facile posse se libidini dedere*, & proinde dicant faciantque omnia, quę suadet turpissimus mentis error.

III. In tertio stadio,

1. Morbus in Maniam recidit, ut modo dictum est, & ægrę mente alienatę, maxime circa ea quę ad rem veneream pertinent, obscena, impudica verba proferunt continuo, obvios quosvis notos, ignotosve, ad opus sollicitant, cunctantes urgent & compellunt, & si pertinacius reluctentur, eos pugnis & unguibus impetunt furibundę.

2. Por-

2. Porro accedunt cetera symptomata, quæ Maniam comitari solent, ut agrypnia constans, famis, & sitis defectus, fervor totius corporis, sed sine febre, frigoris tolerantia, alvi pigrities, urinarum paucitas, spissitudo, color croceus, &c. quibus explicandis superfedemus, cum non sint hujus loci.

IV. Præter hæc adfunt alia symptomata, quæ ad omnia morbi stadia perinde pertinere videntur. Sic,

1. Vellicatio fortior, quam semen acrius utero & vaginæ infert, erethismos ferre continuos illarum partium ciet, unde convulsive contractæ vasa stringunt circumflua, cursum sanguinis morantur, atque adeo locum dant phlogosi, qualem pluries in cadaveribus metromaniacarum (a) observatam fuisse legimus. Ea autem phlogosis, ut interdum morbi causam esse supra vidimus, sic aliquando merum est illius symptoma, sed quo, si superveniat, morbi vehementia multum intenditur.

2. Inde minime mirum, si ferveant in Metromania, & exarescant muliebria, si uteri & vaginæ parietes seu tunica rigeant, si vagina a rigentibus tunicis distenta tentiginæ (b) hiat perpetuo & adaperata sit, quæ singula Observatione comperta sunt.

3. Vero consentaneum est inde quoque venire, quod in Metromaniacis Clitoris (c) valde turgeat solito grandior; quod ovaria ambo, vel alterutrum, tumeant præternaturaliter humore spisso, viscido, purulento; vel oculis naturalem molem excedentibus plena sint; quod tubæ ipsamet similem labem non raro participant, ut in pluribus egrotis morbo defunctis (d) observatum est.

4. In metromaniacis virus distillat aliquando ab inguine, sive quod petulcis digitis locos contrectando perpetuo, ut venerem sollicitent, quid paucum scabendo eliciant spissum viscidumque, quod e vulva manat; sive quod ab ulcere fistuloso uteri vel vaginæ quid purulentum profundatur.

5. Liquet ex dictis in Furore uterino tumores, steatomata, hydatides, apostemata, puris colluviem, phlogosim uteri, & partium quæ utero confinesunt, sæpenumero morbum antecedere tamquam causas, vel subsequi tamquam symptomata; & quoties alterutrum evenit, quomodocumque eveniat, toties morbum induci, qui curationem nullam admittit absolutoriam, sed ex quo egrotantes, post cruciatus varios plurimosque, misera morte, tardius ciutiusve intereunt.

§. V.

Diagnosis.

I. **D**iagnosis morbi evidens est signis pathognomonicis, quæ recensuimus, nempe salacitate effrenata, delirio melancholico circa venerea, & delirio maniaco, quod melancholico succedit.

II. *Diagnosis statuum seu stadiorum morbi non minus obvia.*

1. Si adsit sola salacitas effrenata, quam ægræ quidem mentis adhuc integræ contentur continere, aut saltem contegere, sed cujus tamen interdum non obscura præbeant indicia, primus erit morbi status, seu primum stadium.

2. Si

(a) Josephus Lanzonus, *Miscellan. Natur. Curiosors* Decur. III. Ann. 5. & 6.
 (b) Christian. de Helvich, *Ephemerid. German. Centur. I. & II. pag. 310.*
 (c) Clitoris tumet etiam in Metromaniacis propter frictionem, quæ abuntantur.
 (d) Joh. Michaelis *Praxis Clinica Specialis* Casu 22. Dominicus le Duc, *Zodiaci Medico gallici Ann. Observat. 7.* Fridericus Lochnerus, *Ephemerid. Germanicar. Centur. VII. & VIII.* Stephanus Blancardus, *Anatom. Practica Centur. II. Observat. 99.* Item *Collectanea Medic-ophydæ, Part. I. Observat. 28.* Carolus Philippus Gesnerus, *Actor. Physica medicor. Volum. VII. Observat. 30.*

2. Si invalescente lascivia incipiant desipere, & delirio teneantur melancholico circa res venereas, ac eam persuasionem in animum inducant *haud turpe esse libidini se dedere*, atque adeo ex opinione impure errante se gerant, adest *secundus morbi status*, seu *secundum stadium*.

3. Si furore actæ absurda deblaterent varia, seu delirent cum furore circa plura, uno verbo, si maniacæ sint, obvios quoscunque compellant ad opus, impudicis gestibus eos alliciant, & si reluctantur, incessant furiosæ, morbus tunc ad *tertium statum* seu *tertium stadium* pervenit.

III. *Diagnosıs causarum* morbi vere ardua foret, si opus esset eas accuratius dignoscere, sed ea diligentia nullam præbet utilitatem ad curationem, tum quia ambæ morbi causæ, vitia uteri cum vitiis feminis plerumque concurrunt, atque ideo simul methodo eadem curandæ veniunt; tum quia si non concurrant, quod nec frequens est, nec diuturnum esse potest, eadem vel affinia postulant remedia.

§. VI.

Prognosis.

Metromania sive Furor uterinus morbus est probrosus & dedecorofus, cuius ignominia non solum in ægrotas recidit, sed in propinquos etiam redundat.

In genere semper curatu difficilis est, quod cum delirio quovis commune habet, & tanto difficilior, quanto magis inveteratus. Quod si velis singula curiosius persequi, oportet diversos morbi status distinguere.

I. In *primo*, morbus, ut plurimum sanabilis est, dummodo diligenter accito illi occurratur, cum nondum accessit delirium. Frustra enim conaberis mederi, si tardius mederi cœperis, nec ullum aliud malum esse puto, in quo verius sit verbum illud, quod vulgo dicitur:

*Principiis obsta, sero Medicina paratur,
Cum mala per longas invaluere moras.*

II. In *secundo*, ubi primum adest delirium melancholicum, malum est fere immedicabile, quod tandem in fatuitatem & stultitiam abit, nisi mortem inferat celeriozem. Nonnumquam spes aliqua sanationis affulgere videtur, si morbus inducias habeat frequentes, diuturnas, dilucidas, sed quibus numquam fides certa, & sine ullo recidivæ metu, quoniam semper periculum est, ne male sopitum incendium resurgat.

III. In *tertio* demum, in quo Mania, morbus insanabilis merito censetur, cum vix spes ulla sit, fore ut ægrotæ ad saniozem mentem revocentur, sed omnes absumantur (a) apostemate, ulcere, syrrho uteri, tubarum, ovariorum, quæ vitia Metromania intulit; vel in stoliditatem & amentiam morbi diuturnitate delabantur, donec mortem obeant.

IV. Indubitatis Observationibus comperta sunt sequentia, quæ ad prognosim faciunt, & quæ ideo recensere visum est.

Metromaniam sponte solvi,

1. Si

(a) Vide Auctores supra laudatos, ad Symptoma 3. Art. IV. §. IV. p. 365.

1. Si ægrota laboraverit immodico (b) catameniorum profluvio, seu hæmorrhagia uterina, quod inde emollita, & relaxata uteri facie, veneris sensus re-tundatur.

2. Si largior supervenerit hæmorrhoidum fluxus, quod per anastomases, quibus vasa inter se communicant, venę uteri exinaniantur dum hæmorrhoides fluunt, uterusque inde detumescat, & relaxetur.

3. Si fluore muliebri largo, & diuturno ægotans colliquefcat, quo uterus madefit, & temperatur, atque adeo libidinis stimulis debilius patet.

4. Si ægra (c) imprægnetur, quod humor embryi secundinis contentus, & inde resudans, uteri tunicas emolliat, & relaxet, & ad libidinis incentiva reddat hebetiores, sed facilis est morbi recidiva, nisi intra unum, aut alterum annum a puerperio iterum gravida fiat.

5. Si strenue subagitetur, quod felicem quidem successum pluries habuit in ipso (d) matrimonio; sed multo felicior, si vera narrant, (e) venere vul-givaga, quoties accidit ut ægræ, quæ fugitivæ vagabantur, a nebulonibus pluribus compressæ fuerint.

6. Si uterus casu procidens aeri permittatur, dum infrigidetur. Id relatum quidem novi ab Harveo solo, sed qui unus instar plurium est. Novi, (f) inquit ille, *feminam nobilem, a furore, & melancholia uterina ultra decennium delirantem, cui postquam omnia frustra tentata essent, contigit uteri prolapsus . . . Auctor fui, pergit ille, ut uterus non reponeretur, donec a frigore externo intem-peries ejus deferbuisset. Successit res ex sententia, brevique postea convaleuit, atque uterus demum loco suo restitutus permansit, vitamque etiamnum salubriter degit.*

§. VII.

Curatio.

Quot sunt stadia in Furore uterino, totidem sunt morbi peculiare, qui quantumcumque affines esse videantur, & ab eadem causa inducti, ratio-ne tamen paullisper diversa, si non specie at saltem gradu, debent im-pugnari, quam ideo distinctis articulis explicare necessum est.

Curatio in primo Morbi stadio.

In illo morbi statu debent indicationes omnes eo intendere,

1. Ut sanguis acrior, semenque inde deciduum, & ejusdem vitii particeps, diluantur, & demulceantur.

2. Ut tota uteri, & vaginæ facies interna humefiat, & relaxetur, ad salaci-tatem morbosam, & effrenatam compescendam.

3. Ut interim ægrotę, quoad ejus fieri potest, ab oscenis cogitationibus evo-centur, & in viam regressę animum ad saniora adjiciant, quę singula sequen-tibus auxiliis possunt obtine ri.

I. Ad

(b) Alexander Benedictus; de Curand. Morb. Libr. I. Cap. 28.

(c) Dominicus Panarolus, Pentecost. III. Observ. 9. Johannes Matthæus de Gradibus, Consilio 8.

(d) Zacutus Lusitanus. Prax. Medic. Admir. Lib. II. Observ. 91. Johannes Riolanus, pater, Method. Medendi Sect. IV. Tractat. 2. Cap. 21. Dominicus Leo, Art. Medendi Libr. II. Cap. 9. Ambrosius Stegmannus, Ephemerid. Germanic. Decur. III. Ann. I. Observ. 11.

(e) Alexander Benedictus, de Curand. Morb. Libr. I. Cap. 28. Thomas Bartholinus Observat. Anatom. Cent. II. Observat. 69. Christoph. Johann. Langius, Praxeos. Medic. Cap. 24. §. XV. Ubi laudat Observationem Plateri. (f) De Partu, extremo Libro.

I. Ad diluendum, & demulcendum tum sanguinem, tum semen, profunt,
 1. Sanguis missus e brachio, nisi exiturientia, vel exeuntia catamenia e mal-
 leolo mittendum esse suadeant. Oportet autem sanguinem largius, & frequen-
 tius mittere, pro ratione ætatis, temperamenti, virium ægrotantium, & pro
 symptomatum vehementia.

2. Catharsis frequens cum purgantibus mitioribus, quorum virtus, & efficacia
 sit idonea deducendæ primarum viarum cacochyliæ, & evacuandæ cacochymia
 sanguinis, sed quæ intestinis irritandis, convellendis, in spasmos agendis mi-
 nime par sit, ne uterus in consensum trahatur.

3. Usus jusculorum aut apozematum, quæ fiunt

Cum radicibus Nymphææ
 Althææ
 Cichorei
 Acetosæ

} ad ʒj.

Cum foliis Nymphææ
 Lactucæ,
 Portulacæ
 Salicis,
 Lenticulæ palustris.

} ad m. j.

Cicutæ ad pugillos ij.

Cum floribus Nymphææ
 Malvæ,
 Papaveris,
 Violarum

} ad pug. ij. vel iij.

Ex quibus tria, quatorve seligi debent, quæ magis probabuntur, & ex illis
 confici juscula vel apozemata, ut artis est, bis in die, mane, & vesperi, lon-
 ge a pastu per plures dies continuos exhibenda, addendo cuilibet salem prunel-
 læ, crySTALLUM mineralem, vel salem sedativum Hombergii, ad ʒj.

4. Serum lactis clarificatum, & cartha bibula percolatum ad cyathos sive
 haustus quatuor in die, sed longe a pastu, in quorum unoquoque potest inco-
 qui uncia una radicis nymphææ, in talleolas dissectæ, vel dilui syrapi de nym-
 phæa semuncia. Proderit efficacius idem serum, si pro omni potu exhibeatur,
 modo ægrotæ non repugnent.

5. Lac asininum, bis in die sumptum ad uncias novem vel decem, mane &
 vesperi, si ventriculus illud concoquat. Imo vero, si ægrotæ obsequiosæ sint,
 & tædio hujus diætæ se faciles præstent, conducilius erit lac pro omni ali-
 mento adhibere, & loco tum prandii, tum cenæ, ultra haustum lactis asinini
 matutinum, & vespertinum, haustus alios duos lactis vaccini, vel edulia varia
 lacte illo præparata exhibere.

6. Emulsiones bis in die mane & vesperi, quarum haustus quilibet fieri po-
 test ex seminibus quatuor frigidis majoribus ad ʒjss. vel ex

Semine Lactucæ,
Portulacæ,
Papaveris albi,
Cannabis.

} a ℥iij. ad iv.

Quæ contusa in mortario marmoreo diluuntur,

In aquis Distillatis
Nymphææ,
Lactucæ,
Portulacæ,
Endiviæ.

} ab ℥iv. ad v.

In colatura dissolvitur

Syrupus Violaceus,
Nymphææ,
Althææ

} ad ℥j.

Solent ex illis feminibus, aquis & syrūpis eligi, quæ maxime probantur, numero tamen pauciora, & ea dosi, quæ nec nimis amplum, nec æquo spissiorē haustum faciat.

7. Aquæ minerales acidulæ & chalybeatæ potandæ per mensem, si tempestas faveat, quotidie a Libris II. ad III., addito in primis haustibus sale quodam cathartico, v. g. sale *de duobus* ad ℥iij, sale Polycresto Rupellensi ad ℥ss, sale Epsomensi eadem dosi. Inter aquas istiusmodi commendantur maxime inter nostrates, aquæ de *Vals*, de *Caransac*, de *Bussan*, de *Pougues*, de *Forges*, & inter exoticas, aquæ de *Spa*, de *Selter*.

8. Diata accurata, juxta quam ex artis legibus, debent ægræ iis potissimum cibis uti, qui humectent, temperent, diluant, refrigerent, ut sunt Olera varia,

Cucumeres,
Mellones,
Borrago,
Beta,
Endivia,

Lactuca,
Portulaca,
Cichorium,
Spinachia,
Atriplex.

Et Fructus horæi, ut

Cerasa
Fraga,
Poma dulcia,

Uvæ maturæ,
Pruna dulcia,
Ribesia,

Demum offæ vel cremores oryzæ, cum jusculo tenuiore ex carne vitulina vel gallina juniore.

Interdicendæ vino, chocolata, decocto caffè, & carnibus omnibus, si vitulinam, pullosque & cuniculos juniores excipias.

Demum exhibenda narcotica, quæ somnum concilient, si morbo parcius sit breviorque.

9. Possunt proposita remedia, si videbitur, vel vicissim commutari, vel conjunctim præscribi, modo invicem congruant; sed oportet illis diu insistere, neque enim existimandum est, vitium tenax & vix emendabile, universæ humorum massæ alte inustum posse facili negotio corrigi, aut in melius verti.

II. Humefaciendo & relaxando utero apprime conducunt interna remedia, de quibus jam abunde diximus, sed multo efficacius externa seu topica, quæ sequuntur,

1. Balnea vel semicupia in aqua fluviali egelida, in qua incocta fuerint folia plantarum emollientium, quas modo recensuimus *Articulo præcedente*, n. 3. In illa ægræ bis in die demitti solent, & ibi contineri per duas horas, jussæ manu vel spongia aquam in muliebria alte propellere, qua proluantur.

2. Clysteres frequenter injiciendi,

Ex fero Lactis,

Ex decocto, Lactucæ,
Portulacæ,
Umbilici Veneris,
Sempervivi,
Nymphææ,
Foliorum Salicis,
Viticis,

Quibus potest Oxycratum ad uncias aliquot addi. Ceterum semel recepti, debent diu contineri, ut refrigerationi & humefactioni interaneorum tanto certior locus detur.

3. Immissæ per metrenchyten injectiones subtepidæ.

Seri Lactis

Decocti Hordei,
Lactucæ,
Aliarumve plantarum modo recensitarum,

Quæ debent in uteri cavitatem caute propelli, si illius os dehiscat, ut in illis plerumque solet, & in eo aliquandiu subsistere, ægris ad situm congruum compositis. Si morbus urgeat, præderit singulis injectionis unciis addere semidrachmam, vel drachmam unam succi Solani, *Morellæ* dicti, Sempervivi, imo etiam Cicutæ.

4. Pessaria in vaginam intrusa, quæ varie conficiuntur, nam modo telæ particula in formam rotuli convoluta, vel spongia mollis in longitudinem secta, spisso & frigido decocto herbarum aliquot emollientium, quas recensuimus, imbuta, vaginæ insinuatur; modo vero sacculus oblongus linteus, plenus pulpæ earundem plantarum, in vaginam intromittitur; sed qualiacumque fuerint, oportet introducta pessaria identidem remove, & recentia reponere, ne mora nimis incalescant.

5. Hirundines, plures paucioresve, prout opus esse videbitur, margini podicis admotæ, maxime si phlogosi tumeat, quoniam illarum suctione sanguis ab uteri vasis revellitur, quibus cum venæ hæmorrhoidales multiplici anastomosi communicant, unde depletis vasis substantia uteri relaxatur. Non is ego sum, qui velim id auxilii genus prædicare tanquam absolutorium, sed cum juvare aliquando possit, numquam lædere, noluerim illud omitti.

Astruc de Morbis Mulierum.

L

III. Dum

III. Dum tentantur remedia, omni ope & opera annitendum, ut ægræ ab obscenis cogitationibus avocentur, & melancholiæ modum ponant, in quem finem,

1. Crebris cohortationibus, monitionibus, increpationibus excitandæ, erudiendæ, continendæ sunt, ut ipsæ suam lasciviam perhorrescant, & pudore suffusæ desideria sua refrænent, & tandem e corde evadant.

2. Curandum, ut consuetudinem jungant cum sodalibus prudentibus, probatæ virtutis, sed festivis & hilaribus, quibuscum possint lepide & urbane versari, & quarum exemplo & colloquio ad saniores mentes paulatim reducantur.

3. Occupandus illarum animus ambulatione, chorea, epulatione, villicatione, peregrinatione, ut omni gaudio expletæ ab obscenis cogitationibus, in quibus defixæ sunt, destineantur. Præstaret quidem negotia domestica illis demandare, si sedulo operam dare vellent, sed plerumque vel nolunt, vel nequeunt.

4. Caute illis interdicens omni de re venerea colloquio, libris amatoriiis, lascivis canticis; & sedulo cavendum ne viris ullis utantur familiarius, nec in consuetudinem ullum admittant omnino, præsertim eos quorum amore teneri videbuntur.

5. Prospiciendum, ut non incubent culcitæ plumæ, *lit de plume*, vel lanæ, *metelas*, unde lumbi ardentius incalescerent, atque adeo æstus muliebrium, qui jam nimius est, magis intenderetur; sed culcitæ stramento molliore plenæ, *une paille*, vel ad summum seta equina, vulgo *crin*, fartæ.

6. Ultimo, si hæc ex optato non proficiant, omiſſa cunctatione connubio jungendæ, si non obſtet vitæ institutum, cum amariſis quidem ſuis, ſi commodum fuerit; ſin minus, cum adoleſcentibus venuſtis, qui amabiles ſint, ſi non amati, quæ Medicina in illo morbi ſtadio certiffima eſt & efficaciffima, ut ſupra dictum eſt, §. VI. *De Prognofi*, n. 5.

In ſecundo ſtadio,

Cum, accedente delirio melancholico, omnia tunc in pejus ruant, neceſſum eſt remedia adhibere diligentius, majore doſi, & ſelecta inter efficaciffima, ſed ex iifdem tamen familiis, cum indicationes curatoria eadem ſint.

Itaque

1. Balneatio adhibenda frequentior & bis in die, in aqua ſubfrigida, capiti iterato ſuper ſuperfuenda, in qua ægræ per duas horas detinendæ ſi fieri poſſit.

2. Oportet experiri omnia remediorum genera in præcedente ſtadio propoſita, ſanguinis miſſiones frequentes, ſerum lactis pro omni potu, vel pthiſanas valde refrigerantes, juſcula aut apozemata diluentia, & temperantia, emulſiones aut julepos, aquas minerales, &c., quibus diu eſt inſiſtendum, ut morbi ferocia debelletur vel ſaltem retundatur.

3. Curandum ut ægrotis nutritio ſufficiens, imo larga ſubminiſtretur, ſed ex alimentis eupeptis, & refrigerantibus, qualia propoſuimus in præcedente ſtadio.

4. Si noctes ducant inſomnes, aut irrequietas, narcotica exhibenda ſunt doſi modo congrua, inter quas primas tenent tinctura anodyna, a gutt. xxiv. ad gutt. xxx. vel laudanum opiatum, a gr. i. ad gr. ii.

5. Purgari debent frequentius, & catharticiſ validioribus, ſcilicet in forma liquida, cum decocto ℥iij follicorum ſennæ, & ℥ij ſalis de duobus in colatura diſſol-

dissolvendo ℥ij & addendo Diagridii gr. x. vel xv. In *forma vero solida* cum bolo ex Diagridii & Jalappii pulverati *ana.* gr. xij. additis gr. viii radicis Hellefiori nigri pulveratæ, ea cautione, ut dum operatur medicina, exhibeatur unaquaque hora haustus jusculi levioris carnis vitulinæ cum foliis aliquot cicchorei coctæ.

In tertio stadio.

Ubi primum Mania supervenit, morbus fere deploratus est, neque tamen omnis ægrotantium cura ideo deponenda, sed contra eo diligentius enitendum est, ut illarum miseriis, quoad ejus fieri poterit, quid levamenti conferatur.

In quem finem,

1. Frequenti balneatione opus est in aqua frigida, quæ capiti iteratis vicibus debet superfundi, & in qua ægræ detinendæ sunt quandiu vires sufficient.

2. Sanguis largiter & pluries mittendus, e brachio, e talo, e collo, donec imminutis viribus reprimatur ægrotantium furor, & suæ debilitatis conscia famulantium monitis sint magis obsequiosa.

3. Mochlica purgatio sæpius iteranda cum catharticiis drasticiis, aut cum vomitoriis, qua quicquid vitiosum inest non solum intestinalibus viis, sed etiam visceribus omnibus, quæ cum intestinis communicant, efficaciter subducatur.

4. Uterus fervens injecto oxycrato frigido vel parum tepido temperandus est identidem, si ægræ huic remedio se faciles præstant, ut se plerumque præstant, quoniam ipsæ querunt remedia adversus pruritum & calorem uteri, quibus se cruciari sentiunt.

5. Ægris, si nocte insomnes ducant, ut fere perpetuum est, narcotica exhibenda, dosi quidem magna, quæ somno conciliando par sit, sed quam necessum est partitis vicibus dare per intervalla, ne quid detrimenti succedat a nimia dosi simul & semel data.

6. Curandum, ut utantur victu largo, sed eupepto & refrigerante; ac demum si vehementius ferociant, verberibus mulcendæ, imo vinculis coercendæ, ne violentas manus sibi vel adstantibus inferant.

§. VIII.

Remedia quædam, quæ adversus Furorem uterinum commendantur.

I. **A** Plerisque (a) Medicorum certatim laudatur Camphora, seu specifica ad libidinis æstus compescendos in Furore uterino. Datur in substantia a gr. x. ad xv. in quocunque vehiculo, vel forma boli. Aliquando illius frustulum granorum duodecim inflammatum in haustum aquæ projicitur, quideinde exhibetur potandus.

Miror undenam nata sit ea opinio de virtute Camphoræ anti-aphrodisiaca; an ex decantatissimo illo versiculo,

Camphora per nares castrat odore mares,

qui non alio nitebatur fundamento, quam præjudicio falso, quo Camphora qualitate frigida esse censebatur, quam tamen constat calidam esse.

Ipse quidem experientia compertum habeo vulgarem de Camphoræ virtute opinionem, si non falsa sit, at certe perpetuo veram non esse, nam in feminis duabus ab utero furentibus Camphoram frustra adhibui & pluries, & magnis dosibus.

II. Si Ettmullerus (*b*) audiatur, Furori uterino prodest efficaciter liquor limpidus & aquosus, qui extillat *e teneriobus salcium ramis*, dum verno tempore amputantur. Propinatur autem ille succus, vel solus, vel ex farina illo subacta placenta conficitur, quæ ægotæ data omnem ad venerem propensionem extinguit. Idem etiam facit, pergit ille, decoctum salicis junioris, aliquoties epotum jejuno stomacho, nam & hoc omnem appetitum venereum cohibet, quin & interdum mulieres omnino steriles facit.

Tam disertis promissionibus plene persuasus in feminis iisdem non liquoris ex resectis salicum ramis depluentis, qui non erat ad manum autumnali tempestate, dum illas ope medica conabar adjuvare, sed decocti foliorum salicis periculum feci iterato & magna dosi, at vero ne hilum quidem me profecisse memini.

III. Agnus castus sive Vitex ad compescendos libidinis stimulos celebratissimus est. Decoquitur in jusculis, apozematis, pthifanis, aut injectionibus uterinis. Illius virtutem usu nondum exploravi, sed vim ejus anti-aphrodisiacam merito dubiam reddunt amaror & acrimonia, quæ in masticatis foliis & præsertim seminibus percipiuntur. Adde quod Vitex ad menses ciendos (*c*) usurpetur, argumento maximo illum virtute anti-aphrodisiaca minime pollere. Porro tamen, cum ex ejus usu nihil discriminis impendeat, causa nulla est cur non liceat unicuique pro lubitu periclitari, si occasio fuerit.

IV. Vidimus supra in curatione stadii primi opus esse ut ægotæ incubent culcitis stramento molliore plenis. Volunt autem, qui viticis efficaciam laudant, ut ex foliis ejusdem ficcis ægrarum culcitæ infarciantur; exemplo scilicet ducto ab Atheniensibus Matronis, quæ in Thesmophoriis, seu sacris Cereris castitatem custodientes, foliis viticis seu Agni casti cubitus sibi sternebant, referente (*d*) Plinio, & (*e*) Dioscoride, cui consilio non repugnayero, quamvis de virtute viticis mihi certo non constet, modo prius monuero quotidianum laborem inde impendere in reficiendis culcitis, quoniam sicca viticis folia in pulverem cito resolvuntur.

V. Medici, qui de Furore uterino differuerunt ceteris diligentius, (*f*) Sennertus, (*g*) Riveriusque, inter alia simplicia vere anti-aphrodisiaca, nonnulla numerant, quorum potestas longe dispar, ut Anetum, semen Dauci, lignum Aloes, Rutam, Mentham, ipsam etiam Terebinthinam, &c. quæ cum acria sint, & ad menses movendos efficacia, immoderatam veneris cupiditatem potius inflammare, quam mitigare valent, qua de re monere visum est, ne quis tantorum Virorum auctoritate motus, imprudens credat remedia istiusmodi adversus Furorem uterinum cum successu adhiberi posse.

VI. Ii-

(*b*) Ibidem. (*c*) Dioscorides, Lib. I. Cap. 135.

(*d*) Hist. Natural. Lib. XXIV. Cap. 9.

(*e*) Lib. I. Cap. 135.

(*f*) Practio. Lib. V. Part. II. Sect. 3. Cap. 5.

(*g*) Praxeos, Lib. XV. Cap. 5.

VI. Idem encomiis nimium extollunt remedia quædam, quæ spes datas minime impletura esse videntur. Sic Sennertus^(h) laudat aquam quamdam, quam *castitatis* appellat, & quæ species est Julapi ex commistis aquis distillatis.

℥ Aquar. *Menthæ*, *Chelidonie*, *Anethi*, *Liliorum convallium*, *Liliorum alborum*, *Nymphææ*, ana. ℥j. M. Dosis unc. ij vel iij.

Laudat idem aquam aliam ex plantis pluribus distillatam, quæ sequitur.

℥ Fol. *Nymph.* *Vitic.* *Salic.* ana. m. iij.
Lactuc. *Portulac.* *Umbilic.* *Veneris*, ana. m. j.
Semin. *Lactuc.* *Papaver.* quatuor *Frigidorum majorum*, ana. ℥ss.
Aneth. ℥ ij.
Florum Nymph. m. j.
Violar. m. ss.

Contundantur omnia recentia, & irrorentur succo Limonum, ac stent in digestionem horis 24; postea distillantur, & distillati singulis libris add. *Camphoræ* ℥j. Servetur ad usum. Dosis ℥ j.

Quod totidem verbis apud ⁽ⁱ⁾ Riverium legere est. Sed hæc ambo remedia in Furore uterino parum prodesse puto gemina de causa,

1. Quod in compositionem admittant plantas aliquot, ut *Menthæ*, *Chelidoniæ*, *Anethum*, augendæ potius quam sedandæ veneri natas:

2. Quod certum sit aquas ex plantis distillatas minus valere, quam earumdem decocta, quamobrem in usum non veniunt, nisi cum plantæ recentes deficiunt.

VII. *Cicuta* ab omnibus Medicis antiquioribus commendatur ad Furorem uterinum, ex cujus foliis contusis parabant cataplasmata lumbis & pubi apponenda, & cujus expressum succum admiscebant cum uterinis injectionibus, imo etiam guttatim infundebant haustibus variis ore assumendis; quam medendi rationem ut confirmet, adducunt auctoritatem, tum B. Basilii, qui ait ^(k) se vidisse quasdam feminas, quæ potionem *Cicutæ* extinxerint rabiosas cupiditates; tum B. Hieronymi, qui ^(l) scribit *Hierophantas Pontificatum adeptus Cicuta se castrasse*.

Quid de virtute anti-aphrodisiaca *Cicutæ* sentiendum sit, ipse ignoro, ut qui nullum periculum feci, sed opinor huic plantæ auctoritatem conciliatam esse ex falso præjudicio frigidam esse, cum e contra constet esse calidam. Sed id commodi accidit, quod jam liceat rem tuto periclitari, ex quo notum est succum *Cicutæ* leviter inspissatum ægris carcinomate laborantibus quotidie ad multa grana sine discrimine exhiberi, qua de re plura infra, *Libr. II. Cap. 7.*

VIII. Ut primum varia *Chimiæ* præparata in medicum usum recepta sunt, non cessare quicunque *Chimiæ* nimium credunt, ad morbos multos, & speciatim ad Furorem uterinum obtrudere præparata multa ex Saturno, potissimum *Saccharum Saturni*, cujus grana aliquot in injectionibus uterinis, & quod gravius est, in ipsis haustibus, qui ore assumuntur, dissolvenda proponunt. Sed hunc usum, nec injuria, improbavimus supra pag. 107.

Astruch de Morbis Mulierum.

L 3

IX. Su-

^(h) Ubi supra. ⁽ⁱ⁾ Ubi supra.

^(k) Homil. V. supra Hexæmer.

^(l) Contra Jovian.

IX. Superest quæstio majoris momenti. Nonnulli Medicorum (*m*) auctores sunt, ut titillando muliebria feminarum ab utero furentium, proluvium corrupti feminis proliciatur, unde prima mali labes, quod alii (*n*) nefas esse censent, & religione vetitum. Non nostrum est tantam litem componere, de qua viderint quos pene jus est & norma decidendi; sed illos monitos velim decisionem frustra futuram esse quod ad factum, quandoquidem ægrotantes ipsæ naturæ vel potius morbi ductu sese fricant perpetuo, nec aliena petunt aut expectant auxilia, in quo sibi pessime consulunt, ut quæ fricationibus illis cupiditatem nedum sedent, sed magis exasperant. Verum furdas canas, si eas ab illa turpitudine hortatu coneris dimovere, a qua arceri non possunt, nisi vinciantur.

(*m*) Varandeus, *De Morbis Mulierum*, Lib. 1. Cap. 5. & Antiquiores omnes.

(*n*) Riverius, *ubi supra*.



TRACTATUS

DE

MORBIS MULIERUM.

LIBER SECONDUS

De Morbis, qui a diversa uteri conditione dependent

CAPUT PRIMUM

De Uteri inflammatione.

§. I.

Ejusdem descriptio, & species.



Artes omnes humani corporis præter-naturali sanguinis affluxu corripipi possunt, quem subsequuntur partis affectæ tumor, tensio, rubor, calor, dolor, atque febris ipsa haud infrequenter, dummodo illa graviora appareant; hujusmodi infartus species, communi nomine *tumores inflammatorii* appellantur, qui morbi intensione diversa distinguuntur, in *phlogases* dum leviora, & *phlegmones* dum sevjora ostendunt symptomata.

Præter inflammationem tres supersunt tumorum species *Erysipela* videlicet, *Oedema*, atque *Syrrhus*; inflammatio enim, vel simplex esse potest, quæ inflammationem *Phlegmonosam* gignit, vel alterutro eorum tumorum complicata, a quibus *Erysipilatoza*, *Oedematosa*, vel *Syrrhosa* nuncupatur.

Uterus æque ac ceteræ corporis partes inflammationi est obnoxius, ab his in hoc tamen differt, quod externarum partium tumor, calor, rubor facile morbi indolem aperiant, at uteri inflammatio, in abscondito latitans, nisi per fœnomena, quæ extrinsecus præsefert deduci possit.

Ex eo enim de uteri tumore, atque tensione judicamus ab aucto imi ventris volumine, ejusdemque tactui resistentia; ipsius calorem indicat regionis hypogastricæ calor; pubis, & vaginæ præsertim; ruborem vaginæ rubor ostendit, si eo usque observatio pervenerit, quod etiam a calore, quem animadvertit æger, ceterisque externis signis facile deducitur; dolorem ægræ quærelæ satis demon-

strant, atque uteri tactu summa sensibilitas; febris tandem, uteri inflammationis indivisibilis comes, pulsibus manifestatur.

His, quæ ad uteri inflammationem essentialiter pertinent, alia plura leviora superaddantur fœnomena tamen non contemnenda; hujusmodi sunt Lochiorum, aut Mensium suppressio, si tunc temporis morbus occurrat. Verum urinæ ardor, ac mingendi difficultas alvi dejectiones raræ, & molestæ, cordis anxietas, singultus, vomendi conatus, capitis dolor, sed oculorum præsertim, sopor denique, delirium, vigiliæ, dentium stridor, motusque convulsivi, tum pulsum exiguitas, ac inæqualitas; pubis tandem, inguinis, lumborum, fœmorum, atque cocigis dolor aggredi solet.

Quamvis inflammatio unam indolem constanter fervet, iisdemque plerumque morbis copuletur, nonnullæ tamen differentiæ animadverti possunt.

1. Morbi gradu, si inflammatio levioribus symptomatis affecta tumor, tensio, calor, ac dolor mitiores existant, nullaque, paucave febris superveniat, tunc *phlogosim* appellari censuimus, *phlegmonem* contra, si illa severi, ac febris augeri minentur.

2. Morbi extensione, si inflammatio enim, quod raro contingit, totum uterum afficiat *universalis*, si illius partem aliquam *partialis* dicitur; pars hæc affecta esse potest antica, vel postica, dextera, vel sinistra, ima seu fundus, superior, seu collum uteri, quod novas producit varietates.

3. Morbi natura; nam ut supra enuntiavimus cum de inflammatione generice differuimus, vel simplex erit, suumque nomen retinebit, vel eam inflammationem phlegmonosam appellabimus; aut erysipela, œdema, syrrhumque junctum habet, ideoque *erysipilatoſa*, *œdematoſa*, aut *syrrhoſa* inflammatio vocabitur.

4. Postremo; inflammatio internam, vel externam uteri superficiem, aut ipsius substantiam invadit, ac tres alias inflammationis species gignit.

§. II.

Causæ.

Satis de inflammationis indole locuti sumus dum tumores examinavimus, quare ne superallata inutili sermone repetamus neminem latere putabimus.

1. Inflammationem in genere a tribus potissimum causis oriri:

Ab infartu partis affectæ utriusque generis extremorum vasorum sanguineorum, in quibus sanguinis copia lumen eorum nimis repleat, ac parietes distendat, a quo prior inflammationis gradus, seu *phlogosis* tantum originem agnoscat.

Si in illis vasibus coarcevatius sanguis in lateralia lymphatica vascula irrumpat, secundum oritur inflammationis genus, seu *vulgaris inflammatio*.

Verum si sanguis labefactatis utrorumque vasorum extremis in circumpositum cellularem contextum erumpat, tertium producit inflammationis genus, seu *inflammatio systrophica*, quæ ad supurationem vergit.

2. Tres vero hujusmodi inflammationis causas inter se ita conferre posse, ut maxima, vel nimis protracta capillarum repletio irruptionem in lymphatica inducat, ac utraque ceteris paribus eruptionem faciat.

3. Quod omnis inflammationum lex eo collineet ad causas nempe statuentes, quæ vasorum sanguineorum infartum pariant, quo neglecto necessario posteriora irruptionis, eruptionisque fœnomena oriri possunt, atque debent.

Hæc si uteri inflammationi applicaveris facile innotuerit;

1. Hanc peculiarem inflammationem vel a nimia repletione uteri sanguineorum

rum vasorum; vel a sanguinis hinc orta, in lymphatica irruptione; vel a lymphæ, aut cruoris, discisis extremis vasculis, in uteri testura eruptione originem ducere,

2. Verum has duas posteriores causas a priori ita derivare, ut ad originem hujusmodi inflammationis investigandam nihil amplius requiratur quam nimie vasorum sanguineorum repletionis causas indagare.

His positis cognita sanguinis in æconomia animali circulatione facile patebit, hujusmodi repletudinem a tribus præsertim causis nascisci, vel quod sanguis ad uteri vasa præternaturali confluat copia, vel quod ab iis minori quantitate refluat, quam opus requirat, vel quod ambæ hæ causæ, nimius scilicet affluxus, ac imminutus refluxus simul concurrentes inflammationem promoveant.

Ecce vobis præcipuæ, & universaliores causarum uteri inflammationem præducentium classes, reliquum est, ut specialiter eas perpendamus, in quibus, ut clarius procedamus, sit

I. *Classis*. Sanguis in utero redundat, si ille, qui vicinas partes debet irrigare, retrogrado cursu irritato in uterum irrumpat

1. Id evenit quoties uteri partes propinquiore jam inflammatione laborantes respuant superventurum sanguinem, ex hoc enim vesicæ, intestinorum, atque hæmorrhoidum inflammationi, uteri inflammatio succedit

2. Quoties vero in his partibus pressio sanguinis circulationem intercipiat, vel segniorem saltem reddat; qua de causa uteri inflammationem sæpe inducunt validi, crebrioresque vomendi conatus, alvi fluxus, tormina, tenesmus, atque molesta tussis.

II. *Classis*. Sanguinis necessarius refluxus minuitur si uteri venæ contractæ, aut compressæ diametro coarceantur.

1. Venas uteri contrahunt causæ omnes, quæ in eo fibras delicatiori præditas sensu, valeant crebro, vehementerque irritare, at hæ innumera esse possunt, ex: gr:

Repentina lochiorum, aut mensium suppressio, ab subita constipatione, inopinato metu, gravi dolore orta, aut pessariorum, vel injectionum adstringentium abusu:

Validiores uteri contractiones a nimia venere, ipso adhuc infirmo, aut injectionibus stimulantibus nimis:

Fortior internæ uteri superficiei irritatio per acres injectiones, aut in ejusdem cavitate per embrionis, vel placentæ putrescentiam excitata:

Omne, quod uteri substantiam lacerare, vulnerare, aut aliquo modo ledere valet, uti abortum promovendi, contemnenda methodus; longiores, sevioreque partus angustia; secundarum aut foetus violenta extractio, unguium lesio ab obstetricante imperito facta, vel ab aliquo instrumentorum, quibus in partu præternaturali uti solet; imi ventris vulnus usque ad uterum protractum, vel ictus, qui utero etiam damnum inferat.

2. Venas uteri comprimunt intumescencia, aut durities propinquorum vasorum.

Hujusmodi sunt uteri lactifera vasa, quæ expanduntur ab acquisita humoris lacticinosi spissitudine, qui in illis coacervatus indurescit; hujusmodi census sunt turbercula in glandulas enacta, ubi per vasa lymphatica fluens lymphæ mora densatur.

Tales sunt syrrhi aut syrrhosi infartus inter diversos uteri anfractus geniti a causis infra enunciandis *cap. V.*

Animadverti enim oportet causas omnes usque adhuc allatas venarum uteri compressionem paullatim generare; ideoque ab his raro uteri inflammationem oriri,

oriri, quæ est repentina vasorum repletudo a celeri causa producta, illa tamen nisi immediate, mediate saltem inflammationem poterit excitare, si ipsa occurrat alterutra earum causarum confociata, atque ex eo inflammationis gradus augeatur.

III. *Classis*. Sanguis præternaturaliter in aliquam uteri partem influit, ab altera deficit, si qua simul prioris classis causa cum aliqua secundæ classis concurrat, ab hac copula quæ facilis, & frequens est augetur inflammatio in ratione intensitatis, & numeri causarum concurrentium.

Causæ superallatæ sufficiunt, & valent ex se ad inflammationem producendam, & ab his majores, & perniciosiores fiunt, si simul copulentur dispositiones antecedentes, quæ illas actuent, vel quæ uterum disponant ut intensiores impressiones valeat suscipere.

Eæ antecedentes dispositiones duplicis sunt speciei; aliæ universales, quæ a quantitate, aut natura sanguinis dependent; peculiare aliæ, & locales, quæ specialem uteri, vasorumque conditioni rationem habent.

Generaliores dispositiones sunt plethora, sive sanguinis redundantia ejusdem expansio, aut ad rarefactionem prædispositio, quæ plethoræ æquiparatur; acris, & biliosa humorum crasis, quæ sanguinem reddit rarefactionis minima de causa susceptibilem, cui additur vini, liquorum spirituosorum, Cocolati, aut Caffæ immoderatus usus; vigiliæ continuæ; animi pathemata, ira, nimius corporis motus, urens tempestas &c. Causæ potius sunt omnes sanguinem nimis rarefacere, atque commovere ejusdemque motum per vasa maxime intendere: Locales, seu peculiare hujusmodi dispositiones sunt; lassitudo naturalis, aut atonia texturæ uteri, a quibus deficit necessarium robor, quo vasa se contrahendo progressui sanguinis faveant; obstructio, syrrhi, aut syrrhosi infartus, qui haud raro uteri fluxum inducunt; varices vasorum, quæ facile stasim sanguinis permittunt; vitium quodque peculiare alicujus uteri partis, uti erosio, vulnus, ulcus, &c. in quibus impedito sanguinis circulo ejusdem cursus quodammodo intercipitur.

Reliquum est, ut ejusdem dispositionis indolem, & gradus perpendamus varias rationes investigando; quæ cum diversis uteri inflammationis causis habere possunt, quod obtineri potest recto judicio, quod efformabimus a magnitudine inflammationis pertractandæ a gravioribus fœnomenis, quibus confociatur, & consequentiis, quæ præcaveri oportebit.

§. III.

Differentiarum explicatio.

I. *Differentia*. Inflammationis magnitudinem facit duplex causa, intensitas nempe causarum producentium; & uteri conditiones antecedentes; si eæ causæ ambæ simul vehementer agant, inflammatio maxima est, & phlegmon nuncupatur; si alterutra earum causarum tantum adsit inflammatio mitior evadit; tandem phlogosis dicitur, si causæ illæ leniter uterum perturbent, ut sanguinis modicum affluxum inducant.

II. *Differentia*. Inflammationis positus ab causarum applicatione dependet multiplici ratione diversa; at speciales uteri partium conditiones, aut antecedentes ejusdem alterationes hanc, vel illam uteri portionem plus minusve iis morbosus causis subijciunt.

III. *Differentia*. Præter eam inflammationem tres aliæ dantur species, quæ Oedema, Erysipella, Syrrhumque comitem habent, ideoque si præter sanguineorum vasorum turgentiam lymphaticorum etiam adsit repletudo, quæ oedema constituit, inflam-

inflammatio *Oedematosa* appellatur; id præsertim evenit quando sanguis multo fero deturpatur; *Erysipelatosa* dicitur, quando internam tantum, aut externam uteri tunicam occupat, quam gignunt obstacula ibi locata, quæ sanguinis circulum intercludunt, eamque producit sanguis acer, atque fervens plus minusque pro ægrotantis indole; dum inflammationem faciunt glandulæ, tubercula, aut syrrhus, quæ in paraxismo persentiantur, & post resolutionem persistant, inflammatio *Syrrhosa* vocatur; *Phlegmonosa* denique appellatur, cum a sanguineorum vasorum repletudine, aut uteri substantiæ infartu originem ducat.

IV. *Differentia*. Ipsa internam uteri faciem occupat si eam vitium producat lacteorum vasorum, aut venosarum appendicum, aut in causa sint scissuræ, exulcerationes, aut excoriationes, tum irritationes uteri internæ, quæ vulgatissimam inflammationis speciem producant; externam vero faciem deturpat si ab ulcere, ictu, aut contusione originem agnoscat; tandem integram uteri substantiam infirmat, cum ex utraque parte labefactetur uterus, quod raro evenit, vel quod crebrius accidit ex alterutra parte morbo incipiente, totam denique uteri crassitudinem ipse pervadat.

§. IV.]

Symptomata.

1. **T**umor, tensio, atque uteri resistentia consequutiones sunt necessarissimæ intumescentiæ turgentium vasorum, quare ea sænomena numero respondebunt tumentium vasculorum, & infartus magnitudini.]

2. In puerperis lochiorum suppressio, atque catameniorum in menstruatissimulis ab uteri tumore procedit; nam compressis vermicularium osculis, obductisque venosis appendibus sanguinis, aut lactis fluxuri cursus intercipitur; incompleta tamen eorum fit suppressio si modica sit, aut partialis uteri inflammatio, completa vero si inflammatio maxima sit.

3. Ab hac turgentia penitus dependet uteri dolor qui tendit, producit, convellit, atque fibras nerveas comprimit, quæ sunt doloris sedes; arteriarum pulsus interdum ita illas secutiunt, ut dolorem augeant, valde, ac lancinantem reddant, cum in iis circumstantiis minima de causa uterum extrinsecus prementi ad nervos usque pressio pertingat; nihil mirum igitur si uterus tunc adeo sensibilis experiatur.

4. Hujusmodi dolor prout alicui parti imi ventris propinquus est, vel aliqua communicatio datur cum inflammata uteri parte id vasorum ligamentorum, vel peritonei nexu fiat, ægræ ad hanc vel illam partem ipsum referunt, quare sæpissime de lumborum dolore conqueruntur, si inflammatio posticam uteri partem afficiat; de umbilico dolenti, si anticam; pubes vero, anusque dolent, cum uteri collum inflammatio aggrediatur antè, vel postè; inguina tandem atque femora laborant cum latera ad originem præsertim teretium ligamentorum labefactentur.

5. Calor atque rubor inflammationis sunt indivisibiles comites seu infartus consequutiones præcipuæ, quo uberius enim cruor sponte calidus, coccineusque ad aliquam partem affluit, eo calor ejusdem, ruborque intenditur; utrumque vero auget arteriarum creber pulsus, quin inflammata parte sanguinem quassat.

6. Febrem etiam comitem habere solet uteri inflammatio, ea si præcedat, inflammationem gignit, gignitur illa interdum ab eadem inflammationis causa; at præter hos casus inflammationi facile succedit, nam sola circuli intermissio, in hoc morbo obvia, febrem inducit, citra alias causas a quibus oriiri valeret.

7. Raro hujusmodi febris capitis dolore, quinimo graviore expers est, nam cruor rarefactus, qui segniter per iliacas arterias turgentis uteri ergo compressus transibit, uberius in superiores aortae truncos evehitur, ac proinde in cerebri plexum, quod gravedinem, atque dolorosam distensionem parere potest erit.

8. Quandoque sopore, aut *Coma somnolento* aegrae laborant, quod crebrius accidit si illae plethoricae sint, aut sanguine donentur spissiori, vel febris aestu nimis expanso; demum si sanguis a tumente utero, iliacisque compressis, superius magna ex parte evehitur cerebrum infarciat.

9. Interdum continenti corripuntur pervigilio modo sanguis inops sit, fluidior, minusque rarefcat, tum uteri volumen minus tumefaciat, arteriasque iliacas comprimat, aut ejusdem dolor intensior spiritus in cerebro commoveat, fibrasque tendat.

10. Delirium crebre in utroque casu adest rationibus alias explicandis in *Capitis Morborum pertractatione*; in priori enim casu *Coma somnolentum*, fit *Coma vigil*; in altero casu *Pervigilium* ad Delirium accedit, quandoque vero ex eo *Phrenitis* oritur.

11. Lingua arefcit tunc, febris, & calidi expirati aeris causa, eoque magis infarcito capite, atque cerebro, pallato calorem communicatur, qui magis magisque linguam exsiccat, quod tamen in linguae centro crebrius apparet, ubi causa illae omnes exsiccantes vehementius agunt, minusque ea pars fruitur salivae beneficio.

12. Lingua in inflammatione non solum arida observatur, verum visciditate quadam obnata a mucoso humore a glandulis gingivarum, atque linguae ipsius secreto, ibique a febre inspissato; idem mucus interdum mora, aut medicamentorum assumptione nigrescit.

13. Uteri inflammatio dum partibus propinquis sensim sensimque communicatur, nova teterrima phaenomena producit, idcirco si collum antea afficiat inflammatio tunc, vel phlogosis saltem, per vaginam reptat, atque urethram, quare aegrae difficillime, aut guttatim mingunt, maximumque inter mingendum dolorem urentem perferunt; hujusmodi Stranguria, atque Dysuria ab acrimonia quandoque, aut calore oriri possunt, quem urina intra vesicam inflammationis causa acquirit, vel a sympathica constrictione sphincteris vesicae &c.

14. Quando postica uteri pars, aut ejusdem collum inflammatione corripitur, rectum proximum intestinum pariter inflammatur, ut faeces intercipientur, aut cum dolore excernantur; id parere poterit excrementorum constipatio, vel Sphincteris ani sympathica crispatio phlogosis ergo.

15. Ea quae dicta sunt, ostendunt matricem cum pluribus partibus relationem habere sympathicam, quam fusius videbimus postremo hujusce libri capite ubi de *hysterico morbo*, quare sympathiae legibus, quae in utero eveniunt phaenomena, ceteris partibus diversis communicata ea ratione, quam superius explicavimus convulsiones excitabunt plus minusque validas, atque continentes; huic causae referre debemus convulsivam constrictionem, quae motum cordis retardat, atque liberam ipsius dilatationem implicat, ut pulsus qui in statu febrili magni, vividi, explicati reperiri deberent, exigui, duri, profundi in inflammatione uteri appareant, ut in ceteris imi ventris viscerum inflammationibus, quod non parum concurrat ad animi deliquia producenda, quibus crebre tunc aegrae sunt obnoxiae.

16. Cum in hoc statu ab arteriarum atque cordis pulsibus sanguis debiliter, & exigua copia impellatur ut difficulter ad extremitates pertingat, ideoque pedes, manus, vultusque frigescunt, etiamsi uterus inflammatus sit, & propinqua partes abdominis caleant; hujusmodi externum frigus interno fervore conjunctum

Etum tum exigui, & profundi pulsi eam febris speciem constituunt, quæ viscerum inflammationem solet comitari & græco nomine *Febris Lipyria* appellatur.

17. Sympathicis interdum commotionibus, quæ alias diversas partes aggrediuntur, Singultus referuntur, Cardialgia, Cordis anxietas, Nausea, aut Vomitus, quæ in uteri inflammatione ægras vexant; singultum atque cardialgiam gignit convulsio superioris orificii ventriculi; nauseam vero atque vomitum contractiones pylori atque totius visceris.

18. Similibus de causis uteri inflammatio laceffit anteriorem duræ matris partem, atque Pericranium ubi frontem, & orbita intus obtegit quod circumscriptum capitis dolorem inducit, quem in *Sincipite*, & *Oculorum radicibus* ægræ persentiunt ut caput introrsum trahi sibi suadeant.

19. Iisdem causis tandem tribuuntur tendinum in manibus subsultus; motus convulsi musculationum maxillæ inferioris; qui dentium stridorem producant; motus convulsi diaphragmatis, qui respirationem perturbant, & visum, vel fletum involuntarium movent; verum laryngis, atque pharyngis convulsiones, quæ tum respirationem, cum deglutitionem intercludunt; tandem ceterarum partium omnium convulsivæ commotiones, quæ ægras magnopere infestant; at huiusmodi motus inordinatos infra speciatim examinabimus *Capite XIII.*, ubi *De hysterico morbo*, ad quem attinent, erimus locuturi.

§. V.

Diagnosis.

I. **F**acile erit uteri inflammationem detegere atque ab aliis morbis distinguere, qui cum ea aliquam affinitatem habent.

1. Ipsa uteri syrrhum, Erysipella aut veram gestationem emulatur, si voluminis augmentum tantum respiciamus; ab iis tamen clare distat dolore, calore, atque febre, quæ in illis morbis defunt, verum sollicito agresso, & incremento quibus huiusmodi inflammatio adortur ab iisdem differt qui lente procedunt.

2. Vesicæ, aut recti intestini inflammatio illa videtur si a dolore, calore, aut febre iudicemus, quæ in omnibus inflammationibus adsunt, distinguitur tamen per doloris sedem, quæ in iis speciatim cuique parti respondet, & extensionem intumescentiæ quæ major est in matricis inflammatione; per externum partium genitalium statum ut vaginæ præsertim, & uteri orificii, quæ tunc labefactantur valde; tandem fecum excretio, aut mictus sati manifestant inflammationis indolem; in vesicæ enim, aut uteri inflammatione minime vel cum extremo dolore feces excernuntur, citra gravem molestiam vero in altera inflammationis specie.

II. Signa vero extant certissima quibus variæ uteri inflammationis species determinantur.

1. Symptomatum violentia morbi gradus dignoscitur, idcirco tantum phlogosis aderit, quando dolor, tumor, durities, atque febris modice vexabunt, contra maxima inflammatio habebitur cum ea omnia sevjora supervenerint.

2. Extensionem, atque sedem morbi addiscimus per subsequencia indicia.

Si dolor pubi respondeat, ac difficulter ægræ aut dolenter mingant, anterior uteri pars, circa collum, inflammatione laborabit.

Si ossi sacro dolor respondeat, atque moleste feces expellant ægræ, posterior colli pars morbo afficietur.

Si lumbi doleant, uteri fundus inflammatione periclitabitur; si umbilicus, anterior pars egrotabit.

Si in-

Si inguinum aut femorum alterutrum labefactetur, latera ibi propinqua uteri inflammatione laborabunt.

Si dolor vaginæ respondeat, & digito intromisso orificium uteri durum, renitens, aut urens persentiat, ibi inflammationem existere fateberis.

Si dolor tandem, tensio, resistentia totum uteri volumen occupent, atque tumor maximus sit, nullum superest dubium matricem pertotum sui affici ambitum, etiamsi id inequaliter interdum fiat.

3. Specialis patebit inflammationis indoles circumstantiarum concomitantium naturam perscrutando.

Uteri enim inflammatio phlegmonosa erit, cum tumor, tensio, dolor, calor, atque febris grandiores fiant.

Erysipelatosa cum dolor, sensibilitas, calor sevimissime infestent, etiamsi tumor exiguus, aut modicus sit.

Oedematosa vere quando tumor magnus, & mollis appareat, dolor tamen, sensus, calor, atque febris leviores sint.

Syrrhosa tandem cum tumor resistens citra multum calorem, dolorem, aut febrem existat.

III. Nihil interest plerumque causas hujus inflammationis detegere, verum si id utile videatur multiplici methodo certiores fieri possumus:

Temperamentum investigando sanguineum, plethoricum, aut biliosum &c.

Statum uteri antecedentem examinando laxatum, aut labefactatum in laborioso partu, infartibus obnoxiosum, & obstructionibus plenum, syrrhosum, excoriatum, aut ulcere deturpatum.

Circumstantias perpendendo in quibus morbus supervenit, in catameniorum, aut locchiorum fluxu, vel in eorum suppressione, vel post abortum, aut laboriosum, difficilem, atque diuturniorem partum.

Historiam denique percontando eorum quæ inflammationem præcesserunt, vitæ nempe regimen, excessus caloris, aut frigoris repentinos quibus se exposuerunt, ictus, aliasve lesiones quas uterus passus est.

§. VI.

Prognosis.

I. **P**artis internæ inflammatio nerveæ & sensibilis qualis uterus est perniciose plerumque, & lethalis evadit.

II. Idcirco noxa quam comitem habet hujusmodi inflammatio multiplici circumstantiarum ratione variare poterit, quas indicare satagam.

1. Pro diverso inflammatorii infartus gradu; quare inflammatio proprie dicta, seu phlegmone quod majorem infartum supponit phlogosi, periculosior est, quam levior affluxus gignit.

2. Pro inflammationis extensione; quando ea penitus uterum, aut ejusdem maximam partem occupet parum spei supererit; prognosis tamen mitior institui poterit si inflammatio modicam partem adoriatur, inferiorem præsertim, collum uteri nempe ubi remedia commodius applicantur, & consecutionibus inflammationis facilius mederi quimus.

3. Pro diversa accidentium vehementia; tunc aliqua enim valetudinis recuperandæ spes refulget, si ea phenomena pauca, & leviora sint; at lethalis pene morbus evaserit si violentioribus tunc egre sint obnoxie doloribus, atque continuis commotionibus, quibus addantur pervigilium, delirium, vel sopor, verum egre sepe deliqueant.

4. Pro febris indole, quæ si modica sit, nullis vel paucis exacerbationibus comi-

comitata, minus pernicioſa evadet; major aderit periculum ſi febris ardens ſit & diutinis vehementioribus exacerbationibus conſociata; tandem maximum damnum minatur, quando pulſi arctantur, extrema frigeſcunt & febris lityria ſit.

5. Pro diverſo uteri ſtatu; ideoque ea mitior erit inflammatio, quæ ſanum aggreditur uterum, contra vero lethalis ſi labefactatam, erroſam, ulceribus aut ſciſſuris deturpatam, obſtructam, aut ſyrrhoſam matricem infeſtet, vel ſi aborti, aut diutini, & laborioſi partus conſequens ſit.

6. Pro diverſa tandem inflammationis indole; quare maximum erit pertimeſcendum detrimentum ſi ea eryſipilatoſa ſit; modicum ſi phlegmonoſa; minimum tandem ſi œdematoſa aut ſyrrhoſa appareat.

III. Quatuplici diverſa ratione huiusmodi inflammatio finem habet.

1. Reſolutione primum dum, cruor vaſa ſanguifera infarciens aut lymphatica, vulgarem recuperat circuitum; hæc via ſalubrior eſt & integram valetudinem reſtituit præſertim ſi retardatus ſanguis penitus reſolvatur; reſolutio plerumque ſeptimo, aut decimo accidit morbi die quod facilius ſperare licebit dum inflammatio mitior ſit, parum doloroſa, aut extenſa, eaque magis phlogoſim, aut œdema, quam phlegmone & eryſipela æmuletur, paucam vero febrem abſque gravioribus exacerbationibus conjunctam habeat, urinæ, aut ſecum excretionem non impediat, verum a morbi initio medicis auxiliis, venæ ſectionibus poſſimum non fuerit deſtituta.

2. Gangræna, quæ plerumque lethalis eſt ut ſequenti capite demonſtrabimus, teterrima valde experitur quando inflammatio eryſipilatoſa eſt, aut phlegmonoſa, magna, doloroſa, extenſa atque urentem febrem crebris exacerbationibus copulatam comitem habet; vel uterum aggreditur jam ægrotantem, excoriatum, ſyrrhoſum, ulceroſum, atque a difficili partu laceſſitum, neglectis idonea occaſione medicinæ ſubſidiis; tempus quo gangræna aggredi ſolet intra quartum eſt & decimum aut duodecimum diem, ab altiori nempe inflammationis gradu ad certa reſolutionis vel ſuppurationis (non conſecuturæ tamen) indicia perſiſtens.

3. Suppuratione etiam morbus judicatur; ea naturam ſanguinis ſtagnantis pervertit qui vaſa aut cellularem uteri tunicam replet, ipſumque in pus convertit quod abceſſum aut apoſtema gignit intra uteri ſubſtantiam, periculoſum valde atque moleſtum, ut infra videbimus; illa tunc erit ſuperventura quando morbi circumſtantia mediæ ſint inter eas quæ reſolutionem, atque illas quæ gangrænam poſcunt; ſuppuratio enim erit expectanda quando inflammatio magna ſit non maxima tamen, phlegmonoſa ſed non eryſipilatoſa, cum febre conjuncta non tamen ardenti aut lityria; ſi ea matricem perturbet, aut ſanam, aut parum infirmam; verum morbum ab initio ſatis ſubijcere, etiamſi non diligentiffime, medici fatagiſſent, niſi poſt diutinum tempus retardatus ſanguis attenuabitur, atque ſolvetur ita ut in pus abeat, quare ſuppuratio plerumque niſi ſeptimo die apparebit; interdum etiam duodecimo, aut decimo quarto ſolum manifeſtabitur.

4. Syrrho, aut ſyrrhoſa duritie, quæ pertinacem morbum in utero relinquit curatu difficillimum, & teterrimis conſecutionibus obnoxium de quibus inferius locuturi erimus; nedum ſyrrhus inflammationi ſuccedit niſi prius obſtructiones, glandulæ, tubercula, aut ſyrrhoſi tumores præceſſerint, qui inflammationem induxerint, aut ipſam magnopere auxerint, iſdem de cauſis, quæ morbum produxerunt, quæ tandem manifeſte ſunt poſtquam reſolutio inflammationem diſſipaverit.

§. VII.

Curatio.

TRes potissimum indicationes implere nostrum erit in uteri inflammatione subigienda.

1. Affluxum sistere cruoris vasa infarciensis; peractum jam infartum imminuere; atque ea methodo inflammationis progressus intercipere, eorumque violentiam compescere.

2. Fibras relaxare uteri constrictas ut minus ramificationes capillarium vasorum constringant, neve magis sanguinis circulationem retardent.

3. Dolorem sedare qui scenomena ea intendit, atque potissimum in causa est constrictionis aut erethismi fibrarum matricis.

I. Prima earum indicationum gravissima est, atque magis morbi valetudinem fovet; eam brachii venæ sectione pluries & cito repetita implemus donec ægre vires permiserint, uberius, initio morbi præsertim, sanguinem extrahendo.

Haud facile est determinare numerum venæ sectionum aut extracturi sanguinis copiam in hoc casu magis idoneam, cum id pro morbi gradu, ægrotantium viribus, atque temperamento variare soleat, generice tamen duobus prioribus diebus sex, septem, aut octo venæ sectiones institui possunt, quorum tres, quaterve priores quatuor cucurbitulas singulæ æquent.

Neque pulsum exiguitas, neque extremorum frigus in inflammatione uteri obvium quod plerumque febrem lityriam constituit minime phlebotomiæ usum interdiceret potis erit, modo aliunde morbi occasio ipsum postulaverit; in eo casu tamen mitiora cordialia qualia superius proposuimus opportunissima sunt levioribus narcoticis remixta ad pulsum suscitandum, atque doloris intensitatem compescendam, quæ morbum pertinaciorem reddit.

Veteres in uteri inflammatione cucurbitulis, frictionibus, vinculis utebantur, quæ venæ sectionibus substituebant, at hujusmodi remedia futilitatis causa hodie obsoleverunt; frictiones interdum permitti possunt, modo circa artus superiores instituantur; vel si egrè laxè nimis appareant, scapulis, aut mammis possunt cucurbitulæ applicari; vincula tamen nocua evadunt, penitusque contemnenda videntur.

II. Multiplici methodo secunda absolvitur indicatio, alterutram seligendo pro circumstantiarum ratione, vel utrasque successive tentando.

1. Potus uberrimus demulcentis, atque refrigerantis pthisanæ ex leviori perfectæ decoctione radicum Althææ, Nymphææ, vel ex jure pullorum simplici, additis etiam contusis amygdalis; emulsionem locum habent dilutiores ex seminibus frigidis coctæ, & per linteum percolatæ, syrupus hordeaceus cum tepenti aqua, aut citrea potione simul quassatus.

2. Oleum usuvenit amygdalarum dulcium sine igne paratum & syrupis remixtum Bismalyæ, Pavaveris rubri, aut Citri; ejusdem morbi initio tres, vel sex uncias æquabit, cum dimidio syrupi plerumque; quandoque mane exhibetur per duas vices cum decoctione quadam laxante si alvum ciere oporteat, interdum repetitis vicibus per integrum diem.

3. Frequenter clysteria adhibentur refrigerantia, annodyna ex decoctionibus radicum Althææ, Nymphææ; foliorum Malvæ, Violarum, Lactuæ, Solani; florum Malvæ, Violarum, Verbasci; feminum Lini, Papaveris albi, quibus adduntur uncia, vel duplex uncia olei rosati, aut amygdalarum dulcium sine igne parati.

Illæ denique conficiuntur etiam ex decoctionibus Omasi, Puli & fero lactis vel

vel ex emulsionibus coctis, & percolatis addendo unciam semis syrûpi Papaveris albi, aut unam Nymphææ.

4. Injections vero vaginæ aut uteri profunt, qua de causa decoctiones sumuntur foliorum Bismalvæ, Nymphææ, Malvæ, Brancę-urcinæ, Solani &c., aut lac Caprinum ebutyratum cum anatina aquæ rosarum quantitate copulatum, vel serum depuratum, in quo infundatur croci parum, aut Laudanigrani dimidium, tandem mucilagines ex seminibus Lini, Psilli cum aqua rosorum extractæ addito tertio albuminis ovi bene quassati.

Si injectiones solam vaginam intrent, infirmę experiuntur virtutis, citoque refluunt; efficaciores itaque evaserint, modo uteri collum inflammatione afficiatur cujus orificium sit partium turgentia obtectum, at si hujusmodi ostium patulum sit ut siphonis tubulus intromitti queat; uteri cavum injectione irorare magis saluberrimum erit, ut necessarium levamen præstet; verum multa requiritur peritia ne canaliculo aut vehementiori injectioni impulsu, uterus lædatur.

5. Cataplasmata pubi, aut regioni hyppogastricæ applicata, valde conveniunt ex pulpa confecta, plantarum emollientium, quales sunt Malva, Althæa, Branca-urcina, Portulaca, Lactuca, Solanum, Hyuscyamus, quibus additur mica panis, lac; solani, aut hyuscyami succus excoctus, aut oriza lacte cocta, vel Lini semina, quæ omnia additione pauci olei rosati diluuntur.

6. Fomenta demulcentia cum saturatori decoctione stirpium dulcificantium nuper indicatarum, vel cum lacte tepenti, quæ pubi, aut regioni hyppogastricæ apposita cataplasmatibus vices gerunt, modo uteri sensus maximus sit, ne ægræ cataplasmatibus pressionem valeant sustinere.

7. Embrocationes, quæ interdum fomentationibus substituuntur modo inflammatio sevjor appareat, aut fomenta ægræ fastidiant, illæ oleo amygdalarum dulcium rosato patrantur, addito etiam paucio unguento Althææ, aut Aceto; interdum sat erit linteam apponere cerato Galeni oblitum.

8. Pessaria tandem ex pulpa plantarum emollientium confecta, quæ proposuimus ad cataplasmata subiigenda. Hujusmodi pulpa linteolo obtegatur, quæ in mulierum vagina intromittitur; filiabus vero vulvæ tantum sub cataplasmatibus forma apponitur.

III. Ut tertiam impleamus indicationem necesse erit:

1. Topica relaxantia, & annodyna exhibere, quæ nuper proposuimus eorumque usum continenter servare usque dum pars affecta laxetur, eaque laxata dolor imminuatur.

2. Narcotica etiam usuveniunt modo simplex partium relaxatio impar sit morbum levare; narcotica usitata in hoc casu decoctiones sunt capitum papaveris albi, ejusdem syrupus, aut Diacodii, Laudanum, Tinctura Annodyna, pillulæ Cinoglossæ &c., quæ pthifanis, clysteribus, injectionibus &c., superadduntur, aut sejunctim exhibentur; verum nisi exigua dosi propinantur, quarta aut quinta quaque, hora tali pacto ut doloris vehementia compescatur absque quo ægræ sopore afficiantur; patet enim dum ægræ stupidæ sunt morbi causa inopportuna esse hujusmodi remedia.

Cautelæ generales, quæ hujus inflammationis medellam respiciunt.

I. Valde necessarium videtur quod ægræ continenter lectulo detineantur supra dorsum quiescentes, & divaricatis cruribus nonnihil genibus inflexis pulvinorum etiam auxilio ut in hoc statu uterus persistat magis idoneo; optimum tunc erit consilium culcitas crinibus repletas potiusquam lanugine ipsis subtus ponere, verum tum corium marochino dictum quod crebre mutare oportebit, ne res nimis caleant, interdum ceratum Galeni aceto confectum, & supra lin-

teum extensum renibus applicabimus, tandem ipsis silentium, & animi tranquillitatem commendabimus pro valetudine recuperanda necessarissimam.

2. Ægrotantes alere necesse erit decoctionibus levioribus vituli, pulli, vel ex simplici aqua pullorum; saluberrimum pariter erit cum iis simul ebullire plantas refrigerantes Lactucæ, Endiviæ, Boraginis, Oxalidis, aut nodulum seminum Mellonis mundatorum, & contusorum, modo illæ emulsione non imbibantur supra pulmentum seminum frigidiorum transabiendo; etiamsi exquisita hujusmodi dieta videatur, in ea tamen erit persistendum per quatuor aut quinque dies morbi initio, postquamquod modo opus requirat, decoctiones saturiores perfici poterunt ex majori pulli, aut vituli copia, bovillam carnem interdicendo, donec resolutio inita sit, verum prudentis Medici erit primis saltem diebus orizarum cremorem, tantum addere, de cetero nihil immutando.

3. Urinas ciere curabimus per refrigerantia ac antiphlogistica remedia diuresim promoventia, quæ febris ardorem atque inflammationis compescere valeant, hujusmodi sunt nitrum depuratum, Sal Prunellæ, aut sedativum Hombergi ad drachmam semis pro quovis pthisanæ œneforo, abstinendum tamen erit a calidis diureticis, quæ febrem aut inflammationem augent.

4. Quando pulsi debiles fiunt, levioribus cordialibus revivificabuntur, quæ aliqualem madorem excitent, atque partium constrictionem subducant; hujus census videtur potio ex aquis composita Card. Bened., Scabiosæ, Ulmarie, quibus addi poterit drachma una confectionis Hyacintinæ, aut Alkermes, verum unum vel duo coclearia aquæ florum aurantiorum, aut Cinnamommi hordeacæ & si cui libuerit guttæ nonnullæ addi poterunt Tincturæ Annodynæ, modo alia narcoctica non adhibeantur; verum guttæ aliquot Tincturæ Lilliorum, vel grana nonnulla Salis Volatili Viperarum; caute tamen ea urentia Cordialia propinare fas erit, ne febrem aut inflammationem augeant, atque nocua potius quam utilia evadant.

5. Primis transatis diebus modo vasa depleta fuerint idoneis venæ sectionibus, verum imminuatur inflammationis dolor, primas vias blande expiare oportebit apozematibus plantarum demulcentium, & emollientium Boraginis videlicet, Lactucæ, Endiviæ, Cicorii, addita uncia una Mannæ, aut Pulpæ Cassiæ, pro singulis vicibus ter quaterve, in die tertia quaque ora repetitis, vel haustulum fiat ex Cassia soluta in duplici, aut triplici cratere feri lactis depurati; hujusmodi leviora laxantia tollunt, vel saltem imminuunt inflammationis exacerbationes, quæ maximum prænunciant detrimentum, atque novum uteri infartum.

6. Si cognoveris ex imminuta tensione aut sensibilitate hyppogastri resolutionem incepisse, resolventia tunc leviora poterunt adhiberi, quæ ei faveant, qua de causa injectionibus, aut cataplasmatibus erunt superaddenda semina Feni-græci, aut folia Artemisiæ, Matricariæ, Pulegi cum ceteris herbis emollientibus, aut floribus Cammomelli, & Melliloti ebullita.

7. Quando resolutio jam perfecta, vel saltem valde inchoata videatur per aliquot dies decocta duo, seu apozemata quotidie mane videlicet, & vespere fumant ægræ ex foliis ebullitis confecta Scolopendræ, Pimpinellæ, Agrimonix, Fragariæ, cuique addendo drachmas semis Salis admirabilis Glauberi, verum ægras validius purgare oportebit decoctione Tamarindorum, Sale Vegebile, Cassia, Manna, additis etiam aliquibus fennæ glomis, si opus requirat.

8. Tandem si album, aut rubrum effluvium superveniat statu, vel decremento inflammationis, nefas erit eo mederi, imo letaberis quod iis natura conatibus uterum depleat, modo post resolutionem non persistat, tunc enim ipsum remediis superius in hoc morbi genere propositis sistere oportebit.

Praxis a nonnullis Auctoribus proposita, infirma tamen, vel suspecta.

I. Medici diu inter se discreparunt circa venam in uteri inflammatione secandam magis idoneam; Galenus (*a*) clare, duplici loco admonet eam ex *Poplite* scindere vel saltem ex *Malleolo* potius quam ex *Cubito*, circa quod a se ipso aberrare videtur cum identidem contrarium (*b*) doceat; (*c*); Oribasius; Paulus (*d*) Ægineta, & Aetius (*e*) una brachium secare jubent, tandem Avicenna (*f*) & Auctorum caterva, qui post eum scripserunt, excepto (D. Arnaud de Villeneuve) (*g*), Galeni assensu, opiniones conciliarunt initio morbi cubitum, & sine pedem incidendo.

Hodie Medici circa hoc in unum conveniunt; autumant enim prius venam cubiti esse incidendam, quæ utilitates complectitur revulsionis, & evacuationis, excipitur ea tantum inflammationis species, quæ a lochiorum aut menstruorum suppressione dependet, ut iis aliqua ex parte adhuc fluentibus pedum venæ sectione spes supersit ipsa revocandi, quare ea sectione incassum adhibita, persistente nempe suppressione, ad brachii incisionem erit deveniendum, ut efficacius ab utero infarciens sanguis revelatur.

II. Quandoque animose præscribunt in uteri inflammatione frictiones, vincula, aut cucurbitulæ leves, vel scarificatæ, discrepant tamen ubi sint apponendæ; (*h*) alii superius brachiis, scapulis, dorso, aut mammis applicant, alii inferius coxis, cruribus, aut pubi apponunt.

Nunc pene exoluerunt hujusmodi remedia, quæ ægras nimis vexant, & venæ sectionibus valde infirmiores sunt, at si sententiam explanare nostrum foret juxta circulationis leges, vincula primo proscriberemus cuique parti applicita valde nocua, fritionum vero, & cucurbitarum respectu earum actionem similem esse ostendimus, ac de venæ sectionibus dictum est.

III. Galenus (*i*) contendit ægras tunc somnum capere, saluberrimum esse, cum illud inflammationem intendere credat; huic sententiæ certo quoddam modo (*k*) Hyppocrates interdum adhæret; nil mirum ergo si iis auctoritatibus suffulti plures Medici (*l*) eam amplexi sint; non desunt tamen alii plures (*m*) qui narcoticorum usum strenue defendunt, quod communiter hodie receptum est; ea nihilominus interdicere necesse erit quando inflammatio soporem inducat ubi frustranea videntur; utiliter potius exhiberi poterunt dum ægre gravi, & acutiori dolore cruciantur, difficulter quiescunt, vel mente aberrare incipiunt, aut delirio furenti laborare.

IV. Avicenna (*n*) vomitum excitare suadet quare, plures hoc (*o*) Medici

M 2

com-

-
- (*a*) De curandi ratione per venæ sectionem *Cap. 18. Method. Medend. Lib. XIII. Cap. II.*
 (*b*) *Lib. II. ad Glaucon Cap. 2. & 4.* (*c*) *Synopseos, Lib. IX. Cap. 50.*
 (*d*) *De re medica. Lib. III. Cap. 64.* (*e*) *Tetrabibl. 4. Serm. 4. Cap. 83.*
 (*f*) *Lib. III. Fen. 21. Tract. 4. Cap. 12.* (*g*) *Pratic. Medic. Lib. II. Cap. 11.*
 (*h*) *Aetius ubi supra. Joh. Varandæus. De Morbis Mulierum, Lib. I. Cap. 7. Victor Trincavellius. De ratione Curandi particul. hum. corp. affectus. Lib. II. Cap. 14. Daniel Sennertus, Lib. IV. Part. I. Sect. 2. Cap. 13. Guill. Rondelerius, Method. Curandi Morb. Lib. III. Cap. 72. Dionys. Fontanonus, Prat. Lib. III. Cap. 26. Rodericus a Castro, De Morb. Mulierum Lib. II. Cap. 27. Barthol. Perduleis, Univers. Medic. Lib. XIII. Sect. 8. Cap. 16.*
 (*i*) *Comment. IV. in Sect. 4. Text. 17. Lib. VI. Epidemior. Comment. in Aphorism. 1. Lib. II.*
 (*k*) *Epidemior, Lib. VI. Sect. 4. Text. 12. De ratiōe ratione Lib. II.*
 (*l*) *Avicenna ubi supra. Valerius de Taranta, Philon. Lib. VI. Cap. 14. Rodericus a Castro, ubi supra. Petrus Forestus, Observ. Lib. XXVII. Observat. 41. 42. 43. Lud. Mercatus. De Morb. Mulierum Lib. II. Cap. 17. Hier. Mercurialis, De Morbis Mulierum Lib. XIV. Cap. 18. Jean Liebaux, Des Maladies des Femmes Liv. II. Chap. 14. Lazare Pè, Des Maladies des Femmes Lib. II. Chap. 13.*
 (*m*) *Johannes Varandæus, ubi supra. Dan. Sennertus, ubi supra. Lazar. Riverius, Prax. Medic. Lib. XV. Cap. 7.* (*n*) *Lib. III. Fen. 21. Tract. 2. Cap. 12.*
 (*o*) *Bern. Gordonius, Lili Particula VII. Cap. 11. Dion. Fontanonus ubi supra. Val. de Taranta, ubi supra. Lud. Mercatus ubi supra. Vict. Trincavellius ubi supra. Rodericus a Castro ubi supra.*

commendarunt remedium quasi revulsivum, ac proinde valde salubre; id tamen merito contemnerunt (p) Medici alii plures creduli minus, & proveciores, at hujusmodi praxim tunc temporis amplecti fas erat citra noxam, nam emetica quibus veteres utebantur parum, vel nihil vomitum excitabant, in præsentiis vero nostra validiora sunt, antimonialia præsertim, quæ maximas succussiones concitando tum inflammationem cum uteri dolorem augere valerent.

V. Paulus Æginetta (q), prohibet tribus prioribus diebus ægras alere, quod prosecutus est Aricenna (r), & alii multi (s), quorum tamen plerique ab ea sententia recesserunt; certum enim est exquisitam dietam, in acutis morbis convenire, quod omnes Medici defendunt, imo quandoque sola pthifana eas sustinere oportet initio saltem morbi, ex eo tamen arbitror universalem legem sancire nequi, verum cum sapienti Medico (t) suspicor hanc Pauli opinionem non ab experientia, sed a præoccupatione methodici systematis in quo versabatur fuisse desumptam; circa hanc rem Clerc. consulto, *Hist. de le Medecine Liv. 4. Sect. 1. Chap. 7.* & Gorreum, *Definit. Medic. in voce Διαιτησις*.

VI. Nonnulli (u) Auctores in uteri inflammatione injectiones annodinas laudaverunt in vesica intromissas potius quam utero; illuc enim diutius illæ morantes utiliores evadunt, præsertim si inflammatio collum uteri occupet, verum in iis circumstantiis ipsas difficilius adhiberi poterimus; nam inflammatio vesicæ collo communicata impedit quominus siphonis tubulus apponatur procul acerbiori dolore, quare hodie hac de causa, vel pudoris ergo hujusmodi remedium pene obsolevit; at si eo uti libuerit prius intestina clysteribus expiare oportebit, ut dilatationi vesicæ majus spatium relinquatur, animadvertendo tandem, ne uno eodemque tempore simul uterum, vesica, & intestina injectentur, quod partem affectam fortassis nimis premeret.

VII. Plures Medici (x) interdum applicabant animosæ pubi, aut vulvæ frigida topica, aut aceto parata, itaque cum ea ardorem nonnihil inflammationis compefcerent, lætabantur valde ægræ; at levis hujusmodi utilitas praxim hanc minime debet confirmare, quæ nocuas consecutiones præstat; ea enim medendi ratio sanguinem inspissat, ipsumque intra vasa retardat capillaria, circa quæ immediate agit, resolutionem impedit, atque gangrænam haud infrequenter, supurationem, aut syrrium inducit; quamobrem jugiter anteponendæ sunt utilitates persistentes palliatio levamini, incerto plerumque, verum tepentia tantum, & relaxantia remedia erunt apponenda.

VIII. Olim topica adstringentia, & repellentia communiter recepta erant, ex bolo, composita sanguine Draconis, Terra Sigillata, Gallis, Balaustris, Corticibus Granatorum, Coriaria, Santalis, & Saccharo Saturni &c.; at hujusmodi remedia hodierna die suspecta, valde, & perniciose experiuntur, quia fibras erodunt atque laceffunt partis affectæ, verum vasa capillaria constringendo circulationem sanguinis implicant, quod inflammationem auget, resolutionem retardat, & gangrænam, suppurationem, aut syrrium frequenter inducit.

IX. Clinici nonnulli (y) quandoque docuerunt in uteri inflammatione subsequens balneum valde prodesse, quod latine *inseffus* sonat, pro filiabus præsertim

(p) Varandeus, *ubi supra*. Sennertus, *ubi supra*. Riverius, *ubi supra*.

(q) *Ubi supra*. (r) *Ubi supra*.

(s) Donat. Anton. ab Altomari. *De Medendis humani corporis affectibus*. Valefc. de Taranta *ubi supra*. Dionysius Fontanonus *ubi supra*.

(t) Petr. Salius Diversus. *Annotat. in Donat. Anton. ab Altomari. Cap. 106.*

(u) Jean. Liebault, *ubi supra*. Lazare Pè *ubi supra*.

(x) Gordonius, Fontanonus, a Castro, Rondeletius *ubi supra*.

(y) Valefc. de Taranta, Bernard. Gordonius, Dion. Fontanonus *ubi supra*. Jacob. Primeosius. *De Morb. Mulier.*

sertim quibus neque injectiones intromittere, neque pessaria apponere facile est, illud paratur ex decoctione emollienti, & annodyna qualis pro fomentis adhibetur, at hujusmodi praxis inconcinna experitur; nam vel hujusmodi decoctio magis frigescit quam madida pars, & tunc remedium eosdem nocuos effectus afferret quam topica frigida applicita, vel calescit valde, & tunc augebitur inflammatio ad humetata partem sanguinem trahendo, ut in pediluviiis, aut pedum venæ sectionibus evenire compertum est.

X. Jonstonus (2) subsequens remedium valde commendat, quod inflammationem uteri sistere potis esse autumat. Putatur, ait, inflammationem uteri propriate quadam sistere; fit enim ex decoctione Serpilli cum aqua chalybeata confecta, qua spongiæ imbibuntur eaque extrinsecus uteri regioni applicantur; videtur enim Jonstonum ab aliis auctoribus hanc opinionem desumpsisse, eumquem valde credulum fuisse; hoc remedium enim quod serpilli ergo resolvit, calybeata aquæ ratione valde constipat, ideoque morbi decremento potius locum habere potest, quando progressam jam resolutionem fovere fas erit; verum nocua valde experiri poterit morbi initio, ut Jonstoni verba suadent.

CAPUT II.

De Gangrena, seu uteri sphacelo.

§. I.

Descriptio, & Differentia.

Generice gangræna, & sphacelum, duo species sunt, corruptionis, & macerationis, in quibus pars ægrotans livida, aut nigra fieri solet, caloris atque sensus non parum amittit, vel iis quandoque prorsus orbatur, neque juvat amplius circulationis sanguinis lymphæ, aut spirituum animalium favor.

Hujusmodi corruptionis species, fanenihil inter se, nisi gradu, differunt; modo aliquis reliquus sit sensus aut calor, verum pars affecta livida tantum nondum nigerrima appareat, atque sanguis lymphæ, vel spiritus animales, etiam si imperfecte aliqualem circulum servant, morbus Gangræna tantum appellatur; Sphacelum vero dicitur quando pars corporis ægrotans calore penitus atque sensu orbetur, nigerrima appareat, & sanguinis, lymphæ, vel spirituum animalium circuitus intercipiatur.

Præter ea distinguitur gangræna in humidam, in qua pars macerata multum pus icoremque per ulceris marginem effundit; & in siccam in qua pars corrupta indurescit, cornea fit, fanas partes simul agglutinat, magis quam in statu naturali: hujusmodi differentia magis sensibilis fit, quo magis gangræna ad sphacelum accedit.

Cum utraque morbi species omnes partes humani corporis æque aggredi possit, ideoque neque uterus, & propinquæ partes, vagina nempe, vulva liberæ evadunt; hæc erit hujusmodi capitis materies.

Observatione didiscimus necdum vagina, aut vulva alterutra morbi specie corripitur nisi tribus subsequentibus casibus.

1. In vehementiori harum partium inflammatione, & id plerumque nisi in violentiori morbi statu supervenire solet post tertium videlicet, aut quartum morbi diem, ad septimum usque aut octavum.

Astruch de Morbis Mulierum.

M 3

2. In

(2) Joh. Jonstonus, *Idea universæ Medic. practic. Lib. X. Tit. II. Cap. 2. Artic. 4.*

2. In descensu uteri grandiori quando corpus uteri foras labitur, aut maxima vaginæ pars, verum in hoc statu prolapsa pars diu persistat, eaque de causa comprimatur valde, atque constringatur.

3. In ulceribus phagedenicis, quæ intimam uteri, atque vaginæ faciem rodunt, quod pariter evenit in scissuris, excoriationibus ejusdem partis deleteriæ indolis plerumque, quæ uteri internum profunde incidunt.

Communiter gangræna, quæ in priori, aut postremo casu supervenit, humida est; contra vero, sicca in secundo casu experitur.

Quandoque ipsa omnem uterum aggreditur sed raro, quandoque ejusdem partem aliquam, at plerumque collum aut orificium quod a parte inferiori coarctata originem ducit.

Interdum morbus quaque versum uteri crassitudinem penitus aggreditur, raro externam faciem tantum occupat, frequentius tamen internam superficiem infestat.

Tandem modo solam matricem afficit, modo vaginam, atque vulvam, citra uterum; at haud infrequenter utrumque, collum nempe uteri, & fundum vaginæ offendit.

Cujusque indolis sint gangræna, aut sphacelum, qualemcumque partem uteri afficiant, vel quibuscumque circumstantiis comitentur, symptomata consecutura semper eadem experiuntur: pulsus exiguus est, frequens, atque profundus, ægræ vero oripilationibus, tremoribus atque universæ cutis convulsivis succutionibus sine causa manifesta laborant, eo præsertim tempore quo parum vel nihil doloris in utero persentiunt; repente tum corporis cum animi maxima debilitate corripuntur, ut frequenter delinqueant, extremitates frigescent, atque difficillime calefiant; generice ægræ spirantium habitum referunt procul extrinseca causa cum morbus intus uterum tantum infestet; at persistente morbo foetens, atque cadavericum effluvium tandem morbi naturam declarat, modo adhuc ancipites hæreremus.

§. II.

Causæ.

Explicavi gangræna, atque sphaceli theoriam in meo Tractatu Tumorum, atque in eo ostendi.

1. Vitæ, aut *vitalitatis* statum in partibus omnibus pendere a continenti successione vibrationum vasorum omnium quæ illas componunt, arteriæ nempe sunt, & venæ, vasa lymphatica, nervi &c., quod præsertim pertinet ad arteriosorum vasorum contractiones quæ magis sensibiles sunt iis ceterorum vasorum, atque, ut ita dicam, ea in motum cient.

2. Ea de causa status macerationis, aut mortis earum partium gangræna videlicet aut sphacelum nisi a quiete earum contractionum originem ducit, præsertim vasorum arteriosorum, quæ per partem affectam repunt, ut in gangræna vasa vix contremiscant, in sphacelo penitus quiescant.

3. Observationes denique ratione omnino congruentes ostendunt, tres præcipuas adesse causas, quæ vasorum arteriosorum contractiones imminuunt, vel impediunt omnino ut gangræna aut sphacelum nasciscantur.

Prior est: Maxima vasorum capillarium plenitudo atque ramificationum arteriosarum, quæ cum tonica & violentiori tensione afficiantur, nequeunt amplius referari, ideoque inertes existunt.

*Alter*a abolitio est roboris tunicarum eorum vasorum, quæ contrahi renuunt levioris compressionis, ergo aut plethoræ supervenientis.

Tertia. Laceratio est extremitatum capillarium, ceterorumque vasorum animalis partes componentium, quæ cum erosa, concisa, vel aliquo modo labefacta sint nequeunt amplius alternas vulgares contractiones peragere.

Hujusmodi generalis theoria omnem specialem complectitur legem gangrænæ uteri, aut sphaceli, ideoque consequitur, quod eam utero applicando

1. Gangrænâ aut sphacelum nisi ab alterutra trium earum causarum oriri posse, eaque tres causæ causas omnes complecti, quæ speciales omnes uteri gangrænâs producant.

2. Prima earum causarum gangrænâ, aut sphacelum inducit inflammationis uteri proprium quando maxima sit & dolorem inducat, vel si perperam repellentibus, aut adstringentibus reprimatur, aut pro resolutione fovenda cito nimis resolventia validiora adhibeantur, tandem quando segniter resolvatur, aut suppuretur quod *priorem casum* constituit.

3. Secunda earum causarum gangrænâ aut sphacelum inducit post uteri, aut vaginæ descensum supervenientem, quando prolapsa pars irritationi, aut frigori exponitur; vel violentiores constrictiones patitur, quæ in syrrhum degenerant; vel lymphâ repletur, ejus constrictionis ergo retenta, usque dum naturalem elaterium amittat, & ecce *secundum casum*.

4. Tertia denique earum causarum eam gangrænâ aut sphaceli speciem facit, quæ ab ulceribus, aut scissuris phagedenicis vel ulceroso cancro internum uteri rodente dependet, præsertim si hujusmodi ulcera, aut carcinomata maligna sint, ichorosa, aut purulento sero obliterata, qui uteri substantiam pervadit, atque humectat ita ut tandem ejusdem contextum destruat; id *tertium casum* constituit.

§. III.

Differentiarum explicatio.

I. *Differentia.* Gangrænâ duplici ratione adnotatur vel quando uterus naturalis suo loco existit ut *in priori*, aut *postremo casu* inflammationis aut ulcerationis præcedentis ergo; vel quando extra naturalem positum locatur, ut *in secundo* œdematis causa in uteri descensu supervenientis.

II. *Differentia.* Matricis gangrænâ vel incipiens vel confirmata esse poterit videlicet simplex gangrænâ, vel sphacelum; gangrænâ *incipiens* dicitur, quando vasorum contractiones quamvis imminutæ valde aliqua ex parte tamen adhuc subsistant; cum causæ gangrænâ inducentes debiliores sint vel nuperrimæ; vel sanum uterum infestent, qui earum actioni strenue resistat; *confirmata* appellatur modo penitus fibrarum oscillationes in affecta parte supprimantur; ex eo quod causæ validius agent, a longo tempore, vel matricem labefactatam perturbent, œdematosam, ulcerosam, & impressionibus iis omnibus magis obnoxiam.

III. *Differentia.* Gangrænâ omne uteri corpus afficit vel partem aliquam; *totum uterum* (quod raro evenit) deturpat, quando causæ producentes integram matricem occupant, vel ab aliqua parte incipientes magnopere extenduntur; verum *aliqua pars* uteri afficitur quando ibi tantum causæ morbosæ agant eaque extendi impediuntur.

IV. *Differentia.* Partialis gangrænâ diversas uteri portiones aggredi valet fundum nempe, latera, anteriorem vel posteriorem partem, collum &c., id dependet a specialibus causis, quæ actionem suam ad hanc potius quam illam partem dirigunt; plerumque illa uteri orificium occupat, quod acriori magis expositum est fluenti latici, & excoriationibus, aut scissuris in laborioso partu obviis, ceterisque gangrænæ causis.

V. *Differentia*. Gangræna externam uteri superficiem lædit quando ab ejusdem descensu dependet, quia tunc externa facies aeris impressionibus, atque aliis causis magis exponitur, quæ uteri contextum pervertere potis sunt; omnem crassitudinem uteri occupat cum ab universali inflammatione, aut œdemate illa procedat; crebrius tamen internam superficiem perturbat, quæ causis gangrænam inducentibus magis est obnoxia, ut de uteri ostio ostendimus.

VI. *Differentia*. Uteri gangræna in primo & secundo casu plerumque *humida* est, & inflammationi aut ulceribus succedit, quia inflammata pars tunc pus, spumamque gignit; *sicca* vero quando in secundo casu eam uteri descensus producit, nam aeris contactus, tum indusii confrictio ejusdem externam faciem exsiccant, atque indurescunt ita, ut exchara gangrænosa ei magis adhæreat, atque difficiliter separari sinat.

§. I V.

Symptomata.

1. **C**alor affectæ partis valde imminuitur, ramificationum plerarumque articularum contractionibus labefactatis, aut subactis, vel quod sanguis parum, aut nihil per eas circumvehatur, ut maxima ex parte, vel penitus calore tum ipse, cum infirma pars orbetur.

Ea de causa prout imminuuntur numero sese contraentes arteriosæ ramificationes, aut labefectantur earum oscillationes, calor etiam imminui debet in ratione majoris, vel minoris earundem labefactionis; verum calorem omnino deficere in sphacelo, ubi absolute tum eorum vasorum constrictiones, cum ceterarum ramificationum prorsus demuntur.

2. Sensus pariter imminuitur quia nervorum vibrationes, quæ cursum spirituum promovere solent debilitantur valde, aut desinunt in plerisque eorum filamentis quod afluxum & refluxum spirituum retardat, aut penitus impedit, ideoque minime per affectam partem cerebro sensuum impressiones communicantur, aut valde imbecilliter.

Consequitur sensum in hoc morbo imminui in ratione numeri staminum nervorum quorum vibrationes imminutæ sunt, vel in ratione augmenti imminutionis vibrationum earum, abiit vero ille omnino in sphacelo, omni nervorum contractione tunc sublata.

3. Partis illius tensio pariter imminuitur, quia sanguis ibi affluens, articularum contractionibus sublatis, inspissatur, suamque serositatem effundit, quæ expansa pervadit, atque relaxat articularum tunicas, ceterasque fibras, ut ex solide partes impares evadant naturalem gradum tensionis substinere.

Quare molities aut *flaciditas* laborantis partis in gangræna augeri debet prout numerus tunicarum articularum, aut fibrarum tendinearum laxatarum crescit vel in ratione augmenti laxitudinis; verum in sphacelo in quo tum fibræ, cum vasorum tunice maximum attingunt laxitudinis gradum, flaciditas etiam maxima haberi debet.

4. Pars infirma livida fit quia sanguis mora inspissatur, atque nigro colore inficitur per omnes articularum ramificationes superiori indicata ratione labefactatas, verum diversa puncta nigerrima in hac parte remixta iis. portunculis, quæ naturalem colorem conservant, partem fuscā reddit, seu melius dicam lividam.

Hac de causa gangrænata pars plus, minusve nigrescit prout sanguis affluit, vel nigrescit intra majorem numerum arteriosarum ramificationum, denique ipsa

ipsa prorsus nigerrima apparebit in sphacelo, in quo sanguis undique, & maximo gradu nigerrimus fit.

5. Pulsus in hoc morbo exiguus frequens durus atque profundus reperitur, eoque magis in sphacelo, quod duplici de causa oriri potest, vel quod purulentis serositatis, & corrodentis pars aliqua sanguinem inficiat, eumque inspisset atque circulationem cohibendo pulsum ita leges pervertat; vel quod obtusus dolor in gangræna, aut sphacelo obuius circumpositæ sanæ carni communicetur ut sympathiæ lege convulsivas constrictiones fibrarum muscularium cordis excitet, quæ hujus visceris dilatationem naturalem impedian, verum frequentiores, atque validiores contractiones suscitent, quæ pulsum exiguitatem, frequentiam, duritiem &c. inducere potis erunt.

6. Extremitates in gangræna & sphacelo frigescent, eoque magis quo pulsi exiguiore sunt, nam in pulsum exiguitate minus sanguinis a corde ceteras partes versus longinquas præsertim impellitur, quare corporis extremitates minus calefactæ facile frigescunt, eoque citius vel facilius prout aeris frigidi impressionibus correpta pars exponatur.

7. Virium defectio pariter pulsum exiguitatis consequens est multiplici de causa; etenim ex una parte in parvo pulsu minus sanguinis ad cerebrum evehitur, minus ex hoc spirituum fecernitur, minusque eorum cerebrum partibus communicat propinquis; ex alia parte arteriarum cerebralium pulsi, & meningum contractiones, spirituum animalium debilis impulsus ergo, imbecilliores sunt, ideoque tum copia, cum celeritate spirituum in nervos irrumpentium simul imminuta, etiam musculorum contractiones, atque vires valde imminuuntur in composita ratione imminutionis copiarum, & celeritatis spirituum animalium.

8. Frequentiora deliquia quibus sunt tunc agræ obnoxia tum a pulsum parvitate, cum virium deficientia oriri possunt, quæ leviori de causa, aut animi pathemate augentur ita ut syncopem inducant; hæc omnia gignere potest etiam obtusus partis affectæ dolor sanas vicinas partes infestans, qui cor ipsum perturbat.

9. Inæquales horrores, aut rigores convulsivi, quibus repente corripuntur egræ, duplici pariter de causa oriri possunt, ut in pulsum exiguitate, aut deliquiis explicandis enuntiavimus; videlicet vel quod serum purulentum; atque causticum a parte affecta refluens sanguinem denset, quod horrores inducat; vel quod obtusæ impressiones progredientis morbi identidem per omnes cutis contextum, omnesque cutaneos musculos sympathicas contractiones excitent, quæ hujusmodi scœnomena producant a Latinis *horrores* & *rigores* nuncupata.

Apparet enim pulsum exiguitatem, deliquia, rigores &c. duplici causæ me referre, qualitati videlicet humoris, aut serositatis, quæ sanguinem inficit atque condensat; verum indoli obtusarum impressionum, quæ in affecta parte excitantur, atque hujusmodi scœnomena, cognitæ legibus sympathicæ commotionis, inducunt; at posteriori causæ magis adhærerem, nam ea scœnomena nondum validiora sunt, nisi gangræna majores progressus faciat, vel nervosas partes & sensibiliores afficiat, quod minime deduci potest ex eo quod major deleteriæ indolis humoris copia in sanguinem irrumpat, quod falsum est; verum facilius explicatur, si supponamus eas impressiones vividiores sensibiliores fieri, quod certissimum experitur.

10. Acris serositas, quam stagnans sanguis, atque inspissatus suppeditat, sibi per uteri spongiosam substantiam pandit viam, at cum erumpi impediatur a tunicarum compactiori contextu, ideo expandi debet sub ampularum forma, hydathides initio referentium, quæ tamen increcendo luteo sero repleri, rubro, aut nigerrimo reperies, prout hujusmodi serositas pura fuerit, aut sanguine plus minusve infecta.

11. Tandem hujusmodi serum acre, causticum tunicam quæ ipsum amplectitur rodere debet, & substantiam uteri ipsam, quæ in pus converti debet; at si gangræna humida sit a parte affecta ichor, atque foetidum pus cadaverosum orietur.

§. V.

Diagnosis.

I. Quæque gangrænae species habet propria diagnostica signa.

1. Gangrænam quæ inflammationem subsequitur tunc adesse fatebitur quando dolor, calor, tensio, postquam in inflammata parte ad summum gradum pertingerunt repente abeant, ut perperam ægræ sibi suadeant valetudinem recuperasse, de qua tamen tristari debent medici, quorum suspicio augebitur prout pulsus debiliores fient, extremitates magis frigescent, illæ vero rigoribus & lypothimiis magis erunt obnoxia; tandem de gangrænae existentia ipsi certiores fieri poterunt, a fenomenorum eorum augmento, & foetido fluenti latice.

2. Gangræna quæ ab ulceribus uteri originem ducit diversimode progreditur, facile tamen erit eam detegere; tunc enim purulentum effluvium quod ulcera suppeditant desistit, vel saltem imminuitur dum affecta pars inflammatur quod dolorem, calorem aut tensionem auget; hujusmodi augmentum certissimum præbet instantis gangrænae judicium; merito enim gangrænam jam perfectam esse suspicari licebit, modo ea phenomena repente desinant, aut imminuantur, cum maxima pulsuum debilitate rigoribus aut lypothimiis citra causam manifestam supervenientibus; tandem morbus confirmatur & symptomata illa perseveraverint, atque purulentum effluvium cum foetenti odore reverterit.

3. Gangræna quæ uteri descensui succedit duplicis est speciei; plerumque inflammationem subsequitur quam uteri descensus inducit, ideoque per signa illa innotabit quæ sunt gangrænae inflammationem consequuturæ communia, quamvis jam oculis inspicere possit; quandoque œdemati uteri succedit & tunc lente, segnitèque progreditur; verum cum facile pars affecta oculis subjiciatur, facile etiam erit illa cognoscere nigredinis, mollitiæ, & insensibilitatis ergo.

4. Tactu æque ac visu *speculo uteri* adhibito judicare tuto possumus de vulvæ, vaginæ, aut uteri orificii gangræna, aut sphacelo, a quacumque causa procedant.

II. Variæ gangrænae species in utero obviæ facile distinguuntur

1. Quando uterus præter naturam locetur a livore, mollitiæ, insensibilitate, aut frigore affectæ partis judicamus an morbus gangrænae vel sphaceli nomen mereatur; hujusmodi indicia neque tuta, neque facilia sunt utero naturaliter constituto, at morbi diurnitas, mollitiæ gradus & regionis hypogastricæ amissus sensus, tum effluvii qualitates satis morbi indolem pandere potis erunt.

2. Extensionem, atque locum in utero affectum visu & tactu perspiciemus si uteri descensui ipse succedat; si hujusmodi descensus absit ex antecedenti notione extensionis, aut positus inflammationis vel ulceris quæ eam induxerunt facile dignosci poterit.

3. Quando uterus extra naturalem positum reperies, verum spumam, ichoremque affectam partem effundere videbis, tunc gangrænam humidam esse fateberis; siccam vero si affecta pars areseat; verum utero naturaliter locato difficillime speciem gangrænae detegere fas erit, nisi foetidi fluentis laticis nec ne indoles aliquod indicium præbeat.

III. Cau-

III. Causarum tandem indago satis evidens est ut circa eam cunctari frustra-
neum videatur; gangræna enim a duplici causa oriri solet inflammatione nem-
pe, aut exulceratione, quam *calidam* veteres appellavere; vel ab œdemate aut
laxitudine, quam *frigida* nuncuparunt, ergo difficile erit circa eas profus di-
stinctas causas medicum decipi.

§. VI.

Prognosis.

Gangræna uterum infestat naturaliter locatum vel citra naturam positum ut
in uteri descensu observavimus.

1. Gangræna uterum aggrediens in naturali statu positum lethalis est & meri-
to quidem, nam cui rationi fidendum est affectam partem remediis fovere pos-
se, nam si qua fortuito illuc attingerint cito erunt refluxura; validiora vero
impendi nefas erit qualia sunt excharotica; tandem gangrænam secare unicum
extremum remedium impossibile est; hujusmodi prognosis plerumque constans
est, nullamque vel paucas exceptiones finit; non desunt tamen auctorum ob-
servaciones, quæ declarant gangrænosam partem a sana separatam fuisse ægro-
tantes dein perfecte convaluisse, verum hujusmodi observaciones pleræque sal-
tem nisi partiales uteri gangrænas respiciebant; nonnullæ tamen adsunt, quæ u-
niversalem gangrænam abrasam fuisse defendunt; optimum est concilium eas
traditiones animadvertisse ut valetudinis spe interdum ægras sustineamus, at-
tamen cum paucæ sint minime valebunt funestam indicatam prognosim deme-
re, quare in hoc casu tuto asserere possumus, quod ea *rara non sint artis* &c.;
itaque si quid spei refulgeat id nisi in superficiali gangræna sibi suadere lice-
bit, vel parum extensa, aut vagina vel circa uteri ostium locata, quam pro-
duxerant leviora scœnomena in utero bene constituto, & subjecto vivido, ju-
vene & optimo temperamento donato.

2. Detrimentum quod gangræna affert minus erit si vaginam tantum occupa-
verit, minus etiam si vulvam cum iis partibus remedia facile apponantur, quæ
ad uterum usque non pertingunt; verum scarificationum auxilium pudendorum
saltem respectu facile usuveniet, quod affectam partem abradet; nihilominus
nedum letari debemus de vaginæ aut vulvæ gangræna, quæ adhuc insensibilissima
est neque penitus unquam, aut tuto extirpari quimus.

3. Aliqua spes superest modo gangræna prolapso utero superveniat, nam,
præter topica remedia, partem affectam secare licebit, quod feliciter haud in-
frequentem evenisse observationibus constat, ut infra observabimus cum de uteri
descensu erimus locuturi.

§. VII.

Curatio.

Quamvis lethalis plerumque videatur hujusmodi morbi prognosis; sævum ta-
men erit curationem præterire; nihil sane magis perterret, quam omnem
felicitis eventus spem abesse; at quoties medici est diuturnas curationes pie
patienterque inire, etiamsi laboris futilitatem cognoscant; gangræna uteri præbet
novam hujus virtutis exercendæ occasionem, quæ tamen cito tedio levat.

Generice medendi ratio in hac gangræna specie nihil distat ab ea quæ in
ceteris gangrænis requiritur, etiamsi partis affectæ nobilitas, atque morbi po-
situs

situs nonnihil magis implicet, idcirco quinque erunt indicationes proponendæ ut in ceteris aliarum partium gangrænis.

Prima indicatio eo collineat ut causarum vim minuamus, quæ gangrænam inducunt plenitudinem nempe vasorum sanguineorum, quæ tunicarum oscillationes impediunt; vel laxitudinem lymphaticorum, quæ elaterium amittunt; aut utrorumque lacerationem acris humoris causa, quod omnem vibrationem demit.

Itaque 1. Modo gangræna interna sit atque uterum secundum naturam locatum infestet, unica superest via per quam triplicis illius causæ actionem imminuamus; videlicet sanguinem extrahere ut ejusdem circuitus renovetur; verum cruoris, atque lymphæ vel acriorum humorum plethoram imminuere quæ affectam partem infarcit; quam ob rem modo gangrænam a præcedenti inflammatione consecuturam suspicemur, venæ sectiones reiterare nostrum erit usque dum pulsi, & ægrotantium vires permiserint; neque in eo præcipiti casu pulsuum aut virium debilitatem magni faciemus, modo ii debilissimi, aut vires maxime prostratæ non videantur.

At 2. Si gangræna extrinsecus appareat, utrumque ledat prolapsum, aut vulvam, vaginam, vel uteri orificium deturpet, ut *speculi uteri* auxilio facile conspiciatur, venæ sectionibus jungi debet scarificationum auxilium, ut pars aliqua sanguinis, lymphæ, aut acrium humorum ibi exuberantium dematur, verum libera restituatur vasorum oscillatio, si qua adhuc superfit, per quam priorem *vitalitatem* ipsa recuperent; ex scarificationes plus minusve profundæ, aut uberime fiunt in ratione gradus, aut extensionis gangræne; generice ut omnem utilitatem præstent vivam usque carnem scindere necesse erit donec agræ conquerantur, atque sanguis liquidus, ruber, & calidus fluat.

Secunda indicatio postulat quod vasorum robur restituamus, si quod recuperare potis sint, postquam superioribus auxiliis vasa depleta fuerint; hac de causa remedia spirituosæ usuveniunt, & stimulantia, quæ valeant vividiores succutiones excitare in affecta parte, cujus sensus pene abolitus videtur, ideoque escharotica ipsa præscribi licebit.

I. Ecce vobis ostendam remedia, quæ uteri gangræna affecti summa gracilitas in diversis circumstantiis impendi finit.

1. Si gangræna intus uteri cavitatem deturpet, injectiones commendant ex decoctione tepenti patrata foliorum Absynthii, Matricariæ, Artemisiæ, Aristolochiæ, Pulegii, Meliloti, Camommelli, aut Scordii, quibus addi poterit aqua Calcis simplex, aut Sale Ammoniaco imbuta, vel Unguentum ægyptiacum, Collyrium Lamfranci, spiritus Theriacalis, Tinctura Myrrhæ aut aqua vitæ Camphorata & Sale Ammoniaco saturata; eorum remediorum dosis gradui, & vehementiæ morbi respondet; at cum hic urgeat melius erit excessu nonnihil quam defectu peccare; interdum modo ea parum agant injectionibus permisceri aquam phagedenicam limpidam necesse erit vel saturatiorem si opus requirat.

2. Si gangræna extrinsecus offendat, uterum nempe prolapsum, aut vulvam ledat, eadem decoctio adhibetur simili ratione parata, verum cinerum lixivio ebullita, aut additis drachmis duabus vini meraci; ut efficacior evadat, fomenti more tunc usuvenit, quo gangrænosam partem fovent aut affectam vulvam; possunt etiam linteola ea madida explicari.

3. Tandem si gangræna alterutrum latus vaginæ aggrediatur torundæ species parantur modicæ vinctæ, & ea decoctione saturatæ, quæ pessariorum more vagina intromittuntur.

In singulis iis casibus numquam injectiones sunt reiiciendæ, fomenta, aut pessaria prout morbi status postulaverit, aut partis sensibilitas vel ægrotantium patientia permiserint.

II. In externa gangræna efficaciora reliqua sunt auxilia, minime prætermittenda.

Hujusmodi sunt 1. Cataplasmata, aut pessaria laboranti parti applicita; veteres cataplasmata farinacea tantum adhibebant ex Orobi, fabarum, aut hordei pulveribus confecta, & oximelle ebullita, quibus interdum addebant lupulorum farinam, Aloes, aut Myrrham, quæ virtutem earum intenderet; hodie simpliciora sed validiora efformantur ex subero, Myrrha, & Sal Ammoniaco rite pulverisato, & idonea dosi parco melle subacto ad pulmenti consistentiam, addito etiam Unguento Ægyptiaco si opus videatur.

2. Escharoticorum applicatio parti affectæ aut melius scarificationibus jam patratæ hic locum habet; veteres rotulas adhibebant Andronii, Polidæ, Musæ, Passionis, aut Asphodeli quorum compositiones apud Galenum extant a quo nostri veteres Pharmacopolæ eas didicerunt paucis mutatis; at ea remedia prorsus obsoleverunt, neque amplius in pharmacopeis reperiuntur, quibus remedia tutiora substituerunt atque usitiora cujus census prostant Præcipitatum rubrum egyptiaco remixtum, supra pulvinum extensum; aqua Pagedenica diluta, vel saturata, qua affectam partem humectant; vel quod efficacius agit Mercurii vivi solutio, aqua forti peracta, qua leviter gangræna irroratur; nihil tamen caute incedendum est circa validiorum horum escharoticorum usum tum ut effectus ipsorum dirigamus, cum impressiones compescamus quæ dolorem excitare valerent acutiorem, verum ægras infensissimis convulsionibus lacescere si ipse nemis augeatur.

Tertia indicatio erit escharæ separationem promovere aut gangræna, quam si incassum tentabimus superstitis ulceris consolidationem strenue promovere nostrum erit.

Escharotica numquam sunt prætermittenda nisi certiores fieri possimus gangrænam non amplius progredi, quod tuto dignoscitur in externa gangræna circuli rubri ergo, eam circumscribentis, aut purulentis humiditatis, quæ ab hoc margine separatur, quod tantum conjecturari licebit in interna gangræna a cessatione, vel saltem teterrimorum gangrænae fenomenorum imminutione.

Tunc in externa gangræna escharam tondere sorficum acie, verum partem oblinire ter, quaterve in die cum butyro recenti, lactis cremore, albo ovorum quassato, aut oleo rosato necesse erit; denique si suppuratio circa gangrænae limbos oriri incipiat pulvilli suppurantibus mitioribus cum ovi lacteo obducti applicito, donec deterso ulcere materies separetur.

At cum gangræna interna sit, injectiones tantum intromitti poterit butyro, lactis cremore, oleo rosato, aut leniori suppurante confectæ, naturæ effluviiratione habita, aut fenomenis quæ escharam jam separari prænunciant.

Modo eschara jam prolapsa videatur, superstes, ulcus consolidare nostrum erit, quod difficilius erit in interna, quam externa uteri gangræna, injectionis enim similibus remediis imbutæ tantum adhiberi poterunt: hanc tamen medendi rationem in utroque casu pluries in die renovabimus injectiones præsertim, circa quod *caput proximum* pervolvito, in quo *ulceri hujusmodi* curandi methodus exhibetur.

Quarta indicatio. Erit motum cordis sustinere atque liberam promovere circulationem sanguinis cordialium auxilio; efficaciora tamena ut nimis callefacientia minime amplectenda videntur, quæ sanguinis velocitatem intendunt, ac proinde febrem, inflammationem, atque infartum affectæ partis augent, & gangrænam ipsam; verum tuto mitiora exhiberi poterunt quæ actione sua potius quam solida lacescere ipsa leniter emolliunt; hujusmodi sunt potiones cordiales ex aquis distillatis C. B., Melissæ, Scabiosæ, Scordii, Vlmariæ paratæ; electuaria Hyacinthinæ, Alkermes, Theriacæ; Antimonium diaphoreticum; oculi

cancrorum ; aqua florum aurantium aut Cynammoni hordeacæ &c. syrupus cariophylli eorum nonnulla congrua dosi pro circumstantiarum ratione di-
simul copulando.

Hujus remedii coclear aut uncia semis quarta quoque hora ægris propinatur dosim augendo aut vices repetendo , si casus urgeat efficaciora addendo Lili-
um nempe Sal volatile C. C. aut viperarum idonea dosi , neque sunt con-
temnendæ guttæ flavæ aut albæ sic dictæ *Ducis la Motte*, etiamsi revera species
sint aquæ fortis imperfecte edulcoratæ.

Postrema indicatio postulat abrasionem partis gangrenatæ, incassum ceteris adhi-
bitis remediis ; ea præsertim potissimum locum habent in prolapso utero inti-
mius gangræna foedato cui aliter mederi spes desit , idem quandoque usuvenit
in simplici uteri descensu citra gangrænam quando pro aucta crassitudine redu-
ctio impediatur, non desunt exempla in capite *De uteri descensu* enuncianda ubi
hujus amputationis methodus fusius explicabitur ; eadem extirpatio tutius pera-
gitur dum vulva gangræna deturpatur, cujus rei observationem reperies apud Vie-
rum (a) at ea prorsus frustranea atque impossibilis evadit tum in vaginæ, cum
uteri naturali modo locati maceratione

Tandem in uteri gangrænæ amputatione subsequentes animadversiones erunt
sedulo perpendendæ.

1. Jura leviora exhibere in gangrænæ saltem progressu necesse erit, quod si
morbus consistat, brodia carnibus saturata aut orizæ cremore, vel luteo ovorum
inspissata erunt exhibenda.

2. Alvum quotidie laxare oportebit clysteriis emollientibus.

3. Ægras ita locare fas erit ut ventris altior positus puris fluxum per vagi-
nam expediat ; hæc methodus minus necessaria videtur dum uterus injectionibus
irroratur, quæ ibi persistere debent.

4. Ægras subinde leniter purgare oportebit modo gangræna desistat aut
ejusdem maxima pars avulsa sit ; leniora tamen purgantia erunt præscribenda
ex uncia, & semis Mannæ, vel duplici uncia Mannæ, aut Cassiæ in grandiori
cyatho feri, aut decoctionis Althææ solutæ.

Remedia proposita adversus uteri Gangrænam, quibus tute uti potest.

Paucis ab hinc annis per totam Europam invaluit adversus gangrænam speci-
fica corticis Peruviani efficacia ; primam circa hanc rem observationem Chi-
rurgus Anglus ostendit nomine (M. Ruschvort in Northampton) ; anno
1715. ipsa instituta fuit in iis gangrænis quæ a febribus intermittentibus origi-
nem, aut progressum ducebant, ut in iis tantum circumstantiis ille hoc
pharmacum præscriberet, in quibus solum fortasse utiliter usuvenit.

At paullo post Medici Londinenses experiētiis comprobare tentarunt illam in
omni gangrænâ a causa externa orta convenire, febrem ea, vel non intermit-
tentem, aut continentem comitem haberet ; nonnullæ eorum animadversiones
reperiunt in *transactionibus Anglicanis* anno 1732. ; specimen vero confirmatæ
hujus observationis in versione cum notis hujus voluminis legitur D. Bremond.

Demum publici juris facta hujusmodi observatio Scoti novis experiētiis ipsam
illustrarunt quod constat ex *Observationibus Medicis Societatis Edimburgensis*
Tom. II. Art. XXXIV. Tom. III. Art. V. & VI., & Tom. IV. Art. X., quare
non

(a) Observation. Medicar. Lib. I.

non solum Anglorum inventa confirmarunt, verum China China in omni tum ab externa, cum interna causa nata gangræna ampliarunt.

Hujus rei felix eventus apud Alemanos transitum fecit, quare D. Heisterus, Universitatis Helmstadiensis Publicus Medicinæ Professor celeberrimus, remedium non inutiliter in duplici casu tentavit, ejus observationes naturæ curiosis communicavit quæ Volumine quinto *Observ.* 156. pag. 520. reperiuntur.

Liceat hic mihi animadvertere D. Tacconum Celeb. Medic. Bon. haud paucam sibi laudem promeruisse qui hujusmodi experientias utiliter reiteravit, verum de iis loculentissimum libellum nuper conscripsit.

Abramus Vaterus Medicinæ Professor Vittembergenfis dissertationem scripsit *de efficacia admiranda chinæ chinæ ad gangrænam sistendam in Anglia observata*, plures tradidit observationes, quæ tamen minus fide dignæ sunt.

Apparet etiam apud Gallos & Parisienses præsertim non defuisse qui hujus remedii virtutem tentare non maluissent, at eventus conceptæ spei, & Anglicis observationibus non respondit. D. Georgius enim Christoforus De Tharding Professor Medicus in Rostock, verum Regis Daniæ Medicus parvi faciebat hujus remedii efficaciam quam animose adversus gangrænam ceteri jactabant, ut in suis Thesibus apparet quas Rostock defendit an. 1746. atque Celebr. Hallerus in Colectione Thesium Medicinalium inseruit Tom. VI. *De corticis chinæ efficacia in gangræna & sphacelo adhuc dubia.*

Ea tamen minime sufficere suadeo ad rejiciendum pharmaci usum adversus gangrænam; procul enim audaciæ nota nemo contentionem definire audebit, verum caute incedendum erit illum sedulo perscrutando antequam animose amplectamur, secus enim maxima præoccupatio recentiorum remediorum materiæ medicæ incertitudinem potius augere, quam explanare potis esset.

Nihilo tamen minus cum hujus pulveris usus nullum detrimentum inferat fas erit remedium tentare in desperatis præsertim casibus internæ gangrænae, ubi cetera remedia, topica præsertim, frustranea videntur, qua de causa methodum referam pro circumstantiis diversis qua in Anglia hujusmodi remedium exhibebatur.

Corticis Peruviani enim exhibitio tum in Anglia, cum in Scotia gangrænam adversus nihil differt ab ea quæ in febribus intermittentibus obvia est, præscribunt enim semel bis in die, vel quarta quoque hora si opus requirat ad dosim interdum scrupuli unius, crebrius tamen ad drachmam semis, scrupulos duos, aut drachmam; autumo poroæque in substantia vel in decoctione eandem utilitatem afferre modo dosis servetur, haud inutiliter etiam profecuturi erimus Chirurghi Londinensis monitum Joannis Schipton, cujus rei libellum in *translationibus Anglicanis* extat an. 1732., ipse docet; resinam, aut extractum pulveris loco, & minori dosi esse exhibendum, verum in hoc casu salem præcellere, vel saltem extractum testatur methodo confectum D. de la Garraye, nam putat China Chinæ virtutem magis servare quam cetera extracta.

De cetero supervacaneum censeo animadvertere China China usum minime implicare exhibitionem ceterorum remediorum adversus hunc morbum usitatorum; effectus enim China China adhuc valde incertus est, & gangrænae exitus valde funestus, ut imprudenter in ea nimiscunctemur, ceteris usitatoribus neglectis remediis, & temporis diuturnitate confirmatis.

C A P U T III.

De Aposthemate, seu uteri abscessu.

§. I.

Descriptio, & Differentiæ.

I. **Q**Uando uteri infartus inflammatorius impar sit uteri gangrænam inducere; vel quia ipse nondum vasorum oscillationes penitus intercipiat, vel causæ eum producentes ita violenter agant, ut integram resolutionem implicant, tunc humor in utero redundans in pus degenerabit, quod in aliqua parte congestum aposthema, aut abscessum gignere potis erit.

Dum ea peragitur humorum corruptio in inflammata parte inflammationis phenomena valde increscunt calor, rubor, dolor, tensio, febris &c., imo rigores crebri, breves, irregulares superveniunt.

Ea phenomena suppuratione perfecta, & aposthemate aut abscessu confirmato imminuuntur, verum neglecto morbo exacerbationes citius duplicantur, & in diem vehementiores fiunt, quæ in sudorem colliquativum, & lentam febrem desinunt, ægræ dein emaciantur, pallent, arescunt, urinæ turbidas purulentas minguunt, colliquativo ventris fluxu laborant, aut anasarca, modo pus sibi viam non pandat, aut hanc ipsi non aperiamus exeunti.

Suppurationis prænuncia, modo citius, modo serius apparent plerumque tamen intra sextum, aut septimum, & undecimum aut duodecimum inflammationis diem occurrunt.

II. Eadem accidentia, vel saltem valde similia citra aliquam præcedentem inflammationem interdum eveniunt; in hoc casu ægræ statim tumorem, tensionem, calorem in utero perferunt, quæ mitiora sane experiuntur quam in inflammatione, ita valida tamen persistentiæ saltem causa, ut sedulam attentionem mereantur.

Interdum ea symptomata deservescunt, ita ut morbum abire credamus, at paullo post horores revertunt a lenta febre persecuturi, quæ semel, vel pluries in die recrudescit; iis de causis ægræ macie corripici incipiunt, pulsi turbantur, & febriles evadunt, dolor, tensio, calor, atque tumor renovantur aliquam uteri partem respicientes, quæ in suppurationem vergit.

Anallogia cum morbis pectoris præsertim, & cadaverum inspectione deducitur a tuberculis morbum incipere in substantia tunicarum uteri locatis, quæ in diem augentur, augentque phenomena illa omnia valde teterrima.

III. Igitur duo erunt species aposthematis aut abscessus uteri, quæ causæ producentis ergo inter se differunt, altera inflammationi succedit, & phlegmonosa appellatur, altera tuberculis quam tuberculosa dicunt, veteres eas non latebat quibus prima erat *calidum*, altera *frigidum* aposthema.

Ceteræ differentiæ quæ haud paucae sunt a præcipuis morbi circumstantiis derivantur.

Ideoque morbi gradus respectu, *abscessus fiens* dicitur dum vehementiora sunt symptomata, *factus* dum mitiora apparent.

Positus morbi ratione abscessus, fundi, lateris aut colli uteri dicitur anticus, vel posticus, tum vaginæ aut vulvæ.

Distinguitur extensionis ergo in magnum, profundum, vel exiguum, aut superficiale.

Verum modo simplex appellatur abscessus si unica cavitate pus coacervetur; cellulosus vero si per plures anfractus invicem communicantes sanies pervaget.

Tandem vel *non complicatus* quando simplex est abscessus, vel *complicatus* si cancro, aut syrrho copuletur.

§. II.

Causæ.

Cum abscessus inflammatorius, & tuberculosus inter se differant, ideoque duplicem postulaverint explicationem;

I. Inflammatorii abscessus respectu jam in Tractatu de Tumoribus ubi de supuratione locuti sumus quæ illum producit, ostendimus,

1. Ex quatuor partibus conflare sanguinem ex rubra nempe seu globulosa; ex lymphatica gelatinosa seu melius fibrosa, ex lymphatica tenuiori; denique ex serosa; ex iis elementis lymphæ gelatinosa, & tenuior in pus converti possunt, vel prior solummodo.

2. Quare in omni inflammatione, quæ in suppurationem vergit, necessum erit quod rubram partem, serum, atque lympham tenuiorem, vel absorbeant vasa venosa, vel evaporatio earum maximam partem demat, gelatinosa tantum superstita in pus reversura.

3. Hujusmodi gelatina ut in saniem se convertat plures mutationes subire debet, videlicet, 1. Quod liquida persistat etiam frigefacta, cum antea glaciei more inspissaretur. 2. Quod aqua saponis modo se solvat, cum prius insolubilis experiretur. 3. Quod falsa, acris, corrodens fiat, etiamsi prius insipida, & dulcis esset. 4. Quod ex inodora situm redolet. 5. Verum opaca cinerea fiat etiamsi antea clara, alba, lactea appareret. 6. Tandem aqua specificè gravior evadat cum antea levior foret. Hæc totidem conditiones sunt, quæ a pure distinguunt naturalem gelatinosam lympham.

4. Omnes denique hujusmodi mutationes quæ necessarissime sunt ut lymphæ illa in pus convertatur per successivam vasorum turgentium oscillationem accidunt, quæ jugiter quassando, succutiendo, aut subjigendo gelatinosas moleculas facile eas alterationes inducit quas intimius perscrutari supervacaneum censeo.

Generalior hujusmodi Theoria sufficit ad explicandam specialem abscessus uteri generationem, nam evidens est.

1. Aut vasa in inflammata uteri parte rubram, serosamque substantiam ibi stagnantem per resolutionem haurire, aut per evaporationem expellere.

2. Verum mora gelatinosam lympham a vasorum pressione alterationes omnes subire necessarias ad pus gignendum.

3. Hujusmodi metamorphosis sanguinis in pus nedum accidit in ea inflammatione, quæ in gangrenam definit, nam citius quam par est oscillationes vasorum tunc abeunt, antequam suppurationem inducant; Item in inflammatione, quæ per resolutionem tollitur, nam in eo casu sanguinis circulus restitutus oscillationibus arteriarum non fit obnoxius quæ valeant ipsum vitare.

4. Verum gignitur in ea tantum inflammationis specie quæ neque in gangrenam neque in resolutionem definit; nam in confluentia horum casuum ex una parte oscillationes diu persistunt, ex altera sanguis morans earundem actioni expositus tandem in pus converti debet.

5. Ea nunquam cis diem sextum neque trans decimum solet supervenire; non cis sextum, quod tempus requiritur ut arteriarum vibrationes valeant sanguinem

in faniem mutare, neque trans decimum quia oscillationes quę per decem dies continue impares fuerunt ad suppurationem gignendam, modo validiores non fiant, minime valebunt citra hoc tempus eam generare.

6. Tandem suppuratio citius, aut serius procircumstantiarum, aut subjectorum diversitate erit superventura. 1. In ratione nifus, & frequentia majoris, vel minoris oscillationum turgentium vasorum sanguine in eodem statu persistente. 2. Prout sanguis plus minusve dispositus sit ut in pus converti sinat, in eodem gradu oscillationibus persistentibus. 3. Prout ambæ hæ causæ simul concurrant, videlicet tum in ratione nifus, & frequentia oscillationum, cum dispositionis sanguinis.

II. Abscessus tuberculosi respectu omnis ejusdem theoria a tribus potissimum subsequenter causis dependet: 1. Qualia sint hujusmodi tubercula quæ abscessum inducunt? 2. Quomodo ea in utero efformentur? 3. Qua de causa suppurentur?

Quæstio prima. Tubercula generice grana sunt glandulosa, dura, firma, compacta, alba, levigata tunica obiecta fortiter adhærenti, spherulam, aut spheroidem plerumque referunt, at crassitudo eorum, & numerus in singulis casibus, & subjectis variare solet; interdum ea pisum adæquant, vel exiguiora sunt parvi faciendâ; interdum nucem, aut ovum columbi magnitudine non superant; quandoque quamvis exigua tamen confertissima sunt; quandoque pauciora apparent, verum crassiora valde, & ampla.

Structuræ partium cognitio, ubi tubercula communiter efformantur, ostendit tres species tuberculorum distingui; 1. Ea quæ in exiguis glandulis coagmantur, quæ per omnes partes incedunt, & sunt potissima causa segnitiei circulantis lymphæ. 2. Illa vero quæ efformantur intra nodos venarum lymphaticarum capillarium, videlicet in confluentia valvularum sygmoidarum, ubi venæ sunt per intervalla intersectæ. 3. Tubercula quæ originem habent in glandulis cuicque parti propriis, ut bronchiales in pulmone, & intestinales in intestinis.

Quare ut in viam revertamur, tubercula de quibus agitur uteri propria a tripli-
ci loco oriri possunt. 1. Intra exiguas lymphaticas glandulas ibi locatas. 2. In-
tra nodos ramificationum capillarum venarum lymphaticarum quæ per uteri
tunicam repunt. 3. Intra vasa lactea uteri propria quorum structuram atque
usum breviter explicavimus in *Cap. I. Lib. I.*

Quæstio secunda. Cum tubercula semper necessariæ consecutiones sint turgentia glandularum, aut venarum lymphaticarum, vel vasorum lacteorum, ideoque necesse erit lympham affluere in iis glandulis, aut venis in primo & secundo casu, aut in postremo lac vasa vermicularia infarcire.

Tunc enim lymphæ, aut lacteus uteri liquor nequit intra propria receptacula cumulari nisi hac triplici de causa: 1. Vel quod spissiores sint quam in statu naturali, ut circumvehi impendantur. 2. Vel quod angustiores sint anfractus per quos libere transire nequeant. 3. Vel quia ambæ hæ causæ simul concurrant ad hanc æconomix animalis partem pervertendam.

Fusius infra examinabimus hujusmodi tres causas cum de syrphis verba facie-
mus, sat erit enim hic animadvertere. 1. Priorem casum videlicet lymphæ spif-
situdinem, aut lactis uterini oriri, 1. Ab usu viliorum alimentorum, quæ cras-
siorem chylum suppeditant. 2. Ab eorum incompleta digestionem, etiam optimo-
rum quæ non bene subactum chylum præstant. 3. Ab admixtione fomitis vene-
rei, strumosi, aut scorbutici &c. quæ sanguinem inspissat. 4. A repentino fri-
gore quod casu fortuito uterum infestat, ibique circulantes humores condensat.

2. Verum alterum casum, videlicet canalium occlusionem per quos lymphæ, atque uterinum lac transire solent, ab erethismo pendere, aut convulsiva crispatione quæ fibras uteri laceffit feminis virulenti ergo, quod communicaverint albus fluor, & acer, aut usus injectionum stimulatium, & corrodentium, ictus, aut

aut collisio uteri, vehementiora animi pathemata iræ, lætitiæ, aut mœroris &c præsertim menstribus fluentibus, aut Lochiis.

3. Tertium denique casum, connubium nempe duorum priorem procedere, a specialium causarum utrinque affinitate quæ hanc copulam gignit; consequitur enim 1. Numerum tuberculorum ab extensione causarum producentium originem ducere; idcirco prout magis lymphæ, aut lac uterinum inspissabuntur; fibræ matricis crispabuntur; verum quo magis lymphæ, aut lactei humoris in propria receptacula detinebitur, confertiora erunt tubercula, & contra in oppositis circumstantiis.

2. Magnitudinem tuberculorum facere facilem dilatationem glandularum, venarum, aut turgentium vasorum, verum nifum quo eo lymphæ, aut lac impelluntur; ideo quo magis dilatabilia erunt organa illa, eo grandiora fieri tubercula videbit, at contrarium eveniet, si oppositæ causæ agant.

3. Duritiem tuberculorum a gradu spissitudinis pendere lymphæ, aut lactis uterini, ideo quo citius, ac validius ii humores inspissabuntur, eo tubercula erunt compactiora, & contra in opposito casu.

4. Tandem tubercula quantumvis dura apparuerint, compactiora semper erunt in circumferentia, quam in centro; humor enim qui tuberculi internum parietem lambit, primus est qui retardatur, atque inspissatur; contra vero qui centrum occupat liquidior est, serius detinetur.

Tertia Quæstio tubercula matricis æque ac ceterarum partium crebre in suppurationem vergunt; hæc corruptio in cenno plerumque incipit tuberculi, ubi vidimus materiem fluidiorem esse, ideoque magis dispositam ad hanc mutationem suscipiendam:

Etenim nisi violentioribus contractionibus arteriarum, circumpositarum hujusmodi suppuratio tribui potest; evidens porro est auctum vasorum pulsum agitare, quassare, succutere, sensim sensimque retentam lympham in pus convertere, ut in inflammatione partis crassioris sanguinis lymphaticæ evenire observavimus.

Et iis consequitur nedum tubercula suppurari nisi, inflammationis ergo, aliqujus propinquæ partis arteriæ validius commoveantur; vel ictu, contusione, aut frigore pars afficiatur infirma; intemperanter vescantur cibis acrioribus, spirituosioribus, calefacientibus; denique pervigilio, animi pathemate, exercitio nimio, solventium abusu &c. crucientur quæ una similem effectum præstant.

Nihilominus enim, etiamsi suppuratio tuberculosa & inflammatoria haud levem affinitatem habeant, in utroque tamen casu pus diversæ indolis reperitur; quod inflammatio suppeditat album est, spissum, equale; quod vero gignunt tubercula serosum, cinereum, inæquale, & grumosum &c. itaque illud ex gelatinosa sanguinis lymphæ magis corruptibile efformatur; hoc ex vulgari lymphæ producitur, aut peculiari humore haud facile eæ mutationi prono; alterum denique promovent propinqui arteriarum pulsi, & validiores; alterum imbecilliores, atque distantes.

Qualitati etiam materiæ in tuberculis detentæ, atque inertię causarum suppurantium segnitiam tribuunt, qua tubercula marcescunt; interdum incepta suppuratio in aliquo tuberculo diu citra sensibilem augmentum persistit; attamen augetur tandem, ichor tumescit, rarefcit, tuberculum inflatur, emollitur, receptaculum gignitur aut *cystis*, aut si mavis tuberculosus abscessus.

Quod de uno tuberculo dictum est, idem de pluribus in aliqua parte locatis dicendum erit; nam causæ æque agentes, eosdem prorsus in hac mutatione effectus præstant, hac de causa unius tuberculi putrescentia ceterorum præsentem aut proximam suppurationem indicabit, pro diversa causarum applicatione, & suppurantis materiæ qualitate.

§. III.

Symptomata.

1. **D**Um abscessus producitur, ichor in parte affecta rarefcere debet, ibique nerveas laceffere fibrillas, vafa capillaria comprimere, fanguinis curfum fiftere, pulfum arteriarum intendere; iisque de caufis tensionem, dolorem, atque calorem augere.

2. At abscessu jam confecto ea fymptomata iminuuntur, vel quod pus non amplius rarefcatur, aut minus; vel quod inducta a fuppuratione continui folutio vafa, fibrafque laxet.

3. Dum pus in abscessu congeritur, ejufdem pars non exigua a vafis hauritur fanguineis, & lymphaticis propinquis, quæ illum in fanguinem devehunt; hujufmodi inquinamentum tunc lentam febrem inducere debet pro ratione falium quibus faturatur, quæ humores folvunt, crebrioresque excitant cordis, & arteriarum contractiones.

4. Ea puris transfufio augeri poteft per caufas accidentales, pervigilium nempe, dolorem, corporis aut animi commotionem, remediorum applicationem, aut partium vibrationem &c. tuncque fanie magna copia tranfducta condensabit fanguinem ferius ea nondum perfecte remixtum, quod rigores plus minusve frequentes excitabit, fenfibles, aut regulares, prout pus illud citius, vel ferius aut uberius cruorem deturpabit.

5. Cum intimius ichoris flocci fanguinem penetraverint, horrores imminuentur, febris explicabitur, quia libere tunc falia agent adverfus cor, atque arterias; ex eo procedunt febriles accessus que rigoribus fuccedunt, plus minusve diutini pro copia, aut qualitate puris producentis, qui, humoribus folutis, in fudorem colliquativum definunt.

6. Ex anteaftis deducitur abscessum, matricis præfertim, jugiter febrem lentam inducere, persistentem ufque dum pus effluit, quam comitantur exacerbationes irregulares, rigores, & confequuntur fudores colliquativi; huic febrim enim, & fanguinis folutioni macies tribuuntur, confumptio & ægrotantium excidium.

7. Quando pus quo fanguis inquinatur uberrimum fit nimis, atque fpiffum ut difficillime, aut imperfecte folvatur, ejufdem flocci, aut guttæ aliquot urinosam ferofitatem deturpant, & per renes feperantur, ut lotium turbidum, foetidum, atque purulentum appareat.

8. Ea fœnomena magis confpicua funt in inflammatorio, quam tuberculoso abscessu, quia in illo pus undique effunditur, in hoc a circumpositis membranis impeditur, nifi ipse difrumpantur.

9. Pus in abscessu collectum uteri continenter tunicas erodendo tandem vel per vaginam antè aliquam fibi pandit viam, vel multiplicem pofterius; modo enim veficam aut rectum penetrando per lotium, aut alvum materies feperabitur; modo, circa techam teretium ligamentorum ferpendo, aut latera vaginæ, iuguina aut pudenda infarciat; modo in abdominis cavitate collectum erumpi impeditur. Hujufmodi exeuntis puris femitæ diverfæ a vario abscessus poftitu dependent; quando abscessus internam uteri faciem deturpat (quod crebrius evenit) intra ipsum difrumpitur; exterius vero erumpit dum externam faciem matricis lædit; in poftremo cafu prout abscessus uteri fupradictis partibus propinquus erit, eo concifo, hanc vel illam ichor infestando fibi viam aperiet, peritonæum interdum perfodiendo.

§. IV.

Diagnosıs .

I. **D***iagnosıs morbi .* Omnem inflammationem plerumque suspicari licebit in abscessum vergere, modo decimo, aut duodecimo morbi die inditia perfectæ resolutionis non appareant; verum uterus doleat, atque durus, & tensus persistat.

Signa pene certissima erunt instantis abscessus quando loco resolutionis, doloris, tensionis, atque caloris augmentum, aut febris exacerbatio appareant sine causa manifesta.

Tandem nullum superest dubium uteri abscessus, quando persistunt in hac parte tumor, pondus, & abscessus dolor, tum lenta febris, exacerbationibus obnoxia, quam rigores præcedunt, & sudores subsequuntur, qui ægras labefactando marasum inducunt.

Signa hujusmodi abscessus qui a tuberculo suppurato procedit, valde incerta sunt: initio enim morbi illum nihil prænunciat, levior tantum suspicio adest modo tuberculum increseat, nam ægræ tunc circa uterum constanti tensione, atque dolore cruciantur; tandem certiores fieri incipimus tuberculum intra uteri substantiam referari, nam tunc pus ibi expansum eadem phenomena producit, quæ abscessus inflammatorius induxerat etiamsi tunc mitiora appareant.

II. *Diagnosıs specierum morbi*

1. Abscessus vel *fiens* dicitur & augmento doloris, caloris, tensionis uteri, atque febris exacerbatione ipse innotescit; vel abscessus *factus* appellatur & fenomenorum imminutione, febre lenta, rigoribus, exacerbationibus atque sudoribus colliquativis qui marasum progignunt dignosci solet.

2. De abscessus positu judicamus a positu majoris doloris, atque resistentiæ quam ægræ perferunt.

3. Ejusdem extensio a tensionis, doloris extensione, & tumoris volumine cognoscitur.

III. *Diagnosıs causarum.* Certi esse possumus abscessum *phlegmonosum* esse modo inflammationi uteri succedat, cujus resolutio vel nullo modo, vel imperfecte fieri potuit; progressus hujusmodi abscessus plerumque facile patefcunt.

Tuberculosum vero abscessum sine præcedenti inflammatione evenire solet, ejusque incrementum segne est & symptomata eo valde mitiora sunt.

§. V.

Prognosis .

Abscessus uteri morbus valde periculosus est; vel ille durus, compactus existat; vel disrupturus sit.

1. In *primo casu*: 1. Pus qui in abscessum irrumpit insensibiliter sanguinem inficit, ibique persistens febrem lentam quæ ægram minatur inducit in consumptionem, aut hydropem desitutam.

2. Si pus in abscessu valde spissum sit parietes indurefcit, qui callosi fiunt, & temporis diuturnitate carcinomatosi.

3. Si pus vero liquidum & acerrimum sit sensim sensimque destruit solidas partes, & matricem lædit ita ut uteris in corruptionem, aut gangranam vergat.

In *Secundo casu* ignoramus qua ex parte abscessus disrupturus sit: 1. Si in abdo-

abdominis cavitate refferetur pus ibi collectum, atque expansum gangrænam certissime induxerit.

2. Si intra vesicam, aut rectum rumpatur pus affluere poterit, ut diutius egræ vitam gerant febre lenta tandem morituræ.

3. Nonnihil spei aderit si abscessus inguina, aut vulvæ labia infestet, nam facilem puri viam parare poterimus ulcusque detergere, quod tamen plerumque impossibile est consolidare.

4. Tandem abscessus plerumque intra uterum refferatur, quod etiamsi minus periculosum evadat, ulcus relinquit foetidum, & curatu difficillimum, cujus consecutiones valde lethales sunt ut capitulo subsequenti ostendemus.

II. Detrimentum uteri abscessus etiamsi maximum sit, variat tamen diversis circumstantiis.

1. Pro magnitudine abscessus, qui si modicus sit, & exiguus, minus periculosus evadit, & contra.

2. Pro ejusdem positu, nam qui vulvam infestat minus nocuus quam ille qui vaginam lædit; & qui vaginam offendit minus periculosus est quam si uterum lædat.

3. Pro ipsius natura, nam tuberculosus phlegmonoso mitior est.

4. Pro abscessus specie, nam simplex complicato minus, calloso nempe, syrrhoso, aut carcinomatofo læthalis experitur.

5. Pro uteri statu, nam abscessus qui per accidens uterum foedat de cetero bene constitutum, minus infensus evadit quam si matricem deturparet ægram, tumidam, aut laxatam.

6. Pro ægrotantis constitutione, aut ætate, ideoque abscessus magis noxius evadit in subjectis infirmis, cacheticis, aut in senibus quam in sanis mulieribus juvenibus, & bene constitutis.

§. VI.

Curatio.

IN duplici casu nostrum erit abscessum pertractare ægrotantis uteri; vel quando suppuratio fit; vel suppuratione perfecta.

1. Suppuratione persistente, seu melius increcente, sat erit calorem, dolorem, tensionem partis affectæ, atque febrem ipsam compescere ut inflammationis progressus, atque abscessus consecuturi extensio inhibeatur.

Hac de Causa 1. Cubiti venam incidere fas erit, idque reiterare prout ægrotantium vires permiserint.

2. Optimum erit consilium reiterare remedia laxantia humectantia, & anodyna, quæ partem affectam lacecant, eaque præscribendo sub injectionum, pessarium cataplasmatum, aut fotuum forma ut Capitulo præcedenti exposuimus.

3. Exquisitam diætam jubeto ex jure vituli aut pullorum, modo ægrotantium imbecillitas majorem nutritionem non poscat.

4. Alvum clysteriis laxare fas erit; verum si morbi violentia sinat, leviora apozemata convenire possunt ex Manna, aut Cassia confecta.

5. Tandem si dolores acutiores sint modico narcoticorum usu obtundere illos poterimus quarta vel sexta quaque hora tantum ipsa exhibendo.

II. Perfecta vero suppuratione, & confirmato abscessu exituro puri semitam parare oportebit, ut citius ipso evacuato minus affectæ partis contextum destruat.

1. Si abscessus vulvæ labia deturpet, facile est ipsum phlebothomo fecare inferio-

feriorem partem versus, ut puris effluvium promptius eveniat ulcusque facilius detergatur.

2. Si abscessus latera vaginæ foedet, pariter phlebothomo indici digito applicato manus dexteræ illum scindere necesse erit, vel speculo uteri adhibito vaginam dilatare ut illum tuto etiam scalpelli falcati ope aperiri queat.

3. At si abscessus uterum lædat tunc eum aperire conabimur, commotiones excitando, quæ valide uterum fucutiant; hujusmodi sunt sternutatio, vomitus, thussis, nifus in excernendis fecibus &c. quare ægras admonere oportet ut validius tussiant, verum errhina, emetica, clysteria, irritantia, stimulantia, & suppositoria, quæ intestina laceffunt frequenter adhibeant.

Errhinorum respectu sufficient plerumque Nicotiana, Salvia, Bethonica aut pulvis radicis Iridis Florentinæ; verum si pulveres hujusmodi debilius agant addi poterit parum Piperis longi, aut rotundi, Pyrethri, Veratri, aut Euphorbi, sedulo circa eorum dosim morbi gradui ratione habita.

Emeticorum ergo usitatoria sunt tartarum emeticum solubile ad grana tria vel quatuor, modo methodo Parisina præparetur; etiam si & Itali ipsum egregie patrare potis sint; verum optimum censetur vinum emeticum ad unciam aut drachmas decem; Ipecacuanha etiam usu venit ad grana circiter 25. aut 30. si aliqua indicatio illam poscat; emetica antimonialia efficaciora tandem præscribuntur ad duo vel quatuor grana, si vulgaria inefficacia experiantur, quod tamen rarissimum est.

Ut clysteria irritantia evadant, adduntur plerumque vulgari decoctioni duæ vel tres unciae mellis Mercurialis, vel sex drachmæ, aut uncia Diaphenici, vel *hiere-picræ* aut unciae duæ vini emethici.

Tandem suppositoria componuntur ex duabus vel tribus uncis mellis cocti cum drachma salis gemmæ, aut communis; verum si illa efficaciora malueris addito drachmam *hiere-picræ*, aut scrupulum semis diagridii; vel trochiscorum alhandal.

C A P U T I V.

De uteri ulcere.

§. I.

Diagnosis.

Uteri ulcus, ceterarum ulcerum more, solutio est continui, seu scissura faciei internæ matricis vetustior, quæ pus, aut purulentam saniem effundit.

Fœnomena quæ præcedunt, aut symptomata concomitantia, vel consequentia indicant interdum hujusmodi scissuras profundiores esse, intra uteri tunicas, ejusdemque substantiam locatas; interdum superficiales excoriationes referentes.

Cadaverum inspectio eam, circa istiusmodi ulceris species, sententiam confirmavit, ostenditque illas ab aphthis haud absimiles esse confertis plus minusve, quibus uterus scatet, interdum verum rhagadia, aut incisiones referre profundiores, quæ matricis cavitatem fulcant.

In omnibus iis ulcerum speciebus pus, ichorve ex utero profluit quod ægrorum indusium inficit; illa vero sanies plus, minusve uberrima est, aut acris, spissa quandoque ut verum pus repræsentet; interdum liquidior seu melius

parulentum ferum emulatur. Colore etiam variat modo alba, cinerea; modo flava, aut viridis pro circumstantiarum diversitate apparet; tandem hujusmodi morbus dolorem initio comitem habet qui in progressu acutior fieri solet, atque lancinans; hic modo dextrorsum, modo sinistrorsum lumbos, clunes, inguina, aut femora torquet.

§. II.

Causæ.

HUjusce ulceris affinitas cum ceteris ulceribus quorum origo satis perspicua est, demonstrat ea a tribus potissimum causis oriri; 1. ab abscessu, aut aposthemate præcedente, in utero disrupta; 2. ab erosione sensim sensimque nata circa internam faciem matricis, nullo antecedenti abscessu; 3. ab ulcere quod cavum uteri deturpat, & in fistulam degenerat, eæ omnes causæ singillatim explicabuntur.

I. Abscessus uteri de quo superiori capite locuti sumus, modo aperiatur, ulcus fit pus effundens; verum cum ille cavitatem efformet intra uteri tunicas ulcus hinc ortum sinuosum evadit, quod per uteri substantiam flexuose reptat.

Vidimus jam præcedenti capite abscessum duplicis generis esse, alterum *Phlegmonosum* quem gignit inflammatio, aut suppuratum Phlegmone; *tuberculosum* alterum seu *steatomatosum* a tuberculo procedentem, aut cystico tumore, quod duplicem etiam ulceris speciem in utero inducit.

II. Erosio faciei uteri internæ altera causa est valde obvia ulceris quæ diversimode oriri potest; etenim vel

1. Illam faciunt fluores albi, acres, vetustiores qui matricem laxant, & excoriant, vel

2. Foetus, molæ, aut placentæ putrescentis retentio, vel

3. Injectiones acres, corroderentes, aut stypticæ, quas nonnulli Chirurgorum imprudenter præscribunt adversus uteri descensum, aut album fluorem, vel

4. Coitus cum viro venerea lue laborante; vel

5. Acrimonia menstrui sanguinis, lymphæ, aut lactei humoris, quæ albos fluores inducit, præsertim si ii humores viri admixtione scorbutici; strumosi, aut venerei, tum sanguis ipse inquinentur.

III. Raro tunc uterus vulneratur, crebre tamen diversa ratione excoriari potest.

1. Ictu unguinum imperiti obstetricantis in laborioso partu

2. Instrumentis perperam adhibitis in extractione fœtus mortui, aut capitis in utero superstitis.

3. Violentiori secundinarum extractione valde cum utero coherentium, quæ ejus aliquam partem secus exportent.

4. Turpi methodo quam nonnullæ adhibent vulnere sepe causa.

§. III.

Differentiæ.

SI rite perpendamus quæ adhuc dicta sunt, verum ea animadvertamus quæ in plerisque ulceribus observantur, facile innotebit plures dari diversitates in uteri ulceribus.

I. Idcirco *causæ proximæ* respectu illud ulcus producentis; vel eum gignit abscessus uteri, vel erosio sensim aucta; vel scissura ejusdem internæ faciei.

II. *Causæ*

II. *Causæ remotæ* ergo; modo ulcus a viru procedit venereo in sanguine diu latitante, aut nuper per copulam in utero introducto; modo a scorbutico fomite, aut strumoso dependet, quo inficitur cruor; quare eorum respectu ulcera venerea, strumosa, aut scorbutica dicuntur, verum citra hujusmodi causas, ulcera simplicia appellantur.

III. *Positus* ergo, quem ulcus occupat, modo ipsum fundum, latera uteri detrorsum, aut sinistrorsum, superius, aut inferius; modo orificium matricis deturpat; quod fundum tamen infestat uti verum uteri ulcus consideratur.

IV. *Qualitatis* ratione ulceris illius; dum ipsius margo mollis est *Simplex* dicitur & *Benignum*; dum ejusdem ora dura, renitens reperitur *syrrhus* appellatur; quandoque *syrrhosa* labia dolentia fiunt, & lancinantia, & tunc ulcus *carcinomatofum* dicunt, & quasi cancer consideratur.

V. *Reptandi* modo; nam vel ulcera tantum internam superficiem uteri late deturpant, & *Superficialia*, seu *Erysipelatosa* vocantur; vel illa profunde rodunt substantiam & *Cava*, *Profunda* appellantur, quæ in *Sinum* aut *Fistulam* degenerant.

VI. *Communicationis* ratione quam cum partibus habent propinquis; nam ulceris materies interdum modo per rectum; modo per vesicam sibi pandit viam, ut in ulceribus profundis vaginæ evenit; præsertim vero in lateralibus uteri, quæ circa teretia ligamenta serpendo per alterutrum inguinum patefcunt.

§. IV.

Symptomata.

I. **I**N omnibus uteri ulceribus pus continenter effluit quod ulcus supreditat; post abscessum illud valde uberrimum stillat, spissum conspicitur, a laudabile pure haud absimile; at evacuato abscessu effluvium fit abundans minus, & ferofum magis.

II. In ulceribus quæ ab erosione aut scissuris procedunt virus stillans, initio morbi saltem, post erosionem præsertim, parum abundat, ut vix ipsum ægræ animadvertant; at, ulcere aucto, fluxus augetur; in hoc casu pus plerumque ferofum, lymphaticum, granulofum apparet, ut difficillime de ipsius qualitate judicare possimus; tandem ulcere increfcente uberius funditur, latex facilius dignoscitur.

III. Cum ulcus initio plerumque exiguum spatium occupet, ac de cetero uteri conditio eadem persistat, idcirco catamenia periodice ut in statu naturali erumpent, si dolorem excipias, quem interdum ægræ persentiunt menstruo fluente phlegmonosi infartus ergo, quo tunc afficitur ulceris margo; quandoque fluxus menstruus diu perdurat dum ulcus segniter progreditur desistit tandem quando uterus pene omnis ulcere fedatur.

IV. Ulcere aucto sæpe ipsum exigua corrodit vascula sanguinea, arteriosa, aut venosa, hincque fluens cruor pure remixtus sanguineum, vel saniosum saltem reddit effluvium plus minusve pro diversa crassitudine, aut turgentia eorum vasorum; interdum concisa vasa modo grandiora sint, aut arteriosa hæmorrhagiam inducunt, aliamve sanguinis jacturam periculofam valde.

V. Pus illud quandoque mite admodum est, neque situm redolet, neque vaginam, aut vulvam lædit; at sæpissime acre est, foetens, corrodens ut in transitu phlogoses, & excoriationes producat; hujusmodi differentias faciunt qualitas sanguinis, quæ ceteris paribus cum pure una est, & mora plus minusdiutina in utero viri, quod ibi persistens maxime corrumpitur in callefacto præsertim utero.

VI. Nervi qui per ulcus transeunt puris irritationi sunt obnoxii, quæ dolorem excitabit in uteri ulceribus obvium.

VII. Hujusmodi dolor levis est, parumque sensibilis quando ulceris labia inflammata non sint, pus mite, & parum corrodens experiatur, verum minus sensibilem uteri partem ulcus occupet, quæ fundus est, vel alterutrum latus; acutior contra dolor per sentitur in inflammato ulcere pure acriore infecto, aut circa collum, vel orificium uteri locato.

VIII. Dolor variat etiam pro diversa ulceris conditione, si illud syrrhosum fuerit, nullam, vel leviolem impressionem pus excitabit, deque eo parum vel nihil conquerebuntur ægræ, tamen vivissimum ipsæ dolorem per sentient si syrrhosum in carcinomatofum ulcus degeneret ut infra Cap. De cancro explicabimus.

IX. Quando pus mite est, libere fluat, verum tenuiore ægræ limpha donetur, ulcus numquam syrrhosum fit; contra vero accidit si illud acre sit fibrasque erodat, verum in ulceris cavo detentum valeat tum labia ejusdem fedare, cum lymphæ cursum intercipere, vel denique hæc lympa naturaliter spissa sit, viscida & ad stasim disposita; hac de causa plerumque ulcera neglecta, aut imperfecte deterfa in syrrhum convertuntur.

X. Ægræ diversis partibus referunt dolorem quem per sentiunt pro diverso ulceris positu; ipsum renibus, seu melius inferioribus lumbis, aut ossi sacro respondere sibi suadent, si ulcus uteri fundum infestet; clunium alterutro si alterutrum latus laboret; ano aut vesicæ quando ulcus matricis orificium, aut vaginæ fundum afficiat; inguini tandem, aut interiori coxæ ubi rotunda inferuntur ligamenta per aponeurosim expansa, quando ad originem ligamentorum eorum oritur ulcus.

XI. Dum ulcere anterior colli aut orifici matricis, vel vaginæ pars deturpatur, tunc phlogosis, atque calor vesicæ collo communicatus mingendi frequentiam excitat cum ardore tamen, & stranguria in ratione causæ producentis majori vel minori, at dejectiones liberæ per alvum succedunt; contra vero quando postica colli uteri pars, aut fundi vaginæ eo morbo laborat phlogosis tunc propinquo recto communicatur quæ dolentem tenesmum inducit præsertim si feces duræ sint, facile tamen mingunt; hæmorrhoides nihilo secius superveniunt.

XII. Haud infrequenter vesica, & rectum majorem relationem habent cum ulcere illo, nam si fistulosum sit, antè fundum versus uteri aut vaginæ locatum, vesicam perforabit, ut urina per vaginam exeat; simili ratione dum posterius rectum versus pus sibi pandit viam, feces liquidiores, præsertim per vulvam, stillabunt.

XIII. Ulceris sinus undique indurescit ut uteri volumen augeatur; hoc augmentum ulceris progressus rationem sequitur; in simplicibus ulceribus in quibus margines naturalem flexibilitatem servant, uterus etiam si tumens, mollis persistit; at durus fit atque resistens dum ulcus syrrhosum evadit.

XIV. In omni uteri ulcere difficulter mulieres cum viro coheunt, hujusmodi incommodum tamen non semper unum est; initio enim morbi præsertim si illud a scissuris proveniat minus molestiæ induxerit; minus si fundus, aut latera uteri laborent; multum vero incommodi aderit, si vaginæ fundus, aut matricis orificium foedo ulcere laboraverint.

XV. In ulceris aggressu nulla vel pauca febris adest, at illa lenta sensim sensimque supervenit puris admixtionis ergo, cui ægræ dolores non parum favent, horrores & rigores duplicantur aut imminuuntur pro vetustate, & profunditate ulceris, pro copia aut acrimonia puris in foedum ulcus irrumpentis, pro vividis cruciatibus plus minusve crebris.

XVI.

XVI. Tandem ægræ ab hac febre consumptæ marasmo corripiebuntur, pedum œdemate in die crescente, diarrhœa vero colliquativa crebro laborabunt.

XVII. Pleraque eorum scœnomenorum dolor saltem qui partibus diversis respondet ægras perturbant, etiamsi leviter in omni tumore aut tensione partis alicujus uteri quamvis ulcere expertis; cavendum enim est, ne hujusmodi levioribus molestiis contemptis, ulcus succedat.

§. V.

Diagnos.

Diagnos *ulceris* uteri ut in ceteris morbis per gradus innotescit.

I. Agitur statim de ulceris existentia inquirenda quæ cito apparebit.

1. Per doloris sedem, quem mulieres persentiunt; partem cui ipsum referunt, & augmentum ejusdem prope menstrua.

2. Idem ostendit purulentum effluvium quo indusium quotidie inficitur; interdum difficillime distinguitur ab alvo fluore qui simul fluat, vel acer sit; patet tamen a dolore quo hic caret, verum aucto ulcere, dolore, & tumore uteri, ab odore, colore, ceterisque proprietatibus fluentis laticis facile innotebit secundum lactitans ulcus.

De cetero de iis tantum ulceribus dubitare poterimus quæ a scissuris, aut excoriationibus originem ducunt, quæ lente procedunt; verum si ea abscessus disruptus producat, antecedentia scœnomena satis indolem morbi declarabunt.

II. Cum certiones facti simus de ulceris existentia, quam citissime detegere necessum erit proximam illud producentem causam.

1. Evidens est quod pus dum copiose derepente exit, id a præcedenti suppurata inflammatione derivare, hujusmodi ulceris causa potissima.

2. At si ulcus tacite, insensibiliter procedat, pus vero sensim sensimque erumpat internæ uteri faciei erosionem, aut, scissuram ipsum inducere cognoveris; erosioni tribuitur si qua ex causis corrosionum nuper Articulo *De causis* enunciatis antecessa fuerit; scissuris vero referri debet cum nulla appareat erosionis causa, verum uterum lacinatum fuisse suspicetur.

III. Alterum est investigare remotas causas, quare ægrotantium statum percontari oportebit ut si quid adsit luis celticæ, scorbuti, aut strummarum seminum inotescat; si ægræ cachexia laborent, quæ ulcus confirmare potis sit, tandem iis continentibus causis deficientibus morbi origo accidentalibus tribuitur supra recensitis.

IV. Reliquum est variam indolem ulceris determinare.

1. Positus ergo quem occupat, quod simplici tactu præsertim cum uterus tumeat facile dignoscitur, partium notione quibus ægræ dolorem referunt, quæ lumbi sunt, os sacrum, inguina &c., tandem tutius digitorum introductione cognoscitur an ulcus uteri orificium aut fundum vaginæ sedabit.

2. Ulceris naturam perpendenti patebit illud phlegmonosum esse quando uterus caleat, atque doleat, febris adsit non exigua, spissumque pus erumpat; œdematosum si modicus calor sit, atque dolor, modica febris & serosum pus; syrrhosum tandem quando uterus dolore sit expers, durus, renitens, modo extrinsecus, modo intrinsecus digito ipsum tangendo.

3. Communicationum ulceris respectu cum ceteris propinquis partibus apparebit cum vesica ulcus communicare, aut cum intestino, si per alterutrum hytum pus effugiat; vel urina aut fæces per vaginam exeant.

§. VI.

Prognosis.

I. **U**teri ulcus semper valde periculosum est. 1. Quia in partibus locatur internis quibus difficillime remedia applicantur detergentia, & consolidantia, 2. Sensibilibus, nervis refertissimis quod gravem dolorem teterimque phenomena inducit, 3. Quia deleteria sanguis materie inquinatur, qui in ulcere deponitur.

II. Hujusmodi morbus mulieribus qui eo cruciantur valde molestus evadit operationum ergo, quibus subjici debent; merito vero impudicæ penam luunt vitæ transactæ; at pudicæ omni comiseratione dignæ sunt, quibus fortuito hec eveniunt calamitates.

III. Ut rite prognosim instituamus ulcus distinguere debemus quod abscessui repente succedit ab eo quod lente procedit ab erosione, aut scissuris ortum.

IV. Illud quod patefactus abscessus progignit multum puris effundit, maximumque terrorem incutit, at eo semel evacuato, modo absint antecedentes causæ, fluxus, ceteraque phenomena imminuuntur.

V. Quando puris fluentis copia in diem subducitur, verum persistens fluor albus sit, spissus, æqualis, neque fetens, neque corrodens; quando ægræ parum vel nihil doloris persentiant, uterus flexibilis sit, non durus, non resistens, ægræ nulla, vel pauca quæ in diem abeat febre laborent; denique si consumptione desistente illæ pinguescant, tunc multum spei superest valetudinis recuperandæ; contra vero si ea omnia in deterius ruant.

VI. Generice ulcera hujusmodi felices sunt eventus quando mulieres aggrediuntur bene constitutas, optimæ crasis sanguinis donatas; quando uterus pariter bene constitutus sit, neque syrrhosis, neque obstructus aut laxatus, qui naturalem elaterium servet; verum abscessus aut inflammatio ab accidentali causa proveniant nullo supposito vitio antecedente sanguinis, aut matricis; tandem ulcera exigua sint; at contrarium eveniet in circumstantiis oppositis.

VII. Segniora ulcera quæ ab erosione sensim efformantur; ut de iis rite prænunciemus, distinguere debent in *instantia* videlicet nondum incepta; in *incipientia* quando nonnihil ferositatis purulentæ jam effundunt; in *confirmata* quando multum puris stillat cum substantiæ maxima jactura.

VIII. Modo ulcere instante idoneis remediis cito occurramus diu continuatis, verum ægræ optimo donentur temperamento, medica, etiamsi molesta ferant auxilia felicem valetudinem sperare licebit.

IX. Ulcere vero semel incepto, ac fluente latice jam purulento facto prognosis valde incerta est, convalescunt interdum ægræ si optimo præditæ sint temperamento, morbus levior sit, remedia prompta adhibeant infra proponenda; at sapissime pereunt, pro infirma uteri conditione, deleteria sanguinis indole propria indocilitate, aut animi vexationibus quibus tunc fiunt obnoxia.

X. Ulcus confirmatum lethale est, non desunt tamen exempla hujusmodi sanati ulceris; at ea valde rara sunt ut valeant prognosim infirmare funestam.

XI. Addi poterunt quæ infra exponemus, quæ nonnullas differentias faciunt circa specialiolem ulcerum prognosim instituendam, quare

1. Ulcus quod uterum fœdat, magis nocuum evadit ceteris paribus eo quod vaginam deturpat, & quod orificium lædit magis eo quod substantiam ipsam uteri infestat.

2. Idcirco ulcera phlegmonosa quorum labia inflammata sint syrrhosa, aut carcinomatosa lethalia sunt

3. Pa-

3. Pariter desperata erunt quæ vesicam aut rectum invadunt.

XII. Interest animadvertere venerea ulcera Mercurii frictionibus plerumque convalescere, modo tamen seminium Gallicum sola causa eorumdem fit, verum simplex ulcus nuperrimum, parum, profundum existat citra callum, cancrum aut læsionem partium propin quarum.

XIII. Generice lethalia sunt. 1. Ulcera uteri fistulosa phagedenica quæ pus acre, foetidum, uberrimum cum dolore suppeditant.

2. Vetustiora quæ febrem lentam conjunctam habent, marasimum, oedema, sudorem nocturnum aut fluxum ventris colliquativum

3. Carcinomatosa denique omnia facta, vel instantia quæ dolor sævissimus prænunciat.

XIV. Experientia didicimus ulcera quæ cito progrediuntur magis dolorosa experiri & infensa in mulieribus adhuc menstruantibus, quam in iis defecturis: hanc differentiam gignit affluxus in utero sanguinis qui in illis redundat in his deficit.

§. VI.

Curatio.

A Pud clinicos tres ulcerum species enumerantur *simplex nempe, venereum, & carcinomatofum*; hic de duabus prioribus locuturi erimus tantum, carcinomatofum vero in Cap. De uteri cancro considerabimus.

Eas species medendi ratio diversas methodos postulat, quas in diversis articulis singillatim explicabimus. 1. Primo generaliora remedia exponemus in singulis uteri ulceribus idonea. 2. Qualem medelam poscat instans ulcus quod creber dolor uteri prænunciat cum hæmorrhagia aut albo stuoze conjunctus, 3. Tutio rem methodum proponemus pertractandi hujusmodi ulcera modo simplicia sint modo confirmata. 4. Quomodo pertractari debeant ulcera venerea vel suspecta ostendemus. 5. Curationem palliativam demonstrabimus modo eradicationem non liceat sperare. 6. Tandem remedia nonnulla indicabimus ab auctoribus proposita adversus omnes uteri ulcerum species commendata.

Medendi ratio, & remedia generaliora circa omnes uteri ulcerum species.

In omnibus ulceribus duæ potissimum indicationes proponuntur, *altera est præoccupare plethoræ, aut doloris augmentum in ulcerata parte, ne morbus augeatur; altera est corrigere deleteriam indolem sanguinis, quæ ulcus induxit, aut produxit.*

I. Ut *priorem* impleamus 1. ægras admonere necesse est, ut ab omni exercitio se abstineant, verum longo bisseilio decumbant; minima enim corporis commotio premendo, aut uterum succutiendo infartum auget, quem doloris, atque fluoris augmentum perbelle declarat.

2. Si venter nonnihil obstructus reperiatur, quod raro accidit, decumbentibus ægris illum clysteribus tepentis aquæ laxare opus erit, quæ fecum ita expulsionem promoveant, conatusque impedian, qui matricem laceffunt.

3. Eadem de causa cubili a conjuge distincto quiescere debent a quo consilio putarem semel tantum desistere velle mulieres de propria valetudine fatigantes.

4. Vitam ipsæ gerant sobriam, & methodicam, *primum* ne augeatur sanguinis

nis copia, quæ nimis uteri vasa tumefaceret; *alterum* ut alimenta poscant facilis digestionis, dulciora, acrimonia orbata, & boni succi quæ optimum chylum suppeditent, & edulcorare sanguinem potis sint; quare vesci debent jusculis, orizarum cremore, vermiculata massa, furfuricula; hordeo perlato, aut succo lentium cum brodio excoctis; parum ipsæ carniæ comedant, solummodo alas pulorum, aut lepuseulos fumendo, a vino vero se abstineant, caffè, aut quovis minutalium irritantium genere.

5. Demum animi pathemata omnia removeant quæ sanguinem valeant comovere; hujusmodi sunt mœror, vexatio, ira, vel pervigilium, quod eum valde callefaciunt.

II. Huic regimini addi poterunt remedia quæ cruoris redundantiam immi-
nuunt, atque humorum acrimoniam obtundunt latitantem.

1. Venam igitur cubiti incidere oportebit, non solum ut vitiatorum humorum aliqua pars dematur, verum tumida uteri vasa depleantur, id crebre vel raro reiterando prout dolor, affluxus, aut profluvium plus minusve postulerint.

2. Ægras purgare identidem necessum erit non modo ut ventriculum, primasque vias saburis expiemus, verum sanguinem repurgemus; mitiora itaque purgantia usuveniunt Manna videlicet, Cassia, Sal de *duobus*, Rhabarbarum addita pauca Senna, si ægrotantium temperamentum sinat.

3. Sanguinem etiam diluere fas erit laxantibus, & refrigerantibus remediis, id præstant serum lactis depuratum, aut succo plantarum edulcorantium remixtum; apozemata, aut jura iisdem plantis confecta, Cichorea nempe, Boragine, Lactuca; at si tempestas permittat, efficaciores erunt aquæ minerales frigida; illæ de *Forges* admodum profunt ad fontem haustæ, minus vero exportatæ; iis substituuntur aliæ de *Selter*, *Spa*, *Cáranfach*, ipsas aqua communi copulando si valida nimis experiantur.

4. Eo collineant balnea, aut semibalnea tepentia ad uteri æstum compescendum; hujusmodi remedium valde utile est quo idonea tempestate crebre uti debent, modo profluvii copia non obsit.

5. Hac methodo diluta sanguinis massa ipsum edulcorare nostrum erit lacte caprino, aut asinino, alterutrum seligendo quod magis ventriculus patiatur; ante lactis assumptionem primas vias tamen expiabimus, semel illum in die mane, aut bis mane, & vespere exhibendo; tandem eum vel simplex hauriendo vel duplici uncia aquæ secundæ calcis copulatum, aut aqua dosi succi depurati Fummaria vel Acrimonia.

6. Modo ventriculus sinat lac etiam vaccinum usuveniet cum tertia parte decoctionis Chinæ radicis, eum pro eventu bis, vel ter in die præscribendo, vel pro integro nutrimento, si stomachus ipsum non renuat.

7. Cauterium tandem apponere alterutro cruri non contemno, ut sanguinis inquinamentum per hanc partem effugiat; & ipse merito in animum induco hujusmodi remedium haud utilissimum esse, verum neque frustraneum evadit, quod sat erit ut ipsum in hoc morbo adhibeamus, in quo paucissima medicina præstat auxilia.

Methodus idonea in instantibus ulceribus, quæ prænunciant continentes, aut crebri uteri dolores, vel anomalum cruoris, aut albi fluoris effluvium.

His status ulcus respicit quod segniter per erosionem aut excoriationem efformatur; modo tamen ægræ cito sapientem Medicum consulant, lethalis morbi valetudinem sperare licebit, verum per unicum, aut duplicem annum ipsæ medenti obediant.

1. Regimen primo exacte observare debent tum circa qualitatem, cum circa copiam ciborum, ut nuper admonuimus.

2. Continenter vero animi affectus debent temperare, a vigiliis desistere, & clysterum abusu, verum idoneo positu quiescere, immo lectulo, aut biffellio detineri pene decumbendo, ne sedentes uterum comprimant.

3. Verum penitus a connubio cum viro diu abstineri

4. Semibalnea tepentia mane jejuno stomacho, & vespere ante coenam tunc præscribere debemus, in quibus per horam persistant.

5. Identidem denique ipsas lenientibus purgare conveniit superius indicatis, lac asininum, aut caprinum pro stomachi vi præscribendo, semel, vel bis quotidie haustum; iis vaccinum etiam valde commune substitui potest, si ipsum perfecte digerant, at in hoc casu optimum censeo ipsum remisceri decoctione Hederæ terrestris, aut Graminis.

6. Valde utile experitur ægras penitus lacte alere, duplex poculum lactis asinini mane & vespere exhibendo, totidemque vaccini loco prandi & coenæ, vel vaccinum tantum quater in die præscribendo; hujusmodi tentamina tamen prudenter inire debemus.

7. Pro circumstantiarum diversitate unica vel duplex uncia quotidie aquæ secundæ calcis addi poterit, vel duplex uncia succi depurati Nasturci, aut decoctionis Hederæ terrestris.

8. Si stomachus omne lactis genus respuat, serum lactis quotidie simili methodo substituemus probe depuratum, vel duplex dosis decoctionis, ex pullo, vitulo, nonnullis cancris, aut ranis confectæ; modo vero tempestas sinat pro vulgari potu hauriant ægræ aquas de *Forges* aut *Spa* parum aquæ communis addendo si opus requirat; verum si hujusmodi aquæ desint substitui poterit levior decoctio, Orixæ, aut Graminis, in qua Verbaci pugilli aliquot infusi sint.

9. Cubiti venæ sectio quæ in hac morbi specie plerumque utilior evadit institui potest; si dolores crebri, & vividiores sint bis terve in die Venam incidere fas erit ut ipsi compescantur; iis vero subactis, singulis mensibus sufficiet hujusmodi remedium reiterare ad novem uncias, octavo, aut nono die ante catameniorum regressum.

10. In iis casibus utiliter adhibui grana duodecim Cascharillæ, interdum totidem tartati martialis remixta, sub forma bolarii parum ante prandium propinata; alterum horum remedium tonicum est, valet uteri elaterium substinere ab affluxu sanguinis labefactatum; alterum modice aperit, atque sensim sensimque infartum imminuit.

Tutior methodus, & efficacior adversus uteri ulcus simplicium sed confirmatum.

Confirmato jam ulcere animadversionibus sedulo consulere necessum erit primo Articulo enunciatis, generalliorem rationem ulcus medendi propositam amplectendo

Stendo; videlicet illum detergere, carnis productionem fovere, verum cicatricem consolidare; totidem indicationes in uteri ulceribus aut vaginæ implere nostrum erit iisdem remediis in utroque casu adhibitis; at cum aliqua adsit differentia in eorum exhibitione, ideoque singillatim de iis nunc tractabimus.

I. Ad ea foeda uteri ulcera detergenda plures adhibentur rationes pro majori, vel minori deleteria morbi indole.

Varia externa remedia usuveniunt interius copulata, quæ Articulo primo proposuimus, videlicet. 1. Apozemata aut decoctiones ex Folii Acrimoniae, Pimpinellæ, Argentinæ, Alkimilæ, Bugulæ, Saniculæ, Virgæ Aureæ & Mille folii, idoneas tres aut quatuor earum plantarum seligendo.

2. Decoctiones sub pthisanæ forma ex Chinæ radice in taleolas divisa, aut Salsaparilla confectæ; verum si opus requirat Guayaci raspati pauco, quarum quotidie unum, vel duplex poculum exhibetur, modo ægræ pinguiori, & pictuoso donentur temperamento, febris absit, & illæ dolore sint expertes.

3. Injectiones denique intromittuntur idoneo siphone adhibito caniculo oblongo instructo, in extrema sui parte globuloso, & foraminulis pertuso.

Plerumque iis injectionibus cedit serum lactis cum saccharo rosato, vel decoctio hordei cum melle rosato, aut decoctio Artemisiæ, Matricariæ, Marubii, Hypperici, Apii, &c. vel radicem Aristolochiæ, aut Iridis cum melle simul; verum si ulcus maxime falsum conspiciatur quod ab affluenti pure sanioso, & foetido innotebit, iis additur lixivium sarmentorum, aut utilius parum Tincturæ, Myrrhæ, Unguenti Ægyptiaci, aut Collyrii Lanfranci modica primum dosi, pro opere aucta.

4. Magnopere verum intererit quod ex injectiones cavum uteri invadant ubi ulcus locatur, ideoque obstetricans id peragere debet qui canaliculum uteri ostio valeat aptare, quod tentare ægris, aut assidentibus nefas erit, modo diutina observatione non edoceantur.

5. Vapores etiam per sellam familiaricam in utero recepti aliquem usum habent, etiamsi inutiles evadant absque tubuli auxilio qui ad orificium usque illos perducatur, verum pro hoc scopo tepentes tantum decoctiones adhibeantur ne uterum lædant.

II. Dum uterus mollis reperitur, flexibilis, atque pene indolens; pus vero inops effluit, & laudabile remedia leviter detergentia tantum conveniunt, quæ ulceris fundum mundent donec labia resolvantur, & caro regeneretur; hac ratione secundam implere indicationem poterimus; hujus census remedia sunt.

1. Injectiones ex decoctionibus hordei foliorum Artemisiæ, Centauri minoris cum pauco melle.

2. Injectiones aquarum thermalium sulphurearum, quales sunt illæ de Barrege, d' Aix la Chapella, aut Aix in Sabaudia.

3. Suffumigia, aut vapores decoctionum, vel aquarum earum quæ modo superius indicato in utero recipiuntur.

5. Per os vero balsama sumuntur videlicet Coppai, Canadense, Meccæ alterutrum eorum seligendo ad quatuor vel quinque guttas cum saccharo depurato comixtum, aut syrupo Capillarium; iis substitui possunt grana quindecim, aut viginti Terrebynthinæ Venetæ, cum ovi luteo.

III. Si unquam summo naturæ beneficio scenomena omnia desistant, puris effluvium abeat, aut lymphaticum tantum persistat, tunc ulcus sensim sensimque consolidare fas erit, quo pacto tertiam indicationem implebimus.

Huic scopo enim favent. 1. Balsama supradicta quibus junguntur trochisci Gordoni, Sanguinis Draconis, Myrrha, Mastix, Sal sedativum Hombergi, Gummi Tacamacha, duo vel tria seligendo, & sub pillularum forma octogranis singulorum exhibendo.

2. Injectionum usum protrahere ex aquis thermalibus sulphureis proficuum erit aliquibus additis coclearibus aquæ secundæ calcis, vel decoctionis sanguinis Draconis, aut terræ Japonicæ.

3. Earum aquarum defectu substitui poterit decoctio radicis Consolidæ majoris, Bistortæ; foliorum Plantaginis, Bursæ Pastoris, Argentinæ, Pillofellæ aut Brunellæ &c., iis additis quæ superius enunciavimus.

4. Sequentium rotularum fumus quandoque tubuli auxilio in utero recipitur; hujusmodi rotulæ conflantur ex Myrrha, Mastice, Gummi Tacamacha, Ladano, Thure iis omnibus simul tritis, & anatina parte commixtis, verum guttis aliquibus Terrebyntinæ, aut Resinæ subactis, animadvertendum est quod ea suffumigia, quæ primo nimis calescunt, tepentia tantum ad uterum pertingant, qua de causa pauce rotulæ supra prunas pene extinctas superimponentur, removendo nonnihil tubulum.

5. Exhibebuntur quotidie unum, vel duplex poculum decoctionis Chinæ radicis, aut Lentici ad unciam ebolliti cum quatuor circiter sextertiis aquæ communis ad tertiæ consumptionem.

6. Quamvis diutinum nimis videatur hujusmodi regimen, ægræ tamen ipsum observare debebunt, ut Articulo primo enunciavimus, in eo persistendo post valetudinem diu.

IV. In ulceribus vaginæ qualemcumque partem occupent, fundum aut latera infestent, eandem methodum prosecuturi erimus, videlicet triplicem statum distinguendo deterfionis ulceris, regenerationis carnis, & cicatrificationis, eadem continenter remedia prescribendo.

1. Injectiones quæ impendi debent pro singulo stadio eadem constanter sunt, quas intra vaginam ducere facile erit; curabimus enim ut ægræ dorso decumbant, caput inferius deprimant, clunes vero elevent ut remedia diu in utero detineantur; quod pariter fatagere debemus ipsum injectando.

2. Suffumigia vero usuveniunt per siphonem introducta, quod facillimum erit patrare.

3. Præter ea in ulceribus hujusmodi semibalnea utilia evadunt in quibus clunes tantum infunduntur, quare Latini illa *inseffus* appellarunt, huic finì cedunt decoctiones idoneæ, & ulceris gradui appropriatæ, quæ valde profunt in ulceribus vaginæ, quæ hac methodo facile quaque versus deterguntur.

4. Denique vaginæ ulcera pertractare possunt quasi externa forent, initio pulvinum oblinitum apponendo digerentis simplicis, aut Tinctura Myrrhæ copulati: verum pulvinum Balsamo Arcei tantum, aut digerenti remixto obliniendo; denique sicci pulvini, vel aqua secundæ calcis imbuti usuveniunt Terrebynthina inspersi pulverisata; tandem omnia quæ vaginæ introducuntur filo necti necesse erit ut facile extrahi possint.

Methodus curandi ulcera uteri Venerea.

Modo cognoscamus uteri ulcus a lue Venerea penitus derivare, omne studium impendere nostrum erit ut efficaciter virum subijciamus quod morbum produxerat; hic supervacaneum foret de illo speciatim pertractare, librum enim pervolvite qui de hac materia fusius disserit; sufficiet animadversiones nonnullas addere quæ speciatim hunc morbum respiciunt.

I. Primo ægram cubiti venæ sectione viribus, & pulsui accomodata disponere, verum ipsam purgare superallatis lenientibus necessum erit.

II. Imposterum balnea tepentia semel vel bis quotidie per decem, aut quindecim dies continuata utilia experta sunt, verum intra balneum, aut ex eo re-

duci dosim exhibere fas erit feri depurati, aut jus vituli vel puli cum herbis refrigerantibus coctum.

III. Sed si morbus urgeat ejusdem progressus sistere frictionibus mercurialibus tentabimus, adhuc persistendo in balneorum usu.

IV. Experientia didicimus, Mercurium sanguinis circulationem accelerare, atque pondus augere, verum utraque ratione internis ulceribus nocuum evadere, præsertim si ea in partibus delicatioribus locata sint. Id pluries experti sumus in hoc morbo affectis qui luis celticæ causa phthisici facti sunt, etiamsi in iis ratio suadeat frictiones convenire; verum etsi eorum nonnullos quandoque convalescere videamus, tamen observavimus plerumque Mercurium pulmonem ledere in iis etiam qui feliciter convaluerunt; eæ animadversiones mensuram præbent medendi rationis ulcerum venereorum uteri respectu, docentque frictiones paulatim initio saltem esse instituendas.

V. Iis rationibus adductis intervalla inter unam & alteram junctionem tres saltem dies æquare debent; pro singula vero frictione unguenti drachma sat erit ex anatina parte Mercurii extincti, & Suillæ adipe confecti, paulatim immo hujusmodi unguenti demere debemus quo interius vaginam fricemus; in progressu, effectus Mercurii perpendendo, frictiones crebriores fieri poterunt, dosim etiam unguenti adaugendo summa tamen cautione.

VI. Ut optatum frictiones effectum præstent pro integra curatione sex unguenti uncia impendi debent, procul interruptione, aut purgatione intermedia; ex quibus patet hanc medendi methodum quatuor, vel quinque menses perdurare.

VII. Per omne id tempus ægotantem alere oportebit ea methodo quam in hoc morbo medicis præscribere mos est, modo lac pro integro nutrimento adhibere aliqua de causa impediatur; verum usuveniunt remedia a nobis articulo præcedenti proposita diu continuata donec ulcus perbelle deterfum, atque cicatrizatum videatur.

Curatio palliativa ulcerum uteri incurabilium.

In hoc casu omnis diligentia impenditur ad graves dolores mitigandos, terribimaque scœnomena compescenda, quæ ægris superveniunt, vel ea saltem mitigare modo morbi vehementia, quandoque imminuta id tentare sinat.

1. Hac de causa præcipuum erit dolorem ab ulcere ortum moderare cui levioribus venæ sectionibus, quæ vasa uteri depleant, imminuantque phlogosim, aut sensibilitatem, occurremus.

2. Tunc carnum usum interdicere necesse erit ægotantes lacte tantum nutriendo, vel jusculis, aut farinaceis alimentis ex leviori jure insipido confectis.

3. Si sæviores exurgant dolores narcotica modica dosi quarta quoque hora exhibere conabimur, qualia sunt granum semis ladani aqua callida solutum, aut duodecim vel quindecim guttæ Tincturæ annodynæ augendo, at imminuendo remedii quantitatem pro doloris gradu, aut pharmaci effectui.

4. Injectiones tunc a nonnullis adhibentur ex succo Plantaginis, Portulacæ, sedi majoris ad unciam unam & semis, aut duplicem unciam singulorum in quibus dilui poterit parum Amylli calce non remixti; eandem indicationem implet succus Solani *Morella* dicti ad trium vel quatuor unciarum dosim, postquam in mortario plumbeo diu ipsum tritum fuerit.

5. Iis injectionibus interdum adjungitur syrupus Papaveri albi, Ladanum aqua solutum, aut Tinctura annodynæ, dosim modificando in ratione quantitatis ejusdem remedii per os sumpti.

6. Tan-

6. Tandem semibalnea præscribi poterunt ex decoctionibus earumdem plantarum confecta, hortando ægras ut aptiori spongia hujusmodi decoctiones intimius quam fieri potest intromittant, at id fusius Cap. *De cancro* examinabimus.

7. Crebre eveniunt, in desperatis præsertim ulceribus, lethales hæmorrhagiæ, quas sistere superioribus venæ sectionibus necesse erit, verum pthifanam exhibendo ex decoctione perfectam radicis Consolidæ majoris, ad gratam aciditatem usque superaffundendo 55. aut 56. guttas aque Rabelli pro singulo œnopforo, addita etiam uncia syrupi Plantaginis, aut Capillarium; si morbus urgeat integrum sextarium exhiberi poterit pthifanæ illius in plures partes divisum; at si mitior ægritudo videatur, fatiserit unicum sumere cyathum pro singulo die.

8. Si vehementia, aut pertinacia hæmorrhagiæ periclitentur ægræ, utrum tunc eadem pthifana irrorare conveniet leviter tepenti, ipsas ita locando ut injectiones illuc diu persistant.

Remedia nonnulla proposita adversus uteri ulcera.

Ulcera matricis incommoda sunt quorum effectus admodum conspicui sunt, atque medendi ratio omnibus patula nimis, ut difficillime decipi possint Medici novas mirificas medendi rationes instituendo; mihi tria subsequutura remedia tantum innotuerunt, quæ aliquam attentionem mereantur.

I. (a) Felix Platerus Rauracus testatur succum urticæ urina infantis remixtum mirifice ulcera uteri sanasse: *succus urticæ cum urina pueri mixtus mirifice abluendo injectus ulcera uteri sanat*; at de hac observatione valde dubito, verum ille innocuus saltem experitur.

II. (b) Bellostus magni nominis Chirurgus pene certum remedium proposuit in omni uteri ulcere, hoc est decoctio foliorum nucum pauco saccharo remixta, qua linteam imbibitur ulceri apponendum; hac de causa injectiones usuvenirent ex eadem decoctione paratæ & uteri ulceribus applicatæ, quæ sane nihil nocerent; per os simul sumi poterit aqua destillata nucum earumdem, modo ejusdem diuretica virtus non læderet, cum sciamus ægras plerumque cruciari inter mingendum.

III. Johannis Liebaut Doctor Medicus Facultatis Parisiensis libellum composuit latine conscriptum Sæculo XIV. sub eo Titulo *Tractatus de Morbis Mulierum* ab operibus desumptum Johannis Marinelli Medici de eadem materia pertractantibus; animadvertit hic (c) suffumigia aut injectiones quæ in ulceribus uteri instituuntur, Auripigmento flavo, vel citreo, aut Sublimato corrosivo actuari, circa quod fideliter a Lazaro Pe (d) profecutus est, qui Marinelli opus Gallice vertit: at, eorum medicorum pace, hujusmodi praxim valde infensam judico, neve unquam adhiberem Auripigmentum dum uterum injectare vellem, cum illud revera Arsenicum sit, etiamsi vero Arsenico mitius, aut Corrosivo.

(a) *Praxeos Lib. XXX. Cap. 14. Tom. II. pag. 575.* (b) *Pag. 26. in sua Chirurg.*

(c) *De la santé, fécondité, & Maladies des Femmes. Chap. XIX. & XX.*

(d) *Traité des Maladies des Femmes, & Remedes d'icelles, Liv. II. Chap. 19. & 20.*

C A P U T V.

De uteri Syrrho.

§. I.

Descriptio, & Differentiæ.

SYRRHUS genus tumoris est quatuor essentialibus characteribus a ceteris tumoribus distinctus, durus est, renitens, indolens; verum sensum sensimque per *congestionem* augetur; tandem colorem naturalem partis affectæ non pervertit; signa tria priora valde conspicua sunt in hujusmodi tumoribus, qui uterum aggre-
diuntur, at haud facile est quantum recognoscere indicium procul visu latitans; conjecturis enim fidendum est, & cadaverum sectionibus quæ satis illum declarant.

Vidimus in Tractatu *Tumorum*, & *Ulcerum* syrrhos omnibus corporis partibus, glandulosis præsertim communes esse, quare facile patebit matricem præsertim iis esse obnoxiam, quod observationes etiam confirmant.

Dum syrrhus omnem uteri volumen occupat *totalis* aut *universalis* appellatur; verum si aliquam partem tantum ut plerumque evenit, *partialis* dicitur; in utero pars affecta variat sæpissime; modo enim fundum, modo orificium, modo latera destrorsum, aut sinistrorsum, modo anticam, modo posticam uteri partem syrrhus deturpat; at hujusmodi differentiæ parvi faciendæ sunt, qui nihil naturam morbi immutant, tantum ab iis distingui debent syrrhi vaginæ, vulvæ, aut al-
rutri labiorum, non causarum respectu, quæ eadem sunt, sed curandi methodi quæ diversa est, cum topica his applicare queamus, non vero uteri syrrhis.

Maxima vero differentia a gradu resistantiæ, aut indolentiæ desumitur; quando syrrhus admodum durus, resistens valde, indolens etiam sub maxima pressione reperitur, syrrhus *perfectus* dicitur, vel, ut alibi diximus, *legitimus* aut *exquisitus*; contra vero *imperfectus*, *illegitimus*, aut *incipiens* appellatur, quando imperfecte resistat, aliquem sensum servet saltem dum manu præmitur.

Syrrhus plerumque ab œdemate, aut inflammatione circumscribitur, quare *œdematosus*, aut *phlegmonosus* appellatur; secus enim *simplex* dicitur si œdema aut inflammatio absint.

In utero syrrhi circumferentia facile distinguitur modo corpus uteri, fundum, aut latera afficiat, tuncque syrrhus *circumscriptus* dicitur; difficilius tamen innotescit ejusdem extensio si collum uteri deturpet, cum tumoris maxima pars tunc ossi pubis subjaceat, ideoque tunc *non circumscriptus* nuncupatur.

Tandem syrrhus legitimus, & perfectus, verum interdum spurius, aut imperfectus tument atque dolent, aut lincinationibus plus minusve crebris fiunt obnoxii, ideoque tunc carcinomatosi fiunt, & in cancrum degenerant, ut infra Cap. *De uteri cancro* enunciabimus.

§. II.

Causæ.

SYrrhum uteri nisi aliquis circulantium humorum gignere valet, aut eorum qui separantur, morantur, cumulantur, aut inspissantur in aliqua parte, donec in tumorem durum resistantem concrecant; itaque nisi duo humores in utero circulant, lymphæ nempe atque sanguis; humor vero lacteus de quo in Libro præcedenti locuti sumus unicus fecernitur intra speciales vesiculas pro usibus illuc explicatis; syrrhi ergo incrementum vel sanguinis congestionem, vel lymphæ congeriei tribuendum videtur, vel denique lacteo humori in suis receptaculis collecto, atque inspissato.

At evidens est id sanguinis infartui minime tribui posse, 1. Quia hujusmodi cumulus quotidie calorem producit, quo syrrhus expers est, 2. Quia ejusdem congestio citra ruborem numquam fit qui in syrrho deest naturali tantum calore fervato, 3. Verum quia sanguinis collectio cito pergit per modum *fluxionis*; syrrhus vero sensim sensimque ingrandescit per modum *congestionis*; idcirco iis rebus omnibus rite perscrutatis uteri syrrhus nisi a lymphæ affluentis intra propria vasa inspissatæ maxima congerie oriri potest, quæ syrrhum *lymphaticum* generat; cumulus vero lactei seu uterini humoris in propriis vesiculis detenti, atque condensati syrrhum *lactinosum* gignit; denique a lymphæ simul, & lactei humoris affluxu syrrhus *lacteo-lymphaticus* oriri debet, qui crebrius uterum infestat.

Iis explicatis, superest causas explanare quæ lymphæ aut lactis uterini infartum inducunt: hæ duplicis sunt speciei; aliæ universales *efficientes* dictæ, quæ illos humores constipant, ut in utero concrecant; aliæ speciales seu *occasionales*, quæ ad uterum spissos humores dirigunt.

Causæ generales quæ lympham figunt hæ omnes sunt spissitudini sanguinis communes, videlicet copia alimentorum valde nutrientium, & eorum qualitas vitata, aut crassitudo.

Vitia digestionis plerumque consecutiones sunt intemperantiæ, & inordinati vitæ regiminis, a quibus sanguis chylum recipit imperfecte subactum, atque valde densum.

Animi longa, & sæviora pathemata, quæ sanguinis cursum retardando illum inspissant.

Tandem deleteriam cruoris inquinamentum quo sanguis inficitur, Celticum nempe, scorbuticum, aut strummosum.

At hujusmodi generales causæ nedum valent syrrhum uteri producere nisi locales, aut occasionales lympham lacteamque humorem eo devehant; inter hæc recensentur,

1. Spissitudo, quam uteri, & propin quarum partium lymphæ acquirit, in coitu cum viro lue venerea correpto.

2. Injectiones gelidæ nimis, aut adstringentes, quæ interdum imprudenter usuveniunt ad dolorem inflammationis cohibendum, atque uteri elaterium sustinendum, aut resolutionem promovendam.

3. Subita restrictio uteri, frigoris externi ergo, dum agræ perperam, mensibus, aut lochiis fluentibus, aqua frigida pedes luunt.

4. Atonia uteri vel naturalis ut in labefactatis laxisque subjectis; vel ea quæ collisioni hujus partis, abortui, aut laborioso partui succedit, in quibus circumstantiis magnopere viscus distenditur.

5. Obstructiones denique inveteratæ, quæ lymphæ circulum, atque lactis uterini

rini expansionem prohibent; hujusmodi in iis crebræ sunt, quæ dum impuberes erant pallore laborarunt, incomplete vero menstruarunt, aut mensium suppressionibus fuerunt obnoxia, ut superiori libro perspicimus.

Connubium nonnullarum earum causarum lympham congerit, lacteumque uteri succum, seu simplicem redundantiam inducit, quæ in diem aucta uterum constipat, vel id eveniat, quod liquidiorum partem affectæ partis calor dissipet; vel arteriarum proximarum contractiones exprimant, spissiori superstitæ; quæ de causa syrrhi congestio insensibiliter, segniterque pergit, ut tumorem diu ignoremus, nisi ipsum dira prænuncient scenomena.

§. III.

Differentiarum explicatio.

I. Interdum sola lymphæ inspissatur, quæ vasa lymphatica infarcit per uteri substantiam reptantia, eaque syrrhum efformat, qui *lymphaticus* appellatur; si idem eveniat, a lacteo uteri succo intra vermicularia detento lacteum syrrhum oriri videbis; verum si utrumque coacervetur hinc natus syrrhus *lymphatico-lacteus* vocari solet in utero magis obvius.

II. Quando lymphæ, atque lacteus humor omnem uteri ambitum obstruant aliqua accidentali de causa, quæ tamen totum uterum afficiat, *syrrhus totalis* nuncupatur, raro id evenit, tamen fidæ observationes illum ostenderunt.

Contra vero syrrhus ille *partialis* dicitur, dum partem uteri aliquam ipse occupat, speciali de causa, quæ illuc tantum lympham, aut uterinum laticem congerit; hujusmodi species diversas partes deturpat, modo fundum, collum, aut latera; modo sinistrorsum aut dextrorsum; modo antè aut postè pro diversa vicii sede, quæ syrrhi generationi locum præbuit; quandoque syrrhi uteri nomine insignitur ille vaginæ, vulvæ, vel pudendorum ut jam admo- nuimus.

III. Si lymphæ, aut lac uterinum, quæ syrrhum efformant, valde spissæ sint, verum lente ille procedat, tumor durus, resistens, atque indolens apparebit, ut *perfecti*, aut *legitimi* syrrhi nomen mereatur, quia ii humores compactiorem tumorem efformabunt, qui in diem indurescet, dum continenter calori partis affectæ, & arteriarum pulsibus subicitur.

Contra vero si ii humores liquidiores existant, tumor celerius fiat, syrrhus durus minus, & sensibilis magis apparebit, isque *spurius*, aut *imperfectus* appellabitur, tum quia ii humores minus densi molliorem efformabunt tumorem, tum quia hic tumor per breve temporis spatium calori, atque arteriarum pulsibus expositus fuit, ut tenuiores moleculæ ab iis causis, neque dissipatæ, neque expulsæ fuerint.

IV. Syrrhus hujusmodi nunquam trans uterum pergit, ideoque jugiter *circumscriptus* erit, totalis sit, vel partialis; verum ejusdem margines haud facile erit determinare si orificium uteri syrrhus deturpaverit, cum tunc ossi pubi subjiciatur, modo per vaginæ hyatum eum perscrutari nequimus.

V. Syrrhus uteri dum majorem extensionem acquirit hujus partis sanguinea, aut lymphatica vasa distendit, aut sui volumine comprimit; modo causæ leviores sint, lymphatica tantum vasa graciliora convellent ut lymphæ in syrrho tenta oedema producat, seu *œdematosum* syrrhum; verum si eæ causæ validiores sint, sanguinea vasa etiam contorquebunt in propinquis partibus locata, quare sanguine retento inflammatio oritur quæ syrrhum *phlegmonosum* inducit.

VI. Syrrhus imperfectus, aut pseudo-syrrhus interdum resolvitur quia nondum coacervata materies indurescit, verum fibræ non parum elaterii servant; de-

demum syrrhus perfectus, aut legitimus nunquam resolvitur tum duritiei coacervati humoris, cum fibrarum inertium ergo, quæ nullo modo resolutionem fovere possunt.

VII. Syrrhus legitimus sæpe in cancrum degenerat rationibus infra exponendis *Cap. De uteri cancro*; syrrhus vero imperfectus huic minus est obnoxius, interdum potius in supurationem vergit, quæ abscessum producit, deleteriæ indolis, in ulcus syrrhosum desitutum.

§. IV.

Symptomata.

I. SYrrhus uteri perfectus indolens, est neque colorem, aut calorem partis affectæ immutat, ut in *Tractatu Tumorum*, & *Ulcerum* syrrhi respectu generice ostendimus; iisdem de causis syrrhus sanguinis, aut lymphæ circulum non intercipit, ut diu ægræ interdum sine noxa illum perferant.

II. At modo ipse majorem volumen acquirat uterum gravat ut inferius ipsum trahat, qua de causa ægræ moleste incedunt, aut pedibus stant, autumant enim ægræ tunc uterum jam prolabi.

III. Difficilime etiam decumbunt circa unum, vel alterum latus, modo syrrhus totalis sit, quia tunc uterus ad alterutram partem trahitur ut ipsis dorso tantum decumbere fas sit.

IV. Contra vero dum syrrhus partialis gignitur, citra incommodum dorso, vel in affecta parte jacent, non vero sanam partem versus decumbunt, in qua lancinantem dolorem persentiunt.

V. Interdum syrrhus hujusmodi catamenia minime implicat, quæ vulgarem periodum conservant, modo sufficiens uteri pars, aut lacteorum vasorum numerus compressione expers sit, atque leges menstruationis, quales *Lib. I. Cap. II.* descripsimus, libere exerceantur; at contra dum interiorum uteri pene omnem ambitum volumen syrrhi auctum comprimit, menses sistunt, vel saltem inordinate fluunt, tum copię, cum periodorum respectu.

VI. Interdum in hoc statu lethales hæmorrhagiæ superveniunt; neminem latet confirmatos syrrhos varicibus innumeris scatere, quare si alterutra disrumpatur hæmorrhagiam induxerit, plus minusve uberrimam, atque diutinam, pro diversa venæ concisæ amplitudine, aut difficili occlusionem.

VII. Syrrhi uteri confirmati, plerumque albos fluores lymphaticos comites habent, nam vasa sanguinea, & uteri lymphatica, & tumore compressa tenuiorem lympham per tunicarum hyatus effugere sinunt.

VIII. Dum syrrhus modicus persistit neque mensium periodum impedit, aut albos fluores inducit, vel leviores tantum, mulieres fetum concipere, gerere, feliciterque parere potis sunt, quod certissimæ observationes ostendunt; at contrarium evenit modo syrrhus amplius existat, omnem uteri capacitatem occupet, catamenia perturbet, album fluorem inducat, ut fusius *Cap. De sterilitate* observabimus.

IX. Idem syrrhus ad certum gradum auctus iliacas venas premit, quæ ab extremitatibus inferioribus sanguinem revehunt, ejusdemque ordinis lymphaticas venas reduces, quare difficulter refluendo sanguinis, atque lymphę ferositatem deponunt, quæ pedum, crurum &c., aut genitalium oedema gignit.

X. Eademque de causa, sanguinis circulo intercepto, tum in hac parte cum in ceteris abdominis visceribus, uteri Hydrops, & Ascitis ipsa producuntur, etiam si postremum morbum magis viscerum infartus, quam syrrhus inducat.

§. V.

Diagnosıs.

I. **H**Aud facile erit morbi initio syrrhum cognoscere latitantem, ægræ ipsæ nullam molestiam perſentiunt, nullum poſcunt auxilium; ille crescit tamen, conspicuus fit, magnopere vexat, tum exterius abdomen premendo facile circumſcribitur, verum pondus syrrhi existentiam declarat; interdum juvat digitum per vaginam ad uterum uſque intromittere, imo modo syrrhus exiguus fit, manu exterius hypogastro applicare, ut reſiſtentiam tutius, & volumen tumoris conſpiciamus.

II. Quamvis hujusmodi ſigna ſatis ſyrrhum deſignent, ipſum tamen quandoque cum hydrope, geſtatione, aut mola confundunt, ideoque indicia diſcere neceſſe erit, per quæ ab his ſyrrhus differt; verum cum hydropis aut molæ indolem non cognoscamus, id perſcrutari hic ſupervacaneum cenſeo, quare lectorem eo mittimus ubi de iis morbis ſpeciatiſſime diſerturi erimus.

III. Species etiam ſyrrhi diverſas detegere noſtrum erit, ut de ſingulis rite prognosim inſtituamus, quod tamen facile obtinetur.

1. Modo enim preſſioni tumor nonnihil cedat, & aliqualem ægræ dolorem perſentiant, ſyrrhus *ſpurius* aut *imperfectus* aderit.

2. *Perfectus* vero, aut *legitimus* cum indolens fit, atque reſiſtens.

3. Hypogastrium premendo, matricem verſus præſertim, facile dignoſcitur an ſyrrhus *partialis* fit, vel *totalis*; modo *partialis* ſit ejuſdem poſitus innotabit, ſimili ratione inum ventrem examinando, neve fundum, aut alterutrum latus occupet; qui vero uteri collum infeſtat; digito pateſcit.

4. Denique ſyrrhus *phlegmonosus* erit quando ægræ de calore, atque dolore conquerebuntur, cum pulſu crebro & elato; *œdematosus* vero quando citra dolorem, calorem, atque febrem copioſum ſtillet lymphaticum eſſluvium.

5. Vaginæ tandem, vulvæ, aut pudendorum ſyrrhi oculis ſatis ſubjiciuntur, ut de eorum volumine, atque indole facile certiores fieri poſſimus.

§. VI.

Prognosıs.

I. **G**enerice ſyrrhus teterrimus morbus eſt, & curatu difficillimus quod præſertim de eo intelligendum eſt, qui uterum deturpat, ubi topica remedia neſtquam applicantur, univerſalia vero vix pertingunt.

II. Syrrhus *perfectus* incurabilis eſt, cum neque reſolvi, neque ſupurari queat, quæ duplex eſt ſed unica medendi ratio.

III. In ſyrrho *imperfecto* aliqua ſuperſt valetudinis ſpes, cum morbi ſaltem initio, vel reſolvi poſſit ut obſervationes docent; vel ſponte ipſe in ſuppurationem, aut abſceſſum deſinat; prima admodum ſalubris via eſt, ſed rara; altera frequens, ſed periculosa magis, cum in abſceſſum, aut ulcus degeneret plerumque noxium valde, & periculolum.

IV. Uteri ſyrrhus ut ceteri aliarum partium facile in cancrum degenerat, rationibus infra Cap. de Cancro enunciandis; hujusmodi methamorphoſis magis periculosa evadit in iis mulieribus, quæ bilioſo, aut atrabiliari donantur temperamento, quam in iis quæ ſanguineo, aut pituitoso donatæ ſunt; magis in illis, quæ animi paſſionibus, aut vigiliis defatigantur, quam in iis, quæ tranquillam vitam ducunt; verum illa nocua magis in vetuſtiori, quam in recenti; in

ti ; in imperfecto quam in perfecto ; in ampliori quam in exiguo tumore experitur.

V. Non inutile erit animadvertere lactinosum syrrhum lymphatico facilius solvi , nam lymphatici humores modo resolvantur per longos amphractus , circumvehi debent antequam in circulum revertant ; lactinosi vero facile per vermicularium hyatus in utero patulos excernuntur ; idem prænunciabimus de syrrho vaginæ , aut vulvæ , qui ab iis parum distant.

§. VII.

Curatio.

EX anteactis apparet duplicem esse syrrhi medendi rationem , altera palliativa videtur in incurabili syrrho , perfecto nempe , & vetustiori ; altera eradicativa , fortassis , in syrrho recenti imperfecto , minus extenso , qui mulieres infectat de cetero bene constitutas , & temperamento sanguineo , aut pituitoso donatas , in quibus menstruus fluxus adhuc persistit.

Quare primum . I. Methodum curativam in iis circumstantiis obviam explicabimus .

II. Palliativam medendi rationem enunciabimus , quæ potissima est in vetustiori , & perfecto syrrho , qui mulieres vexat cacheticas , & temperamento præditas atrabiliari , aut bilioso menstruâ orbatas .

III. Cautelas proponemus necessarissimas quando syrrhum in cancrum vergere suspicemur .

IV. Tandem remedia nonnulla demonstrabimus adversus uteri syrrhum commendata .

Methodus curativa.

Dum Medicis auxiliis tumorem durum , syrrhum nempe resolvere conamur , statim nostrum erit : 1. Massam humorum attenuare , fluidioremque reddere ut materies ipsa relaxetur in tumorem detenta : 2. Partis affectæ tensionem imminuere ut facilius sanies subacta excernatur : 3. Hanc aperientibus & solventibus efficacioribus alcolizare : 4. Tandem partium elaterium sustinere ut collecta materies a vividioribus fibrarum oscillationibus citius exprimatur , syrrhusque resolvatur .

Quatuor hujusmodi indicationes subsequutura remedia implent ; quæ validiora experta sunt .

I. Sanguis atque lympa subsequentibus attenuantur pharmacis , videlicet ,
1. Decoctionibus , aut apozematis confectis ex

Radicibus Cichoræ
Eryngii
Anonidis
Brusci
Asparagi &c.

} ab ʒj ad ʒjss.

Foliis Agrimonie
Pimpinellæ
Fumariæ
Nasturci aquatici

} a pug.j ad pug.jss.

in qui-

in quibus ad libitum solvi possunt

Tartarum vitriolatum) a gr. xxx. ad xxxvj.

Arcanum duplicatum) ad ʒj.

Sal Glauberi) ad ʒj.

Terra folliata Tartari) ad ʒss.

Tartarum martiale) a ʒj. ab ʒss.

Flores martiales) a gr. xij. ad gr. xxiv.

Perfici possunt ex iis radicibus, atque foliis decoctiones cum pullo simul, aut carne vitulina ebollitæ; vel apozemata simplicia, addito etiam syrupo V. radicum aperientium

2. Serum lactis vaccinum, aut caprinum coagulo paratum, & per cartam bibulam depuratum optimum censetur, pro singula vice super affundendo uncias tres succi depurati Chærophylli, Nasturcii fontani, Fumariæ &c., in iis solvendo aliquod ex salibus aperientibus superiori Articulo indicatis.

3. Lac pariter asininum prodest modo sanguis acris sit semel saltem in die sumptum, verum asellam seligendo a partu recentem quæ bonæ crasis lac, ferumque suppeditet.

4. Aquæ minerales ferrugineæ exhiberi poterunt modo tempestas permittat, inter quas mitiores, & magis idoneas seligito quas diu valeant ægræ perferre.

II. Uno eodemque tempore tumorem emollire, & tensionem tollere debemus, quod obtinetur sequentia remedia exhibendo tum exterius applicita, cum intus sumpta, videlicet,

1. Apozemata, & decoctiones laxantes, verum cetera remedia superius proposita modo nondum adhibita sint.

2. Balnea, & semibalnea aquæ purissimæ, vel decoctionum plantarum emollientium, quales sunt.

Bismalva

Parietaria

Nimphæa

Branca-Ursina

Viola &c.

Ad libitum balnea præscribi possunt mane aut vespere, procul tamen a prandio, in quibus per horæ spatium persistere debent ægræ.

3. Cataplasmata usuveniunt parata

Ex pulpa Capæ

Lilii

Vel Foliis Oxalidis

Althææ

Malvæ

ceterarumque plantarum de quibus locuti sumus, sub cineresillas coquendo, iis pulpam copulando per cribrum transjectam, oleum liliorum, aut micilaginem feminum Psylli.

4. Fomenta regioni hyppogastricæ applicita, & injectiones ex decoctionibus tepentibus earundem plantarum confectæ in utero introductæ.

5. Cly-

5. Clysteria ex eadem decoctione, & oleo amigdalorum dulcium patrata; sane hujusmodi remedia, balnea nempe, cataplasmata &c. debiliter syrrium uteri destruant; verum cum intimius partem affectam pervadant sat erit ut eorundem usum non contemnemus.

III. Postquam ea remedia precessa sint per idoneum temporis spatium, materiam in syrrio detentam solvere curabimus.

1. Ufu opiatorum, bolorum, aut pillularum solventium ex marte compositarum videlicet

Crocus Martis aperiens) ad gr. xx.

Tartarum Martis solubile) ad gr. xxx. vel xxxvj.

Flores Martis) ab gr. xij. ad xvij.

Ethiops Martialis leniter aperiens a gr. xx. ad xv.

vel, quæ ex Mercurio parantur nempe

Ethiops mineralis per deflagrationem paratus, vel Ethiops confectus, Mercurium vivum quassando cum sufficienti quantitate resinæ alicujus, Peruvianæ præsertim &c. donec nigrescat, dosis hujus remedi a xv. ad xx. gr. consistit.

ex salibus solventibus, & aperientibus, qualia sunt

Sal admirabile Glauberi

Arcanum duplicatum

Terra folliata Tartari

} a gr. xxv. ad xxx. pro singula vice.

ex pulvere

Afellorum recentium) a gr. xv. ad xxv.

ex gummis aperientibus, videlicet

Gummi Ammoniacum

Sagapenum

Galbanum

Oppoponax

} a gr. vij. ad viij.

ex trium, vel quatuor eorum delectu oppiata, boli, aut pillulæ conficiuntur, quæ modicæ dosis syrupi alicujus aperientis, ut quinque radicum, additione mane jejuno stomacho sumuntur, superbibendo simplicem decoctionem, interdum ex herbis aperientibus propositis alteratam.

2. Applicantur cataplasmata ex pulpa radicum excoctarum confecta nempe.

Brionia

Cucumeris silvestris

Gladioli

Ebuli &c.

his pulpis jungitur oleum lauri, anisorum & inde cataplasmata efformantur regioni

gioni hyppogastricæ apponenda ubi syrrihus uteri prominet; vel syrrihis ipsis vaginæ aut vulvæ, identidem reiterata.

3. Emplastrorum respectu solventium Cicuta, Nicotiana, Galbanum, Manus Dei, aut Diabothanum usveniunt, simplicia, vel cum emplastro mucilagineo, aut melliloti remixti parti affectæ simul applicata.

Merito suspicor tamen hujusmodi externa remedia parum, vel nihil utilitatis afferre; at in graviore morbo nihil prætereundum videtur.

4. Remedia solventia exhibendo nuper proposita intererit.

Primum ægram phlebotomizare, præsertim cum menses suppressi sint, aut intercepti, quod ab uteri calore dignoscitur; Alterum leviora purgantia præscribere ad humores evacuandos idonea, bilem præsertim, quam remedia prius attenuarunt, modo tamen, cui non libeat purgantia pillulis, aut bolis solventibus addere; Tertium tandem erit diluentia, & humectantia solventibus copulare, ut calefactionem syrrihi cohibeamus; quandoque etiam per intervalla a solventibus desistere dum refrigerantibus uterum humidamus.

IV. Tandem modo imminuamus, atque emolliamus syrrihosum tumorem remedia convenire poterunt, quæ uteri elaterium substinent, atque oscillationem solidorum restitunt, hujusmodi sunt:

1. Injectiones tepentes aquarum thermalium *de Barrege, de Balaruc, Bourbon, Aix-la Chapelle* &c. per aliquod tempus uteri cavitatem detentæ.

2. Suffumigia per cellam familiaricam recepta aquarum earum thermalium, aut pulverum, gummi, Hedera, Juniperi, Myrrha &c., quæ super prunas funduntur terrebynthina remixta; verum suffumigia ex combustis silicibus aceto extinctis, quæ Galenus admodum laudat; curandum tamen erit ne ea calidiora sint, utrumque lædant.

Methodus palliativa.

Quando syrrihi natura, & morbi gradus valetudinis spem eludunt, palliativam tantum medellam amplecti fas erit, quæ eo collineat ut morbi progressus retardemus, sævioraque symptomata nonnihil compescamus; hujusmodi indicationes sequentium remediorum usu implebuntur.

Etenim 1. remedia omnia solventia, diluentia, humectantia superiori articulo proposita priori indicationi satisfaciunt, addi poterit etiam aliquis aperiens ad modicam dosim modo sanguinis spissitudo illum postulaverit.

Vulgaris methodus est hyeme apozemata, atque decoctiones humectantes & diluentes exhibere; vere & autumnio vero lactis serum, vel si sanguinis acrimonia poscat asininum; tandem æstate aquæ ferruginæ mitiores & balnea, aut semibalnea tepentia præscribere solemus plus minusve in his remediis insistendo prout opus requirat.

2. Purgantur ægræ identidem lenioribus ecoproticis, quæ nequeant intestina irritare, aut inflammare nimis.

3. Interdum cubitum secamus modicam quantitatem sanguinis extrahendo, id tantum instituendo quando pulsus turgeant, atque syrrihus doleat, quod in iis mulieribus præsertim locum habet in quibus menses suppressi sunt, aut ætate amissi.

4. Ægræ hortantur ut vehementiora corporis exercitia effugiant, vel prope-rando, vel saltando, aut colloquendo, neve vigilent, diu animi pathemate crucientur, aut matrimonii usu frequentiori commoveantur.

5. Eadem de causa necesse erit ventrem remediis continenter expiare, ne in excernendis facibus laborent, verum sedulo curare ne rheumaticis affe-ctibus

etibus corripiantur, vel si hi superveniant bechicis & narcoticis illos compescere, ne syrrhus inter tussendum intendatur.

6. Ab injectionibus, & suffumigiis erit desistendum, ne syrrhus callescat, vel si nonnulla adhibeantur dulcificantia sint ad uterum luendum tantum instituta, modo albus, & acris fluor exsistat.

7. Tandem sobriæ vitæ, & methodicæ regimen erit præscribendum, iuscula tantum, elissas, & asatas carnes permittendo, salitis omnibus, aromatis, mineraliis interdicendo, vinum etiam modo tamen pauxillum haurire non velint.

Regimen, cui studere oportet, ne syrrhus in cancerum degeneret.

1. Penitus solventium usum in hoc casu contemnere debemus diluentia tantum, & humectantia amplectendo, serum lactis præsertim pro ordinario potu exhibendo.

2. Simul nostrum erit brachium incidere semel bis & amplius prout morbus exiget.

3. Narcotica etiam initio morbi conveniunt, ad dolorem mitigandum, quem ægræ persentiunt; hujusmodi sunt syrupus Diacodii, Tinctura anodyna, aut Laudanum idonea dosi propinatum.

4. Tandem ægras per aliquot dies decoctionibus, aut brodis sustinere necessum erit, vel solo orizarum cremore.

Remedia specifica, adversus uteri Syrrhum.

I. Cum aliunde edocti simus Mercurialium frictionum usum, aut præparationes Mercuriales ganglia, & exostoses scindere, idcirco autumarunt nonnulli eadem remedia syrrhos, ac proinde illos uteri solvere potis esse; at experientia ostendit actionem Mercurii, ejusdemque præparationum nisi syrrhosos tumores, aut syrrhos resolvere a lue venerea natos; in hoc casu optima censeantur hujusmodi remedia, tuto exhibenda in uteri syrrho, imo exempla ad hoc excitant; at neutiquam salubrem effectum vidi, aut valde incertum dum ea adhibita sunt adversus vulgares syrrhos, citra Celticam luem, supervenientes.

Itaque animadvertendum est tumores venereos interdum minime resolvi mercurialium auxilio, quæ futilia evadunt modo tumores maximum gradum duriæ adepti sint; non desunt exempla exostosum, glandularum inguinum, gangliorum, quæ etiam si a Celtica causa originem agnoscant, modo vetustiora sint minime cedunt Mercurii exhibitioni; eadem de causa suspicari licebit quandoque syrrhos uteri etiam si venereos incassum remediis Mercurialibus tentatos diu in eodem statu persistere posse.

De cetero modo certiores simus de indole venerea hujusmodi syrrhi, cui frictionibus mederi judicemus, methodum prosequi poterimus superius p. 209. & 210. indicatam, dum rationem ulcerum venerearum uteri medendi exposuimus.

II. Jactant nonnulli pro syrrho uteri sanando *Belladonam*, aut *Solanum maniacum*, verum etiam *Cicutam*, ecque cancerum adversus utilissimas esse, ac proinde magnopere solventes credunt; cancer enim numquam convalescere potest, nisi humor in eo retentus solvatur, ut resolutio aut suppuratio perfici possit, quod efficacioribus solventibus tantum obtinetur; videbimus subsequenti capite, quanti existimanda sint hujusmodi remedia ad curandum cancerum, quare etiam adversus syrrhos quanti pendeant tunc judicabimus.

III. Apud Gallos omnes conveniunt in omnibus syrrhis, uteri præsertim, aquas de Barrege in Pireneis scaturientes mirificis virtutibus præditas valde proficuas experiri; hic minime in dubium revocabimus earundem virtutem detergentem, atque cicatrizantem adversus fistulas inveteratas, aut ulcera fœda; tum adver-

fus ossium cariem paralyfim, rheumatismos, aut nervorum resolutionem; verum ipfarum proprietatem emolliendi, atque solvendi frigidos tumores, & syr-rhosos ipsos magnifacio, circa quod ceteris omnibus facile præcellere defendam.

Hujusmodi aquæ fibras laxant, atque membranas syr-rhosæ partis; restituunt, atque substinent earum systalticum elaterium; spissum humorem liquant, ideoque hac ratione simul resolutionem promovent, ac suppurationem impediunt, quod citra ullum detrimentum peragitur, neque morbus intenditur, neve cancer inducitur; adhibentur hujusmodi aquæ multiplici ratione interius, exterius, per embrochationem, aut per injectionem; applicantur regioni hypogastricæ ipsarum sedimenta si unquam adipisci queamus cum ipsa exigua copia decidant; verum cum morbus pertinax sit, & segne videatur aquarum earum auxilium, diu earum usum continuare fas erit, identidem desistendo, ut ægras purgemus, & magis magisque venæ sectionibus, iterum si opus requirat, aquarum assumptioni præparemus.

C A P U T VI.

De Pseudo-Syrrho, seu Steatmate, & Sarcomate uteri.

IN utero coagmentantur ut in ceteris corporis partibus steatomata, & sarcomata, tumorum species a syrrho valde natura dissitæ, quæ tamen illum referunt externi habitus respectu, initio morbi saltem, ut facile ægrotantes, & medicos decipiant, quare eos tumores *pseudo-syrrhos* vocant qui cum a syrrho vero differant tum prognosis cum medendi rationis ergo singillatim eorum naturam explicare in duplici Articulo curabimus.

A R T I C U L U S P R I M U S.

De Steatmate, & tumoribus uteri membrana inclusis, sive Cysticis.

§. I.

Descriptio, & Differentiæ.

Steatoma tumoris species est membrana involuti ut cystis nomen mereatur; hujus receptaculi cavum humore spisso, diversimode colorato turget, qui interdum viscosus est, albus, salitus, a sebo haud absimilis, quem Græci *Steatoma* dicunt, quasi tumor *sebæus* dicerent; si humor ille minus spissus appareat, luteus, granulofus ut Mellem referat *Melliceris* appellatur quod Græce significat tumorem ex *Melle repletum*; si liquidior tandem, & albidior fiat ut Papparium repræsentet, *Atheroma* vocatur quasi tumor *Pappario* repletus.

Observavimus jam superius in Tractatu *Tumorum & Ulcerum*, hujusmodi tumores initio exiguos esse, qui in diem sensim sensimque crescendo maximum volumen acquirunt, ut deformes interdum fiant.

Quandoque unicam ipsos cavitatem continere, plures interdum.

Eos plerumque folliculum gignere duplici lamina instructum, ut internus nucleus concentricus sit, insulatus vel levi pedunculo partibus cohærens.

Eos tumores plerumque suapte natura colore & dolore expertes esse citra naturalis

turalis caloris mutationem, inflammationi tamen obnoxios quandoque, ac proinde calori, dolori, &c.

Crebro post inflammationem in abscessum, aut aposthema ipsum degenerare fœdo pure repletum, quod innotescit tumore disrupto, atque fluente latice.

Tandem illos facile in syrrhum, aut cancrum converti posse.

Ea omniâ quæ de cysticis tumoribus in genere exposuimus, iis uteri pariter conveniunt; animadvertendum solummodo videtur hujusmodi tumores modo extrinsecus uterum fœdare, modo intra tunicas locari, crebrius internam faciem lædere, & duplici sacculo contineri.

Iis tumoribus interdum vagina circa ostium, aut fundum, tum vulva, vel pudenda laborant.

§. II.

Causæ.

SCimus illos tumores efformari ab humoris alicujus in propriis vasis retenti congerie, quæ folliculos sensim sensimque distendit.

Quando in ceteris partibus id contingat lymphæ tantum congestioni tribuitur, ut alibi vidimus; verum uteri respectu a duplici humoris genere illud oriri potest; a lymphâ nempe lymphaticis venis coacervata; vel a lacte uterino in propriis receptaculis cummulato.

Utrumque tamen nisi tribus de causis tumorem cysticum inducere valet;

I. Quando lymphâ detinetur, & lac uterinum expandi cohibetur.

1. Ab infartu qui plus minusve vasa lymphatica, aut vermicularium orificia tegit; hæc eveniunt a subitaneo frigore quod fluentibus præsertim mensibus aut lochis uterum offendit.

2. A compressione quæ vasa nonnulla lymphatica, aut vermicularium ostia occludit; id juvenibus accidit mulieribus, aut statura humilibus, quæ grandiorum fœtum gestarunt, vel laboriosum partum passæ sunt in quo fœtum transversim sibi pandit viam; compressitque alterutrum valde uteri latus.

II. Quando hi humores etsi stagnantes aliqualem tamen fluiditatem servant, quæ syrrhi ortum tamen non impediunt.

III. Quando lymphâ, aut lac uterinum libere in vasa lymphatica, & vermicularia irrumpunt, eaque tumefaciunt ut cysticos producant tumores.

Ex iis notionibus consequuntur:

1. Membranaceum sacculum, qui tumorem complectitur, tunicam esse lymphaticorum, aut cellulam lacteorum vasorum ab affluenti lymphâ extensam, atque dilatatam.

2. Hanc dilatationem augeri interdum, ut ampliorem tumorem deformem ipsa inducat.

3. In ratione tumoris incrementi circumpositam membranam indurescere, lymphæ nutrientis ergo, nimia ibi copia persistentis.

4. Modo unicam cavitatem tumorem præferre dum unicum dilatatur lymphaticum vas, aut lacteum receptaculum.

5. Modo pluribus conflari loculamentis, quæ a multis extensis cellulis, dilatatisque vasis originem ducunt.

6. Hujusmodi vasa lymphatica, aut lactea receptacula, quæ suprà intimam uteri tunicam repunt, hanc dilatare dum expanduntur, quare tumores hi duplici obduci techa *interiori* una sibi propria, altera *exteriori* ab interna nata matricis membrana.

7. Densitatem stagnantis humoris a lymphâ, aut lactis uterini spissitudine deriva-

rivare, plerumque tamen tumoris pertinacia segnitiam illam plus, minusve inducere.

8. Coloris varietatem humoris illius ab eadem spissitudine interdum oriri; crebrius tamen a deleteria sanguinis admodum biliosi indole.

9. Cysticos uteri tumores æque, ac ceteros aliarum partium inflammari posse, exulcerari, in syrrhum degenerare, aut cancerum compressionum, contusionum, irritationum, aut excoriationum causa.

10. Tandem vaginæ etiam atque vulvæ fundum his tumoribus foedari, qui in omnibus cum illis uteri conveniunt.

§. III.

Symptomata.

I. **M**orbi initio nondum tumorem animadvertunt ægræ, eo tamen in diem incrementum venter tumet, & ipse in suspicionem incidunt calamitatis subsequaturæ.

II. Pondus, quod augetur quotidie animi ambaginem confirmat, eoque magis cum nullum gestationis certum indicium appareat.

III. Dolore interdum obtuso cruciantur ægræ qui eas valde perterrit, isque ab ampliato tumore, & inertia laceffitarum tunicarum dependet.

IV. Dum maximus tumor fit eam partem versus venter, labitur qua ægræ decumbunt; commodius enim dorso jacent.

V. In exiguo tumore menses periodice revertunt; abeunt vero si pro magnitudine ipse maximam partem uteri occupet.

VI. Catameniorum loco, lymphaticum erumpit effluvium a tumoris compressione elicitum; hujusmodi latex interdum pus emulatur.

VII. Tumores cystici plerumque lata basi utero valde adhærent; quandoque tamen exiguo coherent pedunculo; iis tamen disruptis difficillime modo grandiores sint expelluntur, plerumque pro molis expulsis ipsos habent, quod veram implicat molæ ideam.

VIII. Quando ii vaginam, aut vulvam deturpant eadem non solum incommoda afferunt, verum cum marito connubium impediunt, ut ægræ, & obstetrices ipse uteri descensus illos esse putent.

§. IV.

Diagnosis.

Ostendimus jam cysticos tumores uteri, atque vaginæ initio morbi nedum sensibiles fieri; at dum eos animadvertere incipimus facile cum aliis pluribus morbis confundimus, cum quibus summam affinitatem habent.

I. Hujusmodi ambiguitates tamen nequiquam inflammationem respiciunt, cum hæc ab iis prorsus vivo a pressione nato dolore, calore, atque febre distinguatur; verum illa ad acutos morbos, isti ad chronicos pertineant.

II. Facile tamen cum uteri syrrho, hydrope, aut gestatione illos permiscet; videbimus infra signa iis morbis propria; sat erit enim hic ea enunciare, quæ hujusmodi tumores a syrrho distinguunt: ea sunt

1. Syrrhum resistentem magis, atque durum cysticis tumoribus experiri.

2. Ipsum angulosum plerumque, esse inæqualem; cysticum vero tumorem rotundum, magisque extensum.

3. Illum denique teterrima scenomena inducere atque mulieres labefactare ; nullum tamen eas cystico tumore correptas incommodum perferre.

§. V.

Prognosis.

Cysticus uteri tumor sane rarus incommodus est, modo vero mulieres aggrediatur, pertinax valde est ad mortem usque perdurans.

1. Nunquam convalescunt, præsertim cum grandiores sint, nam impossibile est spissum, atque uberrimum illum solvere laticem duplici techa duriori obtectum; experientia enim innotuit externos cysticos tumores quos *lupias* dicunt incassum emplastris resolventibus tentare; eoque magis igitur difficile erit illos uteri sanare, quibus nefas est remedia apponere.

2. Hujusmodi difficultas quæ generice omnibus hujus speciei tumoribus convenit, magni facienda saltem est eorum tumorum ergo, qui majorem amplitudinem præferunt, atque spissiori turgent latice qualia steatoma, & atheroma sunt.

3. Plerumque persistendo internis efficacioribus remediis, aut resolventibus injectionibus ut tumor resolvatur, suppurationem imperfectam obtinemus, quæ abscessum anomalum inducit materie nempe repletum granulosa & putrescente, quæ minime verum pus videtur.

4. Interdum hujusmodi incommodum evenit etiam non excitatum.

Quando mulieres quæ iis tumoribus laborant supra ventrem cadunt, vel ictibus, aut contusionibus labefactantur.

Quando lentæ febri fiunt obnoxia, quæ humores, cruoremque sensim sensimque solvit.

Tandem quando in iis circumstantiis concipiunt, quod abortum facit.

5. Quoties ii tumores in suppurationem vergunt, abscessum in uterum efformant nocuum valde, in ulcere fistuloso plerumque abiturum, quod febris lenta comitatur.

6. Etiam si infensi videantur iidem vaginæ tumores, minus tamen periculi conjunctum habent, nam vel erosione, vel amputatione facile tunc extirpantur.

§. VI.

Curatio.

In cysticis illis tumoribus qui externas partes aggrediuntur, interne adhibentur solventia, externe emplastra resolventia applicantur, in hac methodo persistendo donec illi humiles persistant, neque infirmam partem deformant; tamen plerumque, iis frustra adhibitis auxiliis, necessum erit ferro, aut caustico tumores conscindere.

Ex iis inferre possumus quantum spei supersit uteri tumores sanandi quos nefas est abraderè, neve cujusve generis emplastra apponere; tantum nonnulla minus efficacia solventia exhibere fas est, qua de causa facile patebit palliativam tantum methodum inire posse, quæ nisi morbum demat, progressus tamen retardat.

Duæ indicationes hic proponuntur, altera est sanguinem attenuare, atque liberam in utero circulationem sollicitare ne tumoris infartus quam maxime augeatur; hanc implebimus

1. Frequenti usu decoctionum, aut apozematum diluentium, & humectantium quales superius proposuimus in ulceris hujus visceris curatione.

2. Verum usu feri lactis depurati, cui addi poterunt uncia aliquot succi depurati Chærophylli, aut Nasturti fontani; possumus etiam si opus sit decoctionibus, aut sero aperientia nonnulla copulare, qualia sunt Sal *de duobus*, martis Riverii, Tartarum Martiale Solubile, Terra folliata Tartari quæ diluentium virtutem augere potis erunt.

3. Ufuenit etiam lac asininum recens ubi sanguinis acrimoniam adesse suspicemur.

4. Aquæ ferrugineæ modica dosi, atque idonea tempestate sumptæ profunt aliquo præsertim sale purganti remixtæ.

5. Brachii venæ sectio interdum repetita admodum utilis evadit, continenter pulsibus ratione habita; verum necessarissima videtur quando dolor, aut calor uteri ægras infestet.

6. Balnea, & semibalnea tepentia ufueniunt in quibus decoctiones, apoze-mata, aut serum exhiberi potest.

7. Tandem ægras leviter purgare identidem ecoprotica repetendo, quæ non solum primas vias expient, verum sanguinem repurgent.

Altera indicatio erit uterum luere, atque mundare a fordibus ibi affluentibus quas ii tumores devehunt, & sub effluvi lymphatici, aut purulenti specie erumpunt; ea de causa injectiones tantum adhibere fas erit ex decoctionibus Hordei, Abscynthii, & Artemisiæ peractæ, quibus Mel Narbonensis addi poterit; Aquas Thermales etiam sulphureas, injectare oportebit guttas aliquas superafundendo Balsami *Commendatoris de Perne*; suffumigia denique quæ aquæ illæ exhalant utilia experta sunt, modo uterum tubuli auxilio intrent.

Eorum tumorum respectu qui vaginam, aut vulvam lædunt, facilius, tutiusque sanantur, quia emplastra apponi possunt, imo si opus requirat caustico destrui, aut ferro rescindi; verum earum operationum fusio-rem explicationem Articulo sequenti exponam, ubi de vaginæ Sarcomate vulgo Steatomate locuturi erimus.

A R T I C U L U S II.

De uteri Sarcomate.

§. I.

Descriptio.

Uterus æque, vagina, aut vulva rotundis tumoribus citra ullam cavitatem indolentibus, mollibus, cedentibus corripui possunt; tamen neque color, neve calor partium affectarum immutatur; hujusmodi tumores primum exigui sunt, atque insensibiles, at in diem increcendo infantis caput interdum adæquant; at eorum progressus etiamsi certissimi sint inæquali velocitate procedunt;

Illi omnibus corporis partibus communes sunt, omnem corporis ambitum deformare possunt, omnesque cavitates lædere, nares videlicet, œsophagum, aut intestina, idcirco nil mirum si simili morbo uterus laboret, aut vagina.

Dum hujusmodi tumores a morte aut amputatione scinduntur nullam cavitatem ipsos referre observamus, quinnimo interfecatione coagmentantur tendinearum, aut membranacearum aponeurosum, quarum intervalla pinguedinosa materie

terie vulgari sebo magis spissa, atque fibrosa replentur, ibique nervi & vasa sanguinea arteriosa & venosa valde tamen distincta distribuuntur.

Iidem tumores sarcomata nuncupantur quod carneam excrescentiam significat etiamsi sebacei tumoris nomen rationabilius mereantur, cum ipsos oriri cognoscamus ab expansione, atque intumescencia partis alicujus membranæ cellularis aut adiposæ.

Etiamsi indolentes plerumque & molles ii tumores existant, nihilo tamen minus quandoque in quibusdam circumstantiis inflammari possunt, exulcerari, aut in abscessum, syrrhum aut carcinoma degenerare, totidem diversos morbos producendo.

Quæ de sarcomate in genere dicta sunt, perbelle uteri sarcomati conveniunt, quod a ceteris positu tantum differt.

§. II.

Causæ.

MOdo suadeamus sarcoma concrefcere a nulla humoris congestione sed ab exuberanti nutritione cellularis uteri internæ, ejusque nimia crassitudine, ut excrescentiam referat internam faciem uteri deturpantem; reliquum erit causas detegere quæ hanc in utero nimiam nutritionem suppeditant.

Hanc tres causæ potissimæ sunt inducere tantum.

Prior. Prominentia est portiunculæ alicujus internæ faciei uteri, vel id ab ictu unguinum obstetricium eveniat, quæ leviter uterum excoriet, vel ab erosione guttarum nonnullarum rodentium albi fluoris, vel ab aliqua infecti feminis guttula; tunc emollita illa internæ uteri tunicæ parte suptus posita cellularis ab intima membrana minus pressa nutrientem lympham uberius recipiet, quæ sarcomati occasionem præbebit in diem aucturo.

Secunda. Crispatio videtur aut erethismus partis alicujus illius cellularis membranæ ab irritatione orta guttarum nonnullarum spissi atque acerrimi laticis albi fluoris veterrimi, vel ab aliqua venerei viri superafusa guttula, aut ab injectionibus stipticis, aut irritantibus; illa crispatio lymphatica vasa constringendo lympham sistit atque sarcoma tali pacto efformat.

Tertia. Ab imminutione procedit elaterii partis alicujus ejusdem membranæ, quod oriri poterit vel a distentione nimia hujus partis, quam in difficili, & laborioso partu passæ fuerint ægræ; vel a laxitudine ab albo stagnanti fluore inducta; in hoc casu lymphæ a vasis, aut tunicis imbecillibus minus impulsæ in ea labefactata parte persistet, eamque confertim nutriendo sarcoma pariet.

Sarcomatum respectu, quæ vaginam, aut vulvam gravant, easdem prorsus ipsæ causas agnoscunt; harum partium tamen speciales sunt titilamenta, quæ ipsæ, vel ab aliis fieri sinunt.

§. III.

Symptomata.

I. **M**Orbi aggressu hujusmodi tumores exigui sunt, neque pisum crassitudine superant, continuatione tamen agentium earum causarum sensim sensimque augentur.

II. Eorum incrementum plus minusve promptum videtur prout arteriæ, quæ

ad sarcoma humorem devehunt ampliores, plus minusve sunt aut turgentes, quæ videlicet majorem, vel minorem lymphæ nutrientis copiam suppeditant ibi stagnaturam.

III. Ea sarcomata plus minusve dura apparent prout nutriens lymphæ plus minusve spissa est, aut matricem aggreditur calentem plus minusve aut humidam.

IV. Hi tumores indolentes fiunt, vel adipis sensum tantum retinent, sebacei enim tumores paucissimis nerveis staminibus scatent.

V. Sarcomata quandoque crasso sed brevi pedunculo matrici adhærent, quandoque longiori, & graciliori appendice, cum ea cohærent, quod a majori vel minori portionis illius membranæ cellularis extensæ procedit.

VI. Dum sarcoma lato sed brevi pedunculo adhæret, difficilius divellitur; facilis tamen si longiori & graciliori appendice cohæreat; tunc hujusmodi sarcoma expellunt ægræ cum majori molæ molestia; verum interdum ideam pervertunt veræ molæ cognoscendæ.

VII. Quando uteri sarcomata ampliora facta sunt pondus ægræ persentiunt, atque molestiam quam postremis gestationis mensibus solent persentire.

VIII. Tunc pari ratione ac in gravidis mulieres magno sarcomate graves pedum œdemate laborant atque vulvæ, compressionis ergo, cruralium venarum, quæ sanguinem revehunt.

IX. Quando sarcomata exigua sunt, catamenia plerumque periodice restituntur, cum pars maxima faciei uteri internæ libera sit, verum vasa sanguinea, & venosæ appendices tumescere, produci, atque referari possint, quantum menstruatio postulaverit; contra vero amplificato nimis tumore intusque utero compresso vasa minime referantur atque menses desistunt.

X. Nihilominus tunc temporis ab utero erumpit lymphaticum effluvium plus minusve uberrimum vel ab interna uteri facie procedat, vel a tumore ipso segni lymphæ turgenti.

XI. Quando hujusmodi tumor ictui, contusioni vel casui fit obnoxius, aut manu imperiti obstetricantis, vel solventibus nimis emplastris lacescit; inflammatur ille facile, dolet tunc, aut in abscessum vergit, vel in durum syrrhum & carcinomatofum degenerat.

§. IV.

Diagnosis.

Sarcoma cum ceteris hujus partis tumoribus confundi potest cum syrrho videlicet, cystico tumore, steatomate, hydrope, tympanitide, aut gestatione.

I. Distinguitur a syrrho majori æqualitate, atque rotunditate, minori vero duritie, atque resistentia; verum sarcoma eo minus sanitatem pervertit.

II. Haud facile tamen a cystico tumore steatomatofso præsertim distinguunt cum extrinsecus eadem signa ambo præferant; at ea distinctio parvi faciendi videtur, cum una sit tum prognosis, cum medendi ratio.

III. Hydropis vero respectu, tympanitidis, aut gestationis eo mittimus lectorem ubi speciatim de iis morbis pertractabimus.

IV. Sarcomata vero vulvæ aut vaginæ speculi uteri auxilio facile conspiciuntur; a vaginæ tamen descensu interdum decipimur.

§. V.

Prognosis.

I. **H**UJUSMODI morbus incurabilis fane est, idcirco neque speranda, neque tentanda erit resolutio, cum tumor non a spisso congesto humore solubile derivet, at a nimia partium nutritione, atque aucta crassitudine, quam in partibus internis nefas erit amputare.

II. Etiam si sarcomata incurabilia sint, ea tamen diu citra gravem noxam ægræ ferunt, cum neque dolorem, calorem, febrem, aliamve functionum læsionem afferant.

III. Temporis diuturnitate tamen nonnulla superveniunt incommoda, pondus videlicet quod in hypogastrio perferunt, properandi difficultas, quam tumoris volumen parit; lymphaticum effluvium acre interdum, quod distractio uteri gignit.

IV. Cum sarcomata pinguedinis mollitiem servant diu in hoc statu sine mutatione persistunt, eoque magis cum ab externis læsionibus tuta sint, ut raro grave damnum ipsa inferant.

V. Vidimus jam illas interdum inflammari, exulcerari, atque in fyrrhum vel cancrum degenerare, ideoque ea tunc aderunt pericula iis morbis propria, raro tamen hujusmodi mutationes succedunt.

VI. Si vagina aut vulva hoc corripiantur incomodo una cum affectu utero prognosis est, in hoc casu tamen superest ferro aut caustico tumorem rescindi posse.

§. VI.

Curatio.

IN incurabili morbo palliativa tantum methodus reliqua est, duplex tamen *quæ* incrementum tumoris retardat, & *quæ* subsequutura levat incommoda.

I. Priorem indicationem implebimus sanguinis circulum promovendo, ejus fluiditatem conservando, ne copiosius in tumorem quam par est cruor irrumpat, lymphæ vero nutrientis statim a tumore removendo.

1. Hac de causa adhibentur ea circiter remedia quæ in fyrrhi palliativa curatione proposuimus, videlicet decoctiones, & apozemata humectantia atque diluentia, serum lactis depuratum vel succo imbutum, plantarum aperientium, aquæ mitiores ferrugineæ, idonea tempestate propinatæ modo pedum cedema hydropem non prænunciet; verum lac asinum recens dum sanguis acer videtur.

2. Possunt etiam iis remediis aperientia nonnulla mitiora copulari, videlicet opiata aperientia, & leviter solventia, modo nimiam sanguinis spissitudinem suspicemur.

3. Tandem venæ sectiones reiterare, & alvum ciere interdum convenit si mensium suppressio præsens sit, & ægræ juvenes sint, brachium incidere ter quaterve intra annum fas erit, totidemque purgare, verum transacto quinquagesimo quinto ætatis anno minus sanguinis extrahere debemus in purgatione persistendo.

II. Duo potissima hujus sarcomatis incommoda sunt. 1. Pondus quod ægras infestat hypogastrium versus. 2. Fœdum atque continens acre quandoque profluvium.

Priori molestiæ medetur tenuis venter subcingendo fibulis si opus sit connexis. Secundam vero implemus indicationem, ægras hortando ut sæpe leviori decoctione

coctione cherophyli cum aceto Lithargiri ope dulcificato &c. partem abluant; verum injectiones non inutiles sunt Althææ modo nondum patulum sit uteri ostium; identidem semibalnea conducunt tepentia.

III. Si disrupto pedunculo fluctuans sarcoma uteri orificio se præbeat, eam methodum adhibere necesse erit, quam in molæ extractione infra proponemus, id tamen raro evenit.

IV. Sarcomatis respectu vaginæ, aut vulvæ illum ferro modo tumor magnus appareat, vel caustico destrui debet modo exiguus sit, & feminas obesas lædat.

V. In primo casu valde olim implicabantur, dum vinci iniquo loco tumorem tentabant, at nuper tutiora instrumenta inventa sunt, quibus facile id peragitur, etiamsi vinculum frustraneum videatur, nam vasa sanguinea ibi confluentia vel pauca sunt, vel exigua, ut amputatio absque hæmorrhagiæ metu institui sinant, vel levis sanguinis jactura superveniat facile pulvinis aqua aluminosa imbutis sistenda; amputatione vero confecta superstes ulcus vulgari methodo pertractatur.

Si vero caustica amplectamur antequam usueniant vaginæ, atque vulvæ circumpositas partes emplastro mucilagineo, aut pulvinis aqua Bismalyæ saturatis defendere oportebit, orificium præsertim uteri tuendo; his cautelis adhibitis caustica applicantur, qualia sunt lapis causticus, trochisci minii aut sublimati corrosivi in Codice Parisiensi descripti, aut filamenta *de Vigo* jugiter summa cautione atque cunctatione incedendo.

C A P U T VII.

De uteri Cancro.

§. I.

Descriptio.

Cancer generice ut in tractatu *Tumorum & Ulcerum* demonstravimus, Tumor est durus resistens dolens atque lancinans, vel ut melius dicam, Cancer syrrhus est dolore abreptus, quare facile erit canceri uterini naturam cognoscere, cum a ceteris solo positu differat. Ut causas cognoscamus per quas syrrhus in cancrum degenerat, sedulo mutationes examinare oportebit, quæ in syrrho eveniunt.

1. Syrrhus facile dolore, & lancinationibus plus minusve molestiis corripitur præsertim cum ruditer contrectetur.

2. Tumet ille atque celerius crescit, ingrandescit, formam immutat, & inæqualiter acuminatus & angulosus fit.

3. Eorum angulorum nonnulli in diem acutiores fiunt, & membrana quæ illos obtegit tenditur magis, magisque levigata apparet, atque rubra.

4. Hujusmodi mutationes in externis syrrhis facile oculis subjiciuntur, innotescunt pariter in uteri cancro manum hyppogastrio apponendo, aut digitum in vaginam intromittendo, cujus ope colli uteri statum, atque continuos syrrhi progressus distinguimus.

5. Sunt hi anguli qui majori dolore perciti, atque lancinationibus ibi centrum morbi existere ostendunt.

In hoc casu utericancer, æque ii ac ceterarum partium canceri *confirmati* dicuntur, & *occulti*.

6. Tandem hujusmodi membrana postquam maximam tensionem passa erit, disrumpitur ut ulcus hinc ortum centrum usque canceri versus pervadat, a quo ichorosa serositas erit continenter fluxura.

7. Tunc

7. Tunc cancer margins sine causa manifesta aperiuntur magnopere, ut cancer *apertus* appelletur.

8. Dolores atque lancinationes quotidie augentur, ulcusque magis panditur, ut cancer pro vero pure foetidissimam saniem effundat.

9. Ex canceri limine carunculæ molles spongiosæ continenter germinant, quæ cito putrescunt, atque in diem regenerantur.

10. Partes cum utero adhærentes aut propinquæ canceri scœnomenis participes fiunt; vagina enim per quam latex illud defluit, laceffitur, inflammatur, aut ulcere deturpatur; pro diverso canceri positu dolores renibus intestinis, aut lateribus respondent; interdum dejectiones, aut mictus difficulter, & dolenter fiunt, modo inflammatio recto aut vesicæ communicetur.

11. Tandem iis morbis omnibus febris lenta superadditur, cujus exacerbationes plus minusve crebræ fiunt, aut diutinæ pro diversa canceri magnitudine, humoris effluentis acrimonia, aut dolore plus, minusve intenso, vel sanguinis vitio plus minusve deleterio.

Ut superius *Capite V.* observavimus vaginam atque vulvæ similibus morbis foedari posse, neminem latebit.

§. I I.

Differentiæ.

1. **C**ancer *incipiens* est quando syrrhus obtusum dolorem afferre, atque lancinantem incipit, citra tumoris augmentum; *confirmatus* dicitur quando crebrius laniat, aut in diem deformis fit.

2. Uterque *occultus* appellatur, antequam disrumpatur, *patulus* vero seu *ulcerosus* modo referari incipiat.

3. *Malignus* tumor est dum acerbissimis doloribus sævisque copulatur scœnomenis; *benignus* cum ea mitiora appareant.

4. Tandem cancer aut a causa *interna* procedit, a vitio nempe sanguinis procul ulla vel leviori tantum externa labe; aut ab *externa causa* derivat modo pulsus compressus, aut contusus fuerit tumor.

§. III.

Causæ.

Communis est sententia cancrum generari ab acri humore, & corrodente, qui syrrhum exulcerat, & in hoc morbo obvia inducit symptomata; verum haud facile est tali pacto originem hujus laticis explicare in tumore duro, compacto, indolente, eoque difficilius est explanare, etiam concesso illo latitante humore, qua ratione intumescat, aut formam variet. syrrhus dum in cancrum degenerat; tandem per difficillimum erit in ea sententia obversionem labiorum canceri, & citissimam, citra causam manifestam, exulcerationem demonstrare.

Proposui circa hanc rem in *Tractatu Tumorum, & Ulcerum* cogitatum meum, verum ut clarius incedamus animadvertere oportet:

1. Syrrhum uteri tumorem esse sensim sensimque genitum a congestione lymphæ, aut lactis uterini spissi, quassati & indurati, qui valent durum resistentem tumorem gignere.

2. Hunc ita coagmentatum inæqualiter tumesceri, extendi, rarescere prout plus minusve premitur, quod intumescencia, & inæqualitas tumoris confirmant.

3. Membranam cancrum obtegentem corpusque fyrrhi nisi a summa distractione, atque expansione disrumpi ubi præsertim maxima fit distentio.

4. Cancrum semel apertum a sola rarefcentiæ, & distractionis continuatione magis magisque refferari.

His perpenſis facile innotabit materiam fyrrhofam ſummum gradum rareſcentiæ ſuſcipere potis eſſe, huic enim tribuere debere intumeſcentiam, quæ interdum in fyrrho conſpicitur per quam in cancrum immutatur.

Hæc facultas fyrrhofæ materie tributa pluribus exemplis confirmatur; hac de cauſa Gypſum tumet una & indureſcit dum aqua emollitur; limatura chalybis urina & Albio remixta duram maſſam efformat tumentem; verum metallorum atque ſalium ſolutiones vegetantium more arbores loculentiffimas efformant.

Hoc principio ſancito ſupereſt tantum pro methamorphoſeos explicatione cauſam in fyrrho detegere illius rareſcentiæ, quæ cancrum inducit.

Huiusmodi cauſa niſi caloris in fyrrho lactitantis augmentum eſſe poteſt, quod fyrrhofam materiam expandit; id triplici ratione oriri poteſt, dum fyrrhus conſtanter in cancrum degenerat.

Primo id evenit quando naturalis ſanguinis calor augetur febris cauſa vel ciborum acrium falſugineorum, aut calefacientium abuſu, vel pervigilii, exercitii nimii, aut animi patematum ratione.

Secundo quando calor in fyrrhum intenditur a ſpecialiori cauſa videlicet uteri inflammatione, abuſu ſolventium remedium, coitu nimio, geſtatione, laborioſo partu aut abortu.

Tertio tandem irruptio nimia in fyrrho ſanguinis univerſalis plethoræ & febris ergo, vel crebra nimis contrectatione tumoris, balneorum calefacientium abuſu, irritatione albi fluoris, compreſſione tandem, aut icſtu.

§. IV.

Symptomata.

I. **S**Yrrhus in cancrum degenerans, quam maxime ingrandeſcit rareſcentiæ ergo quam alterutra cauſarum propoſitarum producit.

II. Huiusmodi expansio non una eſt in omni fyrrhi ambitu, vel quod materia undique haud diſpoſita ſit, vel inæqualiter rareſcenti cauſæ obnoxia, quæ de cauſa protuberantiæ, & anguli producuntur, qui fyrrhum deſformant.

III. Eadem fyrrhofæ maſſæ rareſcentia nervorum ibi reptantium doloroſam diſtractionem inducere valet, quæ lancinantes cruciatus gignit in incipienti aut confirmato cancro obvios, qui totidem ſigna ſunt cancri pathognomonica.

IV. Ii vero dolores qui affectam partem laniant propinquis partibus nervorum propagatione communicantur.

V. Demum a maxima materie illius expansione membrana cancrum obtegens, & cancer ipſe diſcerpuntur, eam partem verſus, quæ magis tumet.

VI. Eadem de cauſa os cancri quod initio exiguum erat labiorum intumeſcentiæ ergo, ampliatur valde atque in diem extrorſum obvertitur.

VII. Simili ratione caro fungoſa continenter ab ulceris ore germinat, vegetabilium more increſcens, quæ cito decidit a novis ejuſdem cenſus carunculis reſtituta.

VIII. Margines cancri tument, dilatantur, conſcinduntur, itemque ibi reptantia ſanguinea vaſa arterioſa, aut venoſa, diſrumpunt, ut hæmorrhagias inducant plus minusve uberrimas pro conciſi vaſis magnitudine aut genere diſverſo, arterioſo, aut venoſo.

IX. A cancro humor erumpens primum lymphaticus eſt, verum ichoroſus fit, tan-

tandem saniosus, & purulentus evadit, male olet plerumque carnis spungiosæ ergo ipso remixtæ.

X. Cancro vero progrediente febris lenta adoritur cum pervigilio, depravato gustu, atque marasmo superventuro; tandem modo ægræ dolore non deficient anasarca plerumque, aut hydrope abdominis pereunt.

XI. Partes omnes propinquæ labefactantur plus minusve pro diverso morbi in utero positu, interdum enim dolor recto communicatus, aut vesicæ intumescen-
tiam inducit.

§. V.

Diagnosis.

I. **C**ancri existentia experientiis comprobatur innumeris.

1. Succedit quotidie cancer manifesto syrrho, eumque dolores præ-
nunciant lancinantes, qui comitantur intumescen-
tiam cancerum specificè indi-
cantem.

2. Dignoscitur vero a mutationibus syrrhoso cancro supervenientibus, quæ
tunc eveniunt quando tumor ille in cancerum erit desiturus.

3. Certiores magis fieri possumus modo cancer, ut crebrius accidit, collum
uteri deturpet, nam tactu canceri inæqualitatem, & variationes inspicere pos-
sunt.

II. Facile pariter erit modo canceri existentia innotescat status diversos mor-
bi detegere; etenim cum omne desit effluvium cancerum occultum esse fateberis;
verum si dolores lancinantes vehementiores sint, atque pertinaciores illum con-
firmatum esse credes; & contra si ii mitiores appareant, tandem illum dis-
ruptum esse cognoveris modo latex successive erumpat, lymphaticus, ichoro-
sus, saniosus, purulentus, atque male olens.

III. Valde intererit ad prognosin instituendam benignum cancerum a mali-
gno distinguere, quod facile tamen obtinebitur, cancer enim benignus erit,
quando mitis dolor parum, vel raro laniet, fluens materies serosa, & inodo-
ra existat, quod indicat nondum vel seigniter rarefcere, verum parum, aut ni-
hil spungiosæ carnis germinare, quæ ferositatem illam valeat deturpare.

Cancer vero malignus gravissimo dolore vix tolerabile, vivisque, & crebris
lancinationibus corripitur, materies vero ex utero erumpens foetissimo odore
pollet, quod indicat tumoris volumen stendi, atque deformari continuo, verum
latitantem fomitem a fungosa carne in cancro uberius germinanti valde cor-
rumpi.

IV. Tandem perspectis iis, quæ canceri generationem, aut antecedentem egræ
conditionem, aut sanguinis constitutionem respiciunt, facile judicare poterim-
us, an accidentali causæ, & externæ, viro præsertim celtico, aut sanguinis
labi sit tribuendus.

§. VI.

Prognosis.

Generice omnis cancer incurabilis est modo rescindi nequeat, nam, mini-
me vulgares rationes impendi possunt, quæ ceteros tumores sanant, reso-
lutionem nempe, aut curationem excitando, ex quibus consequitur uteri can-
cerum prorsus insanabilem esse, quia amputari nefas est.

Verum iis fini deteriores fiunt valde celerius, nam in parte locati sunt ca-
lida

lida magis, & vasorum sanguineorum repleta, quæ canceri materiam calefaciendo tumorem cito tumefaciunt, atque expandunt, morbumque magnopere intendunt.

Non defunt tamen exempla canceri a venerea causa nati frictionibus hydrargiri sanati, at hæc rara sunt, neque magni facienda, modo cancer exiguus, incipiens, atque benignus, de cetero bene constitutam mulierem non aggrediatur.

Nostrium erit igitur in uteri cancro palliatiuæ medelæ tantum consulere; id eoque prognosis eo collineat, ut cognoscamus circumstantias in quibus facilius morbi progressus retardare atque mitigare poterimus.

Sperare enim licebit eas indicationes implere posse modo cancer adhuc integer sit, parum doleat, parumque figura mutatus sit, atque benignam naturam præferat, verum ægram de cetero bene constitutam, & mensibus donatam adoriatur.

Contra vero merito deseperabimus si cancer ulcerosus valde sit, ut ægræ vitam minetur, quod pertimescendum videtur, quando dolor affectam partem valde laniat, cancer deformior fiat, hæmorrhagias inducat, malignum se præferat, tandem infirmas, aut mensibus orbatas mulieres invadat.

§. VII.

Curatio.

Curatio canceri palliativa, quam solummodo amplecti licebit quatuor potissimum indicationes complectitur, videlicet

I. Imminuere, & retardare internis remediis morbi progressus.

II. Huic externis pariter remediis consulere.

III. Dolorum sedare vehementiam.

IV. Hæmorrhagias tandem sistere superventuras.

I. Primæ enim indicationi satisfaciemus subsequentiū internorum remedium usu.

1. Regimen exactum præscribendo jusculis tantum, farinaceis præsertim ægras nutriendo, usum carniū, vini interdicens, vel exigua copia ipsis permittendo, omne corporis exercitium prohibendo, verum ut diu lectulo, aut biselio decumbant curando, neve nutrientes nimis cibos, qui multum sanguinis gignunt, ipsæ comedant.

2. Præter ea auxilia sollicitos esse debemus ut ægræ identidem de secundo, aut tertio mense brachium incidere sinant, præsertim si imperfecte menstruis gaudeant, aut orbatæ sint; hujusmodi auxilium in hoc casu inter efficaciora recensetur.

3. Ægras pariter purgare necesse erit lenientibus tamen, quæ neque calefaciant aut laceffant: id præstant Polipodius, Tamarindus, Cassia, Rheum, aut Sal vegetabile.

4. Neque prætereundum erit, decoctiones temperantes, & refrigerantes exhibere, serum depuratum, & chalybeatum, lac asininum, aut caprinum, vel vaccinum etiam idonea tempestate propinatum semel vel bis in die; aut pro integro nutrimento si stomachus ferat.

5. Necesse erit æstivo tempore aquas ferrugineas mitiores exhibere quales sunt ille *de Forges* modica dosi, sed continuo sumptæ.

II. Utiliter secundam indicationem implemus sequentibus externis remediis, videlicet

1. Balnea, & semibalnea ex aqua fluviatilis tepentis vel ex decoctione Mal-

væ, Althææ, Brancæ urcinæ &c., in iis agras per integram saltem horam detinendo.

His auxiliis addi poterit feri lactis aut aquarum mineralium potatio; in primo casu balnea, atque semibalnea mane jejuno stomacho usuveniunt ex lavacro exeuntibus serum aut lac exhibendo, in altero casu aquæ minerales mane propinantur balnea vero ante prandium præscribuntur.

2. Uteri injectiones ex succo aut decoctione *Solani Morellæ dicti* patrantur aut *Sedi*; Conteruntur hujusmodi succi aut decoctiones in plumbeo mortario, usque dum liquor densus, spissusque evadat, imo additur interdum parum Saturni combusti, modo dolores vividiores sint, vel saccharum Saturni exigua dosi iis remiscetur.

3. Injectari pariter possunt decoctiones ranarum viridium, cancrorum fluvialium aut marinorum, limacum, vel lumbricorum terrestrium in plumbeo mortario contritorum, iis copulando nonnihil pulveris eorum animalium, vel etiam buffonum excicatorum, modo vero dolor sævissimus fiat trochisci addi poterunt, albi Rhafis, aut syrrius Papaveri albi vel Diacodii.

III. Unica via dolores efficaciter compescendi videtur narcotica exhibere, quæ numquam agris interdicerere debemus, modo ipsæ non abutantur, tutiora igitur hujus census remedia, atque in nostro casu magis idonea ea sunt quæ opium suppeditat; videlicet Laudanum solidum aut aqua solutum, Tinctura Annodina Sydenamii juxta Codicem Parisinum vel Italicum Bononiensem parata, ea non solum intrinsecus exhibentur, verum injectionibus superius allatis permiscuntur; dosi vero eorum remediorum pro cruciatuum vehementia, aut ægrotantium viribus variare solet: salubrius tamen est crebre ea remedia exigua dosi exhibere, quam raro largiori propinare.

IV. In uteri cancro hæmorrhagiam sistimus frequenter superventuras pro potu quotidiano pthisanam exhibendo ex decoctione confecta radicis Consolidæ majoris guttis 57. aqua Rhabellii ad gratam aciditatem remixta, quæ vero dulcificatur cum uncia syrrius Capillarium, aut Ribesiorum; at cum hujusmodi remedium segniter agat, statim utero injectare fas erit succo Plantaginis aut Bursæ pastoris alumen vel thus addendo, vel salubrius pthisanam adhibendo supra descriptam.

Animadvertendum est cancrum uteri orificium, vaginam, aut vulvam lædentem temperare ejusque scœnomena compescere externis posse remediis in externo cancro usitatoribus; hujusmodi sunt pulvini illa decoctione imbuti, & vulgaribus absorbentibus conspersi videlicet plumbo Mercurio copulato, pulvis enim usuvenit anatina parte remixtus pulveris Antimonii crudi, aut antiethico Poterii, vel utilius fomenta ex foliis Cicutæ sacculo inclusis, & aqua fotis profunt, quæ affectæ parti applicantur, ut infra speciali capite ostendemus.

Interdum spungiosas carnes rodere necesse erit pulvinos balsamo chalybis saturatos applicando in Tractatu *Tumorum*, & *Ulcerum*, (a) indicato, quod sæpius abluendo quantum opus requirat edulcorari poterit; identidem vitulinæ carnis frustula applicantur, quæ dolorem atque inflammationem leniant, animadvertendum tamen est hujusmodi topica filo necti cera inducto, ut facile extrahi possint.

Tandem si indicia aut validæ conjecturæ habeantur quæ cancrum uteri venereum prænunciant statim agras mercurialibus frictionibus aggredi debemus, postquam vulgari methodo dispositæ fuerint; hic tamen cautelas reiterare fas erit quas in venereis uteri ulceribus enuntiavimus, videlicet exigua dosi & longis interpositis intervallis frictiones instituere, ne sanguinem nimis commoveant,

aut

aut materiæ carcinomatosa intumescantiam, atque expansionem augeant, neve morbi progressus intendant.

Remedia proposita adversus uteri Cancrum.

I. In cancro æque ac in uteri syrrho atque ulcere mercuriales frictions adhibitæ fuerunt æquo tamen frustraneo eventu; modo cancer a celtica lue dependeat, sæpe hujusmodi remedia levamen afferunt etiamsi neque constantem, neve completam valetudinem inducant; at si nullum optimum effectum præstent dum cancer celtica lue expers, a vulgari causa procedit, superius Caput IV. & V. pervolvere oportebit ube de *Ulcere & Syrrho uteri* differuimus.

Dominus Andreas Elia Buchenerus cum perperam perscrutatus sit indolem, & causas canceri, ideo deceptus est in suis thesibus *De Medicamentorum Mercurialium usu in cancro* quas *Hale* defendit 1755 in quibus jactat specificam virtutem *Mercurialium præparationum & Mercurii dulcis* præsertim adversus foedum Cancrum.

Suspicio simul se valde decepisse Dominum Philippum Fridericum Gmelin Tubingæ Medicinæ Professore, qui hanc sententiam amplexus est, atque nimis observationem extollit Antonii Ribeirii Sanchez, a generali propositione decerptam ejusdem dissertationis, quæ sub Titulo legitur: *Specifica methodus recentior cancerum curandi* Tubingæ impressa Anno 1757., & ab Hallero inserta in collectione thesium medicinalium Tom. VI.

D. Sanchez magni nominis Medicus qui summam laudem in Moscovia medicinam exercuit, communicavit Fratri D. Gmelini cancerum narium ulceratum ad os usque penetrantem medicum quemdam suasu suo curasse ea methodo quam ipse impendere solebat; hujusmodi medendi ratio est grana quatuor sublimati corrosivi in unciiis 48. solvere spiritus vini, verum ejusdem solutionis mane, & vespere unciam ægris exhibendo; omitto remedia nonnulla, externa fomenta videlicet, atque linimenta, quibus usus est, sed morbum moderare, non tolerare ipsa potis sunt.

Eam observationem non contendo, verum autumo cancerum sublimato corrosivo sanatum venereum fuisse; Sanchez ipse animadvertit sublimatum corrosivum ita adhibitum luem veneream subjigere, immo asserit sapissime idem expertum esse, nil mirum ergo si cancerum subijciat a celtica lue derivatum; at Dominus Gmelinus perperam deduxit sublimatum corrosivum in omni cancro specificum remedium præstare: observationes enim Domini Storck de quibus infra loquuturi erimus plane ostenderunt casu 1., & 9. hujus remedii inefficaciam in cancro a vulgari causa orto.

De cetero Domini Sanchez remedium idem est, quod Boheravius (a) in Chemiæ suis elementis descripsit, atque Celeberrimus Vansvieten Publici Juris fecit.

Hoc remedium Parisienses jamdudum cognoverant ut in animadversionibus enunciaui, quæ in tertia Editione Tractatus Morborum (b) Venereorum reperiuntur; verum, quod mirum est, illud jampridem Siberii cognoscebant; extat enim in Bibliotheca Germanica, Historia morum Ostiakorum, quam tradidit Joannis Bernardus Muller Capitanus Sveckus, qui dum per longum tempus in iis regionibus apud Ostiackes Syberiaë populos captivus fuit, observavit adversus luem veneream Ostiackis mos esse comedere sublimatum corrosivum in brodio avenæ postquam quod quotidie aceti poculum hauriebant.

Concludimus igitur Mercurium ejusdemque præparationes mederi interdum vene-

venereo cancro, non vero ceteros ab aliis causis ortos; verum etsi hujusmodi remedium adhibere conveniat, frictiones potius quam per os assumptionem commendarem, *vid. Lib. II. Cap. IV. §. IV.* ubi sublimatum corrosivum exhibere valde periculosum esse, & futile plerumque demonstravi.

II. Haftenus exposita satis confirmant nos specificis adversum cancrum remediis carere, nisi hujus sensus sit cancri amputatio, quæ in uteri cancro institui nefas est; nihilominus magnopere medicos commendabo qui omne studium impendunt, & necessaria experimenta instituunt ad hujusmodi auxilia investiganda; sane quæ ipsi proposuerunt ex plantis valde suspectis, aut nocuis decerpta sunt; at modo veri sint optimi effectus, quos experti sunt, eorum observationes perscrutari non inutile censeo.

Inter has plantas, quæ primum nostræ indagini sese offert est *Bella-donna*, alias *solanum furiosum*, aut *solanum melanoserasos*, quem Lineus *atropa* appellat.

Usque adhuc pro venenosa habuerunt hujusmodi plantam, cujus nocuos effectus testantur Johannes (c) Schenkius, qui plurimum medicorum circa eam opiniones congeffit; verum Simon de (d) Paullis, Jannis Jacobus (e) VVeppferus, Amatus (f) Lusitanus & nuper Joannis Sebastianus, atque Albretius (g) Professor Coburgi qui de ea pertractarunt.

Nihilo tamen minus D. Michael Albertus Medicinæ Professor contrarium defendere curavit Halæ anno 1739. in Thesibus *De Bella-donna tamquam specifico in cancro præsertim occulto*; nondum eas ad manus pervenerunt meas, quare me latet quibus rationibus sententiam sustineat; honorem tamen primus sibi pro merito est ostendisse *Bella-donnam* intus sumptam adversus cancrum, utilem evadere; nam jandudum (h) extrinsecus ad dolorem mitigandum tum foliis, cum succo depurato utebantur.

Dominus Tiberius Lambergenus Groningæ Professor secundus fuit qui *Bella-donnam* illustravit; feminam enim anno 1745. præ manibus habuit, quam vulgari ratione curandi incassum tentata amicorum (i) consilio *Bella-donnam* experiri ausus est, cum a pluribus medicis ejus virtutem prædicare audiret ad fyrrhos subijciendos, verum cum de remedii nocua facultate valde dubitaret primum in se ipso periculum facere maluit, postquamquod de ejusdem innocua virtute certior factus, ægrotanti exhibuit; hujus rei veram historiam tradidit in Prælectione inaugurali habita, & impressa Groningæ anno 1754. sub titulo *Lectio inauguralis sistens Ephemeridem persanati Carcinomatis*, quam D. Hallærus inseruit in sua collectione Thesium Medicinalium Tom. II. ejusdem specimen vobis ostendam.

Infundit ipse per integram noctem, lenioris ignis auxilio, scrupulum foliorum exsiccatum *Bella-donnæ* in ea aquæ quantitate, quæ decem æquet cyathos, unum quotidie exhibendo atque dosim augendo ad unum & semis, vel duplicem poculum hujusmodi infusionis quam dimidiatim mane, & vespere propinabat; diu tamen in hujus remedii usu non perstitit scenomenorum ergo supervenientium perterritus.

Eam methodum quinque menses profecutus est, videlicet a die 24. Januarii 1745. usque ad diem 11. Junii ejusdem anni, quo tempore ægra sumpserat infusum sex drachmarum Solani allata ratione paratum.

Plu-

(c) Lib. VII. De Venenis ex plantis Observ. 164.

(d) In quadripartito Botanico.

(e) In Tractatu de Cicuta aquatica.

(f) Cent. IV. Curat. 98.

(g) In Commenc. Noribergico. Ann. 1731. pag. 332. & Ann. 1752. pag. 121.

(h) Vid. Gendron, Recherches sur la Cancres pag. 137.

(i) Frideric. VVinter, Professor Medicinæ Leidensis.

Plures tamen variationes observarunt, sæpe enim morbus in deterius vertit, antequam ægra perfecte convalesceret; usus hujus remedii nullum detrimentum attulit præter levem vertiginem, aliqualem tumultum, atque oris & gutturi siccitatem, quæ nisi theiformis potum sinebat, at ea fœnomena tandem desistebant, etiamsi paullo post a nova remedii assumptione reverterent, ut numquam perfecte assuesceret, quod Medico obstitit quin dosim augeret.

Quamquam facultatem sanandi cancerum a D. Lambergenio *Bella-donnæ* tributam unica videatur experientia suffulta, attamen plures nostratum excitavit, ut periculum facerent; me vero effectus latet, at eorum silentium suadet illos fuisse, fortassis non decepti essent si Buchenerii superius recensitam thesim perscrutati fuissent, ubi ille, qui anno a Lambergenio scripsit, ostendit Solanum ab aliis laudatum nondum perfecte, aut tuto adversus cancerum facere, ait enim (k) *Neque a multis ad hos usus eximie laudatum Solanum furiosum secure, atque certo furiosum Carcinoma semper refrænavit.*

In iis circumstantiis prudentia docet a simili remedio abstinere, usque dum experientia optimos confirmet effectus, eoque magis cum Lambergenius ipse observasset molesta incommoda, etiamsi leviora evenisse, quæ tamen visum interdum debebant.

Autumo idem judicare debere de *Phytolacca Turneforti Solanum magnum Virginianum Parkinsoni* dicta, quam non (l) inutiliter experti sunt in nova provincia Eboracensi Americæ, & quam defendit Trillerus etiam anno 1752. Vitembergæ in suis thesibus, *De nociva canceri inveterati extirpatione demonstrata.*

III. Aliam nuperrime plantam proposuerunt adversus eundem morbum *Cicutam* (m) nempe terrestrem, ab aquatica prorsus diversam.

Hanc pariter pro veneno olim Medici omnes habuerunt ut de *Bella-donna* animadvertimus; nihilofecius (n) Hyppocrates eam intus exhibebat in uteri morbis, Galenus (o) vero ejusdem semina, atque folia decoctionibus, & compositionibus permiscebat, quas laudare, atque præscribere pluries consuevit.

Præ (p) aliis quendam compositionem extollunt Apollodoro tributam, quam Heraclidus Tarentinus ad dolores, & vapores hystericos [mitigandos commendabat, eam non exigua dosi intrabat succus *Cicutæ*, cujus formulam hic ostendam.

R. *Succi Cicutæ, Hyoscyami ana. ℥ iv.*

Castorei, Piperis albi, Costi, Myrrhæ, Opii, ana. ℥ j.

Hæc lævigata, additis duobus passi Cyathis in Sole commiscebis, donec inspissentur, & inde configes

Pastillos ad Fabæ Græcæ magnitudinem. Dato cum Vini Cyathis duobus.

Rajus vero suo tempore asseruit Medicum quemdam (q) Anglum nomine *Bovole* in febribus malignis, & quartanis *Cicutæ* radicem ad scrupulum sub pulveris specie exhibuisse, dein Paulus Reneamus Medicus Blesensis in suis (r) observationibus tradidit in jecuris obstructione infusum vinosum exhibuisse,

(k) §. XXXIII. (l) Rudolph. Augustin Vogel, in der Medicinischen Bibliothek, Esterbande p. 849.

(m) Celsus De re medica Lib. VI. Cap. 27. Dioscorides De re medica Lib. IV. Cap. 79. & Alexiphar. Cap. 11. Galenus, De simplic. Medicam. Facultas Lib. III. Cap. 18. Aetius, Tetral. IV. Serm. I. Cap. 63. Paulus Egineta, Lib. V. Cap. 41. Et caterva recentiorum Medicorum.

(n) De natura Muliebri.

(o) De compos. medicamentor. secundum locos Lib. VII. Cap. 2. 3. 5. Lib. IX. Cap. 4. & Lib. X. Cap. 1.

(p) De antidotis, Lib. II. Cap. 13.

(q) Histor. Plantar. Lib. IX. Cap. 8. (r) Observat. 3. & 4.

se, primum cum duplici scrupulo Cicutæ radicis exsiccata, verum drachma duplici summo cum fructu.

At hujusmodi auctoritates pauci pendebant; adhuc enim subsistebat Cicutæ contemptus, nisi celeberrimus Storck Vindobonæ Medicus animose primum in seipso, verum in ægrotantibus Cicutam (f) expertus esset, ut in sua prima dissertatione ostendit sub Titulo *Libellus, quo demonstratur Cicutam, non solum usu interno tutissime exhiberi, sed & esse remedium valde utile in multis morbis, quibus usque curatu impossibiles dicebantur.*

At quod ei summam laudem præstitit prudens regimen fuit, quo in difficilissimis circumstantiis eam caute subministravit; diligentia qua experimentorum effectus clarissimis medicis communicavit; verum candor quo compositionem, atque ejusdem eventus publici juris fecit.

Nihil est ea compositione simplicius, Cicutæ enim recenter collectæ succum exprimit, & per balneum arenæ sensim sensimque inspissat, ne comburatur cavendo; modo extracti consistentiam æquaverit succus ab igne removet, & eocopulando pulvim foliorum exsiccatorum ejusdem stirpis pillulas efformat, quæ duplicem granum pendeant.

Idem auctor primum unicam earum pillularum mane jejuno stomacho exhibere, alteram vespere tentavit; verum dosim auxit; in diem pillularum numerum crescendo; statim effectus vix sensibiles obtinuit, in progressu vero magis patebant; interdum a duplici mense convalescerent ægræ, interdum post majus temporis spatium pro diverso morbi gradu, & ægrotantium constitutione.

Ejusdem sententia publico communicata non unica fulcitur observatione, sed pluribus quas ipse reiteravit experienciis, in diversis ægrotantium circumstantiis; in illis videlicet, qui cancro occulto, aut aperto laborabant sinum, aut vultum aggrediente; in iis qui glandulis, aut strummis syrrhosis, vel Epatis syrrhis cruciabantur, & quod mirum est suffusione correpti erant; hoc remedium valetudinem donavit, leniter resolvendo, vel in cancro laudabilem suppurationem excitando; tentamina fecit coram medicis celeberrimis, qui eventus testes candidi fuerunt; tandem medicis pluribus, & Chirurgis idem communicavit, ut experientias in propriis ægrotantibus renovarent, quarum optimos effectus plane recognoverunt; hæc omnia in superius allata dissertatione extant, quæ animose, libenterque fatetur; quot enim mysterium facerent de hoc præstantissimo remedio neve publici juris facere respuerent nulla ratione habita ægrotantium utilitati, qui eorum silentio sanitatem recuperare impedirentur.

Quare nil mirum si candidæ D. Storcki observationes multum spei induxerant iis, qui primum ipsius libellum pervolverunt; statim ac hujus remedii specimen apparuit ipsum tentare plures satagerunt, usque adhuc tamen eventus conceptæ spei perfecte non respondit, dolores tamen canceri valde mitigabantur, & volumen tumoris imminuebatur, quod majoris utilitatis spem substinebat; magni faciendum enim est, neminem gravi ullo incommodo correptos fuisse ab ejusdem remedii ad triginta usque grana quotidie propinati usu.

Quamobrem nedum Cicutæ exhibitionem contemno Storcki methodo propinata putarem enim prudentis medici esse in propositis casibus posse, atque debere remedium experiri; simili enim ratione de recentioribus remediis ac de novis consuetudinibus frui debemus; videlicet neque primos amplecti, neque postremos esse, qui eorum confirmatis utilitatibus gaudere velimus.

Præter eas enunciatas pillulas alia nonnulla Auctor remedia a Cicutâ de-

sum-

(f) Suasu fortasse D. Gmelini qui in Præfatione thesium quas an. 1757. de cancro defendere curavit, ut supra enunciamus, indicavit cum fructu cum intrinsecus cum extrinsecus Cicutam exhibuisse: Sic ait ille, *Cicuta Asropa interne & externe applicata multum levaminis attulerant.*

ſumpſit intuſque exhibuit 1. videlicet pulverem radicis ejuſdem plantæ Gummi Tragachanta in pillulas ſubactas, ejuſdem tamen uſus majorem poſtulat diligentiā cum radix foliis efficacior experiatur 2. Extractum ex ſaturatori decoctione confectum foliorum Cicutæ, quod minus agit, quam ſuccus ille, at largiori doſi exhiberi quit; adhibentur etiam folia extrinſecus partem fovendo in cancro præſertim aperto, aut dolente; ſaculus itaque iis repletur foliis conſiſis cancro tepidus apponendus poſtquam leviter expreſſus fuerit; alvum etiam purgantibus ciet, modo opus requirat.

Reliquum vero eſt Cicutæ virtutem in omni regionem non unam eſſe; certum enim eſt majori virtute pollere in calidis regionibus ut in Occitania, & Provincia quam apud nos; in Italia vero & Hiſpania quam in Gallia, quod animadvertere debent ii, qui in iis Regionibus eam præſcribere velent, at cum Lutetiæ climas parum diſtet a Viennensi putarem eadem tentamina hic inſtitui poſſe, ſimili doſi remedium propinando; revera enim qui primum apud nos remedium tentarunt eandem prorsus rationem, atque doſim proſecuti ſunt, citra ullum funeſtum affectum. (*)

C A P U T V I I I.

De uteri Hydrope.

§. I.

Descriptio, & Differentiæ.

Uteri hydrops eſt aquæ, aut ſeroſitatis lymphaticæ congeſtio in cavitate matricis, quæ tamen non una ratione ſemper colligitur, interdum enim ubertim aquæ in uterum irrumpunt & *Ascitis* gignitur, quæ uter æmulatur apud Græcos *Ασцитίς*; interdum exiguas veſiculas implent communi, vel multiplici pedunculo uteri internæ faciei adhærentes, & *hydrops hydatodes* dicitur a Græco vocabulo *Υδαρίς*.

In hac duplici hydropis ſpecie ſimilia ſcænomena apparent; initio enim vix morbus perſentitur, ſenſim vero ſenſimque uterus inflatur, rotundus fit, gravis, & ponderoſus, preſſioni tamen cedit, & aliquale robur ſervat neceſſarium elaterium reſtituendi pote, tandem in ſummo morbi ſtatu ægræ neque incedere neque decumbere facile poſſunt.

Quantumvis ſimiles hæ duæ ſpecies inter ſe videantur, cauſæ tamen producentes diverſæ ſunt, quas ſingillatim explicare intererit.

§. II.

Cauſæ hydropis cum Ascite.

Cum *Ascitica* hydrops matricis lymphæ congeriei potiffimum tribuatur evidens eſt eam ab ambobus ſubſequentibus ſcænomenis produci; alterum eſt in uteri cavitate ſeroſitatis illius ſtillicidium ſupra ſtatum naturalem uberrimum; alterum uteri orificii occluſio, quæ affluentis lymphæ per vaginam eruptionem impedit.

I. Pri-

(*) Apud nos D. Storck experienciæ ſex ab hinc menſibus inſtitutæ ſunt in iſdem morbis atque eadem methodo quam ipſe oſtendit, verum etiamſi nondum triſtes effectus a Cicutæ aſſumptione conſecuti ſint, tamen uſque adhuc ſpei conceptæ eventus non reſpondit.

I. *Primum* duplici ratione evenire potest:

Vel dum lymphæ per hyatus tunicarum sanguineorum vasorum, aut lymphaticorum quibus uterus scatet sibi pandit viam:

Vel dum vesiculas lacteas pervadit per intimam uteri faciem reptantes.

Etenim 1. Theoretice satis demonstratum est nunquam in aliqua cavitate lympham stillare nisi aliquod obstaculum sanguinis, aut lymphæ circulationi officiat, quod cogat illos humores in propria vasa irrumpere, eorumque tunicas extendere, atque poros dilatare, ut sibi quoad tenuiorem saltem partem, sternat viam.

Consequitur enim in hoc casu adesse debere in uteri cavo obstacula quædam quæ hosce effectus pariant; hujusmodi sunt syrrihi, aut syrrihosa tubercula, steatomata, sarcomata, molæ &c.

Obstructiones veterrimæ cellularum lactearum ab amissione, vel suppressione menstruum, satis indicatæ.

Intumescencia repentina earum cellularum a spissitudine lactis uterini orta, quam gignit externum frigus, subitus terror, aut gravis mæror, quibus menstruo tempore obnoxia fuerunt ægræ.

2. Verum serosam lympham trans lacteas vesiculas effundi nequire nisi in triplici casu.

Quando orificia vesicularum earum laxa valde sint, aut aperta, ut in diutino albo fluore.

Quando lacteus secretus liquor fluidior sit, quod in iis evenit, quæ pituituoso donantur temperamento.

Quando utraque causa simul agat, quod in albo vetustiori fluore accidit.

II. *Alterum* occlusionis uteri orificii respectu, nisi ab alterutra subsequen-
tium causarum obturari potest:

Vel a cumulata segni mucilaginosæ materie, quæ ostium illud obtegit;

Vel a compressione, syrrihi aut callositatis ergo, in laborioso partu nata, quæ orificium matricis premit.

Tandem a constrictione hujus claustrum, convulsivæ crispationis ergo, ut sæpe in hysterico morbo evenire solet.

Quæ adhuc dicta sunt confirmantur cadaverum inspectione mulierum emortuarum; quare statuere licebit modo in iis casibus hydrops non superveniat, neque citra hos evenire posse.

His explicitis concluditur,

1. Hydropem asciticam mulieres frequenter aggredi quæ matricem syrrihosam, callosam, obstructionibus infartam habent, quæ mensibus suppressis laborant, vel illos jamdudum amiserunt.

2. Illas vero lædere, quæ albo lymphatico, aut lacteo fluore uberrimo valde, & vetusto corripuntur.

3. Illas denique infestare, quæ de repente mensibus, aut lochiis orbata fuerunt frigoris, mæroris, aut lætitiæ inopinata causa.

4. Necessum enim esse plerumque aliquam ex indicatis causis concurrere, quæ orificium uteri obtegit, quod etiam si crebre, non semper tamen evenit.

5. Aquas in utero collectas, quas effundunt vasa sanguinea, aut lymphatica per tunicarum hyatus, claras, & translucidas apparere plus minusve luteas, aut acres pro diversa acrimoniæ, aut bilis copia, quibus sanguis saturatur.

6. Verum si hujusmodi aquæ a lacteis vesiculis procedant quasi per cribrum erumperent albæ, lacticinosa, serum non depuratum æmulantes apparebunt, ut (a) Zacutus observasse asserit, quæ qualitates plus minusve conspicuæ erunt pro majori, vel minori tenuitate lactis uterini.

Astruch de Morbis Mulierum.

Q

7. In

(a) Prax, admirab. Lib. III. Observat. 152.

7. In hoc postremo casu hujusmodi aquæ calori uteri obnoxie facile putrescent, & turbidæ, saniosæ atque foetidæ evadent, præsertim si vasa nonnulla sanguinea guttas aliquot sanguinis effundant, quod sæpe evenire scimus Schenkii (b) observatione.

8. Menses suprimi debent tum in hydrope ascitica quæ a syrrho, steatoma-te, sarcomate, mola, aut vetustiori obstructione, cum in ea quæ a laxitudine procedit lactearum cellularum, quæ, inflari impeditæ, nequeunt venosas appendices tumefacere ut catamenia producant.

Nihilo secius (c) Medicus quidam in suis observationibus tradidit mulierem hydrope uteri laborantem mensibus perfecte donatam fuisse; at ille observationis suæ rationem præbuit, animadvertendo in hoc casu menses non ab utero, sed a vaginæ fundo derivasse.

9. Facile enim declaratur Fernelii (d) observatio qui testatur mulierem hujusmodi morbo correptam singulis mensibus menstruo tempore aquas per uterum evacuas-se, ut septem aut octo pelves impleret, postquam quod menses apparebant, & desistebant ut in naturali statu, hydrope revertente prope mensium effluvium, eadem constanti methodo; quare suspicari licebit in hac muliere nondum totum uteri ambitum hydrope affectum fuisse, verum supervenientibus mensibus, uterum illam sollicitasse ut obstacula ad orificium locata suis contractionibus superaret, catameniis vero desinentibus orificium denuo sese constrictum, atque hydropem sese restituisse, usque dum mensium eruptio reverteret.

10. Tandem in gestatione quando sanguinis circulus in interna uteri facie magnopere implicatur (voluminis ergo, aut ponderis foetus) effusio facile fieri potest serosæ lymphæ intra parietes uteri, & membranas, ut experientia confirmat; hujusmodi aquæ enim in partu primæ erumpunt statim ac uterus referatur, easque facile obstetrices cognoscunt, & *Aquas Sylvestres* vocant; interdum ibi maxima copia hujusmodi colliguntur aquæ ut veram hydropem in male affectis mulieribus præsertim inducant, quæ ægras & assidentes perterrit, at feliciter evanescit partus initio, imo ipsum fovet, modo parturientes non sint valde imbecilles.

§. III.

Causæ Hydropis cum hydatidibus.

IN hac hydropis specie uteri cavitas undique innumeris vesiculis, aut hydatidibus repletur ex graciliori tunica contextis, & lymphatica serositate turgidis; modo hydatides illæ racemi more communi pediculo plures simul utero adherent; modo sejunctim propriis pediculis cum utero nectuntur; modo invicem connexæ per uterum fluctuant. Earum magnitudo intra granum miliaceum, & ovum Columbinum, aut Gallinaceum persistit; contenta lymphæ limpida est, & diaphana, quæ leni calore modo inspissatur, modo in auras avolat; interdum tamen liquore turgent denso, sanioso, aut purulento, qui hydatides ipsas plerumque rodit.

Aetius (a) observationem hujus hydropis posteris communicavit quam Medici diu perscrutari neglexerunt; tandem cadaverum sectiones in hac re satis eos docuerunt merito hujusmodi hydropem recenseri inter uteri hydropes &c.

Omnis difficultas reducitur ad explicandam vesicularum earum generationem, circa

(b) Observation Medicinal. Lib. IV. Observ. 220.

(c) Marcellus Donatus, *Medic. histor. mirabil.* Lib. IV. Cap. 25.

(d) Patholog. Lib. VI. Cap. 15.

(a) *Medicine contraite Tetralib.* IV. Serm. IV. Cap. 70.

circa quod Tractatum (b) nostrum *De Tumoribus, & Ulceribus* pervolvere necesse erit, ubi animadvertimus valde implicitos fuisse, qui olim lymphæ existentiam, & uteri structuram atque vasorum distributionem haud cognoscebant, quod *Aetii*, & *Fernelii* exemplis confirmatur; at nuperrimæ anatomicorum disquisitiones magnopere rem declararunt.

Demonstravi enim in eo Tractatu has hydatides gigni a dilatatis areolis intra vasa lymphatica, & valvulas Sigmoides, aut semilunares locatis, cum hujusmodi exigua spatia circa vasorum lymphaticorum longitudinem innumera sint, ut & multissima vasa lymphatica; ideoque nil mirum si in hac tunica maxima copia hydatidum nasciscatur, ut omnis cavitas uteri quandoque repleatur.

Hujusmodi hydatides racemi more communi pedunculo coacervantur cum ab eadem parte inflari inceperint; sejunctim vero intumescunt, quando a diversis uteri partibus originem duxerint.

Pediculi, qui hujusmodi racemos cum utero nectunt exuvia sunt internæ tunicæ hydatidum concisæ, dum intumebant; ii vero qui invicem vesiculas jungunt reliquæ sunt ipsorum lymphaticorum vasorum; quare interdum vesiculæ fluctuantes reperiuntur, quæ increcendo laniant pedunculos qui ipsas utero, aut ceteris hydatidibus jungebant.

Hydatidum magnitudo variare solet pro diverso earum incremento; earumdem cavitas modo liquore limbo repletur, qui vera lymphæ est, ignis vi, dum sponte spissior est, indurefcens, verum in auras avolans modo liquidior existat.

Tandem calor uteri illum liquorem pervertit atque corrumpit, præsertim cum heterogeneis moleculis saturetur, ut turbidus, purulentus, foetidus evadat, & vesiculas ipsas putrefaciat.

Supereft causas determinare quæ potis sint in lymphatica vasa stagnantem lympham congerere, quæ interstitia illa nodorum vasorum dilatando hydatides producat.

Evidens enim erit hujusmodi causas easdem esse, quæ Articulo præcedenti in hydrope ascitica sanguinis congestionem induxerunt, hoc solummodo discrimine, quod in eo casu ad sistendam sanguinis circulationem validiores causæ requirebantur, verum ad lymphæ segnem cursum intercipiendum, ejusque vasa comprimenda leviores sufficiunt.

Itaque ea quæ dicta sunt superiori Articulo circa causas sanguinem sistentes, de lymphæ hic stagnati dicendum videtur, videlicet

1. Syrrhos, ulcera, steatomata, & sarcomata, molæ &c. hujus morbi causas plerumque esse, quare illos affectus plerumque hydatides comitari etiam si crebrius ab iis ascitis procedat.

2. Verum repentina cellularum lactearum turgentia quæ scænomenis succedit superius indicatis, quæque dum modica sit solam intumescientiam inducit, quæ tantum lymphæ cursum intercipit, atque hujusmodi hydropem gignit cum impar sit ascitim inducere.

De cetero in hac hydropis specie uteri orificium plerumque obturatur ut in asciti iisdem de causis evenit; interdum tamen referari debet, si hydatides erumpant, quæ neque utero neve vaginæ adhærebant.

§. IV.

Symptomata.

1. **I**N utraque hydropis specie uterus tumet, atque in diem in ratione augmenti gravior fit, continenter tamen sphericus persistit, & compressioni facile cedit.

2. Quando uteri volumen maximum fit, ægræ difficillime incedunt, neque decumbere facile possunt, distentionis ergo, quam uterus ad utramque partem patitur.

3. Ambæ species mensium suppressionem comitem habent, quæ vel a causis obviis procedere poterit, quæ menses sistere solent, vel a distentione uteri, quæ productionem appendicum venosarum impediunt, quæ menstruationem gignere deberent; tandem a continenti infartu cellularum lactearum, quæ vasa venosa periodice comprimere impedit, quod in menstruationis negotio necessarium est.

4. Sterilitas consequens est necessarium hujus morbi tum quia uteri os obdutum sperma neutiquam intromitti potest, cum etiamsi per uteri orificium intromitteretur, minime potis esset contextum substantiæ uteri valde compactæ penetrare.

5. Volumen uteri valde auctum comprimit reduces internas venas a vulva aut venis illiacis prodeuntes, quæ ab extremitatibus inferioribus sanguinem revehunt, quare consistens in iis partibus cruor serositatem deponit, & oedema producit.

6. In hydrope ascitica dum ab una parte uteri pulsatur ad oppositam partem manui applicatæ pulsus respondet quod scænonon improprie fluctuatio dicitur, quod melius Gallice sonat *contre-coup*, & Græco idiomate *ἀντίρροια*; hujusmodi reactio a continuatione dependet aquæ columnæ, quæ ad alteram partem uteri protenditur; deest hujusmodi effectus in hydatidibus, quia aquea columna a vesicularum, aut hydatidum interpositione motus communicationem ad alteram partem intercludit.

§. V.

Diagnosis.

FAcile est distinguere eas uteri species a ceteris abdominis intumescen-
tiis.

1. Ab inflammatione ubi dolor, calor, & febris ipsa adsunt, quibus hydrops expers est.

2. A syrrho in quo uterus inæqualis durus resistens apparet; in hydrope vero rotundus, æqualis, & uniformis conspicitur, & facile compressioni cedit.

3. A steatmate, & sarcomata; nam in omnibus uteri tumoribus uterus pressionem magis resistit, quam in hydrope, verum in hac pulsando ad alterutram partem reactio minime persentitur.

4. A tympanitide cum neque reactio illa in tympanitide innotescat, verum sonus audiatur pathognomonicum tympanitidis tantum indicium.

5. Ab hydrope imi ventris, quia dum hujusmodi morbus uterum lædit facile circumscribitur; non vero in totali imi ventris hydrope, quæ undique ventrem tumefacit.

6. Tandem ascitica hydrops ab ea quæ hydatidibus scatet reactione pulsationis distinguitur, quæ in postrema specie abest.

7. Dia-

7. Diagnofis refpectu fœnomenorum quæ hydropem a mola ; aut gellatione diftingunt , optimum cenfemus eo mittere lectorem ubi de iis morbis fpeciatim aéturi erimus.

§. VI.

Prognofis.

I. **U**teri hydrops curatu difficilis efl, nam aquæ fpiffis atque compactis membranif includuntur , quæ refluxum valde implicant . Neminem latet eam imi ventris hydropif fpeciem quam *faccatam* appellant ubi aquæ intra peritonei duplicaturam congeruntur haud facile curare poffe ; ex iis de uteri hydrope facile iudicium afferre quimus.

II. Hujufmodi morbus valde periculofus experitur caufarum refpectu quæ illum inducunt ; hujufmodi enim funt plerumque vitia in uteri fubflantia locata , quæ vix deftrui , aut corrigi poffunt , atque continenter morbi reftaurationem minantur , modo paullulum ægræ convalefcant.

III. Eadem hydropif fpecies maximum detrimentum affert confectionum ergo , quæ plus minusve uteri fubflantiam lædunt , aut œdema artum inferiorum inducunt , vel febrem tandem ipfam , aut marafmum produciunt.

IV. Experientia enim didicimus uteri hydropem morbum difficilem , periculofum , & lethalem plerumque experiri.

V. Tandem quæ hydatidibus fcætet afcítica periculofior evadit , tum quia ferositas in veficulis detenta difficiliter refluit , cum etiam curationis ergo quia pauciora adverfus hydatides auxilia medicina præflrat , quam ad afcítim fubjiciendam , ut infra videbimus.

§. VII.

Curatio.

IN uteri hydropif curatione duo præfertim veniunt perpendenda ; alterum aquas tutiori via evacuare ; alterum robur reftituere fubflantiæ uteri atque vitia corrigere , quæ effufioni ferositatis occafionem præbent , ideoque morbi regressum præoccupare.

Triplici ratione prima abfolvitur indicatio.

I. Urinarias vias aperiendo. II. Alvum ciendo . III. Aut aquis per vaginam ipfam femitam parando.

I. Ad urinas provocandas eadem diuretica ufuveniunt , quæ in abdominis hydrope obvia funt , videlicet ,

i. Decoétiones , & apozemata ex plantis diureticis , quas concinno ordine proponemus , quales funt ;

Radices

Eryngium
Asparagus
Bruscus
Anonis
Aristolochia
Rubia Tinctorum
Apium
Petroselinum
Vincetoxicum

} ad ℥j.

T U M

Radices.

Enula Campana
Asarum
Ebulus
Iris nostras

} ad ℥ss.

Folia

Calamintha
Apium
Marubium
Hyssopus
Angelica
Nasturtium Aquaticum
Charophyllum
Foeniculum

} a m.j. ad m.j.ß.

Fructus

Solanum vesicarium
Alkekengi

} in decoct. a ℥j. ad ℥j.ß.

Baccae

Rhamnus catharticus
Juniperus

} a baccis vj. ad x. vel xij. pro decoct.
} ad m. ß. pro decoct.

Cortices

Caparis
Fraxinus
Sambucus
Tamariscus

} ad ℥ss.

Flo-

Flores.

Genista
Sambucus
Ebulus

} aliquot pugilli.

Ex quatuor, vel quinque earum plantarum pro libitu selectis eæ decoctiones aut apozemata conficiuntur, quæ viginti, aut viginti quinque tritis asellis superaffunduntur, Salia aperientia nonnulla addendo, qualia sunt

Tartarum Martiale Solubile
Sal Tartari
- - de duobus
- - Martis Riverii
Terra foliata Tartari &c.

eaque idonea dosi per plures consecutivos dies semel vel bis propinando.

2. Secundo succi depurati prodesse solent, qualis est, Succus Chærophylly ad quatuor unciam dosim, cui additur drachma Salis de Duobus, aut semis Terræ foliatæ Tartari.

Verum Succus radicis Gladioli ad duplicem unciam, cum uncia & semis mannae dulcificatus prodest.

3. Lixivia ex cineribus parata

Corticum fabarum
Surculorum Genistæ
Ligni Juniperi
Sarmentorum Vitis viniferæ

Tres, vel quatuor drachmæ hujusmodi cineris cribratæ aquæ cyatho, aut decoctione Millepedum diluuntur, verum omnia perfecte commiscendo, postquam cineres fundum petierint, liquore versato, per tres, aut quatuor vices, tres uncia, quaterve quotidie cum anatina parte Melis, aut Vini albi propinantur.

4. Bolis conficiendis cedunt

Ethiops Martialis, aut Flores Martiales ad gr. x. vel xv.
Pulvis Asellorum ad gr. xv. aut xx.
Sal Tartari ad gr. viij.
Gummi Ammoniacum ad gr. vj. vel vij. cum syrupo quinque radicum omnia commiscendo.

Præscribitur pariter sub forma bolari, pulvis Buffonum exsiccatorum ad gr. xiv. aut xv. cum sufficiente quantitate confectionis Hyacinthinæ subactus.

Magnificiunt etiam Boracem pulverisatum ad drachmam semis, duodecim granis Croci Orientalis remixtum, & cum succo Sabinæ subactum, at de eo experientiam me latet.

II. Modo hujusmodi medendi methodus frustranea videatur, hydragoga purgantia

gantia adhibentur, quæ per alvum aquas expellant, inter quæ tutiora atque magis commendata sunt

1. Jalapa f. p. a gr. xxx. ad l.
 Resina Jalapæ a gr. x. ad xviiiij.
 Diagridium a gr. x. ad xv. aut xx.

quæ idoneo syrupo sub pillularum forma subiguntur.

Dosis horum remediorum pro ægrotantium viribus, effectum quem præstant, aut numero exhibitionum dirigitur.

2. Pillulæ sequentes ab Hoffmano proponuntur præstantissimæ, atque tutissimæ.

R. Rad. Vincetox. pulveratæ. gr. viij.
 Scillæ exsiccatae, & pulveratæ gr. v.
 Nitri purificati, vel Cryst. miner. pulver. gr. x.
 M. cum f. q. Syrupi de Rhamno cathartico. f. Bolus pro una dosi.

3. Pillulæ hydragogæ Bontii secundum codicem Parisiensem confectæ a gr. xij. ad xv. aut xviiij. optimum effectum præstant.

4. Vinum scilliticum a $\frac{3}{4}$ ℥. ad $\frac{3}{4}$ j. sæpe propinatum prodest.

5. Syrupus Rhamni Cathartici pariter multum levaminis præstat ab $\frac{3}{4}$ ℥. ad $\frac{3}{4}$ j. vel $\frac{3}{4}$ j ℥. haustus, & quodam alio purgante remixtum.

6. Tandem Gummi Gutta utiliter adhibetur a gr. x. ad xv. aut xvj. in mortario marmoreo cum viginti quatuor granis Crystalli mineralis contrita & in pinguedinoso jure tepenti diluta.

Eorum remediorum nonnulla stomachum laceßunt, & vomitum excitant, quod compescitur facile superbibendo poculum pinguedinosi juris vituli ebulliti.

III. Incassum denique hujusmodi auxiliis tentatis, reliquum est orificium uteri relaxare, ut facile aquæ per hanc viam exitum inveniant, vel in extremo casu intromitti poterit pertusus canaliculus qui certam lymphæ exeunti semitam paret.

Hac de causa ufuyeniunt:

1. Injections vaginæ ex decoctionibus emollientibus Malvæ, Althææ, Brancæ urcinæ additis mucilaginibus feminum Lini, Psylli, admonendo ægras ut idoneo positu decumbant, quo diu valeant illas in utero retinere.

2. Suffumigia per fellam familiaricam recepta, modo tubuli ope ad uterum pertingant, utilissima evadunt.

3. Intromissio spongiæ, aut pulvini filo nexi, & mucilaginibus imbuti feminum Lini, aut Psylli ad uteri usque orificium protracti, bis in die restituti non parum juvat.

4. Modo suspicemur orificium uteri satis laxatum fuisse paulatim uterum succutitur, ut aquæ, proprio pondere adiutæ, valeant sibi pandere viam, qua de causa vomitum, aut sternutationem excitare fas erit ægras admonendo ut crebre saliant, vel saltem scilicet gradus junctis pedibus descendant; verum clysteria stimulantia intromitti debent, aut acria pessaria quæ intestina, atque vaginam laceßant, tandem obstetrici jubere, ut digito intromisso si liceat uteri ostium aperiat, quod interdum evenit.

5. Postquamquod, inutiliter his omnibus artis subsidiis adhibitis, potissimum erit cavum specillum perforatum, in extrema parte globulo instructum intromittere, quod

quod cum facile obtineatur in urethra viri valde reflexa, facilius in uteri orificio obtinebitur, quod directe pergit.

6. Hac instrumenti introductione peracta aquæ penitus evacuabuntur; modo translucidæ appareant, tubulum removere poterimus; at si turbidæ, saniosæ aut fœtidæ erumpant instrumenti illius auxilio, injectiones impellentur ex decoctione hordei, melle rosato, aut decoctione radicis Aristolochiæ confectæ, usque dum interna uteri facies perbelle deterfa videatur.

7. Cujusve generis sint erumpentes aquæ, per aliquot dies injectiones patrari debebunt, cum aquis thermalibus, quæ uteri elaterium sustineant, atque orificium patulum conservent. Aquæ illæ de Barege præstantiores videntur, at earum defectu substitui poterunt illæ de Bourbon, Balaruc, aut Plombieres.

8. Tandem uno eodemque tempore causis consulere debemus, quæ hydropem prodixerunt, videlicet obstructions tollere aperientibus remediis, quæ priori hydropis curationis Articulo proposuimus; verum cetera vitia compescere idoneis remediis iis præsertim quæ menses revocare potis sint suppressos, emenagoga seligendo Cap. IV. Lib. I. indicata.

IV. Hydropis respectu quam hydatides faciunt; parum vel nihil juvat in ea morbi specie specillum uteri orificio apponere, cum aquæ in specialibus vesiculis detineantur, verum si earum nonnullæ disrumpantur, parum utilitatis afferant ratione habita innumeris quæ clausæ supersunt; itaque cum me lateat rationem expellendi; aut conscindendi hydatides, pro incurabili hujusmodi species habenda est; rarissimo tamen mulieres aggreditur, vel si umquam, experientia docuit eam diu perferre posse ægræ citra gravem noxam.

C A P U T I X.

De uteri Tympanitide.

§. I.

Descriptio.

EVenit quandoque uterus inflari, tumesceri, atque resiliere ut in vulgari hydropre citra pondus aut dolorem, in hoc casu minime a pulsu reatio persentitur, quam *Antitypiam* dicunt vel fluctuationem appellant in ascite obviam, tamen pulsando *tympani* sonitus oritur, qui nomen huic morbo *tympanitidis* præbuit.

Tunc menses deficient quorum suppressio tumori uteri conjuncta ægras frequenter decepit, ut fœtu esse graves sibi suaderent, & obstetrices ipsas in auxilium vocarent; at a magno flatu sicco quandoque, quandoque a seroso, aut a sanioso effluvio profecuto omnis gestationis suspicio evanuit.

Hujusmodi est *vera tympanitis* quæ *continens* etiam appellatur; eam esse constat, aeris retenti congeriem in uteri cavitate interdum humoribus non remixtam, interdum latice quodam copulata in explosione pariter fluxuro; rarus est morbus, neque multæ observationes illum confirmant.

Ei affinis videtur & magis obvia affectio illa quæ nonnullas mulieres de cetero bene constitutas aggreditur, quæ dum truncum antè inclinant aut uterum comprimunt flatus expellunt; at ii minori cum impetu exeunt, neve ullum comitem habent fluorem, quare *tympanitis vaga* appellatur.

Cum *tympanitidis* hujusmodi species inter se non parum differant eas sejunctim

Etiam examinabimus; imposterum distincto articulo locuturi erimus de uteri intumescencia, quæ plerumque partum consequitur male curatum.

A R T I C U L U S P R I M U S.

De Tympanitide vera seu persistenti.

§. I.

Causæ.

Perlongum foret omnia referre quæ medici veteres excogitati sunt ad hanc flatuum collectionem explicandam, quæ uterum in tympanitide replet, verum inutile evaderet ea enunciare cum prorsus futilia videantur; satis erit animadvertere continentem tympanitidem numquam aggredi nisi in confluentia amborum subsequenterum causarum.

1. Quando post partum matricis parietes imperfecte coarctantur, neque uteri cavitatem imminuunt tensæ, & compactæ persistendo etiam utero evacuato, quem externus aer cito replet.

2. Quando in eodem statu orificium uteri perfecte obturatur ut exitum aeris in uteri cavitate detenti penitus intercludat.

Primum parvi faciunt ægræ hujusmodi expansionem, quæ pro necessaria gestationis consecutione habent, quam uterus nonnihil tumens relinquit; verum medici, & obstetrices a prima mensium eruptione ipsam evanescere sibi suadent.

At aliquot mensibus transactis citra ullam catameniorum eruptionem; dum sedulo magis morbum perscrutantur, & regionem hypogastricam conspiciunt rotundam, tumidam, atque tensam, facile sibi suadeant mulieres foetum gere, quod præsertim facile credunt, quæ infantes parere maxime cupiunt.

Quam ob rem pro morbi explicatione reliquum est duplicem conditionem sancire, quæ una illum producit.

Quare I. Certum est uteri parietes nisi subsequenti duplici de causa compactos, at tensos persistere, ut vacuum cavitatem efforment; *primum* enim dum parietes ii phlogosi laborant, quæ turgentia vasorum ergo impedit quo minus coarctari possint; *alterum* dum ipsi convulsione imperfecta, aut erethismo corripuntur ut eundem pene effectum inducant; duplex hujusmodi uteri status consequitur plerumque difficilem, & laboriosum partum in quo uterus multum passus sit, atque diu vehementioribus succutionibus obnoxiosus fuit.

II. Evidens pariter est uteri orificium minime sub lochiorum fine coarctari in eo duplici statu parietum indicato, phlogosis ergo quæ ei communicatur.

III. Tandem certissimæ observationes ostendunt veram tympanitidem mulieres plerumque aggredi, quæ dum mensibus gaudebant, externo frigori, & inopinato se exposuerunt; facile enim est in hoc casu perspicere aerem in dilatato utero insinuari, ejusdemque cavum replere, postquam quod, de repente obturato uteri orificio, aerem ibi commorari, modo ostium non referetur, quod raro evenit.

Ex iis consequitur: 1. Veram uteri tympanitidem plerumque partum, aut abortum consequi.

2. Ipsamque nisi post laboriosum, difficilem, dolorosum partum apparere, quando uterus valde labefactatus, atque laceffitus fuerit.

3. In-

3. Interdum etiam modo ægræ subito frigori se exponant, aut menstruo tempore, ubertosis catameniis fluentibus, pedes aqua frigida luant, eodem corripī incommodo; at in hoc casu rara vel levis si unquam tympanitis apparet; ea omnia experientia, atque observationes confirmant.

§. II.

Symptomata.

1. **V**era tympanitis, ut hydropem facere observavimus, corporis incessui officit, impeditque quominus ægræ antè truncum valeant inclinare, morbus tamen cum a retento aere tantum procedat, dolore, calore, atque pondere expers evadit.

2. Egræ itaque ad utramque partem libere decumbere poterunt citra ullam a pondere noxam.

3. Dum aer in utero retentus internos parietes comprimit, lactææ vesiculæ, & appendices venosæ inflari aut dilatari renuunt ut in menstruationis negotio necessum esse *Lib. I. Cap. II.* vidimus, qua de causa menses abire debent.

4. Interdum in hoc morbi stadio nihil ex utero erumpit, neque ulla serositas effluit, nondum sanguinis, aut lymphæ circulo intercepto; neque ex lacteis vesiculis obductis ullus stillat liquor, quare tunc tympanitidem *siccā* appellant a solo aere in utero congesto derivatam; hujusmodi tympanitides plures auctores infra indicati (a) observant.

5. Interdum vasa sanguinea, & lymphatica sanguine, & lymphæ affluenti turgida nimis, serositatem aliquam effundunt, aut lactææ cellulæ imperfecte obturatæ uterinum lac suppeditant: in hoc casu tympanitis *humida* appellatur, eaque non a solo aere, sed a lymphaticis, & lacticinosis humoribus originem ducit, qui modo translucidi, modo turbidi cum aere simul ab utero exeunt; hujus tympanitidis species infra alii nonnulli Auctores (b) præferunt.

6. Egræ impares evadunt foetum concipere, nam persistente tympanitide uteri orificium perbelle obturatur; interdum etiam jam sanato morbo diu steriles persistunt, cum non exiguum temporis spatium requiratur antequam interna uteri facies a *siccā* tympanitide arefcens emolliatur; totidemque temporis antequam arefcant postquam ab umida tympanitide nimis laxata fuerit.

7. In utraque tympanitidis specie supressi menstrui ergo ægræ quamplurimis paloris, atque gestationis fœnomenis fiunt obnoxia, quod non parum auget in iis conceptionis suspicionem.

8. In vera tympanitide uterus perbelle rotundus fit, quam configurationem sane suscipere debet modo quæquæ versus ab incluso aere prematur; pulsibus vero tympani modo perfecte respondet; tandem volumen augetur, aut immittitur prout ægræ plus minusve calefiunt, aut frigescent; calor enim detentum aerem rarefacit, frigus ipsum condensat.

Usque adhuc expositæ tympanitidis descriptioni unum tantum obijcitur, videlicet tympanitidem interdum maximum volumen adipisci, quod a modico aere post partum intromisso minime oriri posse arbitror.

De

(a) Valescus de Taranta, *Philoniæ Lib. VI. Cap. 15.* Matthæus de Gradibus, *Comment. in Nonum Rhasis Cap. De Mola.* Thadæus Dunus, *Lib. Miscellaneorum Cap. 8.* Rembertus Dodonæus, *Observat. Medicinal. 49.* Mauritius Cordæus, *Comment. 3. in Lib. I. De Mulieribus Hippocratis.* Philippus Hæchtetterus, *Decad. V. Observat. 4.* Ambroise Paré, *Liv. XXV. Cap. 34.* Philippus Salmuthus, *Cent. II. Observ. 57.* Reinerus Solenander, *in Consil. Medicinal.*

(b) Alexander Benedictus, *De curandis morbis, Lib. XXV.* Christophorus a Vega, *Art. Medend. Lib. III. Sect. 10. Cap. 31.* Laurentius Joubertus, *Cap. 13. De urinis.*

De eo tamen: 1. Incertum exemplum afferunt; unicam enim veram tympanitidem mihi liquit observare, ubi uterus magnitudinem superabat a tertio, vel quarto mense gestantis uteri; volumen fane interdum variat, verum nisi a rarefcentia, aut densitate aeris id procedit prout, calori, aut frigori se subjiciunt ægræ.

2. Si unquam enim hujusmodi tympanitides appareant id humidam potius respicit cum hydrope ascite copulatam, tuncque maximum uteri volumen aquarum copię tribuitur, non aeris quantitati, quæ in ea cavitate minime augeri quit.

§. III.

Diagnosis.

I. **V**era tympanitis, atque persistens uteri voluminis ergo ceteras hujus partitis intumescencias emulatur, syrrhum nempe, steatoma, sarcoma, hydropem, gestationem, molam &c. ab iis tamen differt multiplici ratione, ut infra facile cognoscemus.

1. A syrrho differt qui tumor inæqualis est, angulosus, durus, resistens; ipsa vero rotunda, æqualis, mollis apparet atque pressioni facile cedit.

2. Steatoma vero, atque sarcoma etiam si syrrho molliora sint, tympanitide tamen compactiora sunt; verum pondere suo hypogastrium gravant non vero tympanitis.

3. Hydrops ascitica distinguitur fluctuatione, quæ pulsando cognoscitur, & in tympanitide deest; tympanitis vero sonum edit, nullum tamen hydrops, quod postremum signum sat erit, ut tympanitis a syrrho steatomate, & sarcomate facile distinguatur.

4. Signa vero diagnostica quæ hujusmodi morbum a gestatione, aut mola distinguunt speciatim venient perpendenda, ubi de mola, aut gestatione diserturi erimus.

II. Opportunum videretur ad perfectam diagnosis instituendam, siccam ab humida tympanitide distinguere, at id neque facile est, neque valde necessarium videtur tum ad prognosim cum curationem rite instituendum.

§. IV.

Prognosis.

1. **C**um tympanitis constans obstaculum ad uteri orificium locatum supponat, quod aeris regressum impediat; patet enim idem officere feminis introductioni, quare sterilitas erit consequutura.

2. In sicca tympanitide aer qui uterum inflat parietes exsiccat, & callosas reddit; in humida vero affluens serositas faciem uteri internam nimis humidat, ut interdum putrefaciat; quare veterrime tympanitides vel labefactant matricem, vel foecunditati officiunt, post valetudinem etiam obtentam.

3. Nihilo secius mulieres interdum procul graviore incomodo morbum diu perferre valent, vel saltem ipsum facilius quam hydropem perferunt, quod præsertim de sicca tympanitide intelligendum est.

4. Itaque valetudinem quam citissime sollicitare nostrum erit non jam resolvendo cum aer nequeat per hiatus vasorum resorberi, sed orificium uteri re-ferando, ut aer facile per hanc viam exeat.

5. Interdum casu fortuito ventrem comprimendo, aut truncum inclinando obstaculum citra uteri collum locatum superatur, quandoque etiam obstetrices putati

putati partus ergo advocatæ ostium digitis (a) aperuerunt; at ea non sunt magni facienda; morbo enim recognito ei efficaciter mederi oportebit.

§. V.

Curatio.

CUM certissimum sit aerem in utero detentum resorberi non posse, aut dissipari resolutionis methodo, ideo futilia evadunt resolventia, aperientia, diuretica, & carminativa, quæ veteribus mos erat exhibere; idcirco aeri exituro semitam per uteri orificium parare necesse erit, tres subsequentes indicationes implendo, postquam vitia uteri dempta fuerint quæ morbum produxerant.

Prima enim indicatio erit relaxare, & emollire orificum uteri, quod obtinetur, ut in hydropis curatione ostendimus, præscribendo,

1. Semibalnea tepentia ex decoctione radicum, & foliorum Bisfalsæ, Malvæ, Brancæ urcinæ, verum ægras hortando ut eas decoctiones spongiæ subtilioris auxilio intromittant vaginæ ostio.

2. Injectiones tepentes secundum locum habent, ex eadem decoctione patratæ, cui addi poterit mucilago seminum Lini, aut Psylli idoneo positu decumbendo ægræ.

3. Suffumigia per fellam familiaricam in vagina recepta tubili ope ex vapore tepenti ejusdem decoctionis.

4. Tandem efficaciora experiuntur, atque minus molesta pessaria ex vetustiori tela confecta arte involuta, cujus extremitas mollior sit, & fimbriis laciniata ne uteri orificium offendat, verum ex illa decoctione imbibuntur, vel si lubeat simplici mucilagine seminum Lini, aut Psylli; pessariorum loco usuveniunt pulvini filamentorum filo connexi, qui eodem liquore imbuti vaginæ fundo, aut uteri collo applicantur.

II. Secunda, quæ nobis se præbet indicatio est orificium uteri dilatare modo satis emollitus videatur, id obtinetur valde ægras fucutiendo.

1. Necesse enim est erit eas ad vomitum aut sternutationem excitare; irritantibus clysteribus intestina laceßere, aut vaginam pessariis acrioribus stimulare, quæ uteri etiam contractiones sollicitent, saltusque jubere; tandem obstetrici præcipere, ut digito intra vaginam intromisso leniter collum uteri agent, aut secutiant, quantum necessarium videtur ad ejusdem aperitionem.

2. Modo prima vice effectum non obtineamus emollientium usum reiterare ter quaterve fas erit, at hujusmodi methodus, quæ in uteri hydrope utilisplerumque evadit, in uteri tympanitide frustranea experitur, quia aer minus commovetur secutionum impulsu, quam aqua in hydropico utero detenta.

III. In-

(a) Valescus de Taranta, Philonii Lib. VI. Cap. 15. Matthæus de Gradibus, in Comment. ad Caput de Mola idem refert de uxore sua.

Cui addi possunt sequentia Carmina a Jafone Prateni composita Libell. de Parienti, & Partu Cap. 2.

*Venter cum tumuisset Acciella
Septem mensibus & novem diebus,
Capissetque lien param dolere,
Acciri jubet illico obstetricem,
Quari fasciolas & apparari,
Sperato puerum editura partu,
Mox inter medias manus ministra,
Laxo poplite, cruribus levatis,
Laciniam ingeminans quater pepedit.*

III. Incaſſum iis auxiliis adhibitis tertiam indicationem implere oportebit, aeri ſemitam parando, ſpecillum cavum introducendo, iis conſtanter cautelis adhibitis, quas præcedenti articulo animadvertimus.

IV. Poſtquamquod modo ſolus aer exploſus fuerit, tubuli illius auxilio uterum injectabimus, cum decoctione Radicis Althææ ad emolliendam intus matricem aeris mora arefactam; ſi vero ſanioſus liquor turbidus, ſpiſſuſque cum aere ſimul exitus fuerit, injectiones parabuntur ex aqua hordei & melle roſato ad uterum detergendum; verum cum decoctione radicis Aristolochiæ ſi aqua ſetida fuerint.

Hac ratione ægræ valetudinem recuperabunt; ſi lubeat regressum præoccupare morbi, & uteri morboſam diſpoſitionem corrigere, ſerum lactis depuratum, apozemata, aut decoctiones amaras, aquas ferrugineas, balnea, & ſemibalnea exhibere oportebit in peſſariorum emollientium uſu perſiſtendo, quæ flexibilitatem conſervent, atque occluſionem orificii impediant.

A R T I C U L U S II.

De Tympanitide vaga.

§. I.

Cauſæ.

Tympanitis, quæ vaga appellatur communis eſt morbus, quem tamen nonnullæ mulieres interdum fateri verentur, adoritur ipſa in confluentia ambarum ſubſequentium cauſarum.

1. A tenſione nempe & rigiditate parietum uteri, qui invicem remoti amplioſorem ſpatium relinquunt.

2. A tenſione ſeu rigiditate marginis orificii matricis, quæ impedit quominus complete occludi queat.

Ambæ huiusmodi cauſæ neminem latebit valde affines eſſe, ipſæ plerumque procedunt a naturali calore, aut ſiccitate, crebrius tamen a ſuppreſſione, aut laborioſa menſtruatione, quam confirmat vaſorum plethora, quæ tenſionem, & rigiditatem parietum, aut orificii illius inducit.

In hoc caſu uteri orificium oſcitans externum aerem in ſua cavitate facile recipit, qui ibi moratur uſque dum parietes appropinquantur corporis contorſionis aut ventris compreſſionis ergo, quæ valeant protinus, aut per vices illum expellere, aut, deſiſtente corporis ſuccuſſione uterus denuo aere repleatur, niſi in ſimilibus circumſtantiis erupturo; idcirco uterus tunc perbelle æmulatur follim, qui aerem una expellere, & recuperare facile ſcimus.

§. II.

Diagnosis, Prognosis, & Curatio.

Diagnosis. Huiusmodi morbum haud facile erit cum ceteris uteri morbis confundere; ægras enim ſedulo percontando cito innotebit.

Prognosis. Plures mulieres patienter hanc ægritudinem ſuſtinent, cum nullum plerumque grave incomodum perſentiant, quod remedia poſcat, mihi videtur tamen generationi huiusmodi morbum officere, tum quia uterus areſcens per-

pervertit spermatis virtutem, cum etiam quia semen per uteri orificium refluit antequam mulier concipiat:

Curatio. Quotiescumque de hoc morbo agatur alterutram subsequentium mendendi rationum profequi debebimus.

I. Si ille enim a mensium suppressione procedat eos revocare necesse erit aperientium, & emenagogorum exhibitione, quæ Lib. I. Caput IV. exposuimus.

II. Contra vero si a tensione, calore, aut siccitate uteri spontanea originem agnoscat, remedia humectantia, & refrigerantia tum intrinsecus, cum extrinsecus adhiberi poterunt pluries sane recessita.

A R T I C U L U S III.

De uteri expansione parietum augmento.

Dantur nonnullæ mulieres in quibus uterus inflatur a tunicarum crassitudine, etiam si tumore uterus expers sit, aut alio externo corpore in sua cavitate detento.

Hujusmodi phenomenon partus plerumque consequens est; scimus enim in gestatione membranas uteri valde a vasorum intumescencia inspissari, at ea crassitudo post partum evanescit cum lochia subsecutura vasa depleant, & membranae proinde proprii elaterii auxilio paulatim ad naturalem crassitudinem revertant.

Nihilominus solæ naturæ non est opus relinquendum, puerperarum enim abdomen obstetrices & affidentes solent pressione coarctare.

Ex iis enim concluditur facile posse uteri membranas crassiores quam par est persistere, utrumque tumentem.

1. Quando menstrua, vel cito desistant, vel per intervalla, aut exigua copia erumpant.

2. Quando juvenes parturientes & inexpertæ pati nequeant post partum tenias, quæ ventrem vinciant.

3. Quando mulieres delicatiori donatæ contextu necessario membranae illo careant robore, atque difficilius exuberans sanguinis exprimatur.

4. Tandem quando ætate constitutæ erunt, ut membranae flexibilitate deficiant, ad uteri occlusionem necessariam.

In omnibus iis casibus suadendum est facile posse a partu membranas illas inflari, ut experientia confirmat.

Quandoque evenit mensium ubertatem quæ partui succedit, novos partus, aut lochia hujusmodi intumescenciae mederi; at modo frustraneum hoc evadat auxilium amplum abdomen patienter ferre necesse erit, modo aperientia emagogica, balnea, aut semibalnea, vel aquæ thermæ levamen non afferant, quod raro sperandum erit.

C A P U T X.

De uteri descensu.

§. I.

Descriptio, & Differentia.

IN naturali statu uterus centrum pelvis occupat, fundus paulum ossa illei superat, collum circa ossa pubis inferius nonnihil locatur, in hoc casu collum posterius rectum respicit, anterieus vero vesicæ adhæret, reliquum uteri corpus lateraliter propinquis partibus a simplici cellulari contextu nectitur; tandem cum vaginæ fundo continuatur, imo ejusdem collum ab ipsa vagina circumcingitur ita, ut nonnihil porrigatur.

Hujusmodi positus tamen citra morbum in diversis subjectis variare potest, at hujusmodi varietates in sanitatis statu lævissimæ sunt, eæque nisi in triplici subsequenti casu, crebrius præsertim in duobus posterioribus eveniunt, ut ægrotantium, & medicorum attentionem poscant.

Primo. Id accidit quando uterus nonnihil labitur ut prope vulvam conspiciatur; hujusmodi status *incipiens descensus* dicitur, quem nulla fœnomena consequuntur graviora, & plures mulieres infestat, quæ multos infantes pepererunt; eumque respiciemus quasi vulgarem uteri statum, ubi a statu naturali nonnihil deflectit.

Secundo. Quando uterus in medio vaginæ se profert ad ejusdem usque orificium, cum tunc dolor aggrediatur, pluresque lædantur functiones, ideoque verus morbus gignitur qui *incompletus uteri descensus* appellabitur.

Tandem *tertio* venit perpendendum ulteriorem descensum, qui vaginæ orificium aperit, ut uterus extra vulvam interdum se prodatur circa fœmora; tunc sane uteri *descensus completus* existit: singuli hi casus gravem sane morbum constituent, tunc ægræ pondus, atque tumorem in affecta parte persentiunt, difficilius incedunt, vel pedibus stant; in posterioribus duobus crebre mingunt, moleste tamen; difficulter fœces excernunt; tandem penitus tum matrimonii usus cum conceptio impeditur.

§. II.

Causæ.

Veteres medici autumabant uterum quatuor ligamentis sustineri, duo lata cum lumbis connexa, terretia vero ligamenta, quæ a lateribus destrorsum, & sinistrorsum originem habent, alterum nexum facere; ipsa enim postquam per annulos muscutorum abdominis transierunt, inferi utroque inguine.

Autumabant simul lata ligamenta fulcra esse matricis, quæ descensum impedirent; terretia vero in hypogastri centro uterum detinere ne ad alterutram partem deflecteret.

Quare fanciebant nunquam uterum prolabi nisi lata disrumperentur ligamenta, aut relaxarentur valde, & terretia valde labefactarentur.

At nova anatomicorum inventa satis ostendunt hujus theoriæ futilitatem; lata enim ligamenta ab expansione procedunt Peritonæi, quæ extrinsecus obtegit uteri fundum, & lumbis nectitur, ubi mesenterium ipsum adhæret; idcirco mem-

membranam laxam ipsa æmulantur, quæ minus valet matricem sustentare; ligamentorum vero terretium respectu præter positum qui rei nostræ minime favet, potius ipsa matricem deprimerent; denique ex laxiori contextu arteriarum, & venarum simul coalitarum coagmentantur, ut, hac etiam de causa, minus foveant, uteri firmitatem, ne alterutram partem versus deflectat, mediumque hypogastri teneat, quod tamen raro evenit.

Ex iis enim deducitur uterum a vaginæ fundo substineri, & intra ipsam porrigi digiti transversi dimidium; corpus vero uteri pro magnitudine impediri longius incedere; consequitur enim nisi a majori vaginæ distensione, vel facili dilatabilitate matricem prolabi propriæ gravitatis etiam auxilio, vel alia accidentali de causa; idcirco ad fanciendam veram descensus uteri theoriam duo veniunt perpendenda, *alterum* est causas pandere quæ vaginæ fundum dilatare valent, ut uteri corpus facile recipiat; *alterum* accidentales determinare causas quæ potis sint uterum in vaginam impellere, ejusque resistentiam superare.

I. Ad primum quod attinet certum est vaginam nisi tribus subsequenter de causis dilatari.

1. Vel a naturali conformatione, quæ in diversis subjectis diversa est, ut diversam magnitudinem membra referunt.

2. Grandioris foetus hydropici, hydrocephali, deformis ergo, qui duplicatus erumpit &c. atque vaginam magnopere distrahit.

3. A laborioso partu in quo obstetrix imperita plerumque manu, aut ungue, in extrahendo foetu, aut placenta vaginam dilatavit.

At vaginæ fundum citra ullam distractionem sponte laxum, aut emollitum interdum reperiri potest, ut uteri descensum promoveat, quod in duplici casu contingit.

1. Quando ægræ graciliori temperamento donatæ sunt, aut partium elaterium amiserunt, eademque pollent natura vaginæ tunica, facile dilatabiles, & fibris muscularibus laxioribus scatentes.

2. Quando fundus vaginæ jamdiu lymphatica serositate foedatur, quæ ab utero stillat, ut in albo fluori continenti & veterrimo oriri solet.

II. Quæ adhuc dicta sunt circa causas uteri descensus rationibus non solum, verum observationibus fulciuntur sectionum cadaverum earum, quæ ab hoc morbo discesserunt; at facile cognoscitur eas rationes nondum potis esse ad hujusmodi descensum producendum, modo alia de causa uterus inferius non impellatur; fane ejusdem pondus constans causa est ejus depressionis, imo citra maximam vaginæ distensionem satis erit ut uterus inferius quam par est decidat, nunquam tamen nisi efficaciores superaddantur causæ, quæ obstacula superent, verum descensum parere poterit.

Innumeræ sunt hujusmodi causæ sancitæ experiētiis, & exemplis intestinorum confirmatæ, ut de Epiplo prolapso in homine evenit, hujusmodi sunt

1. Tussis crebra, atque vehemens in pertinaciori rheumatismo, aut asmatico affectu.

2. Sternutatio nimia, quæ consequatur cerebri rheuma, aut ab usu nimio Nicotianæ excitetur.

3. Vomendi conatus qui necessario post epulam concitatur.

4. Ponderis sublevandi nifus.

5. Dissenteria, & tenesmi diuturnioris pruritus.

6. Casus interdum, præsertim dum venter labefactatur, aut ictibus læditur.

7. Magna vocis elatio, atque ullulatus doloris, aut sævioris animi pathematis ergo concitatus.

Animadvertendum est causarum enunciatarum respectu, quod cum superallate

vaginæ conditiones non sufficerent ad descensum uteri producendum, nisi altera de causa uterus prolaberetur, tamen neque hujusmodi posteriores causæ pares essent nisi vaginæ dilatabilitas simul concurreret, quare a duplici causarum genere descensum oriri constat.

§. III.

Symptomata.

I. **I**N uteri descensu positus sine figuræ mutatione immutatur; collum primo vaginam intrat, inde uteri corpus, quod ab obversa vagina circumcingitur.

II. Ægræ morbi initio parum molestiæ perferunt cum modica sit distractio, tum uteri cum vaginæ; utrumque, augetur in ratione depressioris descensus, & tunc in eadem ratione pondus, atque dolor aggrediuntur sæviores necne.

III. Quo magis uterus deprimatur, eo difficilius ægræ incedunt, etiamsi properando caveant ne coxis uterum lædant.

IV. Quamvis descensus incompletus fiat, quando uterus ad orificium vaginæ tantum pertingit; vesica tamen comprimitur a propinquo uteri collo ut ægræ crebrius, & moleste mingant, compressæ urethræ causa.

V. Fæces pariter difficulter excernunt, quando collum transversim locatum rectum comprimat.

VI. In hoc statu menses persistunt, cum nulla ratione intus uterus lædatur; at cum sanguis compressionis ergo difficulter evehatur, atque revehatur, ideoque menses plerumque in continentes degenerant, aut hæmorrhagiam lethalem interdum inducunt.

VII. Hujusmodi morbum comitantur albi fluores serosi, quia sanguis dum uteri vasa replet finit lymphæ eruptionem, quæ plus minusve uberrima apparet in ratione majoris, vel minoris descensus.

VIII. In completo descensu vesica crebre labitur & ipsa, quod confirmat unica (a) Ruyschii observatio; imo collum interdum cum utero decidi posse ostendit Enricus de Heers (b).

IX. Observavimus jam sanguinem difficulter a prolapso utero devehi in completo præsertim descensu, quod de lymphæ pariter intelligendum erit; nil mirum ergo si in hoc statu uteri volumen augeatur; hujusmodi intumescencia de repente fit, & inflammationem interdum gignit, in gangrænam desituram; modo serius intumescat, fyrrhus pertimescendus est, & cancer quandoque.

X. Tandem in uteri completo descensu lotium ab urethra erumpens per totum uteri ambitum disperditur, ut superficiei ulcerosam excoriationem inducat, & ulcera ipsa quæ in gangrænam sæpissime desinunt.

§. IV.

(a) Thesaurus Anatom. VIII. num. 102.

(b) Observat. Medic. Observat. 22.

§. IV.

Diagnosis.

HAud facile est uteri descensum ut jam admonuimus cum ceteris vaginæ excrescentiis, aut productionibus confundere, vel cum uteri obversione, quæ satis extra orificium intra vaginam conspicua fit.

Patebunt signa, quæ excrescentias, & productiones vaginæ ostendunt *Capite sequenti*, ubi hujusmodi species explicabuntur; ibique obversionis causæ apparebunt, & rationes distinguendi uteri descensum, qui eos comitatur morbos, a legitimo descensu.

In præsentiarum posteriorem descensus speciem determinare sufficiet; signa ejusdem præcipua sunt uterum antèius graciliorem esse quam posterius; levigatum, firmum, & vasis sanguineis magis interspersum; rima transversim instructum, ubi menstruus stillat sanguis, modo mulieres adhuc menstruis donentur; tandem corpus uteri circumvestiri, ut digito facile cognoscitur, a propinqua vagina.

§. V.

Prognosis.

UT rite prognosim instituamus diversos uteri status animadvertere necessesse erit.

1. Modo descensus incipiens videatur, videlicet, dum uterus parum prolapsus sit, levis morbus est, periculo vacat, ut nullo adhibito pessario, uteri restitutionem facile sperare liceat.

2. Quando descensus jam confirmatus sit, sed incompletus modo uterus trans vaginæ orificium non decidat, facile reduci poterit, at pessarium utero apponere necessum erit, modo ægræ non malant diu decumbere, interdum tamen & decumbentibus ægris orbiculus locum habet.

3. At si completus fiat descensus, videlicet uterus penitus intra vulvam decidat, vel quod deterius est, extra vulvam prolabatur, modo cito medici auxilium ægræ poscant facile restituitur, neque interest tunc, quod ægræ diu lectulo detineantur, apponere, sat erit orbiculum quod novum prolapsum impediat.

4. Tandem si ægræ valde desides sint, neque prolapso utero nullum remedium ferant, inflatur, indurescit, ut reduci amplius nequeat; tunc facile uteri superficies exulceratur ab acre superaffuso lotio; hujusmodi exulcerationem consequitur gangræna, quæ celerrimos progressus ostendit, cui sola uteri amputatione reliquum est mederi.

5. Idem patrare necessum erit modo prolapsus uterus in syrrhum, aut cancerum degeneret, quod tamen raro contingit: non desunt tamen exempla a medicis tradita; hujusmodi operationes valde periculosa experiantur, atque plerumque funestum habent eventum, ideoque nisi in evidenti mortis periculo sunt amplectendæ, imo conveniunt modo nulla supersit medendi ratio, verum (a) auctores fide dignissimi amputationem uteri commendant.

R 2

6. Con-

(a) Aetius, *Tetrabibl. IV. Serm. IV. Cap. 76.* Paulus Aegineta, *Lib. III. Cap. 72. & Lib. V. Cap. 2.* Berengarius Carpus, in *Isagoge anatomica.* Marcus Garinaria, *Prætic. Cap. de exitu matricis.* Anton. Benivenius, *Observat. Medicinal. Observat. IX.* Christophorus a Vega, *Comment. ad Aphorisma. 18. Lib. VIII.* Ambroise Paré, *Liure XXIV. Ch. 48.*

6. Consequitur uteri descensum nedum lethalem morbum esse, modo uterum reduci possit; non desunt enim innumeræ mulieres, quæ diu absque gravi periculo illum perferunt.

7. Certum tamen est molestum evadere uteri descensum, atque menses sistere, flores albos gignere, conceptionem implicare, & desides mulieres reddere.

8. Generice facilius convalescunt ægræ modo recenti, & incompleto uteri descensu laborent, quam si veterrimo & completo; facilius vero juvenes, quam ætate constitutæ, aut cacheticæ.

9. Completus descensus quando uterus restitui nequeat, plerumque successive in inflammationem, exulcerationem, gangrænam, syrrhum, & cancrum degenerat, multum periculi conjunctum habet, & mortem ipsam frequenter inducit.

§. VII.

Curatio.

Ratio medendi uteri descensus una constanter est, variat tamen pro diverso morbi gradu.

I. Si uterus nondum prolapsus sit, solummodo inferius nonnihil porrigatur, magis quam in statu naturali, adstringentium usu, quæ valeant fundum vaginæ constipare ut magis descendenti matrici resistere, non parum morbi progressus intercludit.

Ea diversimode adhibentur.

1. Vel injectiones vaginæ tres quaterve in die reiterantur, ex decoctione confectæ

Radicum Tormentillæ
Bistortæ
Consolidæ majoris

Florum Bursæ Pastoris
Verbenæ
Equiseti
Mille-Folii

Rosarum Rubrarum
Damascenarum

vel si decoctio fieri velit efficacior conflatur ipsa ex

Corticibus Malicorii
Balaufti
Nucibus Cupressi
Capsulis Glandium

Ex tribus, vel quatuor eorum simplicium selectis cum aqua communi, vel vino albo, aut aqua de *Mareschal* decoctio illa conficitur, quæ tepida intromittitur, modo ægræ idoneo positu decumbant.

2. Fomenta impendi possunt, quæ applicantur spongiæ auxilio eadem decoctione imbutæ, idque tutior est, & efficacior methodus, nam remedia diu persistunt in affecta parte.

3. Suf-

3. Suffumigia methodo pluries descripta in utero recepta valde profunt, verum quæ efficaciora experta sunt conficiuntur ex

Thure
Myrrha
Mastice
Sandaraca
Rosis rubris

subtiliter friatis & super prunas affusis per ore quadrantem.

Valde pariter commendant pro eodem scopo cutim anguillarum fumo-exsiccatarum, at suspicor hujusmodi remedium parvi pendere.

4. Uno eodemque tempore intus exhibentur aliquot cyathi infusionis florum Salviæ, & foliorum Argentinæ, vel decoctionis Terræ Japonicæ, vel quod utilius experitur decoctionis Chinæ, & Salsæ-parillæ radicis.

Boli etiam præscribi possunt ex Catechu, Mastice, Sanguine Draconis, Cascarilla, cum syrupo subacta rosarum exsiccatarum, aut stecadis; etiamsi interna remedia in hoc morbo parum levaminis afferat.

5. Modo tempestas idonea sit, aquæ thermæles usuveniunt quæ elaterium vaginæ sustineant; per iniectionem, ipsæ embrocationem, aut balneum extrinsecus adhibentur; intrinsecus etiam exhibentur; vel per fellam familiaricam earundem vapores in utero recipiuntur.

6. Hyppogastro vero & renibus applicatur emplastrum contra rupturam vel emplastrum Mad. Fouquet; non quia valide agant, verum ne ægræ exanimemus iis remediis indulgendum videtur.

7. Tandem si uteri descensus progrediatur, & ægræ magis desides fiant, doloremque in utero persentiant uteri orbiculum statim applicare oportebit, qui tutior est remedium adversus morbi progressum; sequenti articulo methodum ostendemus, qua impendi debet.

II. Si uterus intra vaginam ad orificium usque descendat, incuriæ patientis aut nifus præcipitis ergo, descensus incompletus sit nostrumque videtur statim uterum ad naturalem statum reducere.

1. Hac de causa inversa ratione decumbant ægræ ut venter coxis inferius locetur; verum digitis pinguedine oblititis leviter uterus reponitur; vel pessarii ope filo nexi, & althææ decoctione imbuti uterus reducitur.

2. Plerumque facilis est hujusmodi operatio, quam interdum ægræ ipsæ patrant; postquamquod crura denuo jungi fas erit, in eodem positu diu persistendo donec omne novi prolapsus periculum absit.

3. Interea orbiculus paratur ovalis ex subero confectus, lato foramine pertusus, ut menses erumpere valeant, ex una parte convexus, ex altera leviter concavus.

4. Hujus instrumenti amplitudo respondere debet vaginæ latitudini, & divaricationi fæmorum; secus enim inutile evaderet pro exiguitate, vel nocuum pro longitudine.

5. Modo aptiorem formam adeptus sit hujusmodi orbiculus cera alba, terebinthina Veneta, & Mastice oblititur ut levigatus fiat, neve pudenda lædat.

6. Orbiculus ita paratus oleo, aut butyro recenti inungitur ut facilius per longum vaginæ introducatur usque dum uterum pertingat; obvertitur tunc ut horizontali positu persistat, ea ratione ut convessa pars uterum respiciat.

7. Hac ratione instrumentum nunquam prolabi poterit, neque uterus quod ipsum sustentat; neque vesicam, aut rectum comprimere quia in sua latitudine majori angustia donatur; foraminis vero ergo in medio locati menses

fluere poterunt, atque jugata viro uti, imo concipere persistente orbiculo quem partus tantum occasione removeri debet.

8. Modo uterinus orbiculus rite fabrefactus sit eo facile ægræ affuescunt, at valde molestus evadit modo imperfecte elaboratus fuerit; si brevior sit, quam par est, fundo vaginæ fluctuantem decidit; si longior vaginam nimis distendit; si latior premit rectum aut vesicam.

9. Modo ille idoneo loco appositus sit ægræ tuto & facile incedere poterunt citra aliud quodve remedium; itaque sat erit exigua spongia decoctione adstringenti imbuta interdum partem humectare, etiamsi difficillime coarctari possit vagina continenter ab orbiculo illo distensa.

III. Si uteri descensus completus sit extra vaginæ orificium protensus, ut prope pudenda conspiciatur, statim reductionem tentare debemus antequam intumescat.

Ut id facilius obtineatur urinas ciere, vel siringa evacuare, tum intestina clysteribus expiare primum oportebit; verum uterum fovere tepenti decoctione Althææ, aut mucilaginis seminum lini; postea methodo superius allata reponitur, quod plerumque obtinetur modo cito occurramus.

At si fero medicus superveniat, atque uterus grandior & compatior reperitur in cassum reductione prudenter tentata, sequentia auxilia præscribi necessum erit: & primum;

1. Bis brachium incidere, decem, aut duodecim uncias extrahendo sanguinis.

2. Uterum fovere cum decoctione emollienti radicis Althææ, Cephæ, Liliorum, & foliorum Malvæ, Althææ, Brancæ Ursinæ &c. eaque linteam imbuere utero pluries apponendum.

3. Cataplasmata etiam applicantur ex mica panis & lacte confecta, vel emollientia cataplasmata cum pulpa parata earundem plantarum, & oleo liliorum, vel amigdalorum dulcium.

4. Semibalnea tepentia interdum usuveniunt ex iisdem decoctionibus, in quibus per unicam, vel duplicem horam ægræ detineri debebunt.

5. Tandem dum ægræ remediis hujusmodi subjiciuntur lectulo quiescere debent, supra dorsum decumbendo, elevatis clunis ut facilius sanguis ab utero revehatur.

Modo iis remediis voluminis imminutionem obtineamus vel majorem saltem mollitiem, denuo reductionem tentare prudenter fas erit.

Si id contingat ægræ jam convaluerint, at cum in ea operatione multum uterus passurus sit, adhuc per plures dies decumbere ægræ debebunt idoneo positu lectulo persistendo; venæ sectio tunc convenit semel vel bis instituta; tum emollientia fomenta hypogastrico applicita; & rectum vitæ regimen.

Tandem, si dolor & calor uteri, aut vaginæ abierit, orbiculum tutius erit intrmittere primum exiguum, verum idoneum ut paullatim affuescant.

IV. Si uterus inflatus valde atque durus appareat, ut reduci nequeat, ægram sane commiserare debemus in hoc teterrimo casu; verum cum morbus incurabilis evadat palliativa medendi ratio institui necesse erit, quæ molestas consecutiones levet, & uterum tueatur ab urinæ acrimonia, aut superventuro ulcere.

Id obtinebitur uterum crebre abluendo cum decoctione radicis Bismalvæ, aut Hordei, vel ipsum obtegendo cerato Galeni, aut tela cerusa oblinita; leviores scissuræ foveantur decoctione radicis aristolochiæ, aut unguento Stiracis induuntur frequentibus etiam fomentis quantum fieri potest impeditur compactio uteri, aut syrrhus, at plerumque incassum iis adhibitis cautelis ulcere & gangræna fædatur, aut syrrho, vel carcinomate; tunc enim jam ægræ in faucibus Orci videntur, ideoque uterum amputare licebit, quod tamen plerumque infelicem habet eventum; sufficit tamen, quod interdum amputatio utilis exper-

experta sit, ut in extremo casu præsertim in juvene, ut bene constituto subiecto, tentari queat.

Cum raro id patrari contingat supervacaneum cenfeo fufius operationem explicare, fat erit animadvertere.

7. Debere vinculo prope vulvam uterum circumcingi matricem extra producendo nonnihil, modo fyrrhosa appareat.

2. Cavere ne vesicam tunc simul vinciamus, quod obtinebitur vesicam tepenti aqua iniectando.

3. Verum uterum supra vinculum falcato cultro secare.

4. Omni diligentia, atque artis majori scrutinio pro diversis morbi circumstantiis ulceri mederi nostrum erit; modo vero vinculum decisum fuerit, & ulcus cicatrificationi proximum, reponere interius debebimus vaginæ reliquias in vulva superstites.

C A P U T X I.

De morbis, qui uteri descensum respiciunt.

HUJUSMODI sunt sarcomata, aut carneæ vaginæ excrescentiæ, sive productiones portionis alicujus internæ ejusdem tunicæ; atque uteri obversio, quæ ut fufius explicentur plures distincti Articuli institui debent.

A R T I C U L U S P R I M U S.

De sarcomate, aut carnea vaginæ excrescentia, ac de productione, aut prolapsu partis alicujus intimæ vaginæ membranæ.

QUÆ adhuc dicta sunt, in postremo capite, circa uteri descensum, observationibus perbelle confirmantur.

Mirum sane est medicos plures (a) infra recensitos in dubium revocasse matricis descensum, eumque pro sarcomate, Vaginæ excrescentia, aut productione habuisse.

Etiam si hujusmodi morbus non raro eveniat, nunquam vidisse credendum est, qui illum contendunt; facile enim est prolapsum uterum distinguere a firmitate, volumine, figura, atque collo, vel rostro lævigato, paucis vasculis scatente, rima vero instructo, a qua menses periodice prodeunt modo ægræ ipsum reduci renuant, vel pro magnitudine restitui nequeat; demum si matricem amputare necessum fuerit cruciatus, & instans Gangræna morbi naturam aperiet, sectumque corpus uterum fuisse ostendet.

Pareus (a) circa hoc certior factus est, nam disecto mulieris cujusdam utero quæ ab amputatione etiam convaluit, verum cum audiret paucos post menses a Pleuritide necatam fuisse ipsam disecuit, observavitque matricis loco corpus callosum adesse quod ostium vaginæ obturabat.

Interdum accidunt vaginæ descensus, aut morbi qui hoc nomine insignuntur, totidemque species constituunt ab uteri descensu diversas, ut infra apparebit tum caufarum, cum medellæ respectu.

(a) Job. Meeckeren, *Observat. Chirurg. Cap. 51.* Henricus à Roonhuysen, *Observat. Part. I. Observat. 2.* Theodorus Kerckringius, *Spicileg. anatom. Observat. 20.* Johannes Van-Horne, *Microtheat. Sects II. Part. 1. §. 18.* (b) Lib. XXIV. Cap. 48.

§. I.

Descriptio descensus Vagine.

Neutiquam integra descendit Vagina, quod impossibile est sed ejusdem pars aliqua, seu melius tunicæ internæ portio, quare merito Vaginæ, *productio* potius dici debet.

Hujusmodi productiones inter se multiplici de causa valde differunt.

1. Vel ratione indolis descensus nam modo sarcomata sunt, aut carneæ escrescentiæ interius adherentes; modo *fungi* in aliqua Vaginæ parte locati; modo plicarum innumerum transversalium quibus Vagina scatet processus videntur.

2. Qualitatum respectu, quando molles sunt illæ productiones, flacidæ, spungiosæ varicibus interspersæ quæ Lymphaticum, saniosum, aut cruentum effluvinm sinunt; quando compactæ, atque firmæ; quando collosæ, & syrrhosæ apparent.

3. Crassitudinis, & longitudinis ergo, nam modo graciles sunt, & fluctuantes; modo grandiores ut Vaginam repleant; aliæ longiores sunt ut extra vulvam quandoque porigantur; modo breviores ut vix ad orificium Vaginæ pertingant.

4. Tandem adhesionum respectu; etenim vel fundum; vel latera; vel orificium Vaginæ lædunt, lata, aut angusta basi.

§. II.

Causæ.

ERgo vaginæ descensus tres complectitur, classes pro diversa quam præferunt natura, 1. Sarcoma nempe, 2. Fungum, 3. Vel simplicem productionem interioris vaginæ tunicæ, quæ totidem causas recognoscere debent.

I. Ad sarcomata quod attinet ipsa eadem de causa crescunt, ac in in cæteris partibus nata sunt, ut in Tractatu, de *Tumoribus*, & *Ulceribus*, vidimus Lib. V. Cap. VI. sat erit hic enunciare in vagina hujusmodi tumores a caruncularum myrtiformium nonnullis originem ducere acrimoniæ albi floris, aut luis Venereæ ergo.

II. Fungi autem ab ulceribus incomplete deterfis, quæ spungiosam carnem producunt nasciscuntur; ulcera vero illa producunt plerumque, albus fluor, luis venerea, aut titilamenta nimia facta, vel permissa.

III. Simples vaginæ productiones nimix vaginæ distentioni tribuuntur quam graciliores præsertim passæ sunt in laborioso, difficili, aut crebro partu; post fetus enim expulsionem tunica muscularis facile constringitur, nervea tamen difficiliter constipatur, pluresque plicas gignit quarum alterutra a lymphæ nutritis ubertate facile producitur; eademque causa internam recti tunicam in infantibus quandoque producendo putatum prolapsum inducit.

His explicitis facilius differentias earum productionum sanciantur.

1. Modo enim fundum, latera, aut orificium vaginæ ipsæ lædunt pro diversa parte quam causæ producentes aggressæ fuerint; adhesiones simul latiores, vel angustiores apparebunt, prout ampliorem, vel arctiorem infectaverint partes.

2. Si illæ protuberantiæ sarcomatosæ sint compatiore observabuntur; molliores vero si productiones simplices sint vaginæ; at omnes duriores una fient tractu temporis, callosæ, & syrrhosæ etiam cum adstringentia cito nimis adhi-

bean-

beantur, quæ illas exsiccent; vel extra vulvam protensæ aeris actionem diu passæ sint, quod præsertim timendum est de sarcomatosis processibus.

3. Sarcomata sicca sunt nullamque humiditatem effundunt; aliquam vero ferositatem effugere sinunt productiones vaginæ; denique ex fungis saniosus, & cruentus stillabit latex.

4. Tandem hujusmodi excrescentiæ longiores vel breviores erunt; crassiores vel graciliores prout causæ validiores aut diuturniores existent.

§. III.

Symptomata.

1. **V**aginæ descensus dum exigui sunt neque dolorem, neque pondus, neve distractionem pariunt, tum parum infectant modo non extendantur, & vaginam, atque vicinas partes comprimant, quod in sarcomate præsertim ori solet.

2. Incommodi valde experiuntur ipsi pro molestiis, quas inferunt; vel quia ferum aut saniem effundunt; vel menses, aut fluores albos intercipiunt, quamquam ægræ sæpe abluantur.

3. Implicant, vel saltem molestum reddunt matrimonii usum, ejusque scopo officiant.

4. Si utero graves fiant, quod facile evenit, difficulter pariunt.

5. Tandem hujusmodi protuberantiæ temporis diuturnitate syrrhosæ plerumque evadunt, vel in cancerum degenerant, quod præsertim sarcomata respicit.

§. IV.

Diagnosis.

Vaginæ descensus modo grandiores fiant, ut supra admonuimus cum uteri descensu facile confundi possunt, omnis tamen difficultas evanuerit modo animadvertere velimus:

1. Vaginæ descensum longum, flexile corpus repræsentare, vel a fungis, vel a vaginæ productione ipsum dependeat; uteri vero prolapsum corpus præferre rotundum, crassum, ovum referens, levigatum, & rima instructum.

2. Sarcomata denique plerumque ampliora esse, ut interdum volumen uteri referat, inæqualia, & angulosa; uteri corpus verum acumine apparet, ut pirum perbelle repræsentet, quæ est vera uteri imago.

3. Digito intromisso facile productionum earum adhesionem deteguntur, etiam si fundum vaginæ deturparent; uterus vero prolapsus utrinque insulatus apparet, & digito circumscribitur.

4. Tandem uteri descensus modo reductionem obtineamus ibidem persistit, nisi a vehementiori nisu denuo prolabatur; vaginæ vero productiones etiam si digitis restituantur iis remotis statim decidunt.

§. V.

Prognosis.

1. **V**aginæ excrescentiæ, aut plicarum productiones molestæ plerumque evadunt, pluraque incomoda inducunt, quibus vexantur egræ, ut difficilius munera connubii implere valeant.

2. Modicum tamen periculum conjunctum habent, easque diu egræ perferunt, imo crebre ipsas non animadvertunt nisi sanguinis jacturam inducant.

3. Nihilofecius illas nefas esset negligere necessaria remedia omittendo dum grandiores, callosæ, fyrrhosæ, aut spungiosæ fiunt, vel cruentum effluvium, aut hæmorrhagiam inducunt.

4. Hujusmodi sollicitudo necessarissima videtur, quando excrescentiæ extra vulvam producuntur, nam aeris contactus & indusii frictio cito illas fyrrhofas redit; sæpe etiam carcinomatosæ evadunt.

5. Generice tutior methodus est hujusmodi morbum statim cum egras ipse adhoritur idoneis compescere remediis, nam ei tunc temporis facilius est, tutiusque mederi.

§. V I.

Curatio.

IN hoc morbo medendi ratio pro natura speciei morbi diversa variare solet.

1. Si excrescentiæ vaginam occupaverint inutile est resolutionem, aut exsiccationem tentare resolventibus, aut adstringentibus, nam eorum remediorum usudurities intenditur; salubrius erit escharoticis excrescentias abradere, aut forcice conscindere.

1. Escharotica diuturniora evadunt modo excrescentiæ grandiores sint, aut callosæ; verum interdum sanæ propinquæ partes lædi possunt; tandem ea remedia dolorem, & inflammationem vaginæ plerumque inducunt.

2. Amplecti igitur potius debemus amputationem; olim difficillime pediculi vincebantur antequam conscinderentur, neque tamen ipsis facile erat perfecte protuberantias extirpare; nunc simpliciorum methodum inventi sunt, at in nostro casu vincula frustranea videntur, nam gravis hæmorrhagiæ periculum abest, ut torundæ sufficiant aqua aluminosa imbutæ ad cruoris jacturam sistendam.

3. Potest enim modo positum morbi cognoscamus ipsum extirpari, hac de causa sinistra manus ad pediculum usque indice digito intromisso longiori forcice circa digitum introducit, eo pediculo comprehenso sollicite omnis scinditur protuberantia,

4. Possumus levem sanguinis jacturam permittere, at siccis filamentis, quibus vagina repletur, facile citoque cruentum sistitur effluvium; si id non sufficiat torundæ aqua aluminosa, aut stiptica imbutæ intromittuntur; postero die decidunt filamenta, & ulcus vulgari digerenti pauco balsamo Arcei remixto tractatur, ut hac methodo facile convalescat; necessum tamen erit perscrutari an nulla callositas circa pediculum supersit, in quo casu illa destrui debet pulvinos applicando unguento bruno oblinitos, aut solutione lapidis corrosivi imbutos tuendo sanas partes siccis filamentis.

5. Donec hujusmodi medendi ratio completa videatur dorso tantum continuo ægræ decumbere debent, hoc regimen sollicite observando; verum modo hanc operationem

tionem nulla febris consequatur majori nutritioni erit indulgendum ; tandem jam convalescentibus ægris vaginam injectare fas erit decoctione, hordei radicis Aristolochiæ, Melle Rosato, vel salubrius, Aquis Thermalibus de *Plumbier Bourbon*, & *Barege*.

6. De cetero cum suspicemur a lue Gallica morbum derivare, frictiones mercuriales usuveniunt idonea methodo institutæ inunctionem protrahendo ad medium medellæ cursum.

II. Si ægritudo simplex lassitudo, aut productio sit plicæ cujusdam, aut portionis internæ vaginæ tunicæ, nostrum erit tunc laxatam partem exsiccare, atque ad naturalem statum reducere.

Id implebimus exsiccantia adstringentia, & stiptica remedia adhibendo, quæ duplici ratione præscribi possunt exhibendo, vel

1. Decoctiones quibus etiam imbibuntur pessaria linteo involuta ; aut graci-
liores spongiæ quæ affectæ parti apponuntur ; plantæ quæ decoctionibus cedunt
plerumque sunt

Corriaria
Nux Cupressi
Gallæ

Cortices granatorum
Flores granatorum

Folia Myrthi
Equiseti
Bursæ Pastoris
Plantaginis
Pilosellæ &c.

ebulliendo earum stirpium tres, vel quatuor, cum aqua de *Forge*, de *Marschal*, aut duplici drachma vini albi.

2. Suffumigia per fellam familiaricam recepta locum habent parata ex sequen-
tibus pharmacis, quæ sunt

Thus
Mastix
Ladanum
Rosæ exsiccata
Sandaraca

eorum duo, vel tres seligendo quæ anatina dosi simul permiscentur, & supra
prunas insperguntur, quorum vapores per aptum tubulum intra vaginam reci-
piuntur.

3. Animadvertendum est hujusmodi productiones evanescere in iis, quæ ute-
ro graves fiunt, modo in hoc statu nonnihil progrediantur; nam uterus tunc in
pelvi regrediens aucti voluminis ergo vaginam producit, omnesque plicas tol-
lit; at morbus post partum cito, sæviorque revertit.

4. Si pro crassitudine hujusmodi productiones incommodæ magnopere evadant,
vel in syrrium, aut ulcum degenerent, statim ipsas secare oportebit propositam
methodum prosequendo, quam circa excrescentiæ amputationem proposuimus.

ARTICULUS II.

De uteri obversione, in eo prolapsus statu.

Interdum uteri fundus obversus vaginæ orificio se præbet, videlicet reflectitur, cucurbitam refferens, exiitque secum uterum trahendo, ut tumorem rotundum grandiorefformet, quem sæpe pro vulgari uteri descensu habent de quo superiori Capitulo locuti sumus.

Hæc calamitas plerumque partui succedit imprudentiæ ergo obstetricis, quæ placentam violenter nimis abraferat, secum fundum uteri obvertendo; vel quod crebrius accidit convulsivæ constrictionis causa, quæ uterum succutiendo in laborioso partu fundum exterius propellint, ut in violentiori collica sæpe evenit ubi alterum intestinum alterum intrare solet.

Hujusmodi morbi status dolorem sevyssimum comitem habet, quem subsequuntur inflammatio, gangræna, & mors ipsa, modo cito non occurramus uterum prolapsum reducendo; id sufficeret ad distinguendum descensum ab uteri obversione; hæc in partu tantum evenit, ille interdum puerperii consequens est, verum citra partum etiam succedit; obversio lethalis plerumque est modo cito ei non medeamur, descensus minus periculosus evadit, segniusque agit, at hujusmodi diversæ species descensus subsequentibus signis facilius deteguntur.

1. In uteri obversione, quasi cucurbita se præbet extrorsum, in descensu vero naturalem positum plerumque respicit, atque nulla obversio apparet.

2. In ea pariter rotundum corpus se offert, extrinsecus pulposum, involutum in quo neque rostrum conspicitur, neque collum, aut orificium; in descensu vero uteri rostrum, collum, & orificium distinguuntur, verum prolapsum corpus levigatum firmum, & ovale apparet.

At satis est, quod adhuc dictum est, eoque mittimus lectorem ubi de partu locuturi erimus, si fusiozem descriptionem postulaverit.

CAPUT XII.

De Morbis, qui Ovaria, & Tubas infestant.

ARTICULUS PRIMUS.

De Morbis, qui Ovaria ledunt.

§. I.

Describuntur Ovaria, eorumque Morbi.

Ovaria corpora duo sunt modice extensa, figura ovali donata, nonnihil depressa, destorsum, & sinistrorsum tribus circiter digitis ab utero distita, & circa uteri fundum membranaceis utrinque ligamentis connexa, ea peritonæi expansione suspensa, quæ cum lumbis peritonæum neçtitur, ut ligamenta lata uteri producat.

Ambo ovaria ut & cetera viscera propria tunica involvuntur, ac propriis vasis, arteriosis, venosis, lymphaticis, & nervis valde referta sunt, at frustraneum est fusiozem hic eorum vasorum descriptionem afferre, quæ parum, vel nihil ad morborum eorum originem faciunt.

Potissi-

Potissimum tamen est ovaria animadvertere duplici substantia conflari; *altera* superiorem partem, seu externam respicit, quæ ex fibrarum tendinearum contextu coagmentatur, minusque compactam substantiam, seu spungiosum corpus constituit; *altera*, quæ inferior pars est, seu intimior, pluribus exiguis cellulis interspersa videtur membranaceis, & distinctis, in quibus exigua spherica vesicula continetur limpidiori lymphâ repleta.

Singulæ vesiculæ proprio pediculo suis cellulis adhærent; eæ confertissimæ, & inter se valde similes sunt quoad figuram attinet; at magnitudine differunt, nam aliæ pisum non superant, aliæ grano Miliaceo non exiguiore sunt.

Plures observationes docuerunt hujusmodi cellulas rima instrui valde arcta, & in statu naturali vix patenti, quæ tamen referatur dum vesicula pro conceptione inflatur, ut vesiculæ exitum finat quæ tubas intrat; animadverterunt etiam diu post vesiculæ descensum ovarii semitam, per quam vesicula sibi pandit viam, rubram persistere, quam *cicatriculam* appellarunt; cicatricularum ergo numerus respondet in ovarii numero foetuum in utero degentium.

Centum ab hinc annis & ultra, qui hanc materiam perscrutati sunt, & generationis mysteria intimius examinarunt, fancierunt, brutorum generationis analogia ducti inter Ovipara, & Vivipara animalia, hujusmodi vesiculas totidem ovula præstare generationi inservientia, modo virili semine fecundata sint, qua de causa ea duo corpora ovaria appellarunt.

II. Hujusmodi corpora præter morbos ceteris partibus communes, specialiter corripì possunt

1. Inflammatione quæ in resolutionem, abscessum, aut gangrænam degenerabit.

2. Syrrho interdum continuo, interdum in plures lobulos distinctos, quod præsertim attinet ad externam spungiosam ovarii substantiam; qui syrrhus quandoque in cancrum immutatur.

3. Inter ceteros morbos ovarii proprios recensentur (*a*) hydatides, aut vesiculæ diversa magnitudine præditæ, externæ ovariorum faciei adhærentes, & lymphâ glanulosa, & translucida repletæ.

4. Verum (*b*) Hydrops faccata in qua aquæ intra sacculum membranaceum diverso volumine, & crassitudine pollentem detinentur.

5. Foetus conceptio in ipso ovario, ubi ille interdum crescit, sacculum referens de quo plures ineluctabiles (*c*) observationes traduntur.

6. Tumores Cystici *steatomata* nempe, *atheromata*, aut *melicerites* (*d*), qui plerumque cellularem, aut intimiorem substantiam ovarii pervertunt; eorum volumen variat pro circumstantiarum diversitate; contenta etiam materies *caseosa*, sebacea, puriformis, plus minusve spissa, aut diversis coloribus referta fusco, cinereo, aut luteo conspicitur: at quod mirum est intra hos tumores interdum capil-

(*a*) Memoires de l'Academie Royale des Sciences, Ann. 1711. Acta Berolinensia Vol. VII. pag. 76.

(*b*) J. Riolanus, An. hropogr. Lib. II. Cap. 35. Fridr. Ruyschius Observ. anatomic. 17. J. B. Bianchi, de Generatione pag. 187. Hans Sloane, Transact. Philos. An. 1699. n. 252. art. 1. Henricus Sampson *ibid.* An. 1678. n. 140. art. 1. Jacobus Douglas. Medicus *ibid.* An. 1706. n. 308. art. 2. Johannes Belchier, *ibid.* An. 1732. n. 423. art. 3. Johannes Huldricus Peyer. Im-off. in Thelibus defensis Basileæ, An. 1719. (*c*) Observatio interea in Diario Medico Abbatis de la Roque men e Januarii 1683. Latine versa in Bibliotheca anatomica Tom. I. pag. 623. Alexius Litreus Memoires de l'Academie des Sciences An. 1701.

(*d*) Fridericus Ruyschius, Advers. anatomic. Decad. I. pag. 6.

capillorum glomos reperiri (e) a vulgaribus capillis haud abfimilium, sed subtiliorum.

§. II.

Causæ.

Postquam generaliores causas examinavimus plerorumque morborum, qui uterum respiciunt, supervacaneum videtur, fusius eas reiterare, sufficiet itaque eas breviter indicare.

1. Ovaria æque ac uterus easdem causas inflammationis cognoscunt, imo ovariorum inflammatio uteri inflammationi necessario succedit; ambo enim ovaria inflammabuntur, dum integer uterus phlogosi laborabit; alterutrum si alterutra uteri pars corripitur.

Consecutiones hujus inflammationis illæ sunt, quæ uterum inflammatum consequuntur; si hæc inflammatio per resolutionem evanuerit, ea pariter desistet; si in abscessum, aut gangranam degeneraverit, idem pariter de ovariorum inflammatione futurum erit.

2. Syrrhi qui ovaria deturpant a lymphæ morâ procedunt intra eorum spongiosam substantiam retentæ; si lymphæ omnem ovarii substantiam foedaverit unicum tumorem; si in diversis distinctis cellulis induruerit plures tumores segregatos efformabit.

Præter causas *Cap. V. Lib. II.* superius indicatas, quæ valent tum in utero cum in ovarii lympham sistere, & syrrhos generare, speciales nonnullas ovaria recognoscunt. Inter ea recensetur primum amoris voluptas, quæ tum ovaria tum ceteras propinquas partes in motum ciet convulsivum, qui lymphæ cursum intercipere, vel saltem retardare potis erit, præsertim si contraria pathemata mœroris, & verecundiæ superaddantur; hac de causa filia magis, aut vidua, quam mulieres, huic morbo sunt obnoxia.

Post ea, quæ superius *Cap. VIII.* dicta sunt circa canceri uteri generationem, supervacaneum erit hic animadvertere, & in ovarii syrrhum indurescere, perfici, & in cancerum converti posse, iisdem de causis quæ in ceteris partibus hanc methamorphosin producant.

3. Etenim dum lymphæ spongiosam substantiam ovarii invadit, syrrhum gignit; at si lymphatica vasa extrinsecus distributa infarciant hydatides producit, quæ a dilatatione valvularum eorum vasorum originem agnoscit, ut in *Tractatu Tumorum Lib. III. Cap. II.* explicavimus; ideoque causæ omnes, quæ lymphæ refluxum impediunt, modo debiliores sint hydatides tantum ovarii superficiales plus minusve uberrimæ, aut expansæ producent in ratione majoris, vel minoris earum causarum actionis.

Haud impossibile est ambo ovaria hydatidibus undique obtegi, at id raro evenit; plerumque enim vel alterutrum, vel eorum pars aliqua hoc morbo solet laborare.

Non

(e) J. Bauhinus apud Teoph. Bonetum Sepulchr. Lib. III. Sect. 33. Observ. IV. n. 6. Et apud J. Schenckium, Lib. IV. Observat. 1-6. C. Bauhinus, anatom. Lib. I. Cap. 31. & apud Hercul. Saxoniæ de Plica C. 12. Guillelmus Fabricius Hildanus. Observat. Chirurg. Cent. V. Observ. 48. Gregorius Horstius. Observat. Medic. Lib. IV. Observ. 53. Daniel Sennertus, Lib. IV. par. I. Sect. 2. Cap. 20. Johannes Rhodius, Observat. Cent. III. Observ. 44. Acad. de Scienc. An. 1743. pag. 82. H. Cornelius Stalpart-vander VViel Observ. variorum Centur. post. Observat. 6. Shephanus Blancardus, anat. pract. Centur. II. Observat. 27. Augustinus Buddeus, Miscellan. Berolin Contin. II. pag. 16. Martinus Naboth. in Dissertat. de Sterilitate Cap. 2. Jacques Yonge, Trans. Philosoph. An. 1707. n. 309. art. 6. Polycarpus Cortlieb Schacher in Commerc. litterario Norimbergenfi. An. 1736. pag. 103 & in Dissertatione de Ovarii tumore piloso, Lipsiæ 1735. quæ prostat Tom. IV. Collect. Hallerianæ.

Non defuerunt auctores, qui crediderunt hydatides conflari ex ovulis, aut vesiculis inflatis, in cellulis superius descriptis fluctuantibus; at haud facile hoc explicare poterimus, cum ovula illa tunica ovarii undique circumvestiatur.

4. Si hydatidis valde ingrandescat sacculum præferet serositate lymphatica repletum, seu melius hydropem ovarii, quam plures observationes confirmant; interdum huiusmodi sacculus insulatus apparet, interdum pluribus aliis exiguis hydatidibus refertus; has differentias faciunt positus obstaculi quod lympham in unico, aut pluribus vasculis retardat, vel dilatabilitas diversa vasorum lymphaticorum.

5. Merito fane mirati sunt, qui foetum in ovario detecti sunt, & conceptionem ibi longe ab utero perfici posse observarunt, id tamen certissimum est; vix enim percipitur qua ratione sperma usque illuc pertingat, at cum pluribus (a) observationibus id fulciatur, statuendum erit a densitate obtegentis tunicae, rimae angustia, aut crebrius a convulsiva crispatione partium ori, quæ in iis circumstantiis verecundiae, displicentiae, aut libidinis ergo mulieres vexat, quare huiusmodi foenomenon in filiarum emortuarum dissectione plerumque apparuit.

6. Cystici tumores ovaria æque ac hydatides infestare possunt, docuimus jam in nostro *Tractatu de tumoribus* ab iisdem causis ipsos derivare, quæ hydatides faciunt, & Ruyschius (b) observavit eandem naturam præferre.

Præter vulgares cysticos tumores singularissimæ species in ovariiis tumoribus formantur putrescentiæ embronis ergo ibi corrupti; ii steatomatosam indolem præferunt, & purulentam magis materiem effundunt, quam in steatmate, aut atheromate, abscessusque habitum æmulantur.

In iis tumoribus speciebus ut jam admonuimus pilorum glommi reperiuntur, quos usque adhuc anatomici plæclarissimi explicare nescierunt; suspicor enim non abs re esse glommos illos ex capillis conflari emortui foetus; verum si (c) Ruyschio fidendum sit, reperiunt racemum dentium, qui certo embrioni tribuuntur, qui augeri continuavit ut (d) Blancus putat, qui pariter credit majorem dentes augmentum adeptos fuisse quindecim menses post mortum foetum in utero superstitem.

§. III.

Symptomata.

Generice adhuc recensitæ calamitates haud facile est symptomatum apparitione determinare.

I. Tamen ovarii inflammatio calorem, atque dolorem hypogastri comitem habet, quæ foenomena tamen, & febris ipsa uteri inflammationi tribuuntur, quæ plerumque læsa ovaria præcedit.

Ovarii abscessus morbi initio valde exiguus est ut vis perferri queat, modo vero amplior fiat, alterutram partem tendit, obtuso dolore afficit, febrilem commotionem inducit, ut in ceteris internis abscessibus.

Gangræna vero eodem tempore, ferius tamen fortasse ac uterum, ovaria aggreditur, eademque simul foenomena inducit, quæ superius *Cap. II.* indicavimus.

II. Syrrhus hujus partis primum latitat, at volumine aucto incessum nonnihil impedit, sensumque tensionis inducit, interdum etiam tactu distinguitur.

III. Non

(a) Ruysch. *Thesaur.* V. n. 21. & *Advers.* Decad. I.

(b) Idem de *Valv.*, Cap. IV. *Observat.* 25.

(c) *Advers.* anatom. Decad. III. pagg. 6. & 20. *Mem. Acad.* An. 1743. p. 88.

(d) De *generatione* pag. 142-143.

III. Non ita evenit de hydatidibus aut hydrope ovarii inquisitione; sero enim hydatides cognoscuntur, & hydropem tunc adesse fatemur quando ipsa maximum volumen adepta fuerit, quod circumscriptum ad alterutram partem hypogastri apparebit.

IV. Conceptionis ergo quæ in ovariiis fit mulieres nullum indicium animadunt, imo foetus perit antequam de eo certiores fieri possint.

V. Totidem dicendum est de tumore cystico qui emortuo aut soluto embrioni succedit, raro enim ita increscit, ut dolorem sensibilem pariat qui suam existentiam prænunciet.

§. IV.

Diagnosis, & Prognosis.

I. **E**X iis consequitur ovaria inflammatione laborare suspicari posse, quando calor, & dolor hypogastrium infestet, verum ipsa febris addatur; supurationem vero aut gangrænam instantem fateri licebit, inflammationis progressus investigando; verum haud facile est hujusmodi morbos cognoscere nisi cum maximum gradum adepti sint, aut volumen ipsum aliquod præbeat indicium.

II. Prognosis vero respectu omnes ovariorum ægritudines teterrimæ sunt; si morbi initio recognosci possent facile nonnullis mederetur, at vix eas suspicari incipimus, quando jam ad summum gradum pertingerunt, & pene incurabiles factæ sunt; idcirco in nostro casu sat erit morbi progressus retardare, & si fas erit sæviora fœnomena compescere.

§. V.

Curatio.

I. **I**N ovariorum inflammatione, aut fœnomenis, quæ eam consequuntur, remedia impendi debent superius *Lib. II. Cap. I. & seqq.* adversus uteri inflammationem proposita.

II. In ceteris vero morbis qui ovaria deturpant applicari debet emplastrum Diabotani, aut mucilaginum, vel emplastrum Cicutæ, postquam tentatæ fuerint embrocationes olei chamæmellorum, aut lumbricorum terrestrium.

III. Circa interna remedia brachium incidere, & primas vias leviter expiare pluries necessum erit idoneum regimen præscribendo prout, tempestas postulerit, verum decoctiones amaras cum Tartaro Martiale solubile exhiberi poterit, tum lactis serum chalybeatum, aut asininum lac, vel aquæ ferrugineæ, & semibalneæ tepentia; boli denique usuveniunt, decoctiones, & pthisanæ diureticiæ ad hydropem abdominis cavendam, quam sæpe hujusmodi morbi inducunt.

IV. Tandem in confirmata ovarii hydrope, periculosa valde, cum acu triangulari parecentesis institui poterit, ut contenta aqua evacuetur; at sequenti articulo cum de tubarum hydrope disserturi erimus, inquireri licebit, quot incommoda conjuncta habeat hujusmodi operatio, etiamsi potissima videatur.

ARTICULUS II.

De morbis qui Tubas ledunt.

§. I.

Describuntur tubæ earumque morbi.

I. **T**UBÆ Fallopianæ canales referunt ab intestinulis haud absimiles, qui ab uteri fundo utrinque ad ovaria usque protenduntur, non jam per rectam lineam sed hic illuc a recto tramite deflectendo, ut interdum grandiores evolutiones faciant.

Earum pars extrema, quæ in utero inseritur, omnes membranas perfodit, ut tubarum lumen cum utero per angustissimum tatum orificium communicet, hinc versus ovaria reflectendo hujusmodi cavitas paullatim dilatatur ad oppositum usque foramen, ubi post novam levem tamen constrictionem canaliculus ampliatur valde, ut papilionis speciem referat, cujus margines in plures lacinias divisi fimbrias plures ostendunt, a quibus corpus *fimbriatum* pars illa solet nuncupari.

Hujusmodi tubæ peritonæi expansione, quæ mesenterioles vices gerit, in naturali positu detinentur, at foramen ovarium respiciens modo libere fluctuat, modo inferius nonnihil portione sua aliformi ovario laxè adheret.

In utraque tuba duæ tunicæ conspiciuntur altèta externa, quæ membranacea est, altera interna membranacea sane, sed interius pulpofa, vilofa, & viscida oblinita lymphæ, quæ aliquam secretionem ibi patrari ostendit; hæc postrema tunica multiplici ratione complicatur, ut rugas, aut cellulas gignat in tubarum cavitate observatas.

Intra illas tunicas oculis sæpe subjiciuntur fibræ musculares longitudinales, circulares &c., quæ motum peristalticum, aut vermicularem harum partium excitant, dum opus est fecundatum ovum in utero devehere, quod ab ovariiis alarum suarum auxilio receperunt; observatione id a tubis perfici statuerunt, verisimile enim est lacinias alarum totidem musculos esse exilissimos, qui inferiorem ovarii partem conceptionis tempore amplectantur, usque dum fecundatum ovulum tubam intret.

II. Tubæ iisdem plerumque ac ovaria morbis laborant.

1. Possunt enim inflammari, & in abscessum, aut gangrænam converti.
2. Syrrhosæ fieri possunt, vel per integram longitudinem, vel ad alterum extremorum foramen.
3. Hydatidibus tum extrinsecus cum intrinsecus innumeris interdum scatent, quarum nonnullæ si grandiores fiant, hydropem hujus speciei inducere valebunt.
4. Quandoque a maxima ferossæ lymphæ congestionè hydrope afficiuntur tubæ, ut plures (a) observationes confirmarunt.
5. Interdum fecundatum ovum ibi detineri potest foetusque augeri, ut tubas

Astruch de Morbis Mulierum.

S

bas

(a) Nicolaus Tulpus. Observ. Medicar. Lib. IV. Observ. 45. Acta Eruditorum Lipsiensia Ann. 1701. Menf. Februario. Ephemeridium Germanicar. Decur. II. An. 2. Observ. 95. Joh. Baptista Bianchi de generatione pag. 187. ubi agitur de hydrope tubarum, quæ libras 80. pendebat. Johannes Mannicks in Bibliotheca anatomica Tom. I. pag. 624. Quæstio habetur de simili hydrope quæ 112. libras æquabat.

bas dirumpat, & matrem necet; hujusmodi gestationis species haud raræ sunt, enunciabimus (b) interea veriores, atque magis obvias.

6. Intra tubas efformari poterunt cystici tumores, ut in ceteris corporis partibus, tum abscessus qui maximam affinitatem habent cum ovo foecundato intra tubas aut ovaria suppurato.

7. Crebrius observatum (c) est fimbrias utriusque tubæ interdum ovariiis necti, ut eæ impares evadant foecundum recipere ovum; quod in abdominis cavitate decidet.

8. Tandem tubarum ostium uterum respiciens, quandoque obturatur (d) ut vix fetam aprinam capiat; idem sed crebre minus altero tubæ (e) orificio evenit, ex eo tamen nulla consequitur functionum læsio, modo unica ægrotesca tuba, incurabilem vero sterilitatem inducit ambarum tubarum obstructio.

§. II.

Causæ.

Post ea quæ dicta sunt circa causas, atque morbos ovariorum, pauca de tubis reliqua sunt, tamen.

I. Tubarum inflammatio tum abscessus aut gangræna subsequutura ab iisdem causis inflammationis, abscessus, aut gangrænæ uteri vel ovariorum procedunt.

II. Syrrhum vero Hydatides, aut hydropem quibus tubæ corripui possunt satis in Tractatu Tumorum &c. explicavimus.

III. Si vero utrumque tubarum ostium obstruatur lymphæ in iis secreta intra earum cavitatem cumulabitur, & hydropem generabit, quæ pro intumescencia vix tubas recognoscere sinet; idem a sola inferioris orificii obstructione oriri potest, at in hoc casu stagnans lymphæ parietes dilatando, tandem & supremum obturabit orificium ut similis hydrops producat.

IV. Ovum foecundatum pluribus de causis in iis detineri potest modo serius quam par est ab ovario erumpit, aut pro magnitudine impar evadit, tubas intrare; modo tubæ pro inferioris ostii angustia, aut obstructione vel debili earum peristaltico motu ovi progressui officiant; modo a rugis, aut cellulis tubarum ovi iter impeditur; in omnibus iis casibus ovum augebitur magnopere, ut gestationem inducat matri plerumque lethalem.

V. In iis tubis iisdem de causis, ac in ceteris partibus tumores cystici gigni possunt, circa quod tractatum nostrum *Tumorum &c. Lib. V. Cap. II.* consulto, præterquamquod a suppurato ovo abscessus efformabitur a steatomate, aut atheromate non absimilis, ut in ovario accidere posse ostendimus.

VI. Verisimile est adhæSIONem tubarum cum ovario ab inflammatione oriri in præcedenti ovarii foecundatione nata, quæ eorum externam lympham, tum eam

(b) Johannes Riolanus refert An. 1650. in sua Anthropographia Lib. II. Cap. 35. plures Observationes gestationum tubarum; unam præsertim, quam animadverterunt Medici Aulæ Regiæ Reginæ Annæ Austriacæ in ejusdem Ancella; at Bartolinus Anatom. Lib. I. Cap. 17. huic observationi parum fidei habendum esse ostendit, nam Gui Parinus admonuit Riolanum ipsum de hac observatione parum fecisse, verum indulxisse precibus cuiusdam Medici Aulæ Regiæ, Petri Seguini; at tamen hujus rei veritas satis observatoribus eluxit, qui plures tubarum gestationes conspexerunt, ex magno eorum numero duos potissimum indicabimus, omni dubio expertes, quarum alteram D. Lihrius affert, alteram D. Du Vernai in *Memoires des Sciences Année 1702.*, quibus addi potest observatio Pauli Bucieri Medico-Chirurgi in *Transact. Philosoph. indicata An. 1694. n. 207. art. 2.*

(c) Regnerus de Graaf. *Libro de genitilibus Mulierum Cap. 1.* Ruyschius. *Adversar. anatom. Dec. II.* Du Vernai. *Memoir. des l'Acadèm. des Sciences An. 1702. pag. 302.*

(d) Ruyschius. *Observat. anatomicar. 83. Adversar. anatomicor. Decad. I. pag. 7.*

(e) VVeitbrecht. In *Comment. Academ. Petropolitanae Tom. IV. inter Physicas Dissertationes art. XIV.*

eam tubæ fimbriarum exsiccaverat, ut hac de causa facile simul coalescant, simili ratione ac pulmones cum pleura coeunt, si alterutrum inflammetur.

VII. Tandem tubarum ostium occluditur vel quando uterus syrrhosis fit, vel phlogosi corripitur in laborioso partu ubi eo tubæ junguntur; similes causæ oppositum orificium, raro tamen, occludunt.

§. III.

Diagnos, & Prognosis.

D*ignosis.* Excepta tubarum inflammatione, quæ propriis signis indicatur, ceteri tubarum morbi vix initio dignosci possunt; verum signa illa, quæ in progressum illos prænunciare deberent ita incerta sunt, ut ex iis nihil inferre possit; quare in cadaverum sectionibus crebre reperiuntur ea, quæ neutiquam excogitata sunt.

Prognosis. Ignorantiam nostram circa existentiam plerorumque morborum tubarum, vexationem ægris tollit, infaustæ prognosis, & Medicis intimius morbum perscrutari.

Theoretice tantum: 1. Noscimus inflammationem plerumque salutariter resolvi, abscessum vero & gangrenam funestum finem præferre.

2. Syrrhum, hydatides, & hydropem tubarum segnius procedere, easque ægras, excepta hydrope quæ pro summo incremento disrupta ascitim inducit, diu posse perferre.

3. Gestationem tubarum plerumque mortem afferre vel quod foetus putrescens lethalem abscessum inducat, vel quod tubas disrumpat, & in abdominis cavitationem decidat, ut vel a supervenienti hæmorrhagia, vel foetus suppuratione ægra intereat; non desunt tamen exempla earum, quæ sensim exsiccatum foetum ibi diu gestarunt citra gravem noxam; at hujusmodi observationes rarissimæ sunt.

4. Tumores cystici cujusque generis serius increfcere, atque diu ægras perferre citra gravem molestiam, iique in cadaverum dissectionibus sæpissime reperi, etiamsi viventibus ægris numquam suspicati sint.

5. AdhæSIONem fimbriarum cum ovariis & obstructionem utriusque vel alterutrius orificii tubarum generationem nocere, nullam tamen molestiam inferre, aut grave periculum minari.

§. IV.

Curatio.

Supervacaneum videtur ea repetere quæ de ovariis ægrotantibus dicta sunt, sat erit animadvertere eadem remedia penitus hic convenire, etiamsi parum efficacia experiantur.

Duplex articulus habetur qui speciales animadversiones postulat, *primus* respicit duplicem hydropem tubarum; tunc idoneum esse apparet antequam disrumpantur, & ascitem aquæ producant, troechateris ope ipsas evacuare; constat enim utiliter hac methodo usum fuisse medicum quemdam Danum (a) ut Thomas (b) Bartolinus refert, certum enim est hujusmodi operationem valde utilem experiri posse si sacculus, ubi latex ille continetur, sit peritoneo injectus, ubi punctio

S 2

insti-

(a) Johan. Henric. Brechfeld.

(b) In Actis Medicis Hafniens. pag. 194.

institui debet, quo in casu Medicus Danus paracentesim iniit; at si contra sacculus minime peritoneo adhæreat punctio funesta evadet, & exitura aqua in abdominis cavitatem irrumpet, alteram hydropis speciem inducet; idcirco cum absint hujus necessariæ adhæisionis signa tutiora, de felici, aut funesto paracentesis eventu valde ancipites erimus, etiamsi interdum eam tentare liceat.

Secundus respicit tubarum gestationem; modo enim illam adesse cognoscamus Cæsaream operationem convenire suadent, eam partem versus, quæ foetum gerit, eoque facilius, cum minus periculi adsit in tubæ sectione, quam uteri; hujusmodi praxis tot fulcitur rationibus, ut modo ægrotantium conditio non obsit, tutius institui possit, præsertim cum subsequens celeberrimi viri exemplum (c) idem confirmet.

C A P U T XIII.

De Passione hysterica, seu uteri suffocatione.

§. I.

Descriptio.

MORBUS de quo nunc sermonem inimus *hysterismus* vocatur, *suffocatio*, *epylepsia uterina* &c., verum non unicus est sed plures complectitur species diversas, quare auctores pene omnes, quide eo pertractarunt, speciali capite hystericum morbum perscrutati sunt, at cum eæ diversæ species potissimum ab una causa, aut œconomix animalis simili vitio dependeant unamque postulent medellam, singulas igitur uno articulo explicabimus.

Hystericus morbus per vices revertit, quæ paroxysmi dicuntur, plus minusve crebri diutini, aut vehementes, quos commitantur plura, aut pauciora scœnomena, quibus in diversis morbis circumstantiis ægræ fiunt obnoxia.

Hujusmodi regressus anomali sunt nullamque periodum servant, in morbi statu periclitari videntur ægræ, at eo transacto perfectam tranquillitatem & sanitatem recuperant.

Eos prænunciant plerumque oscitationes, pandiculationes, singultus ventris, borborygmi, repentinus faciei rubor, atque sensibilis calor, cui succedit pallor, atque frigus, in eadem ratione.

Hi paroxysmi in profundam segnem, atque crebram respirationem desinunt, verum flatuum expulsio succedit, effluitque tunc humor serosus lymphaticus, & cruentus ex vaginæ claustro.

In vehementiori paroxismo omnes pene œconomix animalis functiones plerumque pervertuntur.

Quare sopore ægræ corripiuntur, sui compotes interdum non persistunt, sensus amittunt, inordinate audiunt, vident, neque de auditis, aut visis rationem reddere valent, furiosæ fiunt, vaga paralisi brachiorum, crurum, manuum aut digitorum afficiuntur, artuum convulsionibus, oculorum etiam, capitis aut trunci vexantur, ut interdum antè, aut postè se flectant, aut directo positu convellantur, tandem involuntarias fundunt lacrimas, aut citra rationem rident.

Vita-

(c) Ab-aaam Cyprianus Anatom. & Chirurg. Professor in Academ. Ferneckeriana illud refert in sua dissertatione, quæ sic inscribitur. *Epistola historiam exhibens foetus humani post 21. menses ex utero sub matre salva ac superstite, excisi, ad Thomam Millington, Equitem auratum, Medicum regium ordinarii, & Collegii Medicorum Londinensium Præsidentem. Lugd. Batav. 1700. in 8.*

Vitalium vero functionum respectu deliquiis, & lipothymiis tunc temporis laborant ægræ, inordinate cor, & pulsi contrahuntur, respiratio pariter variat; interdum vero tum respiratio, cum cordis & arteriarum pulsi de repente abeunt.

Tandem quoad naturales functiones attinet, huiusmodi paroxismos plerumque comitantur singultus, cardiaglia, nausea, vomitus, & imi ventris borborygmi præsertim.

Præterquamquod conqueruntur ægræ de eccessivo æstu, quo per omnem corporis ambitum cruciantur ut culcitas aut vestes omnes removeant, huic tamen scœnomeno universalis horror plerumque succedit; conqueruntur pariter de renum, coccygis, coxarum aut lateris dolore, qui si caput aggrediatur, circumscriptam præsertim partem, ipse *ovum hystericum*, aut *clavus hystericus* solet nuncupari; huiusmodi dolores pulsatiles sunt, aut tensiles, utrumque tamen simul plerumque; modo vero frontem, tempora, aut occiput, modo verticem capitis occupant.

Facile vero est ea symptomata quamvis innumera non omnia uno eodemque tempore eandem vexare ægotam, sed diverso tempore, aut in diversis subjectis omnia interdum evenire, ut huius morbi partem constituent.

Inter ea diversa symptomata, quatuor præcipua sunt, quæ in omni hystericæ passionis aggressu conspici solent, etiamsi diverso gradu, ut pathognomonica appellari mereantur; certum enim est,

1. Constanter morbum incipere ab aliqua obtusa impressione, aut latitante uteri subsultu, quem ægræ fati perferunt.

2. Id consequi præfocationem quamdam a qua jugulari sibi suadent ægotantes.

3. Toracem quasi circulo ferreo versus costulas spurias circumcingi.

4. Tandem ad abdomen quod attinet ægras globulum fluctuantem perferire, quæ hic illuc per imum ventrem se transfert; modo major, aut exiguus modo durus, aut mollis apparet.

Tres distinguuntur hystericismi status, *primus* quatuor indicata symptomata etiamsi leviora complectitur, at ratio, sensus, respiratio, & cordis pulsus persistunt, vel parum perturbantur; huiusmodi gradus magis obvius est.

Secundus status præter ea pathognomonica symptomata, quæ sevimora fiunt, tum rationem cum sensum egrè amittunt, ac omnes corporis partes convulsivis subsultibus convelluntur; respiratio tamen, & pulsi etiamsi debiles subsistunt, inæquales tamen valde plerumque fiunt; hic est secundus morbi gradus, rarior tamen.

Tandem *tertius* morbi status adest quando partium motus penitus abeunt, respiratio ipsa, & pulsi pene evanescunt, egrè immobiles fiunt, frigescent, sensum, rationem amittunt, & respiratio, aut cordis contractio deficiunt, uno verbo perfecte cadaver æmulantur: huiusmodi teterrimus status interdum diu perdurat, quandoque ad tertium diem protrahitur, & ita mortem emulatur, ut interdum egrè tumulatæ fuissent ante verum discessum, huiusmodi postremus status ceteris perniciosus est, at secunda fortuna rarissimo invadit.

§. II.

Causæ.

UT rite causas hystericæ passionis fanciamus, necessum erit subsequencia principia ostendere quibus fulciuntur.

I. Hystericus morbus est convulsionis species, id evidens est motuum convulsivorum respectu trunci, aut membrorum; patefcunt pariter colli præfocatio & toracis coarctatio; idem indicat globuli sensus per abdomen fluctuantis, tan-

dem hujusmodi prædicatum ceteris fenomenis convenit, infra fufius explicandis.

II. Hujusmodi convulfiones, aut convulfivi motus, vel mufculos, & mufculares fibras totius corporis infestant; vel membranas, aut tendineas fibrillas. In primo cafu convulfiones funt, aut motus convulfivi proprie dicti; in fecundo cafu hujusmodi motus nifi crifpationis, aut erethifmi nomen merentur.

III. Omnes hi motus vel ad mufculares fibras, vel ad tendineas pertineant, eque tamen ab uberrimo nimis, & repentino fpirituum animalium *influxu* dependent.

IV. Hujusmodi ubertofus, aut celerrimus nimis influxus; vel ab *diopathica* caufa oriri folet, quæ fpecialiter in cerebro fedem habet, quæque fpiritus animales agitando hic illuc inordinate impellit; vel a *sympathica* caufa originem ducit, quæ etiamfi cerebrum non refpiciat tamen *per confenfum* ipfum concitando fymphathico nempe mecanifmo fimilem fpirituum influxum gignit. Igitur alterutram earum caufarum amplecti debemus, cum nulla alterius generis fuperfit ad morbi explicationem.

V. Certum enim eft in hyfterico morbo minime fufpicari poffe; diopathicas caufas, quæ ea fymptomata producere valeant; etenim dum quiefcere videntur egræ, de repente convulfivi motus fuperveniunt nulla præcedente caufa, quæ cerebrum agitare potis fuiffent, iidem motus ftatim quiefcunt, & in naturali ftatu cerebrum relinquunt, quare minime fufpicari licebit tunc ullam adfuiffe; diopathicam cerebri perturbationem.

VI. Confequitur enim caufam earum commotionum, quæ in hyftericis mulieribus observantur, fymphathicam effe, extra cerebrum videlicet locatam in aliqua corporis parte, ubi fenfationes, aut impreffiones excitantur, quæ fymphathiæ lege valeant illos inordinatos præternaturales motus fufcitare; hac de caufa fi quis digitum comburat, mecanice manum removet, quia ufus involuntariam brachii, & radii contractionem excitat; fimili ratione nicotianæ pugillus naribus appofitus fternutationem excitat, quia pulvis ille fubito mufculos contrahendo toracis repentinam refpirationem producit, quæ fternutatio appellatur.

VII. Nihil magis obvium eft in humano corpore, quam hujusmodi fymphathici fubfultus tum infirmitatis cum fanitatis ftatu. (a) Hyppocrates ipfe idem cognovit cum animadvertat fub iis verbis; *Confluxio una, confpiratio una, confentientia omnia*; agitur enim de caufæ inquisitione, at per longum foret epifodiu, cum ea ad alterum Tractatum pertineat: fat erit enim fœnomena vera effe, totidemque morbi leges fancire, quæ ad optimam Diagnofim, Prognofim, aut medellam instituendam conducant.

VIII. Reliquum enim eft fymphathicam partem determinare, quæ femel excitata hyftericum morbum inducat, & quafi caufa primaria confiderari poffit, feu ut clarius me explicem *focus* appellari; eam enim uterum effe patet.

1. Ab utero igitur morbus incipit, nam ægræ matricem tunc dilatari, aperiri, produci, atque hic illuc per abdomen transferri perfentiunt, atque uno verbo certo quoddam periftaltico motu agitari.

2. Hyfterifmus plerumque prope menftrua, aut iis definentibus aggredi folet, tum in menfium, lochiorum, aut albi fluoris fuppreffione, quod uterum complectitur.

3. Cum hyftericæ paffionis paroxifmi nunquam defiftant, nifi e vagina latex erumpat plus minusve uberrimus, atque acris, evidens enim eft hujusmodi effluviu nifi cum utero relationem habere.

4. Verum matrimonii ufus qui cum remedium tutiffimum fit adverfus hyftericam

(a) Lib. De alimento.

hystericam affectionem eamque frequenter fanet, ideo cum utero rationem & ipse habere constat.

5. Tandem observationibus fancitum est hanc sympathicam partem uterum esse, nam cadavera disseccando mulierum quæ violentioribus hystericæ passionis insultibus fuerunt obnoxia, ovarii, tubarum, aut uteri vitium aliquod constanter reperitur.

IX. Semel statuta parte, quæ focus morbi appellari poterit, reliquum est naturam impressionum fancire, quæ sympathiæ legibus omnes ceteras corporis partes in paroxismo in motum ciet; ab effectibus judicando, illæ impressiones validissimæ erunt, at *ex una* parte experientia contrarium suadet, nam etsi ægræ aliquam commotionem in utero persentiant, ut supra admonuimus, minime tamen de vividiori dolore conqueruntur, quo neque in violentiori morbi statu nedum cruciantur; *ex altera* vero parte crebre evenit uterum maximo dolore, inflammatione, ulcere, aut cancro vexari citra ullum hystericæ passionis indicium; statuendum enim erit hujusmodi impressionem, quæ hysterismum producit leviolem esse, speciemque titilationis, aut crispationis in utero excitare, aut propinquis partibus, quibus adhæret.

X. Non immerito autumabimus levem hujusmodi impressionem imparem esse tot scenomena suscitare quæ in hystericis mulieribus observantur, contrarium tamen experientia evincit, nam unica aquæ guttula in tracheam irrumpens, violentissimam tussim movet; vinum emeticum, quod nullam impressionem linguæ aut oculorum albuginæ affert, stomachum ita commovet, ut eam contractionem gignat, quæ vomitum excitare potis est; tandem lucis radii, qui minime retinam laceffunt, pituitariam membranam convellunt, atque sternutationem movent.

XI. Frequenter hujusmodi etsi levissima commotio vividiores effectus præstat quam fortiores impressiones; hac de causa vomitus qui ab aceto non suscitatur ab oleo, aut aqua repenti inducitur; pariter leviora circa axillas titilamenta grandiores contorsiones movent, quam vivissimus dolor; denique debilis nicotianæ stimulus sternutationem facit, quam vehementior narium irritatio impar erat concitare.

Iis explicitis fanciendum erit, subsequentes impressiones potissimas esse hystericum morbum concitare, cum symptomatis omnibus concomitantibus, eoque animosius cum ea confirmet constans experientia; inter causas enim hystericæ passionis recenseri debent.

1. Pulsu arteriarum uteri vividiores, præsertim cum vasa sanguine turgeant ut in approximatione, cessatione, vel suppressione mensium, aut lochiorum.

2. Tensio atque intumescencia vasorum lacteorum uteri, quando lochia, aut lactei albi fluores de repente supprimuntur, dum uberius fluebant.

3. Irritamentum acris humoris, qui in uterum irrumpens in ejusdem cavitate colligitur, dum albi fluoris ferofi, aut acris effluvium persistit, vel ulcere uterus fœdatur.

4. Intumescencia, quæ ovaria, aut tubas lædit in diversis morbis, quibus sunt hujusmodi partes obnoxia in (b) abortu, nempe hydatidibus, hydrope, steatomate, syrrho, aut abscessu.

S 4

5. Tan-

(a) Veteres Medici animadverterunt tumores ovarii hystericam passionem inducere, at decepti sunt nomine quo hujusmodi partes tunc insignitæ erant, & usu, quem iis tribuebant; autumabant enim hujusmodi tumores collectiones esse spermatici humoris corrupti, quod complectitur in communi classe causarum hujusmodi morbi. Vide circa hoc Jean-Nicolas Binnigerus *Observat. Cent. II. Observat. 90.* Isbrandus Diemerbroeck. *Anatom. Lib. I. Cap. 13.* Andr. Vesal. *de human. corp. fabrica Lib. V. Cap. 15.* Lazar. River. *Observat. Cent. I. Observat. 60.* Qthon Heurnius. *Histor. 16. in fine Operum Fernelii editio Utrecht. in 4. an. 1656.*

5. Tandem titilatio, quam excitat spermaticus, uberrimus vel acris latex in mulieribus vividiori, atque luxurioso temperamento donatis, quæ invite abstinentur.

XIII. Nihilo fecius fateri debemus hujusmodi explicationem maximam difficultatem contendere, videlicet omnes expositas causas, quibus hystericus morbus tribuitur constantes esse, idcirco impares, involuntarios, & repentinos, atque variabiles motus excitare, qui in hujus morbi aggressu conspici solent.

XIV. At modo paullisper cunctemur, duplicem subsequenter animadversionem perscrutando omnis evanuerit difficultas.

Primo, indicatas causas nuper fancitas in utero posse, atque debere positum immutare, ut diversa puncta matricis peragrandosympathicas affinitates cum ceteris partibus valeant mutare; idcirco unica causa dum ventriculi fundum infestat, vomitum excitat, deliquium vero inducit, modo superiorem ventriculi orificium afficiat.

Secundo, animadvertendum est eas causas numquam unam vim præferre, ut minima gradus mutatio potis sit sympathicos consensus immutare; hac de causa certa quædam narium irritatio sternutationem movet, quam validior impar erat suscitare.

Infra apparebit ubi symptomata explicabimus quæ caput respiciunt, diversas alias adesse causas, quæ hanc varietatem motuum hystericorum inducere poterunt.

XV. Cause, quæ adhuc enunciavimus, non æque omnes mulieres una vi lædunt; experientia enim ostendit magis periclitari

1. Mulieresemaciatas, graciles, temperamento melancolico, aut atrabiliari donatas, quia in illis nervi uteri, atque totius corporis tensi magis vibratiles sunt, ac magis dispositi minima de causa ad vividiores commotionem suscipiendam.

2. Hinc illas, quæ graciliori temperamento, aut cachetica constitutione præditæ sunt, nam in iis humores vitiantur, uterum parum sui elaterii retinet, ut irrupentes latices copiosius congerantur, & aciores fiant, tum ipsæ continenti albo fluore laborent.

3. Mulieres deinde, quæ vigilis defatigantur, aut alimentorum sapidorum assumptione usu, Coffe, aut liquorum spirituosorum calefaciuntur, in quibus uterus valde calet, & quasi phlogosi continuo laborat, quod nervorum maximam tensionem, & sensibilitatem facit.

4. Tandem illas, quæ luxuria flagrant, eamque venustulorum consuetudine aut lecturis excitant, vel continua amati obiecti cogitatione vexantur, quod secretionem, & virtutem spermatis auget.

XVI. Itaque reliquum erit tantum causas recognoscere, quæ hystericos paroxismos suscitant, vel ipsos sistunt, quam ob rem sat erit animadvertere duplicem hystericus morbi speciem; altera a congerie dependet vitiatorum humorum, qui in utero, aut vasis spermaticis coarcevantur; altera a turgentia vasorum sanguineorum originem ducit per uterum, aut ovaria reptantium.

1. In priori enim morbi specie hystericus insultus numquam superveniunt nisi deturpati humores certa quadam copia congerantur, vel certum activitatis gradum adepti sint; neque abeunt hystericismi symptomata, nisi hujusmodi humores per uterum expellantur, quod sæpissime evenit.

2. Ad alteram morbi speciem quod attinet paroxismi numquam aggrediuntur, nisi quando multiplici de causa vasorum sanguineorum infartus certum quemdam gradum adeptus sit; numquam vero ipsi desinunt, nisi violentiores uteri contractiones detentum sanguinem respuerint, quo vasa turgebant.

3. Consequitur ex iis quod in priori morbi specie paroxismi cessatio celerius

rius tutiusque quam in altera specie fieri debeat, ut & experientia ostendit; in primo casu enim hysterici insultus de repente abeunt, & ægræ naturalem statum fanitatis perfecte recuperant; in altero vero casu serius paroxysmi desistunt, ut ægræ diu periclitari videantur.

4. In utraque vero hysterica passionis specie paroxysmorum finem prænunciant oscitationes plus minusve crebre, aut grandiores pro diversa morbi diuturnitate, aut vehementia, qua persistente paroxysmo respiratio læsa fuerit, & pulmo sanguine infartus; idcirco modo revertat sensus oscitationes necessario excitabuntur, quæ vesiculas pulmonales explicando sanguinem infarciem expiment, quod sanguinis quantitati, & diuturnitati, aut paroxysmi vehementiæ respondere debet; hac de causa in aggreffu febrium intermittentium ægræ pandiculationibus sunt obnoxia, quibus exprimitur sanguis, qui spissitudinis ergo in pluribus partibus cumulabatur, atque ita invite concitantur ægræ ab obtusis impressionibus, quas sanguis eas partes infarciendo inducerat.

§. III.

Symptomata.

Veteres medici in unum conveniebant fœnomena omnia, quæ in hystericis mulieribus observabantur, a spermatico humore derivare in utero corrupto, qui in vapores sublimatus diversas corporis partes invadebat, & sui deleteriæ indolis ergo symptomata illa in hoc morbo magis obvia suscitabat: hodie tamen hujusmodi sententiæ futilitate certiores facti sunt, eamque prorsus contemnunt.

Huic opinioni substituimus sympathicam uteri cum ceteris corporis partibus affinitatem, quam neminem latet.

Neque aliam superesse viam ea fœnomena explicandi putamus, omnemque hac ratione difficultatem tolli posse censemus, ut infra pro viribus demonstrare tentabimus.

Mirabuntur fortasse nonnulli de multiplici affinitate, quam utero tribuimus, at animadvertendum est hanc partem ceteris sensibiliorem esse ut omnes medici defendunt, eique nullam nos speciatim relationem tribuere, quæ effectibus, atque observationibus non fulciatur.

Cum numerosissima sint fœnomena in hysterica passione obvia, quæ hic explicationem postulant, ideoque ipsa in quinque distinctos Articulos explicabimus, sunt enim

I. Quatuor symptomata hysterica passionis pathognomonica. II. Ea quæ abdomen respiciunt. III. Quæ pulmonem afficiunt. IV. Quæ caput aggrediuntur. V. Tandem quæ corpus universaliter infestant.

I. *Quatuor symptomata hysterica passionis pathognomonica.*

1. Primæ impressiones, quæ in utero fiunt, aut propinquis partibus debiles sunt, neque alium sympaticum reflexum animalium spirituum inducunt, quam in muscularibus uteri ipsius fibrillis quarum alterutræ sese contrahendo varias commotiones excitant; modo enim uterus producit, aut abbreviatur, modo destrorsum, aut sinistrorsum se transfert, prout fibræ longitudinales, circulares, aut illæ alterius lateris convelluntur; interdum coarctatur, atque occluditur uterus, tum ejusdem fibræ una constringuntur omnes.

2. Dum impressiones illæ in utero augentur spirituum tunc refluxus musculos Laringis, Pharingis, Ossis Hyodis, atque linguæ quandoque adoritur, ut jugulari videantur ægræ, quæ interdum balbutiunt.

3. Re-

3. Refluxus ille sympathicus quandoque musculares fibras diaphragmatis invadit, quæ sese coarctando fortiter introrsum trahunt costulas spurias, ut difficilem respirationem inducant, & quasi chalybeo circulo ægræ vinci credant.

4. Eodemque tempore simili de causa intestinorum fibræ musculares constringuntur; contractio enim longitudinalium fibrarum intestina abbreviat, & in glomum quasi congerunt circulares; vero intestina coarctando flatus retinet, qui inordinate volumen intestinorum augent, atque globuli illius sensum inducunt per abdomen fluctuantis, quem veteres medici pro utero ipso habuerunt, quasi adhæSIONES matricis hujusmodi commotiones sinere possent.

II. *Symptomata quæ inum ventrem respiciunt.*

1. Cum plerumque in hysterici morbi statu menstruum cessatio, aut suppressio adsint, nil mirum enim est symptomata tunc apparere, quæ eos morbos solent comitari, qualia sunt imminutus, atque depravatus gustus, qui sub nomine *Picæ*, aut *Malaciæ* cognoscitur, incompleta digestio, eructatio, tormina, aut borborygmi &c. at hic frustraneum videtur ea fusius explicare, sat erit pervolvere quæ *Lib. I. Cap. IV. & VIII.* enunciata sunt cum de mensium suppressione, chlorosi, aut pallore differuimus.

2. Ventris constipationes, quæ hystericas mulieres perturbant ab incompleta digestionem oriri possunt, at plerumque in paroxismo a recti aut sphyncteris contractione seimus derivare, refluxus sympathici ergo.

3. Eidem causæ urinæ suppressio tribuitur in paroxismi statu superveniens; eam enim convulsiva crispatio inducit sphyncteris vesicæ ab illo refluxu sympathico excitata.

4. Circa paroxismi finem lymphaticum effluvium stillat mucosum, album, fuscum ac cruentum interdum. Convulsiva constrictio uteri hujusmodi humorem a vasis lacteis, aut glandulosis mucosis exprimit, quibus interna uteri facies scattet, aut latex ille a lacunis erumpit ibi innumeris. Albus enim apparet si ipsum vasa vermicularia effundant; fuscus vero si glandulæ mucosæ, aut lacunæ illum suppeditent; cruentus vero apparet si contractiones uteri irregulares vasorum Capillarium nonnulla discerpant, aut ab extremitatibus appendicum venosarum aliquas sanguinis guttas exprimant.

5. In Paroxysmorum statu pauca quam excernuntur urina clara est, & aquam emulatur; nam renium contextus compactus, & crispatus transitum impedit lotii per secretorios ductus, excretionem tantum tenuioris, & serosæ magis sanguinis partis permittendo.

6. At in paroxysmorum fine ægræ copiosiores urinas effundunt spissiores, atque turbidas. Uberiores enim apparent, tum quia renium contextus minime crispatus earum uberrimum effluvium finit, tum quia facilius ex vesica erumpunt laxati jam sphyncteris ergo; spissiores vero & turbidæ interdum apparent, tum quia in renibus crassiores cruoris moleculæ uberius separantur, cum humoris mucosi ergo qui tunc uterus suppeditat, & urinæ permiscetur.

7. Nauseæ, vomitus, deliquia quæ in hysterica passione frequenter superveniunt interdum a collectione proveniunt fordium, quæ deleteriæ digestionis ergo in ventriculo colligantur, quæque fundum, aut orificium succutiendo ea scenomena inducunt; crebrius tamen ea producit sympathicus refluxus, qui varias commotiones in iis partibus excitat.

III. *Symptomata quæ pulmonem ledunt.*

1. Præfocatio consequens necessarium videtur convulsivæ crispationis laringis, quæ aeris ingressum impedit, tum contractionis convulsivæ diaphragmatis; quæ dilatationi thoracis officit: hujusmodi duæ causæ admodum variabiles sunt, interdum enim suffocatio continens est, interdum per intervalla recurrit, modo respiratio etiam si læsa aliquo tamen modo persistit, interdum cum stertore, sibilo aut ululatu perficitur.

2. Cordis palpitatio ab anomala muscularium fibrarum contractione Principis muscoli dependet, hujusmodi inæqualitas ab inordinato refluxu procedit sympathico uteri, ea de causa varietates omnes apparent in motu cordis, atque arteriarum obviæ, & hysterico morbo propriæ; modo enim pulsi debiles sunt, modo validiores, modo segnes, modo præcipites, quando rari, quando frequentes at plerumque duri, constricti reperiuntur, crispationis tunicarum arteriarum ergo, quam sympathicus ille refluxus induxerat.

3. Pulsi interdum intermittentes fiunt quando cordis motus & ipse intermitat, quod evenit quotiescumque refluxus per intervalla recurrat fibrasque cordis laceffat.

4. Frequenter in seſſioribus hysterice passionis paroxysmis neque cordis motum neque respirationem animadvertimus, non quia penitus abeant ut Galenus autumabat, quod mors ipsa esset, sed quia debiliter valde hujusmodi motus exequuntur maxime tonicæ contractionis ergo, fibrarum cordis, muscutorum laringis, & diaphragmatis, ut vis conspici queat; nihilo tamen minus etiam si imbecilliter tamen ii motus fiunt, quod sufficit ut etiam si segnis aliqua tamen persistat sanguinis circulatio per pulmones, atque reliquum corpus ut vita supersit.

IV. *Symptomata quæ caput afficiunt.*

Explicatio scœnomenorum, quæ ad hunc articulum pertinent, novas sympathicas affinitates uteri supponit; dura mater sympathicis constrictionibus succutitur, hujusmodi contractio, quæ ab utero procedit non una est per omnem meningis ambitum, sed ea diversimode variare solet; ipsa meningis itaque sese constringendo substantiam cerebri premit, idcirco ex una parte exprimit animales spiritus in propinquos nervos, ex altera fibrillas distendit. Spiritus illi dum nervos intrant convulsiones, aut motus convulsivos excitant partium earum per quas pereptant; cerebri vero fibræ ita distensæ impares evadunt impressiones recipere sensuum externorum, quare rationem ægrè & sensum amittunt, eademque de causa fibrillæ illæ tonum mutant, ut plures quæ consonæ erant disonæ evadant, & aliæ quæ disonæ apparebant consonæ fiant, quod judicium plerumque rerum pervertit, & varias delirii species inducit.

Optimum consilium foret hic singillatim unamquamque hypothesim perscrutari, at hujusmodi perquisitio diutina nimis experiretur, & trans institutum nostrum abiret; fat erit enim fateri eas hypotheses possibiles esse omnes & rationi consonas; autumo enim earum hypothesium existentiam vel saltem necessitatem ostendere posse in futuro opere, quod publicis juris facere brevi sancivi, sub titulo *Animastica* quæ est mechanica functionum animalium quoad corpus pertinent; in præsentiarum sufficiet quod eos quasi totidem *postulata* mihi concedant, quæ symptomatum explicationi caput respicientium magnopere favent.

1. Etenim ægrè identidem rationem sensumque amittunt, quod raro vel crebrius plus minusve persistit, ac pro diversis circumstantiis magis vel minus ægras

gras vexat ; interdum morbi aggressu etiam si sensu careant , audiunt tamen , vident at loquela orbatæ signis se exprimunt ; tandem si morbus increseat , penitus sensus , atque ratio demuntur , atque patientes profundi lethargi specie laborant .

In iis in quibus cerebrum nullo labefactatur morbo , ea phenomena nisi a sympathico spirituum refluxu , quem uterus gignit , derivare possunt . Dura mater ea de causa contracta cerebrum comprimendo fibrasque distendendo hasce impares reddit impressionibus spirituum in cerebro latitantium , vel commotionibus eorum , qui ab externis sensibus procedunt .

Interdum omnis cerebri superficies a menynge æque comprimitur , & tunc sensuum amissio totalis fit ; interdum compressio partialis est , neque origines parium ophthalmicorum aut acusticorum lædit , ut visus , atque auditus aliqua ratione supersint , etiam si in paroxismo nequeant id ostendere .

Hujusmodi accidentia crebrius vel ferius revertunt , plus minusve diutina , aut sæva apparent pro repetitis duræ matris contractionibus , plus minusve diuturnis , aut intensis .

Tandem phenomena illa in absolutam & totalem tum rationis cum sensus abolitionem degenerant , modo Menyngis constrictio maxima fiat & universalis usque dum de repente dura mater resoluta statim ratio sensusque revertunt .

2. In hoc statu ægræ frequenter delirio corripiuntur plus minusve universali aut infenso . Id evenit quando cerebri fibræ distensæ tonum crebre immutant , quoad affinitates quas invicem habent , quod inter eas consonantias novasque dissonantias anomalas gignit , idcirco iudicium pervertitur , & delirium supervenit plus minusve intensum aut universale pro diversa majori , vel minori fibrarum succussione , aut spirituum animalium in cerebro agitatione .

3. Tunc sæpe accidit ægras tonica convulsione corripi , quæ *Tetanos* appellatur , corpus in hoc morbo rigidum fit , dentes constringuntur , oculi immobiles persistunt , membra indurescunt , quod ab influxu procedit spirituum animalium , qui sympathici refluxus ergo aut tonicæ menyngis contractionis in eosdem musculos continenter irrumpunt .

4. Quandoque ægræ vividioribus convulsivis motibus agitantur , modo enim truncum antèr flexunt , modo posterius , quare eæ convulsiones modo *Emprothotonos* , modo *Opisthotonos* appellantur ; caput agitant artusque succutiunt ægræ , ululatus emittunt , quos motus convulsivi musculorum respirationis excitant ; evidens enim est hujusmodi commotiones nedum variare posse nisi spirituum animalium influxus , qui ipsas producant , & ipsi varient : itaque hæc influxus diversitas nisi triplici de causa oriri potest , vel a gradu aut positu impressionum quæ in utero fiunt ; vel a menyngis contractione , quæ in diversis ejusdem partibus fit ; tandem a pulsu vario arteriarum , qui in diversis cerebri partibus varios effectus producit .

5. In hysterica passionis ingressu interdum ægræ sine causa manifesta lacrymas copiose effundunt , contra vero invite interdum rident ; tandem , quandoque in eodem paroxismo risus lacrymis , & lacrymæ risui succedunt , de quo valde mirantur , quibus primum id observare contingit .

Certum enim est hujusmodi commotiones neque liberas esse , neque præceptas ; igitur consequitur convulsivas esse , & ea quæ adhuc ostendimus satis declarant a sympathicis affinitatibus pendere , quæ intra uterum , & organa habentur ; modo enim membranæ , quæ lacrymales glandulas cooperiunt , aut tendineæ , filamenta , quæ illas vinciunt crispantur , & lacrymas uberrimas exprimunt , quibus oculi madent , dum eadem de causa ceteræ partes convelluntur ; modo muscoli zigomatici ceterique ad labiorum motum destinati convulsione abrepti risum inconcinne movent ; tandem motus ii risus nempe lacrymæ invicem succedunt

cedunt prout in utero impressiones variant relate ad intensitatem, aut sedem earum.

6. Tandem hystericæ mulieres sæpissime acutiori dolori sunt obnoxia, qui aliquam capitis externam partem lædit, frontem nempe, aut tempora, vel occiput; prout dolor plus minusve extenditur morbus *ovum hystericum*, aut *clavus hystericus* appellatur.

Procul dubio nuper descripta symptomata a convulsiva crispatione pericranii affectæ partis originem ducunt, ea vero constrictio sympathicæ uteri affinitati tribuitur, tum dolor incipit, atque desinit prout morbi aggressus perdurat, isque paroxysmi sævitati respondet.

V. Symptomata quæ totum corpus respiciunt.

Explicatio posterioris symptomatis in articulo præcedenti nuper indicati ostendit sympathicam uteri affinitatem fibras tendineas etiam invadere, & convulsivas crispationes inducere, quæ pro diversa partium natura diversos effectus gignunt; symptomata, quæ externum corporis habitum afficiunt infra enuncian- da hanc veritatem magis patefacient.

1. In hystérico morbo urentem quemdam æstum ægræ perferunt, qui vultus, atque caput de repente inflamat, & rubicundum facit; conqueruntur ipsæ de excessivo calore, qui sudorem promovet, & culcitas remove cogit; paullo post pallor, frigus atque horror succedunt, quæ pluries intra horæ spatium invicem eveniunt.

Facile est cognoscere priorem morbi gradum a convulsiva constrictione tuni- carum procedere, quæ per extrinsecam capitis faciem repunt, ut redux sanguis retardatus ruborem, calorem, atque sudorem inducat; alter gradus crispationis tunicas arteriarum afficit per easdem partes reptantium, quod influxum impe- dit sanguinis, & pallorem, frigus, atque rigorem producit; tandem hæc alter- natim evenient in eo duplici morbi statu pro variationibus affinitatum sympa- thicarum, quæ animales spiritus modo in venarum tunicas, modo arteriarum inconcinne impellunt.

2. Crebre accidit in hystericæ passionis aggressu pulsum abire in alterutro brachio, quod frigidum, & stupidum fit, cum manus pallore, unguium præsertim, ut ægræ artum emortuum credant; paullo post brachium ad naturalem statum revertit, eademque scœnomena alterum artum investit; observavi interdum hac mole- stia unus vel alter simul digitorum tantum affici, quod ægræ paralysem vocant; at hujusmodi spuria paralypsis incompleta, & momentanea est cum motus at- que sensus persistant etiamsi imbecilles.

Evidens enim est ea scœnomena omnia a convulsiva crispatione brachialis ar- teriæ derivare, quæ lumen coarctando copiam sanguinis imminuit, qui bra- chium irroraret; ex eo imminuitur, atque intercipitur pulsus, artus obstupefcit, frigescit, manus vero atque ungues pallefcunt; hujusmodi crispatio in affecta parte tamen cito desinit, alterumque brachium infestat eadem scœnomena pro- ducendo, quæ pluries alternatim succedunt pro diversis impressionibus, quæ in utero fiunt, quæ sunt variabiles, occasionales causæ hujusmodi contractionis.

§. IV.

Diagnosis.

I. **H**Ystericus morbus prioris & secundi gradus facile cognoscitur; plerumque antequam medicum poscant ægræ plures paroxysmi reverterunt, de cetero facile morbus cognosci poterit naturam exacerbationum perpendendo, qui invicem æmulantur, & tutius quatuor pathognomonica symptomata observando, qualia sunt, uteri commotio, gutturis suffocatio, toracis coarctatio, & per abdomen fluctuans globulus, quæ, etiamsi diverso gradu, in unoquoque tamen morbi aggressu se ostendunt.

Nihilo tamen minus animadvertendum est citius quam fieri potest veram morbi ideam nos sancire debere, nam plerumque ægræ vapores hystericos appellare consueverunt, omnes molestias aut succussiones quas persentiunt, omnesque prævæ digestionis effectus, aut languores vel consumptiones quibus tunc temporis ipsæ fiunt obnoxia; præsertim enim sedulo perscrutari debemus ne vapores hystericos mulieribus proprios, quos pathognomonica signa comitantur cum hyppocondriaco vapore confundamus, qui tum mulieribus cum hominibus communis est, neque pathognomonica illa symptomata concomitantia habet.

Semel cognita ægritudinis indole, causam affecti uteri detegere oportebit, quæ morbum produxerat, quod tum ad rectam prognosim, cum curationem instituendam potissimum conducit, si paroxysmi prompte, & perfecte desistant, id evincitur humoris cujusdam effluvio glanuloso, aut mensium eruptione; si per intervalla morbus recurrat, nullo superveniente nocuo hystérico vapore, conjecturari licebit a solo spermatico humore diu in utero retento, aut acriori humore, vel mensium suppressione morbum derivare; contra vero vitium persistens suspicari licebit ovaria deturpans, tubas, aut uteri corpus, quando paroxysmi segniter desinant, vel citra effluviū, aut mensium eruptionem, desistant persistente vaporosa commotione pene continenti intra duos paroxysmos.

Morbi magnitudinis respectu eam patescit frequentia, aut perduratione paroxysmorum, vel illam ostendunt numerus, & violentia symptomatum conmitantium, de quibus facile est oculis certiores fieri.

II. Maxima difficultas quæ in hoc morbo diagnosim respicit ad tertium gradum attinet, quando ægræ rationem, sensum atque motum, verum quod deterius est respirationem, atque pulsum amittunt, ut affidentes magnopere perturbentur, neve satis distinguere valeant vapores hystericos a syncope, appoplexia, epylepsia, aut ipso discessu.

In hoc casu duo animadverti debent, quæ haud leve lumen præbere possunt; primum hujusmodi sævissimus morbi status supponit plures præcedentes paroxysmos qui morbi indolem satis declaraverint; verum si hujusmodi morbi aggressus hystericus sint, ab initio quatuor symptomata pathognomonica apparebunt; complexus enim ambarum harum observationum tutum satis judicium afferre præstaverint.

Nihilo tamen fecius sanum erit consilium perscrutari, quæ in nostro casu diagnosim declarare magis poterunt.

I. Vapores hystericus a syncope distinguere facile erit quia in hystérico morbo pulsi citius, & facilius quam in syncope abeunt, nulla enim datur sincops modo mortem ipsam non inferat, in qua cordis pulsationes perfecte desinant, ut in hystérico vapore accidere solet.

Verum pulsum cessatio diuturnior est in hystérico vapore quam in syncope; hæc

hæc enim trans horam plerumque non perdurat, at vapores hysterici tertiæ speciei per integros dies persistunt, ut haud facile sit ipsos cum syncope confundere.

In syncope nulla abdominis fluctuatio perſentitur; in hysterico tamen vapore modo maximus non sit plerumque circa uteri regionem succutio quadam apparet, quæ melius cognoscitur vaginam digitis examinando.

2. Distingui enim facilius possunt hysterici vapores tertiæ speciei ab appoplexiæ aggressu ex eo quod appoplexiam numquam præcedant symptomata hysterica passionis pathognomonica, quæ eam tuto prænunciant.

Verum in appoplecticis pulsus atque respiratio nedum abeunt; in hysterismo tamen pene desistunt, modo tertii gradus experiatur.

In appoplexia nulla convulsiva commotio tum imi ventris cum uteri supervenit; in hysterico tamen vapore illa conspicitur, modo paroxysmus extreme seviſſimus appareat.

3. Vapores hysterici tertiæ speciei ab epylepsia simili ratione distinguitur, nam vapores propria signa indicant, quæ in epylepsia desunt.

Etenim respiratio, & pulsi in hysterismo cessant, & in epylepsia persistunt.

In hysterismo etiamſi ad summum gradum pertingat, convulsivæ succussiones imi ventris, uteri præſertim, conſpiciuntur, quæ numquam in epylepticis observantur.

Tandem in epylepsia ægræ spumam ex ore fundunt, quod raro vel nunquam quam etiam in sæviori hysterismi gradu apparet; nam respiratio pene aboletur & aer expressus a saliva foveri nequit, ut spuma oriatur, quod in epylepticis evenit, quia respiratio stertorosa fit, atque vehemens.

Vos tamen admonere cenſeo medicorum nonnullos huiusmodi morbum *Epylepsiam uterinam*, aut *hystericam* vocasse, quando præſertim ægræ convulsionibus abreptæ rationem amittunt; idcirco huic denominationi etiamſi impropria erit indulgendum, modo animadvertamus sympathicam epylepsiam tantum esse, a vero morbo Herculeo procul diversam.

4. Interdum proximorum vehementia intenditur ita ut functiones penitus ferre aboliantur; in hoc casu non ab Apoplexia, aut Epylepsia morbus distingui debet, sed a Morte ipsa quam æmulantur; nam si quibusdam observationibus fidendum sit satis docti medici decepti sunt viventes mulieres tumulando, quas obitas crediderunt; tunc inquirendum est an nulla respiratio superſit, nam quantumvis exigua apparuerit, ægram adhuc inter vivos esse fateberis.

Hac de causa ori opponuntur levissimi goſipii flocculi qui indicabunt ne ullum reliquum sit respirationis signum; speculum quandoque applicant, quem per quam minima exspiratio adumbrabit; vel supra toracem cyathum ponunt aqua repletum, quæ costularum minimo de motu effunditur.

Verum iis signis nondum fident, membra perquirunt, ne flexibilia sint, oculos aperiunt inspiciuntque si specie quadam araneorum telæ cornea obducatur, quæ mortem prænunciaret; pedes denique ignito ferro comburunt, ut doloris intensitas succutiat morientem; tandem cantharidum emplaſtrum coxis, aut cruribus applicant, quod si vesiculas elevet adhuc ægram vitam gerere indicat, & contra si nulla appareat vesica; at etiamſi signa omnia mortem una prænunciant nedum sollicitos esse debemus ut cadaver tumuletur, cunctando usque dum appareant putrefactionis indicia, secus enim facile erit nos poenitere præcipites fuisse nimis tumulum precipiendo viventis creaturæ.

§. V.

Prognosis.

HYstericæ passionis Prognosis duo præsertim complectitur an ne sanabilis morbus sit, verum ne periculum maximum conjunctum habeat.

I. Primum postulat nonnullas distinctiones antequam de eo nihil certi faciamus.

1. Etenim facile sanatur hystericus morbus modo a sola suppressione aut cessatione mensium, vel lochiorum procedat, vel ab acriori retento spermatico humore.

2. Ei difficilius medetur si a continenti albo fluore dependeat, qui uteri internam superficiem lædat, cujus effluvium difficulter sistitur, & anomaliis quamplurimis est obnoxius.

3. Minime convalescit morbus dummodo pro causa recognoscat tumorem aut vitium alterutrius ovarii, vel tubarum, vel uteri ulcus.

4. Numquam pene sanitatem recuperant senescentes mulieres, cacheticæ male affectæ, in quibus uteri labes sanguinis aut lymphæ vitio confirmatur.

5. Generice hujusmodi morbus inter pertinaciores ægritudines, & curatu difficiliore recenseri debet, qui minima de causa redintegratur dum proximam valetudinem speramus.

II. Ad secundum quod attinet distinguendum est periculum paroxysmorum a periculo totius ægritudinis complexim sumptæ.

1. Nihil est timendum in peculiari morbi aggressu modo respiratio, & cordis pulsus etiam si imbeciliter persistant, periculum enim respicit earum functionum læsionem, nam etiam si plerumque naturalem statum recuperent observationes tamen docuerunt ægras interdum succubisse, præsertim cum respiratio & cordis motus penitus intercipientur, atque syncopes lethalis fiat.

2. Ægritudinis respectu in se sumptæ etiam si pertinacissima experiatur, raro tamen maximum periculum conjunctum habet, præsertim si a suppressione aut cessatione catameniorum, aut lochiorum dependeat, vel a collecto spermatico latice.

Attamen periculosa maxime evadit quando ab albo fluore habituali procedat, qui irritet, laniet, aut rodat uteri internam faciem, ut morbus crebre in ulcus simplex vel carcinomatofum uteri degeneret; periculosa pariter experitur modo pro causa tumorem, abscessum ovariorum, aut tubarum recognoscat, in hoc casu plerumque abscessum aut hydropem abdominis inducit, & in lentam febrem marasimum, aut consumptionem definit.

§. VI.

Curatio.

IN duplici casu medici erit hystericum morbum pertractare, vel in paroxismo quando insultum violentiam moderare, & persistentiam imminuere tantum fas erit, vel extra paroxysmum quando regressus præoccupare, seu melius causam morbi oppugnare convenerit quantum fieri poterit.

Cum ii status procul diversi sint tum propositi objecti respectu, cum methodi medendi, ideoque in duplici distincto articulo eos extricare oportebit, quibus tertium superaddam, qui specifica adversus hunc morbum remedia ostendet.

Medendi ratio intra paroxysmum.

Ut indicationes impleamus in paroxismo proponendas tria remediorum genera impendi debent.

1. Ea videlicet remedia, quæ diversas partes laxare, atque extendere valent convulsionis ergo contractas.

2. Quæ sanguinis circulum sequebamur aut interceptum promovent in diversis partibus crispatis.

3. Quæ vividius succutiunt organa externa, rapidumque cerebrum versus spirituum refluxum excitant qui sympathico refluxui obsistit ab utero procedenti, vaporum hystericorum causa.

Quod nos maxime implicat in iis rebus peragendis farrago potius est propositorum remediorum quam inopia; generice enim, quæ infra proponemus præcipua sunt ad morbi impetum compescendum, atque plures indicationes satisfaciendas, quæ diversa morbi natura postulat.

I. Si hystericæ passionis aggressio levior appareat, & ratio persistat, ægræ poterunt pro libitu magis idoneum positum feligere; at si minime sui compotes videantur, necessum erit ægras lectulo, aut bisellio ita locare, ut caput altius porrigatur, verum vestium solvere, vincula oportebit, cingula omnia removendo quæ thoracem constringere valerent, monilia etiam discerpendo ne collum vulerent inflaturum.

II. Interdum optimum erit coxas per longum fricare vel, leves cucurbitulas in diuturniori paroxismo apponere, vincula tamen membrorum sunt proscribenda quæ olim medici commendabant decepti ab humore deleteriæ indolis, quem sistere autumabant ne caput aggredereetur.

III. Ægræ suscitabuntur prope nares foetentes materies comburendo sale volatili imbutas, quæ valeant validius pituitariam membranam laceßere, hujusmodi sunt Tanix Violaceæ, Plumæ Perdicis, Soleæ detritæ, Succinum flavum, Gagas; vel naribus apponuntur folia rutæ, aut tanacetii; vel quod ceteris præcellet globus admoveatur ex æqualibus partibus confectus stercoris Diaboli Castorei aut Sagapeni.

IV. Sternutatio errhinis promovebitur, huic satisfacit nicotaniæ fumus naribus intromissus, aut ejusdem plantæ pulvis, floribus ephemeris remixtus, vel quod validius agit pulvis compositus ex sinapi, piretro, aut castoreo, interdum nares intus fricantur plumis oleo Ambari imbutis.

V. Deinde ut commoveantur efficacius ægræ proprio nomine elata voce advocantur vel succutiuntur, aut ipsis digiti contorquentur, capilli abraduntur, aut pilli interdum pudendorum.

VI. Clysteria diversi generis tandem usuveniunt primo purgantia ex decoctione confecta foliorum matricariæ, aut artemisiæ, in quibus solvantur tres vel quatuor drachmæ *Hiere-picræ* Galeni, adita etiam uncia, vel uncia una & semis vini emetici saturatoris.

Postquam hujusmodi clysterii ope primas vias expiaverimus hysterica clisma usuvenient ex decoctione

Foliorum Artemisiæ
Matricariæ
Pulegii
Rutæ

} ad manipulum

Seminum Chervi
Cymini

Baccarum Lauri
Fructuum Aristolochiæ

feliguntur pro libitu ex iis duo, vel tria additis uncis duabus olei Rutæ, vel Galbani, aut Assæ-foetidæ drachma, aut drachma una, & semis.

Interdum simpliciora clysteria conveniunt ex semis sextario confecta vini rubri, & duabus, vel tribus uncis olei Rutæ, vel simplici Oxicroto cum tertio aquæ diluto; at animadvertendum est crebre difficillimum esse in mulieribus hystericeis ullam clismatum speciem adhibere, nam contracta intestina illa respiciunt.

VII. Applicatur plerumque umbilico emplastrum ex Galbano paratum, vel Galbano, & Assæ-foetida, aut Gummis, Caranna, & Tacamacha, oleo Succini, aut Tinctura Castorei subactis.

Mulierum pleræque consuecunt in paroxysmi tractatione centrum umbilici oblinire tribus, vel quatuor granis Moschi, aut Camphoræ, pauco oleo amigdalorum dulcium solutæ, vel cum oleo Succini, aut Gagatis superappponendo emplastrum aliquod ex indicatis.

In Occitania, & vicinis Provinciis Plebæ mulierculæ solent interiorem superficie figulinæ pateræ alliofricare, quam in hoc morbo umbilico applicant, cui fortiter adhæret, modo allium calefiat.

Fortassis subtiliores hujus remedii moleculæ percutis hyatus sanguinem intrando ipsum valde commovebunt; autumotamen optimoseffectus ab odore preteritum procedere qui nares afficit; verum quomodocumque res se habeat cum huic remedio fidant magnopere ægræ, neve ipsum nocuum experiatur, idcirco minime contemnendum videtur.

VIII. Iis adhibitis efficaciores experiuntur boli aut potiones hystericeæ, quæ patrantur sequenti methodo ex remediorum farragine feligendo magis idonea; ceteris tamen præcellunt.

Aquæ adversus hystericos vapores magis comendatæ, sunt illæ,

Melissæ simplicis, vel compositæ

Cardi

Matricariæ

Artemisiæ

Peoniæ

Nucum

Cerasarum nigrarum

Florum Tilliæ

Aurantiorum

Earum singulæ ad duas, vel tres uncias adhibentur.
Pulveres etiam sequentes adduntur quales sunt.

De Gutteta

Radicis Valerianæ sylvestris

Peoniæ masculi

Florum Tilliæ

Ca-

Castorei

Assæ foetide &c.

Dosis a septem, vel octo granis, ad quindecim, aut viginti extat pro diverso pulverum numero.

In aquis interdum diluuntur, sequentia electuaria.

Theriaca

Confectio hyacinthina

Confectio alkermes.

a drachma semis ad drachmam.

Tincturæ etiam usveniunt, quales sunt

Tinctura Myrrhæ

Castorei

a guttis decem ad viginti, aut vigintiquinque.

Tinctura annodyna &c. a guttis viginti ad triginta.

At ut earum dosim tutiori methodo sanciamus theriacæ quantitati ratio habenda est.

Tandem syrupi anthysterici præscribuntur

Artemisiæ

Matricariæ

Peoniæ ad $\frac{3}{4}$ I., aut $\frac{3}{4}$ I. & S. dosim

Ex iis diversis pharmacis potiones anthystericæ subijunguntur plus minusve saturatæ, quæ cocleatim duplici quoque horæ quadrante exhibentur, at coclearia grandiora primum, verum exiguiora propinantur.

IX. Boli, aut opiata ex iisdem simplicibus, aquis distillatis exceptis, componuntur; efficaciores evadunt efficaciora seligendo pharmaca, vel largiori dosi ea propinando prout paroxysmi violentia poscet; boli de horæ dimidio reiterantur, modo tamen grandiori dosi primum indulgeamus.

Etiam si hujusmodi boli, ex similibus substantiis conflentur ac anthystericæ potiones, rarius tamen præscribuntur tum quia haud facile est illos ægris exhibere coarctati gutturis ergo, cum etiam, quia necessum esset ipsos a ventriculo solvi posse secus remedii actio retardatur; quare in aliqua aquarum anthystericarum solvuntur, & potionum more cocleatim propinatur.

X. Inter diversos bolos anthystericos duo præsertim commendant; *primus* coagmentatur ex duplici scrupulo sulphuris communis, & drachma nucis myristicæ cum syrupo Artemisiæ subactis; *secundus* qui validior evadit ex Castoreo, & Assa-foetida conficitur, ad drachmæ semis dosim, cui additur granum & semis, aut duplex granum Laudani; bolorum alteruter in tres partes dividitur, duplici quoque quadrante aut singula hora sejunctim exhibendus prout morbus urgeat.

Pro efficacissima commendant *misturam*, aut potionem simplicem superaffundendo tribus, vel quatuor uncis aquæ Artemisiæ, aut Matricariæ tres vel quatuor guttas olei Succini cum annatina parte olei Gagatis unico vel du-

plici haustu remedium exhibendo, quod efficacior evadet addendo viginti, aut viginti quinque guttas tincturæ annodynæ.

XI. Si vapores hysterici vehementiores sint, & remediis obsistant necessum erit brachium, aut pedem incidere, pedem tamen salubrius, reiterando venæ sectiones etiamsi pulsi debiles, & exigui appareant, ut mos est in iis circumstantiis, circulationis retardatæ ergo; vomitum etiam promovere fas erit tres, aut quatuor grana propinando Tartari stibiati solubilis in duabus, vel tribus unciiis Aquæ distillatæ cardi benedicti, ut ventriculus succutiatur, modo pulmonis conditiones id sinant; de cetero etiam in hoc casu Tartarum exhibetur majori copia aquæ solutum, affatim solutionem hauriendo, ut de aquis mineralibus fieri solet.

XII. Communiter receptum est in vaginam intromittere Moscum, aut Zibetum, qui lymphaticum effluvium promoveant, utrumque abstergant, at Religio prohibet pollutiones ita excitare; nihilo tamen minus assidentes mulieres, invitæ medicis, hanc methodum pluries impendunt, quantumvis turpis esse possit.

Ratio medendi extra paroxysmum.

Quando paroxysmus discesserit nostrum erit tantum regressus præoccupare, quæ de causa necessum erit antecedentem causam detegere, ut eam necessariis remediis validius pugnemus.

I. Si morbus ab intermissione, aut suppressione mensium, lochiorum, aut albi fluoris procedat, hæmenagoga præscribuntur, ceteraque remedia pro iis morbis superius descripta.

II. Si sola albi fluoris acrimonia morbum inducat diluentia, temperantia, atque dulcificantia locum habent superius in albo fluore proposita.

III. Si acrimonia, & copia feminis in causa sint vulgari, & obvio tutiori-que remedio, matrimonio videlicet, ei medetur, secus vero antiphrodisiaca in furore uterino commendata usuveniunt.

IV. Tandem si tumores, & obstructions uteri ovariorum, aut tubarum, vel partium proximarum hysterismum moveant, aperientibus remediis illas resolvuntur, aut progressus pluries indicatis remediis sistuntur.

Generice idonea methodus vapores hystericos eradicative sanandi eo collineat, ut præscribantur.

1. Aperientia martialia mitiora qualia sunt

Tartarum Martiale solubile

Sal Martis Riverii

Croccus Martis aperitivus

Ethiops Martialis

Tinctura Martis a 3 II. ad 3. IV.

|
|
} a gr. x. ad xxv.

2. Aperientia Mercurialia dulcia, quæ purgant debiliter, vel nihil cathartica sunt ut

Ethiops Mineralis cum sulphure, per deflagrationem aut triturationem paratus

Ethiops Mineralis per triturationem confectus, & remixtus faccaro

Affa foetida

Castoreo

Myrrha &c.

singe-

singulorum a granis xv. ad xxv.

3. Resinæ anthystericæ quales sunt.

Castoreum
Myrrha
Gummi Ammoniacum
Galbanum

quæ a granis viii. ad xii. fumuntur, vel in bolos aut opiata rediguntur, ipsas propositis aperientibus remiscendo

4. Diluentia, & humectantia, quæ sanguinem emolliunt, atque refrigerant, ab æstu quem anthystericorum usus nimius excitaverat, qualia sunt.

Balnea repentia
Semi-balnea
Apozemata, seu decocta refrigerantia
Aquæ Minerales ferrugineæ, & acidulæ
Lactis serum simplex, vel chalybeatum
Lac Asellæ

5. Purgantia leviora sæpe reiterata, inter amarotica selectura talia sunt.

Rhabarbarum
Infusio aut syrupus florum persicorum
Syrupus Cichorii compositus, qui amarior evadat sumitates infundendo.

Absynthii
Centaureæ
Aristolochiæ.

6. Narcotica etiam exhibentur, modo suspicemur aliquam in utero impressionem adesse, aut nervorum labem, quæ hystericos vapores minetur; pro libitu impendi possunt

Laudanum in substantia ad gr. j.
Tinctura Annodina ad gutt. xx.
Pillulæ Cynoglossi ad gr. iv.
Pillulæ Starkei a gr. iv. ad viij.
Theriaca communis ad 3 ss.
Theriaca cælestis a gr. vij. ad x.

7. Tandem optimum regimen præcipere necessum erit tum quantitatis cum qualitatis alimentorum respectu, quod haud facile erit obtineri a mulieribus admodum inconstantibus, tamen id necessarissimum videtur.

Interdum evenit gravidæ mulieres hystericis vaporibus, imo, sævioribus corripi; tunc enim coacti erimus proposita remedia impendere tum in paroxismo cum extra paroxysmum proposita; cavendum tamen est ne foetum lædamus effi-

caciora prescribendo, modo morbi sevities ea non postulet, aut mitiora incassum exhibita sint.

*Remedia specifica, quæ adversus hystericos vapores
a nonnullis commendantur.*

Inter plurima hujus speciei remedia nos observationibus magis confirmata, tutiora, & celeberrimorum medicorum auctoritate suffulta tantum exponemus.

I. Primum locum obtinet *Mosculus* intus sumptus sub forma bolari vel idoneo vehiculo dilutus a granis octo ad duodecim, & ultra.

Horatius Augenius (a) remiscebat quinque grana Moschi scrupulo uno Cynamomi Caryophyllorum, aut nucis muscatæ, eaque vino soluta propinabat; testatur ipse constanter felicem eventum hujusmodi remedium prestitisse.

Reinerus Solenandrus (b) refert, incassum jam ceteris adhibitis remediis, hystericum paroxysmum certissime compefcere tria grana Moschi cum annatina quantitate sanguinis Draconis remixta, & in unciiis quatuor aquæ florum aurantiorum soluta, quo auxilio hystericam anum perfecte sanavit.

Gregorius Horstius (c) ait hystericum morbum subiigisse moscum exhibendo ambaro copulatum.

Lazarus Riverius non solum commendat Solenandri remedium in sua edita (d) Praxi; imo in suis (e) observationibus narrat pluries utiliter remedium exhibuisse.

Et ipse Moscum in hystericis vaporibus adhibui, neque inutiliter eosque salubres effectus a narcotica virtute derivare mihi visum est.

II. *Ungula alcis* raspata, & idoneo vehiculo propinata ad scrupuli aut granorum triginta quatuor circiter dosim magnopere commendatur.

Hujusmodi pulvis, ut ajunt adversus Epylepsiam facit, at eventus adhuc minime spei conceptæ respondit. Apolonius (f) Menabenus ex eo concludit adversus hystericum morbum ipsum utilem evadere, cum epylepsiæ affinis videatur, indicat ipse observationem quæ huic sententiæ nonnihil favet; at omnis fides decedit cum pedum integrum frustulum collo appensum hystericos vapores penitus subiigere perperam credat.

III. *Julis nucis Juglandi* exsiccati & in pulverem redacti hic locum habent ad duorum scrupulorum dosim, addendo duplicem guttam olei Karabis.

Thomas Mufetus (g) hoc remedium inter efficaciora jactat, at si ipsum ul- lum effectum præstet succino potius quam Julis tribuendum videtur.

IV. Suffumigia ex-pulvere *Verucarum* quæ equorum crura deturpant pariter prodesse credunt; exsiccantur enim verucæ, & in pulverem rediguntur, atque earum pugilli aliquot supra prunas insperguntur; fumus vero intra nares recipitur.

Aubertinus Bottonus (h) credit hujusmodi remedium mirificum esse ut hystericæ mulieres quæ obitæ credebantur statim vitam & sanitatem recuperent; nihil officit id experiri imo utile evasisse non contendo.

V. *Oxycratum*, aut acetum aqua remixtum per clysterem intromissum ad libram, aut per os sumptum ad sex uncias non parum levaminis asferre putant, Riverius admodum ipsum laudat tum in (i) praxi cum in propriis observa- tionibus (k).

VI. Gra-

(a) Lib. XII. Epist. 7. (b) Sect. IV. Consil. 15. (c) Lib. V. De Morbis Mulier.

(d) Lib. XV. Cap. 6. (e) Cent. I. Observ. 65. (f) Tractat. De Alce Cap. 10.

(g) In Epistola ad Petrum Manarium. (h) De Morbis Mulier. (i) Lib. XV. Cap. 7.

(k) Cent. III. Observat. 83. Et Cent. IV. Observat. 6.

VI. *Grana* actes exsiccata & friata ad drachmæ quantitatem sumpta, & in vini cratere soluta pariter commendant, eorum defectu *fuligo lucida* substituitur simili dosi in ovi luteo hausta. Riverius (l) ambo ea remedia asserit paroxysmos hystericos eorumque regressus, sistere, idque propria experientia confirmat.

VII. Levior decoctio radicis *Brionæ* albæ in vino albo quandoque propinatur. Mattiolus (m) hoc remedium proponit quasi specificum asseritque mulierem quotidie hystericis vaporibus obnoxiam penitus convaluissè hujus remedii haustu per integrum annum loco cœnæ semel tantum in hebdomada continuato; *Brionæ* anthysterica virtus hujus medicinauctoritate præsertim fultur; fœculam etiam nonnulli exhibent quæ infirmiore tamen effectum præstat.

VIII. *Primiparæ placenta* furni ope exsiccata, & in pulverem redacta in idoneo vehiculo ad drachmam propinata, si (n) Riverio fidendum est, ictu oculi paroxysmum subijgit. Fridericus Hoffmannus (o) pariter hujusmodi remedium commendat quasi certissimum adversus hystericismos, eorum enim auctoritate commotus illum retuli, nam candide *plura refero quam credo*.

IX. Medici nonnulli in hystericis vaporibus (p) *Camphoram* adhibent, eamque vel in pulverem redactam ad granorum decem, aut duodecim dosim exhibent, vel sub formam bolari syrupo quodam anthysterico subactam, aut oleo amygdalarum dulcium solutam; interdum ejusdem frustulum comburunt, quod in quinque, aut sex uncis aquæ anthystericæ extinguunt, quam ægris propinant. Hujusmodi remedium annodyna sua virtute agit, ut ejusdem usus prorsus detrimento expers evadat; at experientia didici ipsius eventum admodum variare, idcirco parvi (q) faciendum esse.

X. Chimici jactant adversus hystericum morbum stanni usum, ejusdemque præparationes, videlicet *magisterium*, *sal*, & *oleum Saturni* &c.

Sumunt stanni frustula, quæ in crucibulo ignis ope continuo remiscendo in calcem redigunt, postquamquod in mortario marmoreo longa trituratione in pulverem rediguntur. Hæc salubrior est, atque tutior præparatio; exhibetur ad octo, decem, aut duodecim grana remixta extracto alicujus plantæ anthystericæ, aut simpliciter theriaca, vel confectioe hyacinthina.

Magisterium conficitur solvendo stannum in aqua regali, superaffundendo vero bis decuplum aquæ communis, ut diluatur solutio, & metallum sub pulveris albi specie fundum petat, qui pulvis pluries aqua tepenti abluatur, ut ab aquæ regalis molleculis repurgetur. Hoc remedium vel extrinsecus umbilico applicant, vel intrinsecus ad grana quatuor, aut sex exhibent.

Præparatio salis, & olei Saturni, quam Sennertus (r) proponit longior, & difficilior evadit. Solvitur enim stannum Anglicum cum aqua forti nitri, & aluminis, decidit statim albus pulvis, seu stanni magisterium.

Hujusmodi pulvis in vase sublimatorio, ut de floribus antimonii fieri solet exaltatur, postquam quod collecta materies in aceto destillato solvitur.

Deinde acetum ad ficcitatem usque destillant destillatusque liquor denuo pulveri remiscetur pluries cohobationes reiterando usque dum acetum omnem pulverem secum abripiat, tunc ad ficcitatem acetum evaporatur; ex massa vero residua cum spiritu vini, Tinctura elicitur saturatissima pluries spiritum superaffundendo; ad dimidium tunc spiritus vini destillatur, vero superstes liquor in cella

T 4

vina-

(l) *Prax. Lib. XV. Cap. 6.* (m) *Comment. ad Lib. IV. Cap. 176.*

(n) *Praxeos Lib. XV. Cap. 6.* (o) *Patholog. Part. III. Sect. I. Cap. 5. §. 7.*

(p) Riverius, *ubi supra.* Vellchius, in *Micromimematis annexis Ann. 4. & 5. Decur. I. Ephemerid. Medico-Phylico Germanic. Art. 7.* (q) Vide Augustinum Thonerum, *Observat. Medicinal. Lib. 3. De Morbis Uterinis. Observat. III.*

(r) *Institut. Lib. V. Part. III. Sect. III. Cap. 15. & Prax. Lib. IV. Part. II. Sect. III. Cap. 4.*

vinaria reponitur, & efformabuntur cryſtalli, quę *Sal*, aut *chryſtalli Saturni* dicuntur, intusque exhibentur ad eandem magisterii doſim. Si huiusmodi cryſtalli marmoreę tabulę nonnihil inclinatę in loco humido ſuperimponentur per *deliquium* ſolventur, & liquorem ſuppeditabunt, quem oleum Saturni, aut ſtanni appellant; putant, quod ejuſdem guttę nonnullę umbilico applicatę hyſtericum paroxiſmum de repente ſiſtant, vel eę intus ad quinque guttulas idoneo vehiculo exhibitę.

Noſcimus jam chimicorum jactationes, quibus ſi fidendum eſſet, (f) huiusmodi remedia hyſtericos vapores diſſiparent *uſque ad miraculum*, vel *incantamenti inſtar*. Nondum tamen ea exhibere auſus ſum, & merito quidem, cum Boerhavius & ipſe illa contemnat: *Minus amo*, (t) ait, *hoc metallicum, tutiora præſto ſunt eidem propoſita*.

(f) Præſtantiffima, ac præſentiffima ſunt remedia in uteri ſuffocationibus, quas ad miraculum compoſcunt, tam intrinſecus, quam extrinſecus. Joh. Scroderus. *Mineralogię*, Cap. 14.

(t) *Chimię. Part. III. Proceſſu 187.*

FINIS LIBRI SECUNDI.

CATALOGUS CRONOLOGICUS MEDICORUM.

*Qui speciales de Morbis Mulierum Tractatus tradiderunt, vel de iis
in institutionibus mentionem fecerunt.*

IN QUATUOR EPOCHAS DISTINCTUS.

PRIMA EPOCHA.

Hæc Epochæ cum Medicina primum incepit, cum ipsa vero intra temporum latebras abiit; ea ad annum usque 800. a C. N. producit, quando Romani Imperii ejectione Medicinam, ceterasque scientias secum Arabes exportarunt, quorum florentissimum Imperium Asiam, Africam, & Europæ maximam partem occupabat.

In iis primordiis Medicina valde pervaga erat, ac pluribus divisa sectis, quarum nulla systema referebat quod omnes artis complecteretur partes, & opinionum incertitudinem determinaret; at an. 180. a C. N. Galenus Paripateticorum Affecta in laudabilem formam iis temporibus accomodatam Medicinæ præcepta digessit, atque quatuor admisit qualitates *calidum*, nempe *frigidum*, *humidum*, & *siccum*, quatuor pariter elementa, humores quatuor, totidem temperamenta, totidemque intemperies.

Hippocrates vel nullum, vel illum (a) Democratis addotavit systema, quod & Epicurus profecutus est; Galenus vero ingeniose Hippocratis canones suis accomodavit institutionibus cum ii tunc temporis plurimi existimarentur.

In hoc systemate quamvis erroneo quoad Physicam pertinet essentialia magis, & medicinæ necessaria complectuntur; indoles videlicet, & causæ morborum proponuntur omnes, tum indicationes quibus mederi oportebit; uno verbo
in eo

(a) Autumant Hippocratem Democratis discipulum fuisse. Celsus in Prefatione.

in eo morborum omnium Diagnosim, Prognosim, ac remediorum exhibendi rectam rationem reperies, quod artis essentiam constituit.

Hujusmodi systema nonnullas contentiones passum est, ipsius Auctoris etiam ætate, at cito evanuerunt, & a Medicis omnibus illius ævi communiter receptum fuit; Arabes vero subsequenti ævo, & qui eos secunda Epocha prosequerantur idem amplexi sunt; illum denique tertia Epocha universaliter acceptum fuit, undique lectum, tuitumque a Medicis in Europam post Scientiarum restorationem viventibus usquedum quarta, & postrema Epocha novis Anatomicis inventis, & cadaverum inspectione novissimo lumine medicina refulxit, quamvis nunc jam obsoletum sit quoad physicam explicationem spectat, ipsum tamen adhuc defendunt, quoad indoles, & indicationes morborum attinet, medendique rationes; progressus vero qui in iis posterioribus medicinæ partibus facti sunt ampliarunt potius, quam destruxerunt Galeni systema.

Ea ætate Pharmaciam studio magnopere consuluerunt ut farcimen confirmat formularum, quas Galenus in pharmaceuticis (a) libris congeffit, aut Scribonius Largus, in suis operibus descripsit; animadvertendum tamen est eorum compositiones innumeris conflari pharmacis quare Plinius eas valde (b) merito contempsit.

Neque Botanicam prorsus neglexerunt; asserunt nonnulli quemdam extitisse Cratevum stirpium historia non parum instructum, at ejusdem defuncti opera si ullum exaraverit; eorum defectu Dioscoridis labor, atque Plinii plurimarum plantarum descriptio certum nobis præbent indicium hujusmodi studium tunc satis invaluisse.

Idem tamen de Anatomicis perquisitionibus prædicare nequimus; in cassum enim prædicant Herophilum, & Erasistratum versatissimos in hac scientia fuisse; quinnimo concedere fas erit Hyppocratem, Galenum, ceterosque Græciæ Medicos in ea valde aridos fuisse, nullumque verisimiliter cadaverum dissectuisse.

Cadaverum enim inspectionem, ad morborum sedes, & causas detegendas necessarissimam, tunc temporis rarissimam fuisse censeam, cum morborum explicationem parum, vel nihil ad anatomiam referrent, neque in Græcorum librorum pervolutione hætenus ullam mihi anatomicam observationem animadvertere licuisset.

Chimiam vero penitus ignorabant, multumque post tempus eam colere, & medicinæ aptare inceperunt.

In humana corpora astra influere inter Orientales nationes vetustissimam opinionem fuisse constat a Sabeorum religione, quæ communiter colebatur ipsis derivatam; hæc sententia in Græcia translata Græcos Medicos decepit, eamque Galenus confirmavit, atque ampliavit, cum criticos dies constituisset, & summam Lunæ in humores influentiam prædicasset.

Fides vero quam characteribus, & versibus præstabant summopere erat contemenda, ajunt enim Catonem (c) barbara quædam dicta magnificisse ad ossa luxata, vel fracta restituenda. Verum Quintum Serenum Sammoniacum Gordiani Imperatoris Medicum, & Præceptorem ad Æmitriteum subjiendum ver-

(a) De Antidotis.

De compositione medicamentorum secundum locos. De compositione medicamentorum per genera.

(b) Quo Deorum perfidiam istam monstrante? Hominum enim subtilitas tanta esse non potuit. Plin. Histor. natur. Lib. XIX. Sect. 8.

(c) Cato, De Re rustica, Cap. 160.

verbum (a) *Abracadabra* commendasse, ita pluries conscriptum, ut cuique lineæ demendo literam conum refferret, qui collo apensus morbum profligare censebat.

Pari ratione judicare poterimus de amuletis, seu substantiis quibusdam quas partibus affectis applicitas ipsarum morbis mederi superstitiose fantebantur.

Galenus testatur radicem (b) *Peoniae*, infantum collo suspensam epilepsiae insultum compescere; Aetius suadet (c) *jaspidem* appendere ad scrubiculum usque descendentem, asseritque se ipsum eo pacto stomachi morbo convaluisse; Tralianus magis credulus pene certissimum remedium proponit pro febre tertiana subjuganda, olivarum folium ante solis ortum collectus, cui inscriptum sit verbum (d) *CA ROI*, & collo agrotantium apensus; at innumera exempla asserere possem hujusmodi, quæ perlegi poterunt apud (Augier Ferier) medicum Tolosanum *Lib. II. Cap. II. De methodo medendi.*

Eo tempore Romæ, & Italiæ (e) Plinio teste tres invexerunt morbi species novissimæ, quæ valde perteruerunt, verum brevi evanuerunt.

Prior *lepra* fuit quam exportavit Pompei exercitus e Syria redux ubi cum Ægypto Regno propinquo communis est, & Endemia, at morbus cito desistit, & hic quidem morbus, Plinius ait, in Italia celeriter extinctus est.

Altera *Lichenis* species erat serpentis & epidemicæ, quæ mentum præsertim occupabat, & osculis, aut amplexibus facile communicabatur, *veloci transitu osculi* ex quo *Mentagra* appellata fuit. Plinius enarrat ipsam ab Asia Romæ transtulisse Equitem Romanum, quam ipsum nomine indicat.

Postremus morbus *Anthrax* erat, quem Plinius Narbonensi Provincia Endemium fuisse tradit, ille Romæ transductum suo tempore adhuc vivebat.

Plinius tandem de colico dolore ibidem verba facit nocuo morbo quo primum Tiberius Imperator correptus fuit; tunc Romani valde mirati sunt, cum Cæsar annuntiaret novo nomine se colo laborare, magna enim Civitatis ambage cum edicto ejus excusantis valetudinem legeretur nomen incognitum,

(a) Inscribas carthæ quod dicitur *Abracadabra*,
Sæpius, & subter repetas, sed detrahe summæ,
Et magis, atque magis desint elementa figuris
Singula, quæ semper rapies, & cetera figes,
Donec in angustum redigatur litera conum.
His lino nexis collum redimire memento

A B R A C A D A B R A

A B R A C A D A B R

A B R A C A D A B

A B R A C A D A

A B R A C A D

A B R A C A

A B R A C

A B R A

A B R

A B

A

(b) *De simplicium medicam. facul. in voce Glycyfida.* (c) *Lib. II. Cap. 35.*

(d) *Lib. XII. Cap. 7.* (e) *Histor. natural. Lib. XXVI. Sect. 6.*

gnitum, quare admirationem non ab ignorantia morbi insurrexisse credendum est, sed a novitate potius appellationis qua Imperator eum designavit.

Ant. HYPPOCRATES veterum Medicorum antiquissimus cujus opera ad nos
C. N. usque perventa sint, qua de causa quasi medicinæ Patrem posteriores Medi-
Anno ci omnes ipsum respexerunt, quem neminem latet, ut supervacaneum sit,
432. hic cunctari in vitæ suæ historia, quæ ad paucas & incertas notiones redu-
citur.

Sufficit animadvertere communiter receptum esse ipsum vixisse Anno Mundi 3538., Romæ vero 318. ante Christum Natum 432.; virum gignit Insula Coos in mare Ægeo; verum praxim exercuit Thessalia præsertim, & apud Thraces.

Longiorem vitam duxit nam qui eam subducunt, ad annum usque 86. pertingisse dicunt, sed alii annos 190. perdurasse autumant, quod propriæ scientiæ, atque optimo vitæ regimini valdetribuendum videtur.

Inter opera quæ ei tribuuntur multa suspecta sunt; stili enim diversitas atque systematis principia ab Hyppocraticis non parum dissita suspicionem augent, eamque magis confirmat Galeni (a) opinio qui asserit Adriano imperante, duos Medicos Alexandrinos Artemidorum nempe Capito, & Dioscoridem eas elucubrationes collexisse quingentesimo anno ab Hyppocratis discessu; difficile enim videtur, quod post tot annorum spatium hujusmodi Codicem recto scrutinio perficere possent absque quo stilum atque ordinem mutarent.

Erotienus qui sub Imperio Neronis vivebat genuina Hyppocratis opera determinare fategit, ex quibus respuit Librum *de Natura Muliebri*, & alterum *de Virginibus*; amplexus est tamen illos *de Morbis Muliebribus*, & *Sterilibus*; at ejusdem pace, Hyppocratis editores conveniunt incertum esse finem primi Libri *de Morbis Muliebribus*, quod ambo suspectos reddit.

Me latet qui primus de hoc libro suspicatus sit, Mercurialis qui sedulo Hyppocratis opera inquisivit eorum tres classes constituit; Libros *de Natura Muliebri*, *de Morbis Muliebribus*, & *de Sterilibus* in tertia classe reponit, inter illa opera videlicet quæ minime ad Hyppocratem pertinere credit, sed ad alterutrum ejusdem discipulorum. Johannis Henricus Schultius Medicinæ (b) Professor Altorfi circa hoc Mercurialem prosequutus est idemque novis rationibus confirmat.

Erotieni enim sententiæ adhibebimus Hyppocrati Libros tribuendo de quibus quæstio est; tamen prætereundum non est multum in iis ambiguitates reperiri, præsertim cum de uteri *aberratione* locutus sit, ubi erroneas sententias tradit, etiamsi ab Hyppocratis doctrina in suis Operibus alio suffultæ videantur; putat enim uterum positum sæpe mutare, & non solum stomachum versus, jecur, aut cor transferri, sed caput etiam aggredi, eaque de causa passionis hystericae scenomena omnia producere; mirum sane est, Hyppocratem hujusmodi motus utero tribuisse, quorum futilitatem satis patescit, at magis admirandum est hanc erroneam sententiam plures Medicos, qui illum prosecuti sunt amplexos fuisse.

Ant. ASCLEPIADES Bithynus celebris Medicus Romæ ætate Pompei summa
C. N. cum laude Medicinam exercuit anno ab Urbe condita 658. & ante Chri-
Anno stum Natum 96. Cicero (c) ipsum *Medicum*, & *amicum* appellabat.

Ejus-

(a) *Comment. I. in Librum Hyppocratis de natura humana.* (b) *In Historia Medicinæ, in 4^a Lipsiæ 1728. pag. 215. 216. & 244.* (c) *Lib. I. De Oratore, pag. 283.*

Ejusdem labores numquam ad nos pervenerunt, at apud Aetium (a) de quo infra locuturi erimus remedia nonnulla reperiuntur ad ulcera uteri cicatrifanda idonea, quæ Asclepiadi cuidam tribuuntur, qui (b) Galeni etiam testimonio nostras esse videtur.

AURELIUS, aut AULUS CORNELIUS CELSUS Medicus Romanus, A C. N. Ann. 35. qui vixit sub Tiberii Imperio, illustris evasit, Tractatus Medicinæ ergo quem loculenter latine scripsit ut ceteris in linguæ puritate præcellere videretur; quæstio est si Celsus Medicus fuisset neve Medicinam professus sit vel vir quidam esset ingenio, & doctrina præditus, qui sponte de Medicina scripsisset, ut de Bello, & Agricultura scribere fategit; at id difficile est definire quod ad nos parum facit, sufficit enim animadvertere Tractatum composuisse, seu melius a Græcis Medicis, & Hyppocrate præsertim materias excerptisse quas sine ordine digessit, & quasi *miscellanea*, aut specimina medicinæ considerari possunt.

Hujusmodi opus in VIII. libros distribuitur; in eorum IV. libello Caput reperitur XX. nempe, quod de hysterica passione agit, at inconcinne illam describit; ostenderunt enim recentiores Scriptores (c) manuscripta colligendo Celsi hoc Caput incompletum esse, & lacunam dari, quæ nobis demit finem hujus Capitis; tum, alia tria subsequencia quæ agunt de *Vulva exulcerata*, de *Vesica*, & de *Calculis in Vesica*.

In VII. eorum Librorum duo alia Capita extant in quibus nonnulla de mulieribus agit; primum XXVIII. nempe de Filiabus imperforatis Græce Αἰμηται pertractat, alterum XXIX. de extractione differit foetus mortui; nihil præbet Celsus circa mulierum morbos, quod alio non repariatur & præstantior; idcirco ut Medicus quidam admonet non ad Medicinam discendam, sed potius linguæ puritatem adipiscendam ipsum pervolvere necessum erit, (d) Illius, ait ille, *Cote stylum subiigemus, & pluris latinitatem ejus quam medicinam faciemus*.

CLAUDIUS GALENUS Pergamenus inter Medicos Græcos post Hyppocratem celebratissimus. Ab ætate quam ipse habuisse narrat dum advocatus fuit ab Aurelio, & Lucio Verro dum Aquiliæ detinebatur, deducitur Anno circiter decimo Quinto Regni Adriani ortum habuisse, idcirco a Christo nato (e) vixisse 131. Plures Provincias Imperii Romani peragravit præsertim vero Egyptii, & Alexandria degit, ubi celebriores erant (f) Medicinæ Scholæ; vixit viventibus Antonino, Aurelio, Lucio Verro, Commodo, & Severo, qui illum magni existimarunt, & pluries eo usi sunt. A C. N. Ann. 200.

Suidas asserit Galenum 70. anno vixisse, quare cum natus esset decimo quinto Anno Adriani, tumulatus esset nono Anno Imperii Severi, qui Annus circiter incidit in 201. Æræ Christianæ; hujusmodi calculus magis rationi consonus videtur illius; quem Auctores nonnulli voluerunt diuturniorem vitam Galeno tribuendo; Pergami inter Patrios Lares mortuus est ubi paullo antea, qua de causa ignoramus, restitutus erat.

Plures ipse libros composuit, qui non omnes ad nos pervenerunt, ipse testa-

(a) Lib. XVI. Cap. 93.

(b) Lib. II. De antidotis, & passim, ubi de compositione medicamentorum.

(c) Morgagni, Epist. II. & III. in Celsum.

(d) Johannes Rhodius.

(e) Vide Chronologicum Galeni Elogium a Philippo Labbeo.

(f) Ammian Marcellin. Livr. XXI. Sur. la fin.

testatur plures combustos fuisse (a) in incendio Templi Pacis ubi dum Romæ degebat ipsos reponeret; plures tamen supersunt, qui satis Galeni indolem superius indicatam declarant.

Certum enim est Medicina non solum sed pluribus aliis scientiis edoctum fuisse, at ejusdem styli respectu, longus, prolixus, Asiaticus experiebatur, ut lectores magnopere tæderet; verum si de animi qualitatibus verba facere liceret, vanus erat, gloriosus, ab aliis laudes non expectabat, ceteros Medicos contemnebat, pluriesque vituperabat.

Nihilo tamen minus præter eos defectus quos neque negare, neque excusare audeo, Galenus magni suo tempore existimabatur, multo magis tamen post ipsius mortem, quando suum systema ceteris palmam præripuit; nam primum multas contradictiones passus est, ut ipse affert dum narrat Quintum tunc temporis celeberrimum Medicum (b) irrississe suum systema, defendendo (c) *Quod de calido, frigido, sicco, & humido ajunt, utique Balneatorum esse nomina.*

Haud cognovi qua de causa Galenum somnia magni fecisse, neque ejus credulitatem excusare possem; (d) hortatur enim somnia sedulo animadvertere, atque asserit (e) quod, duorum somniorum causa, ægrotantis pleuritide correpti indicis arteriam dissecuisse quam patulam reliquit usque dum sanguis sponte fluere desinere; nam ait ipse somnium ita præceperat, qua methodo eger perfecte convaluit. Tandem affert Dei (f) Pergameni ministrum eodem morbo affectum sanitatem recuperasse venam manus externam incidendo prout somnium admonuerat, aggressus, ait & ipse illud insomnii monita.

Minime in dubium revocamus inter innumera opera quæ ipse scripsit, interdum mentionem fecisse de mulierum morbis, nos tamen institutum præteriremus paucas circa hoc notiones hic illuc excerpando, sat erit igitur enuntiare nullum de hac re scriptum reliquisse, præter illud, quod a Galeno derivare omnes editores contendunt, sub titulo de *Gynæceis* inter ejusdem opera quandoque relatum, auctoris nomine sane indignum quare Brassalova in IX. Editione dell' *Junta*, & Renatus Chartier conveniunt quod jejuna prorsus & angusta sit tractatio.

A. C. SORANUS. duo habentur Sorani Medici Ephesii alter Trajani, & A-
N. driani tempore vixit, eique tribuitur vita Hyppocratis, quæ ad nos usque
Ann. perventa est; alter junior erat, atque Suidas asserit, ipsum quatuor li-
250. bros composuisse de *Mulierum Morbis*, eidemque tribuunt libellum de *utero*, & muliebri pudendo Parisiis Græce impressum Ann. 1554. Typis A-
driani Turnebe, & latine recussum Ann. 1556. apud Gulielmum Morel.

Hujusmodi Tractatus fragmentum esse videtur majoris operis; uteri structuram exhibet, quam cum imperfecte veteres cognoscerent opus prorsus inutile evadit.

A. C. ARETEUS Cappadocus inter veteres Medicos recensetur, ejusdem su-
N. perest Medicum opus Græce scriptum, & in octo libros distinctum, quo-
Ann. rum tamen non omnes ad nos pervenerunt.
350.

Medicinæ Historici inter se valde discrepant circa ætatem qua vixerat, alii

(a) Lib. I. De composit. Medicamentorum per genera Cap. 1. Et de Libris propriis Cap. 2.

(b) Lib. de præcogn. ad Posthumum Cap. 1.

(c) Galenus, De sanitate tuenda Lib. IV. Cap. 13.

(d) In Lib. VI. Hypp. De Humoribus, Comment. II. Method. Medendi Lib. XIV. Cap. 2.

(e) De curandi ratione per sanguinis missionem Cap. 23. (f) Esculapius.

alii animose fatentur Romani Imperii initio id evenisse, hocce confirmant ostendendo Jonico dialecto ipsum scripsisse, quod post illud tempus obsolevisse asserunt, at Menagius objectionem (a) destruit plures Græcos Auctores enuntiando, qui sub Adriani, & Severi Imperio eo idiomate usi sunt.

Censerem enim hunc Medicum post Galenum locum habere, sed ante Aetium, qui Anno 380., & Paulum Æginetam, qui Anno 420. inter vivos erant, præsertim cum utrique ipsum in suis scriptis advocent.

Areteï stilus concisus erat, & Hyppocratis more valde arctus, quem studuit, atque pluries in testimonium vocavit; ejusdem opera Galenum nihil prorsus redolent, quod confirmat hunc Auctorem, ipsum vel non legisse, vel contempsisse.

In Areteo prima (b) reperitur hydropis cum hydatidibus observatio, quam perbelle descripsit, etiamsi originem, & naturam ignoraret.

Inter octo libros quos ipse composuit quatuor causas, & signa morborum explicant, quorum duo acutos morbos; totidem cronicos explanant, quatuor reliqui pari ratione distribuuntur, duo nempe medendi rationem acutos morbos, reliqui duo cronicos respiciunt.

In secundo libro *causarum*, & *signorum morborum acutorum* in capite nono de Passione hysterica locutus est sub titulo, *De Vulvæ strangulatu*, & in secundo libro, *curationis morborum acutorum* capite nono de illius morbi curatione verba facit, sub titulo *De Curatione Vulvæ suffocationis*.

De *Morais uteri* pariter capite undecimo libri secundi de causis & signis cronicorum sermonem instituit, de eorundem curatione, capite undecimo libri secundi de curatione cronicorum differit, at ibi in originali plura desunt.

ORIBASIUS Sardus quarto ævo vixit, Imperatori Juliano fuit apprime carus, quapropter, & honores, & opes adeptus est; at cum hujusmodi Imperator in bello contra Persas anno 363. occisus fuisset, non æquam Oribasius cum successoribus suis fortunam expertus est.

A. C.
N.
Ann.
363.

Oribasius ipse narrat Julianum Imperatorem ei præcepisse collectionem præstantiorum veterum Medicorum, jussumque implevit, ut in 70. libros opera omnia Medica antiquorum digessisset.

In posterum specimen hujus collectionis in novem libros distribuit ad usum Eustachii filii sui; paullo post quatuor libros vulgarium remedium congeffit quos Eunapio dicavit; tandem in speciali libello instrumenta, atque machinamenta chirurgica tunc temporis usitatiora ostendit.

Extant adhuc novem libri *Synopsis Medicinæ* pro Eustachio filio scripti; verum quatuor Eunapio dicati, tum *Tractatus de Laqueis, & Machinamentis*; at magni operis sub titulo *Collectanea artis Medicæ*, quod 70. libros complectebatur nisi decem & septem supersunt; Oribasii opera ex manuscriptis latine tradita fuerunt a Joanne Baptista Rafario Medico Novariensi, Basileæ Anno 1557. in triplici volumine in 8. impressa; nondum ea Græce typis mandata fuisse arbitror.

Ipse de Morbis Mulierum in duplici opere locutus est; in illo quod
pro

(a) In *amænitatibus Juris*.

(b) De *signis, & causis diuturnior. Morbor. Lib. II. Cap. I.*

pro filio exaravit; in nono videlicet libro quindecim capita reperiuntur, quæ de præcipuis Mulierum Morbis agunt; in altero vero opere Eunapio dicato, in quarto libro nempe septem capita extant quæ de eadem materia pertractant, verum utrinque parum utilitatis inveneris.

A. C. N. 380. AETIUS Mesopotamus post Oribasium vixit quem sæpe in suis scriptis (a) indicavit, idcirco circa finem quarti sæculi; perperam nonnulli confundunt Aetium Medicum cum Episcopo Actio Semi-Ariano qui error a nomenclaturæ similitudine procedit.

Ipse reliquit totius Medicinæ codicem utiliore, & præstantiore illo Oribasii. In XVI. libros dividitur, quorum primi octo Græce impressi fuerunt Venetiis apud Aldum in fol. An. 1534. ceteri octo supersunt manuscripti in pluribus Bibliothecis, obvii in illa præsertim Regis Nostri, ubi plura extant exemplaria. Joannis Cornarius latine tradidit ex Græco idiomate omne Aetii opus, quod Basileæ impressit apud Froben Anno 1547. in fol. sub Titulo *de contracta ex veteribus Medicina*, postremus liber hujus operis qui continet 112. capita morbos mulierum explicat, & primus est tractatus, qui circa hanc materiam pervolvi mereatur.

Nil magis laude dignum est quam auctoris candidus animosus in enuntiandis scriptoribus ex quibus materiem deprompsit, pluries enim in auxilium vocat Galenum, Aspasiam quam credo Obstetricem fuisse, Philumenem, Leonidam, Archigenem, Ruffum, Filagrium, Soranum, & Asclepiadem.

A. C. N. 420. PAULUS EGINETTA videlicet Eginæ Insulanus vixit, ut credunt sub Imperio Honorii, & Theodorii Junioris, anno circiter 420. a C. N., saltem post Oribasium, & Aetium locum habet, cum utrosque frequenter nominet.

Hic Medicus medicinæ institutionem nobis reliquit iis temporibus accommodatam sub titulo *de Re Medica*, & in septem libros distinctam; ipse admonet congeriem esse notionum selectarum Galeni, & Oribasii ceterorumque, qui eum præcesserunt.

Hujusmodi opus Græce primum Venetiis excussum fuit apud Aldum in fol. An. 1528., verum latine versum a pluribus medicis videlicet Albano Torino, Joanne Guintherio Andernaco, & Janno Cornario quæ versiones omnes pluries editæ sunt; in tertio libro hujus operis decem, & septem capita reperiuntur de Morbis Mulierum videlicet a 60. ad 76. comput pariter in sexto libro septem alia capita habentur a 69. ad 75. comprehensa in quibus præsertim de partu, deque ejusdem consecutionibus agitur.

A. C. N. 500. MOSCHIONUS, nos latet hujus Medici ævum, verum suspicari licebit inter vetustissimos Medicos non esse recensendum, extat de hoc auctore Græcæ scriptum *περί γυναικείων παθών* idest *Tractatus de Morbis Mulierum*, qui 163. Articulos complectitur, ipsum in Græco manuscripto innumeris scattet erroribus, etiamsi Gesnerus eum corrigere sategerit, tamen adhuc imperfectus persistit.

Inse-

(a) Lib. XV. Cap. 13. 18. 29. & alibi passim.

Reperitur antiqua versio latina ejusdem operis, quæ nonnihil amplior est, & magnopere conducit ad exemplaris correctionem.

Inseruerunt versionem, & manuscriptum in duplici collectione Auctorum de Morbis Mulierum, altera VVolphiana, & altera Spachiana; verum cavendum est ne Moschionum hujusmodi cum vetustiori Moschione confundamus, cui duplicem tractatum Plinius tribuit, primum *de Raphano*, alterum *de Pessariis*.

CLEOPATRA Ægyptii Regina; librum ei tribuunt *de Morbis Mulierum* latine scriptum, quem tamen ajunt a Græco idiomate traditum fuisse. A. C. N. Ann. 809.

Hujusmodi libellus in collectionibus duabus de Morbis Mulierum invenitur superius recensitis, altera nempe a Gasparo VVolphio Basilææ impressa Anno 1586. in 4., altera impressa Srasburgi ab Israelo Spachio Anno 1595. in fol.; facile est cognoscere hujusmodi opus tunc temporis ignorantia crassante apographum fuisse.

THEODORUS PRISCIANUS Medicus Latinus, quem antiquiorem Medici crediderunt quam revera est, ad VIII. potius, aut IX. sæculum referendum; at hic frustraneum est contentionem discutere. A. C. N. Ann. 800.

Eo nomine insignitus tractatus extat fratri Thimoteo dicatus in tres libros distinctus, quorum primus dicitur *Fænomenon Euporiston*, secundus *Logicus*, tertius *Gynæcea ad Salvinam*, in hoc postremo Auctor decem breviora capita habet de Morbis Mulierum; illud opus Basilææ fuit impressum apud Froben Anno 1532.

Idem eodem anno recussum fuit Strasburgi in fol. triplici libro addito Chirurgiæ Albucasis, sollicationibus Germani Comitis *de Neuvenare*, hoc tamen discrimine quod in editione Basiliensi opus *Theodoro Priscano* tribuitur, in Strasburgensi vero *Octavio Horatiano*: verum in priori impressione tres tantum libri observantur, superallato titulo indicati, in postrema vero, quatuor Tractatus reperiuntur sequenti ordine digesti:

- I. *Logicus de curationibus omnium ferre morborum, corporis humani ad Euporiston.*
- II. *De acutis, & cronicis Passionibus ad eundem.*
- III. *Gynæcia de Mulierum accidentibus, & curis eorumdem, ad Victoriam.*
- IV. *De Physica scientia ad Eusebium filium.*

Tandem in Basiliensi editione Matrona cui liber de Morbis Mulierum dicatur, Obstetrix videtur nomine *Salvina*, in Strasburgensi vero *Victoria* appellatur.

NONUS Medicus Græcus, Anno Christi 915. inter viros erat sub Imperio Costantini Porphyrogenetæ a quo præceptus fuit sequentem librum componere. A. C. N. Ann. 915.

De Omnium particularium Morborum curatione, Argent. in 12. 1568.

Hieronimus Martius Medicus Ausburgensis Manuscriptum in publica Bibliotheca reperit ejusdem Civitatis quod latine vertit & tum Græce cum Latine imprimere curavit.

Astruch de Morbis Mulierum.

V

Ha-

Hujusmodi opus de omnibus pene Morbis pertractat in 296. Capitibus, haud perlongis ut *brevissima Medicinæ Synopsis* videatur, clara tamen & exacta cum idonea praxi conjuncta, quæ brevitati operis respondet; mulierum morbi 13. Capita complectuntur, iique explicantur juxta sententias Pauli Eginetti, & Aetii.

Quamvis Nonus trans errores vitam duceret quos hujusmodi Epochæ adtribui, hic tamen de eo mentionem facere autumavi methodi ergo quam profecutus est, quæ Græcos Medicos valde emulatur, & a Medicina Arabum procul diffita videtur.

FINIS PRIMÆ EPOCHÆ.

SECUNDA EPOCHA.

SÆculo IX. cum Imperium Occidentis obverteretur, & Provinciæ a Barbaris Nationibus invaderentur, quæ scientias parvi faciebant, & illud Orientis etiam si adhuc subsisteret, in diem tamen periclitabatur, scientiæ pariter, quæ illuc florebant, sensim sensimque defecerunt, contra Arabes, qui armis celerrimos progressus faciebant, atque dominium totius Orientis, maximam nempe Asiæ, Africæ, & Europæ partem tenebant, scientias pariter sui juris fecerunt.

Idcirco Artes, & Medicina præsertim, eandem Imperii sortem profecta est, ut dum apud Græcos, cum Imperii dejectione scientiæ desinebant, apud Arabes potentiæ augmento, & scientiæ ipsæ maximum gradum sublimitatis adeptæ sint; sub Imperio præsertim Califi *Almamon Abdalla*, qui anno 813. a Christo nato summum Jus tenebat suo jussu Græcorum opera omnia Arabice versa sunt, qua de causa omnes Græcorum notiones apud Saracenos exportatæ fuerunt, ut Geometræ, Astronomi, Mechanici, atque Medici passim reperirentur, quibus ceteræ Nationes, & Europa præsertim intra ignorantie latebras involuta orbabantur.

Ea scientiarum conditio 400. aut 500. annos perduravit ab 800. nempe anno ad 1200. Tunc Europæ Nationes mercimonii ergo, quod cum Arabis habebant scientiarum elementa denuo exciperunt, hujusmodi commercium patet a vicinis Provinciis peractum fuisse; Italorum respectu, Neapolitani qui Arabis Siciliam imperantibus propinquiore erant, & nostratum Occitani Hispaniæ proximiores primi fuerunt qui ab iis scientificas notiones mutuati sunt.

Quamvis religionis discrepantia, & regionum longinquitas obsisteret nihilo secius Christiani rerum suarum (a) commutationem iniebat, ut traditionibus (b) constat; at summum negotiationis onus Judei utrinque

V 2

exer-

(a) Salerni Portus olim mercimonii causa celebratissimus fuit ubi Arabes qui Siciliam, Africam, & Hispaniam tenebant facile conveniebant. Trotula enim Obstetrix (1) Salernitana, quæ Obstetriciæ Artis libellum (2) scripsit Anno 1200, vel 1250. quamdam Saracenarum (3) mulierum indicat, quæ adversus oris foetorem remedia nonnulla exhibebat, verum illa refert, quæ hujusmodi muliercula ad capillorum nutritionem fovendam suppeditabat; evidens enim est tunc temporis Salerni Arabes fuisse, qui medicinam exercerent.

(b) Monspeliæ vero respectu Gullielmi filii Ermenegaldi Domini hujus Provinciæ legata Anno 1121. exarata, quibus Successoribus prohibet ne Judæis, aut Saracenis aliquam facultatem permittant, satis confirmant tunc Monspeliæ Saracenos habuisse, qui præcipuos honores, atque onera Civitatis implebant; ait enim ipse (4) *Hæredibus meis prohibeo, ne aliquam Bailiam, vel dominationem aliqui Judæo, vel Saraceno in Montepessulano donent.*

Beniaminus de Tudela Judæus, qui Monspeliæ anno 1160. (5) transitum fecit de hac Civitate tradit ibi Saracenos, atque Christianos undique ex vicinis Provinciis negotiationis causa convenire. *Locus, ait, negotiationi accommodus . . . quo ex omni loco ad mercaturam conflunt Edom (Christiani) & Ismael (Saraceni) plurimi.* Verisimile est inter Saracenos plures medicos adfuisse.

Tandem Gullielmus filius Ducissæ Mathildis Monspeliæ Dominus, & junior filius Gu-

(1) Vide infra articul. de Trotula.

(2) De Passionibus Mulierum.

(3) Cap. 61.

(4) Gabriel, *Series Prasulum Monspeliensium, in vita Galteri*, Edit. 2. pag. 140.

(5) In principio Itinerarii.

exercebant, iique Medicinam Occitaniis, & Neapolitanis communicarunt, a quibus vetustiores Europæ universitates tum Monspessulana, cum Salernitana originem duxerunt, ut in posterum sensim sensimque per totam Europam medicinæ studium ampliaretur, & plures resurgerent scientiarum Scholæ.

At cum omnia temporum vicissitudini subjiciantur, circa XI. aut XII. ævum scisma atque intestinæ discentiones potentem Califuum Imperium laniarunt, idque cum Scientiarum dejectione evenit, quæ apud illos tum medicina ipsa labefactari inceperunt; at secunda fortuna nos satis edocti eramus, & medicinæ præsertim studium apud nos non solum perstitit, verum novos in diem progressus adeptum est, semitas tamen Arabum prosequendo, a quibus illam didiceramus; in scholis tunc præ manibus erant versiones Arabum Medicorum (a) præsertim *Canones Avicennæ*, & nonus Liber *Rhazis de Almanzor*. ubi specimen medicinæ, aut summa capita lectionum reperiiebantur; recensentur itaque triginta commentaria Rhazis, & plura Avicennæ ceterorumque Arabum.

Eorum sententiæ 30. ann. adhuc perstiterunt usque dum Bisantium Turcæ anno 1453. subjegerunt, & illuc litteræ obversæ apud nos restitutæ sunt, quare Medici Hyppocratem & ceteros Græcos Medicos pervolvere satagerunt, qui vividiorum lumen afferebant, ut considerari possit hujusmodi tempus, quasi initium tertiæ Medicæ Epochæ.

Dum medica ars intra Arabes fuit, & Sectatores suos, videlicet ab anno 800. usque ad 1500., quod spatium Secundæ Epochæ tribuitur Galeni sistema profecuti sunt, etiam si parum inter Chlinicos usuveniret. Inter opera medica illius ævi leviter de natura, indole, & differentiis morborum pertractarunt; offerunt enim synopsice indicationes, vel ut tunc loqui solebant *intentiones*, & *ingenia* morborum indicabant, quæ prosequi necessum erat, atque magnopere curandi methodum inculcabant.

Simplicibus remediis, quæ Græcis innotescebant innumera nova remedia Arabes addiderunt, quæ apud illos crescebant, vel ex Indiis facile exportabant, quorum pleraque adhuc in pharmacopeis supersunt.

Quantumvis ampla esset eorum remediorum farrago, nihilo tamen minus in medicina adhuc non exuberarent, nisi Medici invicem plura eorum subiegissent ut innumeras compositiones patrassent. Nunquam tot electuaria *Lohoc Pillulæ*, *Sief*, aut *Colyrii sicci*, *Syrripi*, *Trochici*, *Triferæ Philonii*, *Rob*, *Hieræ* &c. medicinam infarcierunt, seu melius dicam nunquam polypharmacia maximum augmentum adepta fuit quam illis temporibus.

At dum materiam medicam excolebant alias medicinæ partes botanicam nempe, & anatomiam magis necessarias neglexerunt; miror cur Arabes Phi-

Gulielmi superius allati (6) solemniter anno 1196. Monspeli commorantibus promisit, atque decrevit publicis edictis, quæ adhuc supersunt minime, *prece aliqua, vel pretio, seu sollicitatione alicujus personæ* commoveri, ut solum Medicum Medicinam facere in publicis scholis sineret, at cuique quavis regione nato permetteret legere, aut præcipere scientias, quod successoribus suis pariter commendat. Evidens enim est generaliores sese explicandi rationes *quicunque sint, & undecumque sint*, Judæos & Saracenos comprehendere, ut medicinam Monspeli libere & ipsi exercere valerent.

(6) Gabriel, *ubi supra*, pag. 129.

(a) Prælegebatur Avicenna, qui Princeps totius artis habebatur ac appellabatur. Prælegebatur Rhazis, & præsertim nonus ipsius ad Almanforem Liber, in quo absoluta curandarum omnium morborum ratio proponi ferebatur. *Janus Cornarius, in præfat. Paulo Aeginetæ præfixa.*

Phytologiæ studium contemnerent, quod a Græcis magnopere excolebatur, quos tamen ipsi profecuti sunt; anatomix vero respectu eam Mahumeti leges contenderint, quæ cadavera tangere sub pollutionis crimine interdicebant, at quod mirum est similem errorem sectatoribus suis Christianis communicarunt, qui etiamsi religio non obesset tamen cadavera secare respuerunt; nonnulli credunt primum Monspeli Anno 1376. humana corpora dissecuisse de licentia Ludovici Galli Ducis Andegavorum Occitanix Præsidis; ipse enim facultatis doctoribus cadavera sumere permisit eorum qui cruce mulctarentur, quod confirmavit Carolus V. Rex Galliarum 1396.

Quod Arabes implicabat ne anatomiam excolerent, emortuorum etiam corpora perscrutari impendebat, ut causas morborum internas detegere valerent; eorum itaque opera pervolvendo hujusmodi observationes nedum reperiuntur, neque eæ obviæ sunt inter scripta Medicorum qui post illos vixerunt, ut inter minus recentes apud Gordonum tantum, aut Valescum de Taranta nonnullæ reperiuntur;

Anatomix Arabes novam scientiam colendam substituerunt Græcis ignotam; hujusmodi chemia fuit, cui præ ceteris incubuerunt etiamsi suspicari liceat ipsam ab Ægyptiis deprompsisse, qui primi eam perscrutati sunt; passim inter Medicorum Arabum reliquias fragmenta hujus scientiæ reperiuntur, quæ eam non parum cognovisse ostendunt, verum eorum affectu utiliter hac arte usi sunt, quod facile innotebit labores perlegendo Arnaldi Villeneuve, & Raymundi Lulli, qui ceteris præcellerunt.

Arabes Astrologiam pariter commendabant, eamque praxi applicabant; necessum enim erat fases, aut conjunctiones planetarum consulere, easque consecutionibus aptare, quas ipsi deducebant; ex hoc procedit distinctio dierum climactericorum, & criticorum, præsertim series Ægyptiacorum, cujus rei futilitas apud nos diu perduravit; diariis enim indicabant tempora purgandi, aut venas incidendi magis idonea, & medici ipsi ea magni faciebant, ut nunquam obsistere auderent.

Eorum credulitas imo dicam fraus in diem magis proficiscebatur, ideoque Talismanorum virtutem magnificiebant, modo tamen certa quadam ratione, aliqua fasi planetarum occurrente, cum juramentis, Iconibus, & characteribus specialibus perficerentur; putabant enim hac methodo sanitatem conservare, amissam recuperare, & fortunas, atque opes facile adipisci posse; innumera referre possem exempla, at sat erit eo lectorem mittere ubi Arnaldus de Villeneuve de sigillis, & physiciis ligaturis in suo Tractatu disferit, in quo duo subsequenter refert exempla. Gersonus Cancellarius Universitatis Parisiensis mentionem facit in una sua Epistola (a) cujusdam Jacopi Angeli Medici, insignis Villæ Montispezzulani, eumque contemnit, quia superstitione abreptus dies climactericos observabat, de observatione ait ille dierum quantum ad opera; aspernitur pariter alterum Clinicum in alia sua Epistola, (b) qui adversus Nephritidem Talismanum præcipiebat collo suspensum, & Leonis imagine paucis characteribus additis incisum.

Eo tempore duo novi morbi, quæ usque illuc Græcis, & Romanis incogniti erant apparuerunt, qui non parum illius ævi Medicos implicarunt, ut novam familiam practicæ instituerent.

Primus fuit variolarum morbus; quidam comprobare tentarunt Medicos Græcos hujusmodi morbum non latuisse, & obvertendo sensum operum eo-

Astruch de Morbis Mulierum.

V 3

rum

(a) Tom. I. editionis postrema Antuerpiana.

(b) Tomo eodem, ad annum 1428.

rum id ostendere satagebant, at illusio neque communis fuit, neque diuturna, hodie communiter receptum est huiusmodi egritudinem Arabis endemiam fuisse, atque apud eos commorasse usque dum circa septimum sæculum extra natali soli dominium ampliarunt in Asia, Syriam, Ægyptum & Persiam invadendo, atque Asiam minorem, in Europa vero circa octavum ævum Siciliam, Neapolim, Ispaniam, & Narbonensem Provinciam occupando.

Ab Arabis ergo, aut Saracenis variolarum infectio ad nos usque pervenit, quam nos ceteris nationibus communicavimus quæ illam ignorabant. Hispani enim in Mexico (a) Angli in Terra Mariæ (b) & Battavi in Insulis quas in Indiis Orientalibus occupant, ubi maxime progressæ sunt variolas exportarunt, id apud nos mille ab hinc annis evenit eque eandem vehementiam servant citra spem quod eas penitus pessundemus.

Alter morbus *lepra fuit* seu *Elephantiasis Arabum* in Ægypto, & Syria communis, quam Pompeus ipse apud Italos exportavit, ubi tamen cito desistit, ut superius observavimus in prima epocha; Galli vero in duplici Cruciata XI. & XII. sæculi hoc morbo correpti sunt, quem in Galliam transtulerunt, ceterisque Europeis communicarunt, at post 500. annos circiter tandem abiit.

Quæ adhuc exposita sunt ostendunt apud nos morbos alienigenos similem effectum præbere ac animalia, aut arbores, quæ, e longinquis Regionibus apud nos transferuntur: Puli enim Indii in Europa facile cicurantur, at Pittaci Americani pereunt, crescunt castanea non vero palmæ, & pistachia, quare concludi potest inter animalia, arbores, & venena exotica, quædam facile climati nostro assuescere, alia nunquam.

A C. AVICENNA Medicus Mahumetanus qui in Araba lingua appellatur
N. *Abubali*, *Alhoussain*, *Ebenhali*, *Ebensina*, idest Houssain pater Hali, fi-
Ann. lius Hali, filius Sina. Ab hac postrema voce *Ebensina* illum Avicenna
100. composuimus, quo huiusmodi Medicus insignitur.

In Persia natus est anno Hegiræ 370. & Æræ Christianæ 980., obiit anno Hegiræ 428., & a C. N. 1038. ideoque 58. annos vixit, cuius brevem ætatem tribuunt libidinosa vitæ.

Ille etiam si parum vixerit, multum tamen scripsit. Ejusdem duo volumina reliqua sunt *in fol.* Venetiis impressa apud Junta Ann. 1595., quorum pars Venetiis pariter edita fuit 1500. *in 4.*

Præcipuum Avicennæ opus *Canon Medicinæ* appellatur videlicet *Medicinæ regula*; in quinque Libros dividitur, qui integram medicinæ institutionem complectuntur, ibique in libro tertio de *Morbis Mulierum* partractat, *Fen* seu Sectio XXI. tres tractatus continet, quorum ambo priores conceptionem, gestationem, & partum respiciunt, tertius ceteros Morbos Mulierum ostendit.

Mihi visum est Avicennam ceterorum Arabum Medicorum assecclam fuisse, at haud facile est clare ipsius operis indolem perscrutari, nam versio illa Avicennæ, quæ apud me est a Gerardo Cremonensi peracta, & ab Andrea Alpago correctæ, tum a Joanne Costeo, & Joanne Paulo Mongio revisa, tandem a Fabio Paulino Utinensi publicata, ita inconcinne elaborata fuit, & hinc illinc obscuris fragmentis, lacunis, arabis vocibus interperfa, ut vix intelligi queat.

JO-

(a) Bernard. Diaz de Castillo, Cap. 221. Francisco Lopez de Gomara, Cap. 102. Antonio de Herera. Decad. II. Lib. X. Cap. 4.

(b) Martinus Lister, Exercitatione VIII. De Variolis pag. 153.

JOHANNES SERAPIONUS Medicus Arabus, de quo pauca scimus, vixit A. C. N. Ann. 1060. probabiliter XI. sæculo circa Annum 1060., aut 1070.

Ejusdem duo libri extant sub titulo alter

De simplici medicina a Simone Januensi latine versus postquam a Judæo Dertosæ ex Arabo traditus fuit.

alter erat

Practica Johannis Serapionis dicta Breviarum ex Arabo latine versa a Gerardo Cremonensi

Ambo ea volumina impressa fuerunt Venetiis in fol. per Bonetum Locatellum Bergomensen 17. Calendas Januarias 1497.

In hoc postremo libro de omnibus corporis morbis agit in VII. Tractatus materiam distinguit; in IV. Tractatu capita decem postrema de Morbis mulierum pertractant juxta ceterorum Arabum sententiam; ea tamen capita non omnes mulierum ægrotudines complectuntur.

HALY ABBAS vel ut ille appellari consueverat in capite III. Operis infra enunciandi Haly filius Abbas, discipulus Abimeher filius Moyssis vixit sæculo XI., & Arabo idiomate scripsit libellum sub titulo. A. C. N. Ann. 1066.

Regalis dispositio quæ morborum est Tractatus in duas partes distinctus, *Theoretica* una, quæ decem libros continet, *Practica* altera, quæ totidem libras complectitur.

De Morbis Mulierum seu melius de quibusdam eorum in libro IX., Capite 38. & 39. primæ partis agit, & in libro VIII. secundæ partis capita 20. consecutiva habentur, quæ ad illos morbos pertinent, at in utraque parte ad formulas nonnullas omnis reducitur labor, nunc jam obsoletas.

Haly opus latine vertit Antiochiæ anno 1127. Stephani quidam ut ad libri collum indicatur; hujusmodi versionem vero repurgavit Doctor Medicus Antonius Vitalis quam typis mandavit apud Jacobum Myt Lugduni in 4. anno 1523.

ABUBETER RHAZES vixit circa annum 1070. inter plures libros quos de Medicina composuit conspicuiore sunt decem illi Almanfori dicati Regi Cordubæ, IX. præsertim qui synopsis morborum omnium complectuntur innumeris aliorum auctorum commentis referti. A. C. N. Ann. 1070.

In hoc libro integer articulus reperitur qui in XI. capita de Morbis Mulierum pertractat; quamquam tamen magni faciant hunc libellum, nihilominus parvi pendet; in eo Avicennam sæpe in testimonium advocat, quod ostendit paullo post vixisse.

Hoc opus Rhazis cum addito libello ab editore exarato sub eo titulo *Libellus familiarium introductionum in artem parvam Galeni* impressum fuit in fol. Hagenoë 1533. sollicitationibus Doctoris Georgi Kraut.

CONSTANTINUS Medicus Orthodoxus Cartagenus qui etiam si in ea Civitate Saraceni imperarent Arabam, Græcam, & Latinam linguam addidiscit in qui- A. C. N. Ann. 1070.

in quibus plures libros Arabum Medicorum tradidit ; verum in Apulia se recepit apud Robertum Griscardum illius Provinciæ Dominum , ibi in monte Cassinensi Monasticam vitam duxit An. 1060. & cum Ablate Didier consuetudinem habuit , qui postea Pontifex creatus fuit appellatusque Victorius III. , qui obiit Anno 1087. , deinde cum Alphano necessitudinem iniit , qui primus fuit Salerni Archiepiscopus circa Annum 1070. cui dicavit libellum *De Stomachi affectionibus* , ideoque ipsum Anno 1060. 1070. , aut 1080. vixisse constat.

Ejusdem operum collectio Basilæ excussa fuit *in fol.* Anno 1536. addito opusculo *De Passionibus mulierum* , & *matricis* ; at hujusmodi Tractatus , qui tres paginas non superat , nihil animadversione dignum præstat.

A. C. ALBUCASIS Medicus Mahumetanus Arabo nomine *Aboul-Casem* vixit N. Anno circiter 1085. post se reliquit opera plura , quæ ad nos nondum per-
Ann. 1085. venerunt , de illo superest Tractatus subsequens Chirurgicus

Manualis Medicina , impressa cum *Chirurgia Guidonis de Cauliaco* Venetiis 1500. *in fol.*

Hujusmodi opus ex Arabo latine vertit Gerardus Cremonensis , qui asserit trigesimam tantum partem complecti grandioris operis sub Titulo *Azaragi*.

At quomodocumque res se habeat Albucasis liber in III. partes dividitur , & in secunda parte a Capite LXXI. ad LXXVIII. de Morbis Mulierum agitur , ibique Chirurgiam commendat in partu , foetus mortui , aut placentæ extractione , & in abscessu aut cancro uteri &c. , octo hujusmodi Capita inferuntur in duplici collectione VVolphii , & Spachii.

A. C. AVENZOAR , seu Arabice (a) loquendo *Aben Zohr Alandlausi* filius N. Zohr Vandalici Medici celebris in Vandalicia nati religione Judæi. Ave-
Ann. 1100. roes (b) ipsum laudat , & asserit 135. An. vixisse. Verum ni id credere mavis concludi tamen poteris paulo antea inter vivos fuisse idcirco initio sæculi XII.

Extat Avenzoaris opus sub titulo *Taisir* , seu *Theisir* quod Arabice sonat

Liber Theisir clahelmodana vahelsabir , idest , *Rectificatio medicationis* , & *regiminis*. Venetiis 1496. *in fol.*

Hoc opus de omnibus Mulierum Morbis differit dividitur in XXVI. Tractatus , & in XXI. de *passionibus matricis* agitur in septem breviora capita distincto , quæ singula hic referam

- I. De matrice & defectu conceptionis
- II. De apostematibus matricis
- III. De corrosione matricis
- IV. De laxitudine , & dislocatione matricis
- V. De superfluitate fluxus menstrui
- VI. De retentione superflua menstruorum
- VII. De opilatione , & plenitudine carnis , & scissura in ore matricis.

AVER-

(a) D' Herbelot , *Bibliotheca Oriental.* sub voce Zohr.

(b) *Lib. IV.* Colliger. Capitulo de diebus criticis.

AVERROES in Arabo idiomate *Eben-Rhorc* Medicus Mahumetanus, qui Cordubę medicinam exercebat circa Annum 1170. plures libros Artis reliquit, inter quos celebrior fuit, qui sub nomine *Colliget* impressus fuit Venetiis inter Opera Abhomeron Aben Zoar apud Gregorium de Gregoriis 1496. in fol. ; at post illud tempus pluribus aliis collectionibus ipsum addiderunt.

A. C.
N.
Ann.
1170.

Hujusmodi *Colliget* synopsis brevissima est omnium morborum in VII. libros distincta; in III. libro Averroes, Capite XXIX. & Capite IX. libri IV. de Morbis Mulierum verba facit, & pauciora de iis morbis refert ut vix mereatur inter Tractatus de Morbis Mulierum recenseri.

NICOLAUS BERTRUTIUS Italus Bononiensis; vixit ut ajunt Anno 1250. Opus Medicum reliquit, cujus titulus

A. C.
N.
Ann.
1250.

Collectorium Artis Medicę tam practicę, quam speculativę. Lugduni 1509. in 4.

Illud opus vero sub diverso titulo pluries recussum reperitur, & in duos libros distinctum, quorum alter *De Morbis particularibus*, alter *de universalibus* agit; prior in 4. partes subdividitur

In tertia parte, Auctor de nonnullis mulierum ægitudinibus sermonem instituit, deque iis causas, & signa ostendit, omittendo tamen medendi rationem; Medicus qui hunc librum edidit Hagenoæ Ann. 1533. cum ipsum laudis extollere vellet in Pręfatione editionis suadere tentat specimen esse tertii, & quarti libri *Canonis Avicennę*, quod elogium nostris temporibus parvi pendet.

TROTULA. Hoc nomine insignitur Tractatus de Morbis Mulierum sub titulo

A. C.
N.
Ann.
1250.
vel
1300.

Gynęciorum Liber, curandarum ægitudinum in, ante, & post partum.

Hujusmodi opusculum quod 63. exigua capita complectitur Anno 1544. Argentinę impressum fuit cura Georgi Kraut, verum Parisiis Anno 1550. recussum, in duplici etiam collectione inseritur Auctorum, qui de hac re pertractarunt.

Hic libellus quamquam parvi faciendus, discrepantię tamen inter Medicos non levis causa fuit, cum nonnulli ipsum *Eros* cuidam tribuant Julię manumisso Augusti filię; alii Obstetrici Salernitanę ipsum referant, quę *Trotula* appellabatur.

At quęstio facile solvi potest; Trotulę enim in prima Argentina editione opus tribuitur juxta manuscriptum ex quo fuit depromptum; eadem Trotula Capite 20. recensetur, quę ægram sanavit ei commendatam, ergo ipsa opusculum exaravit de quo quęstio habetur; itaque qua ratione unquam *Eros* tribui potest, cum Capite 61. de Saracenis Medicis verba fiant, eodemque Capite remedia cosmetica proponantur, quibus Salernitanę mulieres utebantur; verum Capite 17. Cophon recens Auctor in testimonium advocetur, tandem Capite 61. Camphora pręscribatur, quę sub Augusti Imperio nedum innotebat.

Credidimus circa annum 1250. hunc laborem referre cum antea nondum Sera-

Saracenæ mulieres illuc medicinam exercerent ut Trotula *Capite* 61. narrat; & Cophon testatur *Capite* 17.; certiores fieri potuiffemus de Trotulæ ævo si innotuiffet ipsius Cophonis tempus, at ipse pariter latitat; ejusdem enim duo opuscula tantum supersunt, ad calcem Mesue impressa Lugduni Anno 1539. alterum *modus medendi* appellatur, alterum quod brevius est *De anatomia porci* agit, utrumque pervolvi, & reperi ipsum citare *Passionarium Galeni videlicet Gariopontum, & Constantinum*, qui utrique ad annum 1000. pertinent, quod tantum ostendit post illud tempus Cophon vixisse.

A C. HENRICUS DE SAXONIA discipulus Alberti Magni qui vixerit sæ-
N. culo XIII.
Ann. 1290.

Ei tribuitur duplex Tractatus videlicet

De Secretis Mulierum. Augustæ 1489. in 8.

De Secretis Naturæ. Francfurti, 1615. in 8.

Ambo ii tractatus Mulierum Morbos respiciunt videlicet conceptionem, gestationem, partum, & puerperium; verum tot erroneis, & superstitiosis fabulis scatent, & quod veri complectuntur inconcinne ita proponitur, ut minime pervolvi mereantur.

Uterque Alberto Magno tribuitur Fratri Dominicano, & Episcopo Ratisbonensi quem sæculo XIII. magni faciebant. Petrus (a) Borussus ejusdem Ordinis Frater contendit Albertum hunc librum composuisse, quem potius cuidam Thomæ de Cantiprè tribuere vult; fortassis veritatem defendit, at in editione, quæ apud me extat utrumque Henrico de Saxonia Alberti Magni discipulo referunt.

A C. BERNARDUS GORDONUS celebris Medicus Monspessulanus, qui
N. docuit Anno 1285. decem, aut undecim post Annos videlicet ad Ann.
Ann. 1296. Tractatum Therapeuticæ composuit sub titulo *De decem ingeniis seu*
1305. *indicationibus curandorum morborum*, & novem post Annos vigesimo nempe quo lecturam assumpserat circa 1305. grandiozem tractatum exaravit, quem *Lilium medicinae* nuncupavit, ipse universalem omnium morborum pertrationem præstat; delectabantur tunc opera tumidis titulis insignire quales sunt, *Flos florum, Lumen luminum, Rosarium Philosophorum* &c. nil mirum ergo si eodem errore & Gordonus correptus sit; non abs re tamen erit rationes referre, quæ ipsum induxerunt hoc titulo libellum decorare. *Hunc librum*, ait, *intitulo Lilium Medicinæ; In lilio enim sunt multi flores, & in quolibet flore sunt septem folia candida, & septem grana quasi aurea. Similiter liber iste continet septem partes, quarum prima erit aurea rutilans, & clara alie autem sex partes erunt candidæ.*

In ejusdem operis libro septimo de Morbis Mulierum Gordonus agit a *Capite* nempe VIII. ad *Caput* XVIII.; Arabum methodum undique profectus est, quorum fuit assecla, at illis nitidus magis est, & methodicus, verum interdum rationes observationibus confirmat.

Prima editio hujus operis Venetiis impressa reperitur Anno 1494. in fol.

A C. JOANNIS PLATEARIUS Medicus Salernitanus, qui a sæculo XIV.
N. vitam ducebat varios Tractatus digessit alter eo titulo insignitus.
Ann. 1350. Li-

(a) In vita Alberti Magni *Cap.* XVII.

Liber de simplici medicina, dictus circa instans, materiam medicam complectens

Alter appellabatur

Pratica brevis morborum curandorum, ubi de omnibus morbis pertractat.

In hoc postremo libro Auctor de Morbis Mulieribus locutus est juxta Arabum sententiam.

Ambo Platearii opuscula cum Serapione Venetiis excusa sunt in fol. Anno 1497.

VALESCUS DE TARANTA Lusitanus Monspessuli medicinam exercere incepit Ann. 1382. & post triginta, & sex Annos incoactæ praxis videlicet circa 1418. practicæ opus congeffit quod *Philonium* nuncupavit. A. C. N. Ann. 1418.

Illud in septem libros dividitur, at quibus rationibus tali pacto Valefcus opus distinguat perspicito; *Rationabile mihi visum est, ait, hunc librum in septem particulas esse partiendum 1. Enim sunt septem verba quæ Dominus noster Jesus Christus Salvator noster in Cruce pendens locutus fuit, septem sunt dona sancti Spiritus; septem sunt gaudia Virginis gloriosæ; septem Sacramenta Ecclesiæ; septem petitiones in Dominica oratione; septem sunt virtutes &c.*

In septimo igitur libro duodecim Auctor capita ad Morbos Mulierum pertractandos destinavit; Stylus sane barbarus apparet, at medicina rationabilius explanatur quam in pertractationibus tum Arabum cum Sectatorum suorum; observationes nonnullæ in hoc opere reperiuntur, quin etiam in illo Gordoni, quæ minime perleguntur in ceteris illius ævi Auctoribus; prima Philonii editio Lugdunensis est in fol. 1490.

MARCUS GATINARIA Medicus Papiensis sæculi XV., qui innotuit commenti ergo, quod in librum de Rhazis Almanfori dicatum exaravit Lugduni impressum Anno 1506. in 4. & Parisiis in 8. Anno 1540. titulo insignitum. A. C. N. Ann. 1440.

Marci Gatinariæ de curis ægritudinum particularium, Noni Almanforis Pratica uberrima.

In hoc Tractatu sex capita reperiuntur, in quibus de nonnullis Mulierum Morbis interdum agitur, & eorum curatione ex. gr. cura exitus matricis cura superflui fluxus menstruum, cura retentionis menstruum, cura præfo-cationis matricis, cura rhagadiarum vulvæ, & ejus apostematis, cura mole matricis.

Nulla theoria de iis morbis ibi invenitur, at curandi potius methodus, vel ut melius dicam formularum farrago ab Arabis deprompta, quos continenter citat; nonnullos Medicos vetustiores etiam in testimonium vocat nempe Joannem Arculanum, Gerardum De Solo Professores Monspessulanos, tum Mattheum De Gradibus, & alios quamplurimos.

ANTONIUS GUAINERIUS Papiensis Professor, Mediolani medicinam fecit, ut Medicum fuisse Ducis Philippi Mariæ Visconti videatur. A. C. N. Ann. 1440.

Medicinæ cursum elucubravit sub titulo

Pra-

Practica celeberrimi Viri Antonii Guainerii, Papiensis Medicinæ Doctoris clarissimi, Papiæ impressa Anno 1518. in 4. verum Lugduni in 4. similiter Anno 1525.

In hoc libro habetur longa pertractatio de ægritudinibus matricis, quæ complectitur 27. Capita, & dicatur Philippo Mariæ Mediolani ac totius Liguriæ Duci, ubi ipse tunc temporis imperabat.

Hujusmodi dicatio respicit proculdubio Philippum Mariam secundum filium Joannis Galeatii Visconti I., idcirco cum ille Princeps obitus sit Anno 1447., necessum erit, quod opus hunc annum præcedat; hujusmodi Dux legitimis filiis carebat etiamsi magnopere optaret, quapropter paulo post Uxorem duxit ut ex Guainerii dicatione apparet *Dii boni!* ait, *quantas voluptas populos tuos Italiæ invaderet, si eum audierint ex Duce clarissimo natam, Duci magnanimo copulatam, filium parenti, & viro persimilem enixam.*

Guainerii opus Principi dicatum eo collineat, ut illum foveat felicem eventum, nam conceptionem, gestationem, & partum respicit, conceptum præsertim cujus obstacula explanat, & methodum sterilitatem præcavendi docet, at parvi pendet; Joannes tamen *Faucon* doctus Professor Monspessulanus tum hunc cum ceteros Guainerii libros commentatus est.

A. C. ANTONIUS CERMOSONUS Patavinus, qui unam e primariis cathedris hujus Universitatis occupabat, & Præceptor fuit Joannis Michaelis Savanarolæ, obiitque anno 1458.

Ipse publici juris fecit 153. Consultationes Medicas circa morbos omnes, quas typis mandarunt successores sui Venetiis anno 1503. *in fol.*, quod opus postea alio pluries recussum fuit, plerumque tamen cum Consiliis Medicis simul Bartholomæi Montagna Medici Bononiensis.

Inter ea Cermesoni consilia 22. mulieres respiciunt videlicet a 112. ad 133.; tantum nisi farraginem præstant formularum inconcinne distributarum, eaque sane Polypharmaciam satis ostendunt Arabum, & Sæctorum suorum.

A. C. JOANNES MICHAELIS SAVANAROLA Professor Patavinus medicinæ Opusculum exaravit Papiæ impressum *in fol.* anno 1486. postea pluribus Ann. 1486. in locis recussum in sex libros distinctum; eorum quinque priores circa qualitates, & naturam alimentorum versantur, seu materiam medicam explanant.

In postremo tantum libro Auctor de Morbis pertractat, & in Capite 24., uteri morbos ostendit quos in 24. *rubricas* seu paragraphos explicat; at potius conceptionem, gestationem, & partum perscrutatur, quam genuinas, & magis obvias matricis ægritudines.

A. C. GALEATIUS DE SANTA SOPHIA Patavii natus Anno 1490. celeberrimus Medicus fuit, qui non parum laudis sibi promeritus est cum IX. Ann. 1490. librum Rhazis interpretaret; hujusmodi comentarium reperitur in editione Rhazis cura Kraut excussa, superius pag. 311. enunciata, per articulos ipsum distribuitur ad calcem utriusque capitis.

A. C. ALEXANDER BENEDICTUS Veronensis sua prima juventute in (a) Græ-

(a) Medicin. Lib. I. Cap. 2. Lib. XXVI. Cap. 4.

Græciam apud Cretenses appulit ubi diu medicinam exercuit (*a*) Cydonii præsertim, & Methone in Pelopponeso. Ab hoc itinere redux Venetiis Ann. 1495. moram gerere sibi suadebat, at præmio sollicitatus (*b*) onus sumpsit Medici Classis Venetæ, quæ adversus Carolum VIII. Galliarum Regem, eodem anno impellebatur. Deducitur vero ab (*c*) Epistola ad eum missa anno 1508. inter vivos fuisse; imo cum in suis operibus ipse ostendat (*d*) terræmotum Anno 1511. Italiam concussisse, ideoque tunc temporis etiam adhuc vixisse credendum est.

Præcipuum opus ejusdem prostat sub titulo

Omnia a vertice ad calcem morborum signa, causæ, indicationes, & remedium compositiones, utendique rationes generatim libri XXX. conscripta.

Hi triginta libri Imperatori Maximiliano I. dicantur omnes, quare ante annum 1519. compositi fuerint, quia hoc anno princeps discessit.

Inter eos tres de Morbis Mulierum agunt XXV., XXVI., & XXVII. nempe; in priori libro in 39. capita digesto de conceptione, gestatione, & partu pertractat; in postremis duobus fusiùs absolvit alios Mulierum Morbos; videlicet catameniorum cessationem, hystericam passionem, & inflammationem, abscessum, ulcus, atque cancrum matricis ostendit, at de uteri furore filet prorsus.

Ipsam Græcam Doctrinam novisse constat, cum in singulis capitibus sententiæ reperiantur Galeni, Eginette, Oribasii, Empedocli, atque Athenæi ut synopsin potius Medicinæ Græcorum referat.

(*a*) Anatomices Lib. I. Cap. 14. Lib. III. Cap. 9.

(*b*) Chiocus De illustribus Veronensibus.

(*c*) Per Jacques Antiquarius. Elle est à la tête du Livre.

(*d*) Medicin. Libr. XXIII. Cap. 29.

FINIS SECUNDÆ EPOCHÆ.

T E R T I A E P O C H A.

Scientiarum restauratio sub fine XV. ævi, & initio subsequæ evenit, & medicina novam formam accepit; etenim a Turcis capto Bisantio Anno 1453. atque Orientis subverso Imperio litterarum cultores, qui a communi exsidio superfuerunt, se in Galliam, & Italiam receperunt, secum libros, & scientificas notiones exportando, hincque certatim Græcæ linguæ, & Græcorum Auctorum scrutinio se dicarunt omnes, quinnimo latinam linguam, atque latinos scriptores excoluerunt.

Hac ratione scientiis Medici valde profecerunt, & qui Græcos prosequerantur, Hyppocratis, & Galeni opera sedulo pervolverant, tum sectatorum suorum, quorum libros latine tradiderunt, ut omnes nationes facile Medicorum labores perscrutari valerent, quos typographiæ inventum obvios reddidit, brevi apparuit quanti existimarentur Græci, quantumque præcellerent methodo, & soliditate dicendi Arabis, quorum opera confusa, & arida experiebantur, ideoque omnem laborem impendere satagerunt Hyppocratem, & Galenum perquirendo, dum Avicennam, & Rhazim respuebant, qui diu nimis medicinæ imperium substinuerint.

Galeni systemati præsertim incubuerunt difficultates explanando, contradictiones conciliando, consecutiones perscrutando, atque ejusdem etiam incertæ quandoque, aut erroneas sententias defendendo, ut speciem veritatis, futilitatibus darent, uno verbo tunc Galeno ipso intimius ipsius systema cognoscere fatebantur.

Græcorum enim Medicina restituta fuit summumque lumen in hac epocha accepit, quæ etiam si diu non perduraverit, plures tamen doctos Medicos, optimosque libros subministravit; tunc enim primum integram medicinæ institutionem publici juris facere incepterunt, quæ Græcorum observationibus, & nonnullis Arabum suffulta rectam artis sternebat viam; accuratius itaque indoles, species, causas, & differentias singulorum morborum distinguebant, signa in iis intimius inquirebant, ut tutiorem prognosim enunciare valerent, tandem indicationes melius fanciebant, quibus mederi necessum erat.

Cum in Italiam primum Græci appulerint, ibique etiam primum litteræ resurrexerunt; Franciscus I. vero litterarum Pater, litteratos homines in tutelam recipiebat, & præmiis, atque honoribus ipsos sollicitabat, ut apud eum moram gererent, suisque beneficiis fruerentur; nihilo secius Itali ceteris litterarum nomine præcellebant, idcirco Italorum Universitates, Patavina præsertim olim sæculo nempe XVI. scientias omnes, & medicinam potissimum summo cum decore omnibus præcipiebat.

Ostendimus jam hujusmodi epocham breviorē fuisse; sæculi enim XVII. medium ipsa tantum attigit, quando sanguinis circulationis inventum, atque nova philosophandi methodus, ut infra exponemus, mutationes innumeras medicinæ attulerunt.

In hac epocha pharmaciæ incubuerunt, Arabis tamen accuratius atque ab eorum polipharmacia plura dēpserunt, ut tamen hanc medicinæ partem innumeris inutilibus, & superstitiosis remediis adhuc scatentem reliquerint.

Botanicæ Arabis sedulo magis consuluerunt, & in hac epocha Tragus, Clusius, Columna, Lobellius, uterque Bahuinus, & innumeri alii naturæ historiæ cultores floruerunt, qui hujus scientiæ obscuritatem sustulerunt, & plan-

& plantarum species atque virtutes, quibus veteres usi erant utiliter declararunt.

Chemiā pariter excoluerunt ab Arabis depromptam cui magis quam par erat dicati sunt. Paracelsus medicina prorsus expers, at chemicis remediis locupletatus, quibus satis imponere valebat magnum nomen adeptus est, novamque medicinā sectam instituit ratione denudatam, quæ diu tamen perstitit, & rationalem artem deturpavit.

Anatomia vero non parum progressa est; ea ætate enim innumeri flourerunt, anatomia celebres viri, videlicet Silvius, Vesalius, Columbus, Valverda, Falloppius, Eustachius, Spigelius, Andreas Laurent, Fabricius ab Aqua pendente, Gaspar Aselius &c. qui magnopere auxerunt antea actas notiones novaque magni momenti inventa suppeditarunt, tamen magis incubuerunt in describendis ossibus, musculis, vasis, quam in viscerum structura detegenda, quod potissimam constituit anatomiae partem, & medicinæ magis necessariam.

Prout anatomia proficiebatur, cadaverum sectiones, & observationes anatomicæ frequentius instituebantur; potuissimus enim in hoc medicinæ studio quamvis breviori earum plures congerere, quorum pleræque utilissimæ evaserint, & veram nonnullorum morborum sedem, atque causam determinaverint.

Verum Astrologiam judicariam ut in præcedenti magni faciebant; huiusmodi amentia, radicitus animis inserta, & Auctoritate Scriptorum suffulta, haud facile (a) abradi poterat; additote ea delectari debiles ingenii, & creduli, quorum adhuc maximus est numerus, ut vix ab hoc morbo convalescere queamus.

Talismanorum respectu tunc temporis ea parvi faciebant, modo tamen apud Proceres non subsisterent, qui circa hanc rem plerumque magis cum vulgo, quam vulgus ipse sentiunt; celebre illud Talismanum tunc præsertim prædicabatur, quod Regina (b) Catherinæ De Medicis tribuebant.

Tunc primum duo novi morbi invexerunt, lues nempe venerea, & scorbutus adhuc superstites.

Lues venerea enim morbus est advena, quem Hispani in Insula Haiti, seu Hispaniola contraxerunt, & tandem XV. sæculo dum armis Neapolim anno 1493. aggressi sunt, Neapolitanis, & Gallis communicarunt, ut ceteræ Nationes inquinarentur; hic supervacaneum censeo hanc morbi transfusionem reiterare, quam satis exposui in Tractatu *De Morbis Venereis Lib. I.* quem pervolvere fas erit.

Huiusmodi morbus initio vehementior erat, etiam si nunc admodum subactus appareat, adhuc tamen inter sæviores egritudines locum habet; Medici, quibus primum ipsum observare contigit, novitate perterriti undique nova remedia investigarunt quibus tandem ipsum compescerunt; etenim post tentamina innumera, & contentiones invenerunt Mercurium adipe extinctum & frictionibus applicitum genuinum, atque tutissimum adversus hunc morbum evadere; in nullo enim morbo remedii virtus magis elucescit, aut prudentia Medicorum, qui hoc remedium invenerunt, eumque exhibent, magis commendatur quam in hoc, ubi medicinæ certitudo potissimum refulget.

Scor-

(a) Nondum huius epochæ initio Astrologiæ forma quædam medicinam pertinebat destructa erat, ut judicare licuerit subsequentis Libelli ergo. *Nova Medicina Methodus curandi morbos, ex Mathematica Scientia deprompta Joh. Hasfurto Viridungo, Medico & Astrologo doctissimo Authore. Hagæne 1533. in 4.* (b) *Memoires de Trevoux. Decembre 1704.*

Scorbutum olim innotuisse videtur; *Stomacace* enim & *Scelotyrbe* quibus Romana acies ab Aelio Gallo imperata (a) Strabone teste correpta est dum apud Arabes bellum gerebat, verum eosdem morbos qui ut (b) Plinius testatur Germanici milites infestarunt trans Renum missos Scorbutum fuisse autumant, modo descriptioni eorum morborum indulgeamus; censerem enim *Lienes*, *magnos, convolvulos sanguineos*, & *Ileos Hematites* de quibus Hyppocrates pluries agit (c) & *Oscedum* contra quem (d) Marcellus remedia nonnulla proposuit, affectiones scorbuticas fuisse, aut ei valde affines, hujusmodi exempla demonstrant Scorbutum alias invexisse in quibusdam circumstantiis, non tamen communem morbum fuisse ut hodie centum ab hinc annis esse constat.

Ea ægritudo inter Incolas oræ Baltici endemia est, illam vernaculo idiomate *Scorbock*, seu *Scorbuck* appellant, quod significat *imi ventris morbus*, cum venter plerumque labefactetur; ex iis notionibus Scorbuti nomine hujusmodi morbum insignivimus; credunt ipsum in iis Regionibus endemium esse tum maritimi quem inspirant aeris ergo, cum alimentorum causa quibus vescuntur; Europa enim reliqua ubi mitior est aer, & cibi salubriores sunt eo, usque ad finem XV. sæculi, & subsequenter initium expers fuit.

Diutinæ vero navigationes, quas auri, & mercimonii cupiditas impulit, tum Indias cum Americam versus, morbum universalem reddiderunt eum nautæ deleteriæ indolis aeris, quem in itinere hauriebant, præsertim circa lineam, & infirmioris alimentorum qualitatis causa, tum laboris ratione eo facile corripere; animadverterunt iisdem de causis in obscuris carceribus detenti, & male alti, dum ibi diutius detinentur eodem morbo facile inquinari, ut similiter ægri, qui in nosocomiis minus idoneis diu persistunt.

Generice scorbutus pauperum morbus est, qui sordibus vescuntur aut morantur male tectæ domi, injuriis aeris expositi, præsertim cum aliquo languoris morbo vexantur, qui magis sanguinem depauperat; nihilo tamen minus & divites interdum hoc morbo affici possunt, cum extrema valde affinia sint; at id oppositis de causis accidere solet, quia isti plerumque eluones sunt, succosum nimis cibum assumunt, aut minuta gulis delectantur, parum se exercent, ut sanguini acrimoniæ vitium facile communicent.

Desideratur adversus Scorbutum remedium policrestum, ut adversus luem veneream Mercurium experti sumus; non desunt tamen nonnulla remedia, quæ modo cito exhibeantur, atque diu, huic ægritudini valide medentur.

Minime putarem inter novos hujus epocæ morbos recenseri posse febrem purpuream, ab Italis *petechiale* nuncupatam, quia ipsi *petechie* nuncupant rubras papulas, aut purpureas non elevatas, a pulicis moribus haud absimiles; quæ in hoc morbo (f) e cute erumpunt; me non latet Alexandrum Trajanum Petronium asseruisse hujus morbi originem anno circiter 1530. Italiam invasisse, quod Hieronymus (g) Tracastoreus Anno 1505. aut 1528. evenisse defendit; at modo parum versati erimus in Auctores veteres Medicos, innotebit exantemata aut efflorescentias rubras vel violaceas, quæ

(a) Geograph. Lib. VI. circa finem. (b) Histor. Natural. Libr. XV. Cap. 3.

(c) Prædicatorum, Libr. II. (d) Libr. De internis affectibus.

(e) De re medica Cap. II. (f) Voyez Engalenus, de Scorbuto.

(f) Tractat. de morbo Gallico, Lib. VI. Cap. I.

(g) De morbis contagiosis Lib. II. Cap. 6.

quæ Italarum *petechie* constituunt, & Gallorum rubras maculas, obvium febrium continentium, malignarum, præsertim, symptoma fuisse, quod interdum in iis febribus tamen deest; idcirco videtur, utrumque intellexisse potius novam intensiorem hujus symptomatis annunciare, quam novum morbum, ut ex ipsis verbis Fracastorei deducitur, qui asserit hujusmodi febres *Majoribus etiam nostris cognitæ* fuisse.

LEONELLUS DE VICTORIIS Faventinus in Bononiensi Licæo Medicinæ Professor, celebris interpretis libri IX. Rhazis, qui discessit ut putant Anno 1530. (a)

A. C.
N.
Ann.
1525.

Practica medicinalis Lugduni 1554. ad calcem hujus operis in quo pertractare satagit de morbis omnibus, in LXXVII. capita librum dividendo, reperitur subsequens libellus

De matricibus affectibus compendiolum saluberrimum

Ipse complectitur sex subsequencia Capita.

- I. De suppressa muliebri purgatione.
- II. De nimia expurgatione muliebri.
- III. De cursu sive fluxu humiditatum albarum, sive de cursu matricis secundum Avicennam.
- IV. De præfocatione matricis.
- V. De apostemate matricis.
- VI. De præcipitatione seu descensu matricis.

Hujusmodi Auctor nedum perlegerat Medicos Græcos, nam in hoc opere nudam Arabum doctrinam reperies, & editor Joannis Kufner scholia addidit nonnulla ejusdem sensus.

JASON PRATENSIS Zelandus qui floruit circa annum 1531., & non parum laudis in hac arte adeptus est.

A. C.
N.
Ann.
1536.

Libri duo de Uteris, in quibus Lector candidus opulentissimam simul ac lautissimam naturalium rerum, & historiæ suppellectilem inveniet Antuerpiæ 1531. in 4.
Liber de arcenda sterilitate, & progignendis libris, doctus, & elegans. Ibidem 1531. in 4.

LUDOVICUS BONACCIOLUS Florentinus. Extant duo libelli ab hoc Medico de Morbis mulierum exarati, quorum prior,

A. C.
N.
Ann.
1536.

De uteri, partiumque ejus confectione. Ejusdem, quonam usu in absentibus etiamnum Venus citetur? Quod quale, undique prolificum semen, unde menstrua? &c. Argentinæ 1537. in 8.

Alter,

De conceptionis indiciis, necnon maris femineique partus significatione. Ejusdem, quæ utero gravidis accidunt, Astruch de Morbis Mulierum.

X

& eo-

(a) In Epistola nuncupatoria Libro præfixa.

De eorum medicina prognostica, causaeque effluxionum
De, abortuum, De proceritatis improceritatisque par-
tuum causae. Argentinae 1538. in 8.

A C. DIONYSIUS FONTANONUS Monspeffulanus in ea Civitate medicine
N. Professor vixit anno 1556. obiit post annum 1544.
Ann. 1540.

*Practica Medica, sive de Morborum internorum curatione
Libri IV. In lucem dati a Johanne Renerio, qui sin-
gulis capitum initiis causas, & signa morborum ex
veteribus Classicis appinxit. Lugduni in 8. 1550.*

Fontanonus enim in eorum tertio libro 15. Capita habet de Morbis Mu-
lierum agentia. Theoria, & praxis hujusmodi Auctoris Arabum stilum
aemulatur eo magis Gordonii, & Valesci de Taranta

A C. NICOLAUS ROCHEUS Medicus Gallus.
N.
Ann. 1540.

*De Morbis Mulierum curandis Liber, partim ex veterum
Graecorum, Latinorum & Arabum monumentis, par-
tim experientia propria confectus. Parisiis 1542. in 12.*

A C. LEONHARDUS FUSCHIUS, Rhetus, natus VVemdingæ in Rhætia,
N. anno (a) 1501. ad Doctoratus gradum promotus est Ingolstadii an. 1521.
Ann. 1548. ubi paullo post, nempe anno 1526. Professoris Medici munere functus est.
Inde electus Archiater Marchionis Brandenburgici anno 1528. Tandem Tu-
bingam vocatus est anno 1585. ubi Medicinam publice docuit ad annum
1566. qui vitæ ultimus fuit.

Ipse medicinae institutionem in lucem edidit anno 1548., sub titulo se-
quenti.

*De curandi ratione Libri VIII. causarum, signorumque ca-
talogum breviter continentes, partim olim conscripti,
& nunc postremum recogniti, multisque locis aucti. Ba-
sileæ 1548. in 8.*

Fuschius in III. Libro hujus pertractationis 12. capita præbet, quæ de
nonnullis Morbis Mulierum agunt, ut in Cap.

- LIII. De suppressis mensibus.
- LIV. De redundantibus mensibus.
- LV. De fluore muliebri.
- LVI. De uteri suffocatione.
- LVII. De uteri procidentia.
- LVIII. De mola.
- LIX. De inflammatione uteri.
- LX. De inflatione uteri.
- LXI. De uteri exulceratione.
- LXII. De phimosis uteri.
- LXIII. De sterilitate removenda.
- LIV. De Difficultate partus.

Au-

(a) Ex oratione funebris Leonhardi Fuschii, Operib. Fuschii præfixa in edit. Franc. ann. 1604.

Auctor in suis exarandis operibus nitido stilo usus est, & optima methodo, sed obvias tantum notiones refert, neque præcellit Medicis qui circa hanc rem post eum plures Tractatus digesserunt.

Afferit (a) ea volumina publici juris fecisse, ut Arabum & Sectatorum suorum libri abriperentur, ex Alemanorum Medicorum manibus, qui continuo deturpabantur, mordicus Arabum sententias defendendo. Nul-
li, ait, vel pauci per universam nostram Germaniam reperti sunt Medici, qui non constanter eam quam ab Arabibus, ac recentioribus quibusdam Bar-
baris certe, & ineptis admodum hominibus præscripta est in curandis mor-
bis rationem secuti sint, ac ita mordicus etiam tenuerint, ut ne latum qui-
dem unguem ab illa discesserint.

JACOBUS RUEFF Chirurgus Tigurinus.

*De conceptu & generatione hominis, & iis quæ circa hæc
potissimum considerantur, Libri IV. Insertæ quoque sunt
figuræ variæ fætus, primo in utero siti, deinde in par-
tu, mox etiam matricis, & instrumentorum ad par-
tum promovendum & extrahendum pertinentium, nec
non postremo variorum monstrosorum insuper Tiguri
1554. in 4.*

A C.
N.
Ann.
1534.

JACOBUS SYLVIUS DE LA BOE Ambianus medicinæ Doctor in fa-
cultate Montispeffulii, & Bacalaureus in Parisiensi, celebris Medicus fuit,
qui interiit anno 1555. ætatis suæ 77.

A C.
N.
Ann.
1554.

Inter cetera opera, quæ Renatus Moreau Medicinæ Doctor Facultatis Pa-
risiensis collegit in unicum volumen in fol. 1630. Tractatus ejusdem Au-
ctoris perlegitur, qui antea apparuit sub titulo.

*De Mensibus mulierum, & hominis generatione Commenta-
rius. Basileæ 1556. in 8.*

JOANNIS FERNELIUS Clarimontii circa Ambianum Bellovacorum na-
tus, medicinæ lauream accepit in facultate Parisiensi Anno 1528.; scriptis
& praxi celeberrimus fuit; ab Henrico II. in Archiatrum electus munus
illud gloriose sustinuit, obiit Lutetiæ Mense Martii anno 1558. ætatis
suæ 72., ut G. Plantius testatur, etiamsi Fausta hujus Facultatis revisa a
Gui Patin 52. annos vitæ tantum ipsi tribuat, quod ostendit etiam Epita-
fium, quod Inepotes Patruum tumulo aposuerunt ab eodem Patino con-
fectum. Fernelius specialem Pathologiam composuit, in cujus tertio Libro
pertractat *De morbis partium quæ sub diaphragmate sunt*, ibique tria Capita
extant de Morbis Mulierum sub titulo

A C.
N.
Ann.
1554.

XV. Uteri affectus, causæ, signa & curatio.

XVI. Uteri symptomata, horumque causæ, prognostica, curatio.

XVII. Sterilitatis causæ, prægnantium signa, symptomata, ho-
rumque casus, indicationes, prognostica, curatio.

Morbi Mulierum in iis Capitibus explicantur juxta doctrinam Fernelii
tempore receptam, at cum exigua sint capita potius indicantur quam ex-
planen-

planentur hujusmodi morbi ; Quod magis interest est , Fernelium (a) Galenum profecutum esse cum fateatur uterum positum mutare haud posse ; at testatur in hysterico morbo crebre observasse matricem stomachum versus globuli ad instar ascendisse ; patet enim se decepisse , globulum hystericum , aut glomum ab intestinorum convulsiua crispatione ortum pro utero prædicando.

A C. BALDUINUS RONSSÆUS Gandayensis Medicus Goudanus.

N.

Ann.
1555.

De hominis primordiis , hystericisque affectibus , & infantilibus aliquot centones Lovanii 1559. in 8.

Post illius mortem nonnullorum ejusdem operum codicem ediderunt in quo pertractatio extat Morborum Mulierum.

Opuscula Medica. I. Epistolæ Medicinales. II. De Morbis Mulieribus. III. De Venatione Medica. IV. De Scorbuto. Accesserunt quidam aliorum celebrium Medicorum de Scorbuto Tractatus Lugduni Batavorum, 1618. in 8.

A C. JOANNES BAPTISTA MONTANUS Veronensis celebris Professor Patavinus,

N.

Ann.
1555.

De uteri affectibus.

Hujusmodi Tractatus extat in secundo Tomo collectionis nonnullorum operum Montani cura excussa Hieronymi Donzellini in duplici Volum. in 8. Basileæ Anno 1558. , at hujusmodi opus jam Parisiis Anno 1556. fuerat impressum in 16.

Habentur etiam decem Consilia ejusdem Auctoris circa Mulierum Morbos in eo Tractatu

Consultationes de variorum morborum curationibus , auctæ per Joannem Cratonum Crafftheim, & impressæ Basileæ Anno 1583. in fol.

A C. PETRUS de BAYRO Taurinensis diu illuc medicinam præcepit ; Anno 1468. natus est ; obiit Anno 1558. ætatis suæ 90.

N.

Ann.
1558.

De medendis humani corporis morbis Enchiridion, vulgo Veni mecum dictum , cum adjuncto ejusdem Tractatu de Peste . Lugduni 1561. in 12.

Hujusmodi libellus post Auctoris mortem per Theodorum Zvvinger Medicum Rauracum publici juris factus est , fynopsim præstat brevissimam juxta Arabum Medicorum sententiam formulis locupletatam , quæ passim in veteribus reperiuntur , in eo pauca de Mulierum Morbis dicuntur , vel obvia admodum.

A C. VICTORIUS TRINCAVELLIUS Venetus publicus Professor Patavinus, qui Montano anno 1551. successit, interiit anno 1568. ætatis suæ 77.

N.

Ann.
15560.

Victo-

Victoris Trincavelli omnia Opera in duos tomos digesta Lugduni 1586. in fol.

In priori tomo medicinæ institutiones perlegi queunt sub titulo

Prælectiones de ratione curandi omnes humani corporis affectus in XII. Libros distinctæ.

Liber ex illis decimus primus 25. priora capita complectitur, quæ plerumque mulieres respiciunt juxta methodum illius ævi.

In secundo volumine tres libri reperiuntur, consultationum Medicarum, inter quas tres Morbos Mulierum ostendunt, eæque in collectionibus VVolphi, & Spacchii inferuntur.

GULIELMUS RONDELETIUS Monspessulanus, Anno 1507. in lucem A. C. editus medicinam adeptus est Monspeli, ubi laurea 1537. condecoratus fuit, N. cathedram ascendit 1545., & Universitatis Cancellarius creatus An. 1556. Ann. obiit Montisrealis ad Albim Anno 1566., 59. vitæ suæ. 1569.

Præter plures hujus Auctoris diversi generis labores superest subsequens pertractatio;

Curandi morbos Methodus, quæ vulgo Pratica dicitur, in tres libros distincta. Lugduni 1583. in 8., & postea impressa alibi pluries.

In tertio libro Auctor de Morbis Mulierum sermonem iniit a Cap. LX. ad LXXV.; quæ ipse ostendit parvi pendent, quare si hujusmodi opusculum aut venenorum historiam perscrutemur facile deduci poterit magis ipsum in naturali historia, quam in medicina versatum fuisse.

Laurentius Joubert animadvertit ad calcem vitæ Rondeletii quatuor pertractationes reliquisse, quas typis mandare in animum habebat, quarum nonnullæ ad Mulierum Morbos pertinebant.

De impedimentis generationis.

De effectibus gravidæ, parturientis & puerperæ.

De effectibus infantium & puerorum.

De morbis hæreditariis.

At hæc nondum impressa sunt.

THADÆUS DUNUS de Locarno Civitas primaria ejus comitatus.

Muliebrium Morborum omnis generis remedia ex Dioscoride, Galeno, Plinio, Barbarisque, & Arabibus, collecta & disposita. Argentorati 1565. in 8.

A. C.
N.
Ann.
1565.

JOANNES VVIER Gravinensis in Ducatu Brabantii natus circa annum A. C. 1515. originem habuit Parisiis, medicinam profecit Aurelio ubi gradum (a) N. Doctoris sumpsit, iter fecit Cretam versus, & in Africam appulit, donec an. 1550. in Patriam restituto Gullielmus (b) Dux Cliviæ ipsum in tutelam

Astruch de Morbis Mulierum.

X 3

rece-

(a) Melchior Adamus. *De vitis Germanic. Medicor.*

(b) Idem ibid.

recepit, replevitque hujusmodi onus per annos 38. verum anno 1588. occubuit (a) ætatis 73.

Observationum Medicorum rararum Libri II. Basileæ, apud Oporinum, in 4. 1567.

In primo libro VVierus aliquas observationes refert *De utero clauso. De Hyeme. De colli Matricis phymate, ejusque curatione. De curatione gangræne pudendi*, quæ perlegi merentur.

A C. JOANNES GUNTHERIUS Andernachus ad Rhenum ortus anno 1497.
N. Parisiis Medicinam adeptus est, ibique Doctoratus gradum sumpsit, & post-
Ann. 1570. quam diu moratus est Metam se recepit ultra Srasburgum ubi praxim medicam honorificentissime docebat, occubuit 1574. primæ vitæ 77.

Gynæciorum commentariolus, de gravidarum, parturientium, puerperarum, & infantium cura. Argentorati 1606. in 8.

Hic liber impressus fuit, ut patet, diu post Auctoris obitum, nam manuscriptum, quod incompletum supererat, a Joanne Georgio Scheuckio perfectum fuit.

A C. GIOVANNI MARINELLO Veneto.

N.
Ann.
1574

Le Medicine pertinenti alle infermità delle Donne, divise in tre Libri. Seconda impressione, in Venezia in 12. 1574.

Hoc opus offert pertractationem Morborum Mulierum, indigestam tamen, & futilibus remediis refertissimam; prior editio apparuit anno 1563.

A C. AMBROSIUS PAREUS Lavallensis Cenomunus natus anno 1510. Lutetia Chirurgiæ operam dedit, & in facultatem Chirurgorum receptus fuit
N. Sancti Comi, primarius Chirurgus fuit Francisci II., Caroli IX., & Enrici
Ann. 1575. III., magnum volumen digessit Gallico idiomate impressum Parisiis anno 1565., omnem chirurgicam Provinciam respicit, pluresque alios medicine Tractatus, a juvenibus Medicis exaratos quos sui juris faciebat.

Præ ceteris opusculum *de hominis generatione* extat, in quo simul *de partu*, & *nonnullis Mulierum Morbis* pertractat.

Paræi opera latine vertit Jacobus Gulielmus, & typis mandavit Parisiis anno 1582. in fol.

A C. JOANNES LE BON Heteropolitanus, videlicet *de Autreville* in Campania apud *Chaumont* in Agro Bassiniaco.

N. Se jactavit medicum Regis, & Cardinalis *de Guise* quod intelligi debet
Ann. 1577. ni fallor Ludovici *de Lorene* Cardinalis *de Guise*, & Archiepiscopi Senonensis, ipse occubuit anno 1528.

Libellum exaravit sub titulo

Therapeia puerperarum, quem dicavit Joanni Liebaut de quo infra pag. 327. locuturi erimus; Parisiis illum impressit an. 1572. cum *Thesaurο sanitatis*. Idem

Idem opus postea typis mandarunt Basileæ in collectione Spachii anno 1589. verum etiam ad calcem operum Jacobi Hollieri reperitur.

LUDOVICUS MERCATUS Vallisoletanus Patrium licæum plurimum annorum professione (a) nobilitavit, inde a Filippo II. ad regiam acersitus Hispaniarum Rege, cum decore munus gessit; eo defuncto simili officio vacavit apud Philippum III. ejusdem filium; demum annum agens 86. suppressa ex (b) calculo urina acerbissimorum cruciatuum causa obiit.

Gynæciorum sive de mulierum, virginum, viduarum, sterilium, prænantium, puerperarum, & nutricum morbis communibus Libri IV. Matriti 1594. in fol.

Hujusmodi Tractatus inter præstantiores recensetur, qui circa hanc rem editi sint, etiamsi mordicus in eo Arabum doctrinam prosequatur.

JOANNES LIEBAUT Diviensis in Sequana Doctor Medicus, qui in facultatem Parisiensem ann. 1559. receptus est, præter opera medica quæ Vanderlinden, & Mercklin ei tribuunt, opusculum de Morbis Mulierum latine (c) scripsit, quod nondum inspicere mihi licuit, illud tamen Gallice versum a Liebaut ipso fortasse, & impressum fuit sub titulo

Trois Livres de la Santé, Fecondité, & Maladies des Femmes. A Paris 1582. in 12.

Hoc depromptum est ab illo Marinelli vel saltem ejus Auctoris laborem æmulatur, quod minime animadvertit Liebaut, videbimus infra quid de eo censeat Lazarus Pè.

HIERONYMUS MERCURIALIS Forolivensis natus anno 1530. in Gymnasio Patavino medicinæ Professor creatus fuit * anno 1567., successor Antonii Fracantiani, & anno 1569. scamnum Victorii Trincavelli in eodem Licæo occupavit, donec 1573. in Bononiense, & anno 1599. e Bononiensi in Pisanum (d) evocatus est, tandem Forolivii in Patria obiit anno 1606. ætatis suæ 76.

De Morbis Mulieribus prælectiones a Casparo Bauhino editæ. Basileæ 1582. in 8.

Hujusmodi Tractatus præstantissimus est, a Professore enim progenitus fuit doctrina clarissimus, hujus ævi sane decus.

MARTINUS AKAKIA Parisinus filius alterius Martini Akakia Catalauni, facultatis medicæ, quæ Lutetiæ est an. 1569. Doctor, verum Collegii Rea- lis anno 1574. Professor creatus fuit, occubuit anno 1588., vitæ suæ 49.; opus exaravit titulo *De Morbis Muliebribus* a morte impressum anno 1597. in Collectione Israeli Spachii

FELIX PLATERUS Rauracus ab anno 1536. originem agnoscit, medicinam studuit Monspesulii ubi Doctor renunciatus anno 1557. in Patriam redux medicinam gloriose exercuit, & in ea Civitate publicus universi-

(a) Nicolaus Antonio, in *Biblioth. Hispana*.

(b) Castellanus, in *Vitis illustrium Medicorum*.

(c) Idem testatur initio pertractationis de qua infra locuturi erimus, ac dubito ne hujusmodi versio unquam apparuerit. (d) Mercklinus in *Lindenio renovato*.

tatis Professor electus anno 1571. per 43. annos munus implevit donec anno 1614. occubuit ætatis 78.

De mulierum partibus generationi dicatis, Tabulæ iconibus illustratæ, structuram usumque explicantes. Additis observationibus, & curationibus aliquot harum partium affectum.

Ambo eæ dissertationes ab Israello Spachio in frontem collectionis suæ expositæ fuerunt, prior decerpta est ab Anatomico opere, quod Platerus anno 1583. Basileæ edidit in fol. sub titulo sequenti,

De partium corporis humani structura & usu

Altera ab observationibus Plateri deprompta est, quæ nondum excussa erat anno 1597., quando Spachii collectio exurrexit, quæ tamen apparuit anno 1614. Basileæ in 8.

A C. MAURITIUS CORDEUS Remus Doctor, & Præses facultatis medicinæ Parisiensis anno 1559.
N. Ann. 1584.

Hypocratis Coi, Medicorum Principis, Libri prioris, de Morbis Mulierum, interpretatio, & explicatio. Paris. 1585. in fol.

In hoc opere Hypocratis doctrina in plures articulos dividitur, quorum singulos subsequitur Cordæi Commentarium, sedulo elaboratum; nulum tamen ordinem servat Auctor Hypocratis rubricam necessario prosequendo, quæ nullam methodum præfert.

In illo habetur loculenta (a) hydropis cum hydatidibus observatio, quæ prima est circa hunc morbum clara, & distincta; animadversione digna est admiratio Cordæi, & spectatorum suorum, qua ipse narrat captum fuisse cum primum hujusmodi hydropem observaverit.

A C. ALBERTINUS BOTTONUS Patavinus in ea civitate medicinam docuit
N. Ann. anno 1555. obiit anno 1596.
1585.

De Morbis Muliebribus Liber. Patavii 1585. in 4.

De Morbis Muliebribus Liber secundus. Venetiis 1588. in 4.

A C. GASPAR VVOLPHIUS Tigurinus a Corrado Gesnero jussus edidit collectionem Auctorum, qui de Morbis Mulierum pertractarunt, munus sumptit ipse, & implevit sub titulo sequenti postquam rudimenta collectionis ab ipso Gesnero accepit.

Gynæceorum sive de Mulierum affectibus Commentari, Græcorum, Latinorum, Barbarorum, tam olim, & nunc recens editorum, in tres tomos digesti, & necessariis passim imaginibus illustrati. Basileæ 1586. in 4.

Primus Tomus continet

I. Fe-

- I. Felix Platerus.
- II. Moschionus.
- III. Cleopatra, Moschionus Priscianus simul comparati.
- IV. Trotula, cui Editor Eros nomen tribuit superius recensiti.
- V. Nicolaus Rocheus.
- VI. Ludovicus Bonacciolus.
- VII. Jacobus Sylvius.
- VIII. Joannnis Rueff.

In secundo tomo inveniuntur.

- I. Hieronymus Mercurialis.
- II. Joannes Baptista Montanus.
- III. Victor Trincavellus.
- IV. Albertinus Bottonus.
- V. Joannis Le Bon
- VI. Ambrosius Pareus.
- VII. Albucasis Arabes.
- VIII. Franciscus Roussel quem Latine vertit Gaspar Bauhinus Rauracus.
- IX. Joannes Albosius de Lithopedio Senonense.

Tandem tertius tantum continet Commentarium Maurici Cordei in primum Librum Hyppocratis de Mulieribus.

Idem VVolphius eddidit viginti ante annos prima sui ætate subsequenter libellum.

Viaticum novum de omnium fere particularium morborum curatione, Liber Authoris innominati quidem, sed longe doctissimi, vere aureus & incomparabilis, nunc primum in lucem editus per Casparem VVolphium, Medicum, Phisicum Tigurinum. Tigurii 1565. in 12.

VVolphius in præfatione quæ hujusmodi opusculum antecedit narrat, quod celebriores Academies Europæ peragrande ad medicinam hac ratione ediscendam in vetustiori bibliotheca manuscriptum reperisse, quod postquam paullisper cunctatus sit, tamen publicis juris facere fancivit.

Hujusmodi opus morbos omnes in 68. Capita complectitur, quorum sex totidem Mulierum Morbos ostendunt, Auctor Arabum doctrinam profectus est, verum paullo magis quam incompletam refert formularum futilium congestionem; medicina minime frustrata esset, modo VVolphius editionem supprimeret.

HIERONIMUS CAPIVACIUS Patavinus praxis Professor anno 1552. electus, verum theoreticam docuit anno 1651. donec 1589. occubuit.

A C.
N.
Ann.
1536.

Medicina practica, sive Methodus cognoscendorum, & curandorum omnium humani corporis affectuum. Joh. Hartmanni Beyeri studio Lib. VII. interstincta. Francfurti 1594. in 4.

Ex septem libris, qui opusculum replent, quartus Mulierum Morbis dicitur, hic, ut operis reliquum Copivacius in Patavinis Scholiis in discipulorum gratia exaravit, ut constat etiam ab altera editione Lugdunensi anni 1595. in 8.

Prior cura Joannis Arthemani Beyerii excussus fuit post mortem Auctoris. Joannes Crato, a Craphteim Uratislaviensis Medicus Primarius Imperatorum Ferdinandi I. Maximiliani II. & Rodolphi II. asserit (a) praxim Capivacii pervolvendo detegisse ejusdem priorem partem ab Argentiero decerptam fuisse, quod ostendit hujus operis vetustiore editionem adfuisse ea quam ostendimus, nam Crato obiit anno 1585., ut hanc perlegere minime posset.

De cetero, quod Crato Capivacio tribuit ceteris Professoribus valde commune est.

A. C. PETRUS FORESTUS Alcmarianus natus (b) anno 1522. postquam Doctoratus gradus in Bononiensi Licæo insignitus fuit, medicinam exercuit per Ann. omnem Galliam Luthetiæ primum, verum Vastinii dein Pithivierii postea 1590. Alcmariæ venit, & Delphi, denique anno 1575. Lugduni Battavorum Medicinæ Professor advocatus fuit in ea nuperrima Universitate, occubuit tandem Alcmariæ anno 1597., ætatis suæ. 75.

*Observationum & Curationum Medicinalium Libri XXXII.
in fol. Lugdni Batav.; diversis anni.*

Liber XXVIII. hujus collectionis agit de Mulierum Morbis & affectibus in 82. Capita distinctus, qui etiam si inquinetur Arabum theoria, nonnullas tamen observationes præstat proficuas.

A. C. JOANNES GEORGIUS SCHENKIUS Friburgensis Medicus celebris, N. & laboriosus medicinam Tubingæ adeptus est ubi Doctoratus ordine insignitus anno 1554. postea Friburgi inter Patrios Lares in Brisgovia Ducatu restitutus est; diceffit tandem anno 1598., vitæ suæ 38.

*Pinax Auctorum in re medica, Græcorum, Latinorum
priscorum, Arabum, Latino-Barbarorum, Latinorum
recentium, tum & peregrinis libris cluentium, ex-
tantium, manuscriptorum promissorum vel desiderato-
rum, qui Gynecia, sive muliebria pleno argumento,
sive ex instituto scriptis excoluerunt & illustrarunt.
Argent. 1606. in 8.*

A. C. ALESSADER MASSARIAS Vicentius (c) postquam medicinæ Patavii N. incubuit, ibique gradum Doctoris accepit in patriam redux artem exercuit, Ann. 1595. ubi moratus est 25. annos, verum Venetiis anno 1578. advocatus summo cum decore artem implevit per novem annorum spatium, tandem S. C. primarius Professor Patavinus anno 1587. declaratus (d) fuit, Hieronymi Mer-

(a) Epistola 118. inter Epistolas a Laurentio Scholzio collectas.

(b) Joan. Meurlius in Athengo Batavio Lib. XI.

(c) Comnenus Papadopoli, in Histor. Gymnasi Patavini.

(d) Petrus Castellanus, in Viris illustrium Medicorum.

Mercūrialis vices gerens, qui Bononiæ professus erat, obiit (a) decima septima die Octobris anno 1598. trans 70. ætatis suæ.

Perlegit Patavi Opusculum sub titulo

Prælectiones de Morbis Mulierum, conceptus, & partus, editæ in gratiam Medicorum Medicinæ, ut quasi prodromum haberent omnium totius corporis humanis morborum θεραπεύας edendæ.

Opusculum a morte Auctoris Lipsiæ excussum fuit apud Abramum Lambertum in 8. anno 1600.

Eum pervolvere nedum mihi contigit, partem tamen praxis medicæ ejusdem Auctoris constituere censeo quæ edita fuit anno 1601. Francfurti in 4. apud Nicolaum Basseum, & post illud tempus alibi pluries recussa.

Hujus praxis in VII. libros distinguitur, quorum qui tertium subsequitur de Morbis Mulierum differit in tria Capita distinctus, ubi tres, & decem Mulierum Morbis explanantur.

Quam ipse docuit artem stricte Galenum redolebat, concinno tamen stilo, & dicendi claritate Maffarias pollebat, ut tunc temporis inter selectiores Medicos recenseri merito deberet.

Nostrium erit animadvertere de hysterico morbo, aut uterino furore ipsum nec verbum fecisse.

ISRAEL SPACHIUS Argentinus Medicus, & Professor illius Civitatis A. C. novum eddidit Auctorum codicem qui circa Morbos Mulierum scripserunt, vel melius dicam tieravit VVolphi collectionem sub titulo sequenti. N. Ann. 1597.

Gynæciorum, sive de mulierum tum communibus, tum gravidarum, parientium, & puerperarum affectibus, & morbis, Libri Græcorum, Arabum, Latinorum, veterum, & recentium, quotquot extant, partim nunc primum editi, partim denuo recogniti, emendati, necessariis imaginibus exornati, & optimorum Scriptorum auctoritatibus illustratis. Argentinæ, 1597. in fol.

Hujusmodi collectio præter VVolphianos scriptores Martinum Akakia nondum impressum, & Ludovicum Mercatum superius indicatum ostendit.

GULIELMUS BALLONIUS Parisinus anno 1538. natus (b) postquam A. C. per aliquot temporis spatium Humanitatem & Philosophiam in universitate docuit quæ Lutetiæ est, medicinæ studio incubuit anno 1586. verum laurea decoratus fuit 1570. & postquam honorificentissime artem exercuit, occubuit anno 1616. ætatis 78. N. Ann. 1600.

De Virginum, & Mulierum Morbis Liber, in quo multa ad mentem Hyppocratis explicantur, quæ & ad cognoscendum, & ad medendum pertinebunt, Parisiis 1643. in 4.

Hujus-

(a) Hist. Gymn. Patavini Tom. I. Lib. III. Sect. 2. Cap. 20. n. XCVII.

(b) Ex vita Ballonii a Renato Moreo scripta, & operibus Ballonii præfixa.

Hujusmodi Tractatus æque ac cetera Ballonii opera a morte Auctoris impressus fuit. XI Capita complectitur, quorum V. totidem Mulierum Morbos explanat, at diutina methodo usus est, nam ut mihi mos est hujusmodi auctor fufius materias pervolvit, ipse tamen inconcinno ordine scribit, suasque elucubrationes Græcis verbis nimis infarcit, verum Arabum praxim valde æmulatur.

A C. RODRICUS A CASTRO Lusitanus postquam medicinæ causa diu Sal-
N. manciæ moratus est, ab hac vita discessit Hamburgi Alemanorum, quare
Ann. spicor fuisse Judæum; circa finem sæculi XVI. vitam gessit.
1603.

De universa muliebrum morborum medicina, novo, & antehac a nemine tentato ordine Opus absolutissimum.
Hamburgi 1604. in fol.

A C. HERCULES SAXONIA Patavinus natus anno 1551. Doctor in Patriam
N. renunciatus medicinam per annum publice docuit, at munere quo funge-
Ann. batur Senatus Veneti decreto sublato Venetiis se recipit, ibique medicinam
1603. facit ad summam famæ gloriam grassatus est, usque dum Hieronymo Capi-
vacio successor post octo annos designatus fuit videlicet 1590., quod
onus ad mortem usque gloriose sustinuit, quæ anno 1607. evenit æta-
tis 56.

Petrus Uffemboch Doctor Medicus ejusdem affecula Francofurti eddidit
Saxonix Opera anno 1603. sub titulo

Pantheum Medicinæ selectum, sive Medicinæ practicæ templum

Opus XI. Libros exponit quorum quartus Tractatum complectitur mor-
borum in 30. Capita distinctus juxta Galeni Methodum eo tempore rece-
ptam.

Nonnulli Bibliographi specialem de *Morbis Mulierum* pertractationem ei
tribuunt, at hujusmodi tractatus IV. Liber est sive *Pantheum* superius in-
dicatum.

A C. EMILIUS CAMPOLONGUS Patavinus anno 1550. natus in eo Gym-
N. nasio Theoreticam medicinam præcepit primum, verum praxim docuit, vi-
Ann. delictet ab anno 1578. ad annum 1604. in quo (a) mortuus est, ætatis
1604. suæ 54.

De Vermibus: De uteri affectibus: Deque morbis Cutaneis
Tractatus præstantissimi. Extant cum Hieronymi Fabrici
ab Aquapendente Medicina pratica. Parisiis 1634. in 4.

A C. JOANNES HUCHER Bellovacus Professor Regius in facultate Monspe-
N. fulana anno 1574., Decanus anno 1580. Cancellarius 1583. obiit 1603.
Ann. 1606.

De sterilitate utriusque sexus, Opus in quatuor Libros di-
stinctum. Genevæ, 1609. in 8.

Opus prolixum est pluresque sententias complectitur obsoletas, at non
parvi

(a) Comnenus Papadopoli, in *Historia Gymnasi Patavini*, Tom. II. pag. 340.

parvi faciendum videtur, ostenditque Auctoris doctrinam, & contemptum adversus maleficia, quæ tunc temporis usuveniebant.

JOANNES VARANDEUS Nemauciensis, ad Doctoralem gradum promotus anno 1587. in Academia Monspesulana, Professor Regius ibidem renunciatus fuit anno 1597. Ad Decanatum pervenit anno 1609. Obiit anno 1617. A. C. N. Ann. 1620.

De morbis mulierum Libri III., in lucem editi, opera Romani a Costa. Monspessuli 1620. in 8.

At quod mirum est opusculum Lugduni in lucem apparuit anno 1619. sub titulo *Opera &c.* Petri Milei Doctoris Medici, quod ostendit ipsum publici juris factum fuisse a Discipulis Varandei, qui ex propriis manuscriptis illud sollicitè ediderunt.

Id claritate & methodo donatur, theoria ea est, quæ tunc temporis obvia erat, at praxis nimis quam par est Arabum polipharmacia inquinatur.

JOANNES HEURNIUS Ultrajectensis natus anno 1543. postquam humanas litteras a Battavis adeptus est, Parisiis medicinæ studuit per tres subsequentes annos sub disciplina celebris Ludovici Dureti, verum in Italiam appulsus postquam nonnihil Patavii moratus est Doctor Papiæ designatus fuit. A. C. N. Ann. 1625.

In battaviam redux Ultrajecti aliquantisper cunctatus est, verum Professor advocatus Lugdunum Battav. profectus est an. 1581., ubi occubuit an. 1601.

Ejusdem opera cura Ottonis Heurnii filii Lugduni Battav. impressa sunt anno 1609. in 4. & Lugduni 1638. in fol. in hac collectione specialis tractatus habetur.

De morbis mulierum, quem filius sejunctim edidit pariter Lugd. Batt. anno 1607., at brevis est labor, & per pauca refert.

LAZARUS PE' Gallus, in Patrio idiomate Marinelli opus vertit, Italique auctorem laudibus extollit, eumque edidit sub titulo sequenti A. C. N. Ann. 1627.

Les Maladies des Femmes, & remedes d'ycelles en trois Livres de M. Jean Marinello, docte Medecin Italien, traduits en Francois par M. Jean Liebaut, Medecin a Paris, en cette derniere edition, revus, corriges, & augmentes par Lazare Pe, a Paris 1609. in 12.

In fine præfationis Lazarus Pè de Joanne Liebaut sermonem init, qui ediderat idem circiter opus 24. ante annos etenim " Joannis Liebaut hoc librum sibi tribuit, nihilominus utrumque simul comparando reperi materias penitus a Marinello desumpsisse, ordinem tantum obvertendo, pauca proprio Marte addendo, quæ magis furtum adumbrarent, at insistit ipse, necessum est famam vero auctori restituere, commendando aliqua ex parte Liebaut; qui opus nonnihil amplificavit, & in nostra lingua tradidit "; postrema hæc verba suadent Liebaut minime librum illud latine composuisse, ut nos superius supposuimus.

HERMANUS CORBEUS Francofurtinus

A. C. N. Ann. 1629.

Gynæc.

Gynæceium, sive de cognoscendis, præcavendis, curandisque præcipuis mulierum affectibus Libri II. quorum prima affectus omnibus mulieribus communes; posterior qui cuique sorti sunt proprii, proponit. Francofurti 1620. in 8.

A. C. N. Ann. 1625. **GREGORIUS HORSTIUS** (a) Targoviensis natus anno 1578. postquam medicinæ incubuit plures Academias Germanicas peragrando Basileæ Doctor renunciatus fuit 1606. & paullo post medicinæ Professor electus fuit Gissæ; verum a Republica Ulmiensi anno 1622. advocatus, ut medicinam faceret, Præses fuit Collegii Medicorum illius Civitatis, occubuit anno 1636. ætatis suæ 58.

Inter plures Libros quos Horstius publicavit libellum *Observationum medicinalium in 4. edidit.*

Observationum Medicinalium singularium Libri IV. posteriores. I. De morbis mulierum, II. De Morbis contagiosis & malignis. III. De doloribus partium externalium. IV. De Chirurgicis quibusdam Casibus. Ulmæ 1628. in 4.

Observationes quæ mulieres ægrotas respiciunt II. sunt plures earum perlegi merentur, Auctor nonnullos Medicos Alemanos indicat, qui eas communicarunt, hujusmodi sunt Joannes Bilger Medicus Campodunus, Jacobus Eckcold Medicus Meminganus, & Joannes Cristophorus Eifemnenger Heilbrunus.

Extat ejusdem Auctoris Centuria problematum circa curationem diversorum morborum in Decades distributorum, quarum nona ad mulierum morbos pertinet, ubi præstantiores quæstiones perscrutantur, & satis docte explanantur.

A. C. N. Ann. 1627. **MELCHIOR SEBIZIUS** Argentinus natus an. 1578. plures Academias frequentavit postquam quod Basileæ Doctoris gradum accepit anno 1610., inde Professor Argentinus renunciatus fuit anno 1612., quod onus per annos 62. sustinuit, obiit vero anno 1674. ætatis anno 95.

Historia mirabilis de femina quadam Argentoratensi, quæ ventrem supra modum tumidum atque distentum ultra decennium gestavit; & tum hydrope uterino, tum molis carnosæ septuaginta sex, tum ea hydropis specie conflictæ fuit, quæ Ascites dicitur, fideliter relata, rationibus explicata & commentario de hydrope uterino, molarumque forma, materia, efficiente, atque fine, aucta. Argentinae, 1627. in 4.

Suspicio sexcentum hujusmodi & ultra molas carneas, quas Sebizius observavit steatomata tantum uteri fuisse.

A. C. N. Ann. 1627. **FRANCISCUS RANCHINUS** Monspeffulanus in ea facultate medicinæ Doctor renunciatus circa annum 1592. Professore electus 1605., successit Joan-

(a). In oratione Funebris, quæ Joh. Dan. Dietericus Gregorio Horstio parentavit.

Joanni Saporita obito, & Cancellarius indefectus anno 1612. loco Andreæ du Laurent, obiit anno 1642.

Opuscula medica, utili jucundaque rerum varietate referta, publici juris facta cura & studio Henrici Gras Doctoris Medici Monspelliensis, Lugduni 1627. in 4.

In ea collectione Tractatus adest

De Morbis Virginum in tres sectiones distinctus ubi Ranchinus plures quaestiones agitatur quæ mulierum morbos respiciunt, nulla tamen novitatem redolet.

JOANNES PREVOSTUS natus an. 1585. in Diœcesi Basiliensi, gradum A. C. Doctoris accepit Patavii anno 1607. ibique Professor renunciatus fuit an. N. 1613. donec 1616. plantarum viridarium ei commendarunt, contagio obiit Ann. 1629. anno 1631.

De morbos uteri passionibus Tractatio Patavii 1669. in 8.

Hujusmodi opusculum ut & cetera illius opera diu post Auctoris mortem excussa sunt.

MICHAEL DURINGIUS Uratislaviensis.

A. C.
N.
Ann.
1630.

Epistola de nova, rara, & Admiranda Herniæ uterinæ, atque hanc justo tempore subsequentis partus Cæsarei Historia

Ipse hujusmodi Historiam communicavit Gulielmo Fabricio Hildano, qui eam in suis scriptis inseruit.

CLAUDIUS DEODATUS

A. C.
N.
Ann.
1630.

De admirabili quodam affectu uterino Observatio.

Eidem Hildano ab Auctore communicata, & ab hoc in suis Observationibus inserta, quem admirabilem morbum falsum fuisse syrrhum fuisse, aut sarcoma uteri haud dubito.

GULLIELMUS FABRICIUS Hildanus Helvetus sub Hildani nomine A. C. præsertim cognoscitur, quod Patriam designat ubi Chirurgiam gloriose N. exercuit 1560. natus est primum Lusana, verum Bernæ transitum fecit ubi Ann. 1630. ipse fama increbuit, denique obiit 1634. ætatis suæ 74.

Successive eddidit primo Centurias sex Observationum, quas post mortem congefferunt & Lugduni typis mandarunt anno 1641. in 4., inter illas observationes plures de Morbis Mulierum agunt, videlicet de abortu, foetu emortuo, partu, & ceteris præcipuis uteri morbis, easque legere non contemno.

Inter eas nonnullæ observationes reperiuntur quas ei communicarunt Medici superius recensiti.

DANIEL SENERTUS Uratislaviensis in Silesia natus anno 1572. Do- A. C. ctoris gradum Vittberg affecutus est anno 1601. ibidem subsequenti anno N. Professorium munus suscepit, obiit anno 1637. ætatis 65. Ann. 1631.

Ejus-

Ejusdem opera post mortem collecta Venetiis in triplici volumine anno 1640. in fol. impressa sunt, verum pluries recussa cum additamentis, attamen præstantior est opus morborum localium sub, titulo *De Praxi Medica* in V. Libros distributa, singulos in sectiones distinctos.

In quarto enim hujus operis libro fufius de omnibus Morbis Mulierum pertractat, concinne, solide, & methodice Galenum omnino profecutus est, idcirco incassum posteriores notiones quæremus; at præcipua medicinæ fulcimenta solide innixa sunt, & morbi, aut differentiæ exacte distribuntur cum practicis indicationibus satis clare enunciatis; idem observatur in ceteris hujus medici operibus, quæ totidem codices sunt, quibus Medicus minime defici potest; plerumque enim, veræ medicinæ uberiores notiones complectitur, quam nuperrimi libelli qui tot jactant.

A C. ZACUTUS Lusitanus Ullisiponenſis natus est 1575-Philosophiæ, & medicinae studuit in Academiis Salmaticenſi, & Conimbricenſi, ac anno 1640. 1594. Doctoratus gradus affecutus est Sagunciæ in nova Caſtilia.

Inde per annos triginta continuos medicinam cum laude fecit Ullisiponæ; at circa annum 1624. cum Regis Edicto, qui tunc Lusitaniam ditione premebat, Hebræorum quotquot aderant stirpes incolatu regni fuerint interdicta, Zacutus, qui Judæus erat, in Belgium concedere coactus fuit, ubi Praxim Medicam exercuit, maxime Amſtelædami & Hage Comitum. Obiit Amſtelædami anno 1642. ætatis 67.

Scripsit Opus minime contemnendum

De Medicorum Principum Historia a Veteribus, & nuperrimis Scriptoribus excerpta duobus voluminibus in fol. comprehenſa, & in Libros VI. distributa, quos notis illustravit.

Alter opus adest sub titulo

Praxis Historiarum &c. Synopsis est curationum cuique morbo idonearum, de quibus Zacutus in præcedenti opere locutus erat, ea in quinque Libros distribuitur.

Postremum opus appellatur *Praxis medica admiranda*, innumeras observationes speciales complectitur, tum circa morbos, cum remedia in III. Libros distinctas.

Zacutus de Morbis Mulierum in singulo opere agit in priori, in III. Libro 17. priores Observationes de hac re pertractant, in secundo, iis morbis omnem III. Librum dicat, qui 23. Capita complectitur, tandem in tertio 25. Observationes II. Libri eo pariter collineant.

Inter eas diversas observationes quas Zacutus refert, plures admiratione dignas esse fateor, verum doctrina, & eruditione locupletatas, dissertationum ergo, quæ eas comitantur, ut sane pervolvi mereantur; at, omnia credere cunctabor, ipsaque tueri renuam.

A C. NICOLAUS FONTANUS Amſtelædamenſis.

N.

Ann.
1640.

Syntagma Medicum de Morbis Mulierum in IV. Tomos distinctum. Amſtelædami 1645. in 12.

A C.

N.

Ann.
1640.

LAZARUS RIVERIUS Monſpeſſulanus Doctoris gradum ſumpſit anno 1611.

1611. & in eâ Facultate, loco Laurentii Coudini Professor renunciatus fuit an. 1622. susceptumque onus summo cum decore implevit usque ad annum 1655. ætatis suæ 66. & ultimum.

Hujusmodi Professor institutiones medicas digessit, quæ tunc temporis magni existimabantur, at ejusdem præcipuum opus est morborum curriculum eo titulo insignitum *Praxis Medica*, quæ simplicem (a) praxim præstat theoria denudatam, quam in scholis dictavit, pluriesque edidit Gallia, & Belgio; cum experti sint Operis felicem eventum, addiderunt theoriam illiusævi notionibus accomodatam, ipsumque opus tali pacto Parisiis typis mandarunt in 8. anno 1640., quod postea crebre recusserunt.

In hoc opere de omnibus corporis morbis agitur in XVII. Libros, XV. omnis mulieribus ægrotantibus dicatur, ibique clare earum morbi explicantur, & pro iis saluberrima praxis proponitur, ut prudens Medicus hoc solo auxilio Medicinam facere valeat.

Non prætereundum tamen est Riverium Senerti plerumque apographum fuisse, ut integras paginas subdole interdum transcriberet.

De cetero certum est Bernardinum Christinum Corsum, qui Monspeffulii Riverii Discipulus fuit, verum Divi Francisci abitum sumpsit, sed a Medica praxi non destitit postquam nonnulla arcana Chemica compillavit, ea Venetiis imprimere ausus est Riverii nomine anno 1676. in 4., postquamquod operibus ejusdem Auctoris eadem addiderunt; at D. Joannes Chatelain qui obiit postea Decanus Facultatis Monspeffulii olim Riverii discipulus, asserit Christinum fraudolenter ea arcana Riverio tribuisse.

(a) In præfat. Editionis anni 1651. præfixa.

FINIS TERTIÆ EPOCHÆ.

QUARTA EPOCHA.

Sanguinis circulatio quæ jam antea innotescere debuisset anno tantum 1628. Gulielmus Harveus Medicus Anglus, in suo tractatu *Europeis ipsam annunciavit sub eo titulo Exercitatio anatomica de motu cordis, & sanguinis in animalibus*, Francofurti impresso in 4.; ea de causa auctori hujusmodi celeberrimum inventum tribuunt, at intimius rem perscrutando haud facile est ipsum revera inventorem fuisse defendere.

Etenim anno 1553. Michael *Servetus* Aragonensis de *Villanueva* Medicus celebris tum pro religionis erroribus quibus inquinabatur, cum pro supplicio quod hac de causa Januæ passus est, docuit in suo opere eodem anno (a) *Viennæ Allobrogum* impresso, sanguinem per venam arteriosam (nempe *arteriam pulmonalem*) dexteri ventriculi cordis in pulmonem irrumpere; verum ramificationes ejusdem venæ cruorem in ramos alterius arteriæ venosæ (*venæ pulmonalis*) effundere cum quibus communicant; tandem ab hac arteria impelli in sinistrum ventriculum diastolis tempore, a quo per omnes corporis arterias distribuebatur.

Paullo post *Realdus Columbus* Cremonensis qui *Vessalio* in *Patavino Liceo* successit, verum in *Pisano* Anatomiam docuit; tandem *Romæ* Medicinam exercuit, *Venetis* *Anatomicum* opus anno 1559. edidit (b) in fol. ubi idem ostendit, atque *Serveti* Doctrinam (c) circa sanguinis circulationem prosecutus est, imo eam ab *Serveto* ipsum desumpsisse *Jacobus Duglas* Anglus putavit; at eo præexcellit cum acuratus harum partium usum ostendat, verum *Valvulas sigmoideas* arteriarum, & *tricuspidēs* venarum describat.

Novum inventum statim admirationis animos replevit; *Petrus* enim *Monavius* *Uratravienſis* postea Medicus Imperatoris *Rodolphi II.* scripsit (d) anno 1576. *Joanni Cratono* tunc *Maximiliani II.* Imperatoris Archiatro, se *Heilderbergæ* commorantem intellexisse Italum quemdam *Pigafettam* dictum *Falloppii* discipulum qui publice ostendebat *Hispanum* (*Servetum* nempe) invenisse sanguinem ex dextero cordis ventriculo exeuntem per venam arteriosam in pulmonem irrumpere; atque ab eo in sinistrum ventriculum revehi.

Anno vero 1574. *Jeronimus Ab-aqua* -pendente *Falloppii* successor in *Chirurgiæ Cathedra Patavinæ Universitatis*, qui postea ibidem Anatomiam docuit, reperiit valvulas venarum quas in speciali tractatu *de venarum ostiis* *Patavii* impresso in fol. anno 1603. descripsit. Videbatur post hoc inventum gradum tantum deesse ad sanguinis circulationem plane cognoscendam, cum hujusmodi valvulæ ipsam satis indicarent, at id *Aqua-pendente* non obtinuit.

Primum decus enim *Andræ Cesalpino* reservabatur qui postquam diu Medicinam legit in *Pisanis Scholis*, verum Archiater creatus fuit *Clementis*

(a) Sub titulo *Christianismi restitutio* cujus exemplaria cum ipso auctore combusta fuerunt, ut unum vel duo sint reliqua tantum.

Verba *Serveti* ubi circulationem docet a *Michaele Rocho* excerpta fuerunt *Biblioteque Anglaise* Tom. I. par. . . . *VVotton Reflexions on antient and modern learning*; & per *Duglas* in *Bibliographica* in verbo *Servetus* pag. 104.

(b) Sub titulo *de re Anatomia* Lib. XV. (c) Lib. VIII. de corde, & arteriis.

(d) Hæc Epistola reperitur, inter consilia & epistolas *Petri Monavi* in collectione *Laurentii Scholzii* impressa *Francofurti* in fol. 1598.

tis VIII. ad trutinam revocavit jacta hujus juveni fundamenta quæ in concinam formam digessit atque clare ostendit sanguinis circulationem in suo Opere (a) Venetiis impresso anno 1593. ubi afferit (b) sanguinem e ventriculo dextero per venosam arteriam in pulmonem evehi, atque per venam arteriosam in sinistrum ventriculum revehi; verum ipsum per Aortam arteriam partibus distributum per venam Cavam in dexterum ventriculum refluere, ideoque dari in utroque ventriculo venam ad afferendum, & arteriam ad repellendum sanguinem; qua de causa in dextero ventriculo *Arteriam* appellari quod veteres *venam arteriosam* nuncupabant; & *venam* in sinistro ventriculo quod illi arteriam venosam dicebant; Tandem ipse addidit accuratam valvularum arteriarum, atque venarum cordis descriptionem, usumque earum declaravit; uno verbo circulationem explicavit pari ratione, eademque verba adhibuit quæ recentioribus usitatoria sunt; at quod mirum est indicat venas supra vinculum inflari, & hac observatione tuetur motum quem sanguini circulanti adtribuit.

His expositis haud dubito quem ancipitem herere posse Servetum, & Columbum primos, invenisse sanguinis circulationem; minime tamen contendere possumus Cefalpinum accuratius iis illam descripsisse; eamque cadaverum, & animalium viventium sectionibus confirmasse ut sub iis verbis ostendit *quæ & dissectione apparent*; Cefalpinus ergo potissimum hujus inventi honorem sibi promeritus est, eo magis cum verisimile sit Harveum qui initio sæculi XVII. Patavii quinque annos moratus est, ubi Doctoris gradum accepit, ibi hanc notionem addidisse, quam plures post annos publici juris fecit, quamvis penitus non ignoraretur.

Idcirco D. Douglas quamvis Anglus & Harvei conterraneus fatetur (c) Cefalpinum primum sanguinis circulationem invenisse quam Harveus primum publici juris fecit, at id contendit tum impressionis tempus, cum curata descriptio Cefalpini; quiescunt tamen Harvejani si cum Cefalpini saltem inventi honor dividatur, *par decus manet ajunt & illi qui primum invenit & qui postremum perfecit. Nescio enim addunt an præstat invenisse, an ditasse.*

Quamquam evidens esset sanguinis circulatio, & ineluctabilibus rationibus comprobata, minime tamen eam statim amplexi sunt medici, ipsam negabant dum Columbus, Servetus, & Cefalpinus docebant; Harveo adversabantur qui illam tueri tentabat; denique innumeras sanguinis circulationis contradictiones passa est, antequam undique patefceret; in quibusdam tamen Universitatibus nisi post annum 1650. invaluisse credendam est, imo serius quandoque.

Ab eo tempore initium fancivi quartæ Epochæ cum tunc primum fruerentur Medici utilitatibus quas circulatio præstiterat.

Paullo post Renatus Cartesius novum Philosophiæ systema proposuit; quod penitus destruebat Aristotelis dogma quo Galenica Medicina fulciebatur; ipsum statim, atque ejus doctrinam aggressi sunt, at dissentientes parum progressi sunt nam ea cito recepta undique fuit, ut ex medicinæ Scholis Parepateticismus prorsus proscriberetur.

Sane veterum scriptorum dominium in animos validissimum fuerit modo judicemus a nixu quo ipsos secuti sunt, numquam tamen animi obversio perfectata & celerrima fuit; Auctores enim quos antea magis commendabant atque defendebant de repente spernebant, eorumque libros respuebant;

(a) Sub titulo *Questionum Peripateticarum libri IV.*, *Questionum Medicarum libri V.* in 4.
 (b) *Questionum Peripateticarum III. IV. V. & VI.* & *Medicarum Lib. II.* questione XVII., omnis questio circulationis reperitur in Douglas ad pag. 165. 168. juxta Cefalpini sententiam.
 (c) Speciminis Bibliographiæ Anatomiciæ pag. 167., 168.

fatebantur enim nihil veri adfuisse inter medicas notiones quas usque il-
luc docuerant; quasi nonnulla anatomiae inventa, aut nova Physicæ argu-
menta obvertere valerent Medicinæ fundamenta.

Huic tamen vicissitudini, inversio, & cogitandi luxuria successerunt
novarum rerum obvia consecutiones, at cum nulla existeret constans metho-
dus, quisque propriæ imaginationi consulebat ut protinus quot medici toti-
dem systemata haberentur.

Itaque Carthesii fautores subtiliori materiei omnia corporis scenomena
tribuebant; eam pro naturæ indigentis progredi, regredi, in vorticem
circumvehi posse autumabant; tali pacto enim omnia explicabant quamvis
hujusmodi rationes neque veriores, neque magis rationi consonæ essent iis
quas de qualitatibus afferebant & contemnebant.

Alii vero chemiæ fautores in humano corpore salia, sulphura, & aci-
das, vel Alkalinas substantias conspiciebant, tum omnes fermenti species,
atque fermentationes, effervescentias vel explosiones, ut in eo Chemicum
laboratorium constituerent.

Nonnulli vero corpusculari Philosophia delectabantur *Gassendi* quæ tunc
temporis plurimi existimabatur; putabant ipsi sanguinem atque humores sca-
tere atomis innumeris, sive corpusculis sphericis, uncinatis, duris vel fle-
xibilibus, grandioribus vel exiguis, quibus omnes motus tribuebant; at par-
vi faciebant hujusmodi qualitates arbitrarias nulla veritatis specie fulciri.

Earum opinionum nonnullæ in scholis adhuc vigeabant dum Medicum Ty-
rocinium ipse prosequerbar; at nostra fortuna secunda eæ abierunt Hypoteses
ut Medicina tutiorem, certioreque nunc sternat viam; ea itaque ample-
ctimur tantum quæ a cognita partium structura sponte procedunt, aut fun-
ctionibus earum; verum quæ consequuntur certas leges circulationis san-
guinis atque lymphæ, aut cadaverum sectionibus confirmantur.

Anatomiae enim studio in hac Epocha sedulo incumbabant, at in pre-
cedenti anatomici tantum numerum detegere satagebant, figuram, atque
nexus ossium; verum positus, adhesiones, & usus muscutorum; denique
distributionem artiarum, atque venarum quæ omnia chirurgiæ potiusquam
Medicinæ utilia evadunt. Hodierni tamen scriptores *Splanchnologiam*; seu
viscerum conformationem utilius perscrutati sunt; inter quos celebriores
fuerunt *Stenonius*, *Pecquetus*, *Malpighius*, *Ruyschius*, *Morgagnus*, *Du Ver-
neijus*, atque *Winslovius*.

Ipsi enim glandularum atque ab his haud absimilium corporum indo-
lem investigarunt, excretoriosque ductus; injectionum vero ope distributio-
nem ramificationum arteriarum, & venarum, anastomosium plexus, qui con-
tinuos canales gignunt, oculis patefecerunt; Lymphæ denique existentiam
ostenderunt quam nos latebat, ejusdemque circulum, atque speciales semitas
invenerunt &c. ut ex iis notionibus facile naturales functiones explicaren-
tur, harumque perturbationes prospicerentur quæ morbos constituunt.

Tandem veram cognoscere superest structuram cerebri ejusque partium usus
diversos; in eo sanguinis circulum, & lymphæ potissimum; originem,
contextum atque usus nervorum qui ab illo procedunt, ac per omnes di-
stribuuntur partes; Physiologi enim de hoc solliciti quamquam ab osseo cra-
nii cuniculo impediti multa utilia invenerunt; at multa adhuc reliqua
sunt quæ nisi latitarent æconomiae animalis explicationi non parum lumi-
nis afferrent.

Cum anatomiae in hac Epocha magis incumberent ideoque & cadave-
rum sectiones crebrius instituebantur, & utilius cum magis investigarent
viscerum læsiones quæ plerumque potissimæ sunt Morborum causæ; nihi-

lo tamen minus interdum morbi affectum pro causa habuerunt; si quis confirmari velit, observationes pervolvat *sepulchreti* anatomici *Boneti*; numquam enim satis edocti erimus, atque solliciti, ut rectas observationes inire valeamus, cum plerumque observatores decipiantur.

Botanicam æquo fructu excoluerunt, ac anatomen perscrutati sunt; D. enim *Turnefortius*, *Rajus*, *Rivinus*, atque *Linnaeus* genera, & species plantarum determinarunt, ut novam botanicæ formam suppeditarent; utilior tamen hujusmodi perquisitio evasisset, modo experientiis virtutes, & proprietates plantarum potius, quam nomenclaturam perpendissent.

Chemia pariter progressa est; *Stablii* enim *Boerhavi*, *Freindi*, *Homburgi*, plerorumque aliorum exemplo, qui præstantiores fuerunt nostris temporibus composita corpora tantum disgregare conati sunt, ut principia elucescerent, vel notas subigere substantias, quæ nova præberent remedia; sane plura, & medicinæ valde proficua auxilia chemia suppeditavit, at quo efficaciora evadunt, eo cautius incedendum erit, nam similibus remediis errando, numquam errores leviores fiunt.

Pharmacina vero innumeris compositionibus veterum minime hodie infarcitur, eæque tantum retinentur, quæ salubriores, & magis necessariae medicinæ exercitio videntur; præparantur diligentius, quia simplicium indoles magis innotescit, cum eorum farrago non implicet scrutinium; interest quod remedia simpliciora præscribantur, ut melius singulorum effectus distinguantur. Poenitus jam obsolevit Astrologiæ & Talismanorum futilitas, cui veteres tantum fidebant, verum, etsi hujus superstitionis reliquiæ supersint, vulgus potius, & mulierculæ quam medici inquinantur.

In hoc medicinæ stadio tria nova remedia ab America exportata adepti sumus, videlicet *Quinquina*, *Ipecacuanha*, & *Simarouba*.

Prior cortex est arboris cujusdam, quæ *Gannaperis* appellatur, crescit in montibus Peruviæ apud *Loxam* quæ sexaginta leucas a *Quito* distat.

Hujusmodi remedium Jesuitæ Hispani Romam ex Peruvia transtulerunt; paullo post ejusdem virtus innotuit, dum eo uxorem pertractarunt comitis *Cinchon* vice-Regis Peruviæ; at cum Jesuitæ undique Pharmacum distribuerent, atque Cardinalis de Lugo eorundem focius maximam copiam ægris Romæ suppeditaret, idcirco pulvis Jesuitarum, aut Cardinalis de Lugo statim fuit nuncupatus, ut adhuc interdum eo nomine insigniatur, at apud nos etiamsi appellationis lateat (a) origo, *Quinquina* dicitur; suspicor tamen, id evenisse, quod pulvis *Chinæ* ea consuetudine appellaretur, qua incognitas regiones uno verbo *Chinam* nuncupant, at cum distingui debeat a *Chinæ radice*, vulgo *squine*, ideo nomen reperierunt *China Chinæ*, qua de causa ipsam sub eo titulo diu recognoverunt, atque ab hujusmodi nomenclatura illam *Quinquina* fabrefecerunt.

At quidquid sentiendum sit de ipsius Ætimologia, cortex Peruvianus utilissimum remedium præstat, quod, modo prudenter, & generalioribus præmissis auxiliis adhibeatur, valde prodest; nullumque superest eo efficacius febrifugum, quare hujusmodi remedii inventio medicis, & ægris utilissima evaserit.

Ipecacuanhæ respectu, quæ ex Brasilia ad nos exportatur, ut nomen *radix Brasiliana* indicat, quo a medicis insigniri solet, etiamsi vernaculo nomine appelletur *Ipecacuanha*.

Astruch de Morbis Mulierum.

Y 3

Gu-

(a) Crediderunt nonnulli *Quinquinam* appellari a Comitissa *Cinchon*, quæ primum eo remedio usa est vid. *Pauli Hermani Cynosura materia medica edit. 1726. pag. 204.* Et *Mich. Bernardus Valentini, discurs. de China Chinæ c. 2. §. 1.*

Gulielmus Pisonus de ea locutus est anno 1656. *In (a) Histor. Natur. et Medic. Brasiliæ* ejusdem virtutem ostendit, tamen nos adhuc remedium latebat; Medicus enim Gallus nomine *(b) Le Gras*, qui iter fecerat Americam versus, maximam copiam hujus radicis in Patriam redux anno 1672. secum tulit, at cum paullo post occubisset, parum vero de remedii effectibus disertus esset, ideoque ejusdem usus obsolevit; putant nonnulli mercatorem quemdam *Garnierum* dictum denuo anno 1686. hanc radicem exportasse, dissentiunt tamen materiae medicae Scriptores qua ratione *Adrianus (c) Helvetius Medicus Batavus Garnier*. Ipecacuanha usus sit, at certum est, ipsum primum remedium jactasse, & inventoris nomen non parum remedium ipsum auxisse.

Ipecacuanha præstantissimum est remedium, & adversus dysenteriam revera specificum, modo inflammationem venæ sectionibus præoccupemus, tum viscerum calorem compescamus, humectantibus magis idoneis; ejusdem virtus ab eo præsertim procedit, quod saburas solvere valeat, ut dejectionis mutationes ostendunt.

Tertium vero nuperrimum remedium, quod America suppeditavit, cortex est arboris cujusdam *simarouba* dictæ in *Gujane* obviæ; *D. Pontchartrain* a secretis rerum Maritimarum anno 1713. hujusmodi Pharmacum ex novis Indiis accepit, at ipsum tunc parvifecerunt; verum 1718. Dominus *Antonius de Jussieu Doctor* præses facultatis Parisiensis, & Botanicae Professor remedium exhibuit utiliter in dysenterico fluxu, quo Parisienses tunc facile corripiebantur, incassum propinata Ipecacuanha; postquam pluribus experimentis certior factus est de præstantissimis remedi effectibus ipsum scientiarum Academia sociis communicavit.

Autumant enim *Simaroubam* specificum remedium adversus serosos fluxus evadere, id fortasse ab ejusdem diuretica virtute procedet, quæ serum quo intestina madent renes versus impellit; animadvertendum tamen est, hujusmodi remedium etiamsi in quibusdam occasionibus validissimum, crebro tamen frustraneum evasisse.

Variolæ, lues venerea, atque scorbutus adhuc persistunt; at Europa in hac Epocha nondum nuperrimos morbos experta est; nam minime censerem pro novo morbo haberi febrem, quæ Lipsiæ an. 1612. puerperas aggredi solebat sub nomine *friesel* cognita; paullo post hujusmodi morbus totam Germaniam, vicinasque Provincias invasit, imo Angliam aggressa est, ut apparet ab opusculo *Sydenami* sub titulo *schedula munitoria de nova Febris ingressu*, tum ex libello *(d) de febre milliari Amilthonis*; invexit postea taurinorum (*) in Pedemontis, & in proxima Lomgobardia, imo nonnullas Gallia Provincias infestavit.

Hujusmodi febris plerumque a leviori rigore initium agnoscit, quem subsequitur modica febris secundo, vel tertio die auctura quam teterrima phenomena comitantur; erumpit tunc per omnem corporis ambitum papularum innumera congeries, quæ grana milliacea æmulantur, ut febris milliariis appelletur; hujusmodi granula supra cutim elevantur, ut in sudaminibus accidere solet, plerumque rubra, interdum alba; ut duplex species *friesel* oriatur modo ruber, modo albus; postremus tamen infensus magis experiri solet.

Hic

(a) Lib. IV. Cap. 53. (b) *Lemery Traite universel des drog.* ad verbum Ipecacuanha.
 (c) *Geoffroy materia medica* Tom. II. Sect. 1. Cap. 2. Artic. 22. *Guill. Gothofr. Leibnitz, de novo antidysenterico Ephem. Germ. Decur. III. anno III. in appendice.*
 (d) Impressus Londini anno 1710. in 8.
 (*) *Allionius de febre Milliari Taurin.* in 8.

Hic morbus vel puerperas tantum adoriebatur, vel eas plerumque; hodie tamen & homines crebro aggreditur; initio enim nocuus magis evadebat, atque facilius comunicabatur, at nostris temporibus valde subactus apparet, difficiliusque propagatur.

Eruptionis miliaris species Græco nomine *Εκτίματα* in pluribus febribus obviæ fuerunt, & alibi pluries apparuerunt, ut ex observationibus medicorum celeberrimorum constat; quare minime ut de febre petecchiali admonuimus, ipsam novum morbum esse credendum est, quod & hujus morbi scriptores ostenderunt, duo reliqua sunt in hac Epocha proposita quæ ad medicinam facere crediderunt. Primum se prodit *Transfusio Sanguinis*; dum anatomen perscrutabantur, injectiones vasorum instituerunt quæ ramificationes distinguerent; eo ducti exemplo autumarunt venas ægrotantium liquidis remediis repleri posse ex genere præsertim purgantium, diaphoreticorum, solventium, eaque efficacius ita agere; hujusmodi methodum tanti existimabantur, ut *Chirurgiam Infusoriam* ipsam nuncuparent: extant de hac re duo tractatus alter (a) Joan-Danielis Major, seu Meyer, alter Joan. (b) Sigismondi Elshaltzii, at teterrimi effectus cito hujus methodi fallaciam ostenderunt.

Ea ratione igitur sanguinis transfusio invexit; primum undique recepta fuit, & commendata ut de novis rebus evenire solet; statim maxima spes concepta est sanitatem non solum sed *juventutem* restitui posse. Medicorum enim quisque (c) sibi inventum arrogabat, Ricardus Lovverus auctor tractatus cordis asserit se (d) primum exercuisse Oxonii ann. 1665., idque enunciaſſe in transactionibus anglicanis an. 1666. quod verum est animalium respectu; Joan-Denys Parisiensis similem honorem sibi vindicavit ann. 1667. & in *Diario Sapientum* inseruit animalis in hominem transfusionem; Claudius Tardy (e) Doctor Præses Facultatis Medicinæ Parisiorum, testatur se primum de homine in hominem sanguinem transfusisse; alii denique insurrexerunt, & Jeronymus Vehr in Thesi quam defendit Francuforti ann. 1668. sub titulo *Disputatio de Metemachyma* eam Hofmano tribuit Altorffii Professor, at funestus eventus omnem tollit contentionem.

Secundum locum obtinet *Variolarum* Innoculatio, per quam earum fomes ex uno in alterum subjectum transducitur. Multiplex est inoculationis methodus; tutior tamen, & vulgatior obtinetur artuum carnem, cutimque ad pollicis circiter longitudinem incidendo, verum teniam recenti pure imbutam vulneri apponendo, ex benignis variolis desumpto; modo deficiat recens optimæ crasis exsiccatuſ inſpergitur quod, ad opus in phialla obturata servatur ne spirituofior pars in auras avollet; vulnus emplastro obtegatur & circa 7., aut 8. diem pustulæ erumpunt cum majori vel minori scenomerum apparatu, verum ulcus suppurat fluitque pus.

Plures fatentur hujusmodi praxim apud Circassiæ, & Mingreliæ populos antiquiorem fuisse, a quibus Bisantium transducta fuit; ibi Medici duo primum inoculationem sustinuerunt: alter fuit D. Emanuelus Timonus Bisantinus qui ad Londinensem academiam misit experimentorum speci-

Y 4

men

(a) *Chirurgia infusoria* Kilonii in 4. 1617.

(b) *Chlysmatica nova* Coloniz Brandenburgicæ in 8. 1667.

(c) Certum est Joannem Colle professorem Patavinum hanc transfusionem descripsisse in medico tractatu Venetiis impresso anno 1628. sub titulo *Methodus facile procurandi jacundatura, & nova medicamenta* cap. 7. (d) *Tractat. de corde*.

(e) *Tractat. de l'ecoulement du sang d'un homme dans un autre & de ses suites*, Paris 1667.

men (a) in transactionibus Anglicanis insertum an. 1714. n. 339. quod reperitur etiam in Ephemeridibus Curiosorum Germaniæ *Centur. V. & VI. observat.* 2. alter Doctor est Jacobus Pylarinus Cephaleus, qui circa hanc rem opusculum edidit Venetiis anno 1715. cujus specimen extat in transactionibus Anglicanis anno 1716. n. 347.

Auctoritates eorum Medicorum suffultæ exemplo Miledy VVortheley Montaigu, Legati Angli apud Turcas, qui unicum Filium anno 1718. Bisanthii inoculavit, verum in Patriam restitutus Filiam eadem ratione inoculari finit, Medicos plures, Chirurgos & Pharmacopolas excitarunt, ut eandem operationem tentarent invitis DD. (b) VVagstaffe, (c) Plackmore, (d) G Douglas & Freind (e) celeberrimis Medicis, qui contrarium sentiebant; certum enim est ad annum usque 1728. variolarum inoculationem communiter receptam fuisse, at causa latitante asserunt ipsam, (f) *fut suspendue & comme oubliée depuis cette année jus qu'en 1743.*, addunt tamen *s'y est relevé depuis, pour n'y plus essuyer aucun revers semblable.*

Tentarunt hujusmodi praxim per universam Europam propagare, eamque pluribus experimentis confirmare satagerunt, apud nos præsertim omni nisu studuerunt ut undique amplecteretur, at, quamvis sedulo prædicarent felices eventus, nondum celerrime progressa est.

Postquam inoculationis historiam exposuimus, judicium proferre necessum esset, at quæstio nedum nitida apparuit, quare autumo tantum utrinque patronum & adversariorum rationes referre.

Inoculatores enim asserunt rationem eorum qui sponte variolis correptis pereunt esse ut 1: 14. vel 7: 100., verum qui supersunt plerumque deformes evadere, ut statuant minime ancipites esse debere, cum certi simus hac methodo mortem, & deformitatem eludere; hoc unicum est eorum argumentum, quod tamen magni facere oporteret, cum validissimum sit & vitam, atque pulchritudinem tueatur.

Anti-Inoculatores vero respondent 1. Ex una parte nimis extollere numerum eorum qui vulgaribus variolis obeunt, earum Regionum saltem respectu, quæ Anglia ceteris paribus temperatiores sunt, ubi ratio emortuorum est 1: 30. & minor interdum; addunt comparisonem minime æquam evadere, nam pro hoc scopo (g) juvenes seligere solent bene dispositos quibus minus detrimenti morbus afferrat; verum in vulgari variolarum aggressu subjecta cujusque generis, & ætatis corripuntur, deleteriæ indolis morbosæ constitutionibus occurrentibus, ad ægritudinem sustinendam minus parata, quare nil mirum si majori numero pereant.

2. Ex altera parte detrimentum adumbrare inoculationis quo interdum invitis cautelis omnibus, multi sub inoculatione intereunt, etnim D. Jurin hujusce (h) methodi patronus & ipse testatur emortuorum rationem fuisse 2: aut 3: 100., & ultra quandoque.

3. Osten-

(a) Ajunt acta Lips. ann. 1714. pag. 382. hujusmodi opus impressum fuisse Bisanthii ann. 1713. quod vix credendum est.

(b) Epistola Gulielmi VVagstaffe ad D. Storem Freind, impressa Londini anno 1721.

(c) Collectio fragmentorum de inoculatione pag. 171. (d) Ibid. pag. 285.

(e) Freind *Histoire de la Médecine* Part. III. pag. 113. de la Traduction d'Etienne Coulet imprimée à Leyde en 1727. Postquam quasi Agirtam descripsit Joannem Gaddesden veterem medicum Anglum, & addit *s'il avoit vécu ètè de nos jours, il ne doute pas qu'il n'eut ètè à la tête des Inoculateurs*, quod ostendet ipsos Anglos inoculatores parvi fecisse.

(f) Collectio de Inoculatione variolarum impressa Parisiis 1756. in 12. pag. 135.

(g) Vide quod D. Jurin commendat, *Recueil* pag. 92. & suivantes, verum quod proposuit D. Ramby Chirurgus *ibid.* pag. 224. & seqq.

(h) Historia eventuum inoculationum in Anglia in collectione super allata pag. 98. *Ibid.* pagina. 132. 133. *Ibidem* Epistola D. Jurin ad D. Cotesworth pag. 50. du *Recueil*.

3. Ostendunt hujus detrimenti ambaginem sufficere, ut parentes, natos inoculationi minime exponant, quæ mortis periculo non vacat morbum evitandi causa incertum, quo hominum dimidium expers evadit, modo caute incedat.

4. At saltem, inquiunt, antequam inoculationi subjiciamur infantes necessum esset certiores fieri amplius hoc morbo corripi non posse; inoculatores id fatentur, at adversarii (a) contrarium sentiunt, circa quod ineluctabilia hi afferunt exempla; idcirco inoculatores animo deficiunt cum ipsis jam inoculati denuo inoculandi proponatur, & revera cum (b) pluries quandoque variolis laborent ægri citra inoculationem quo speciali favore inoculati semel tantum corripiri poterunt.

5. Anti-Inoculatores testantur, variolas inferendo periculum adesse quod strumæ, herpes, scorbutus, aut lues venerea inferantur, modo ab infecto subjecto alterius morbi pus desumatur; si fomes variolarum vulnere intrusus variolas excitet, idcirco strumofus, herpeticus, scorbuticus, celticus similes morbos excitare potis erunt; minime rationibus tantum hanc opinionem confirmant, verum clarissimis exemplis illam defendunt, in quibus pro variolis alterutrum eorum morborum excitarunt.

6. Tandem referunt hujusmodi variolas, legitimas pustulas minime æmulari, sed a (c) scabie potius haud absimiles esse, verum papulas ullas nunquam in suppurationem vergere, neque pus novam inoculationem excitare posse, quod ostendit minime eam materiam variolosam fuisse, aut a veris variolis processisse, ut tuto statui queat inoculatos nunquam, a variolis legitimis tueri posse.

Me latet si unquam hujusmodi animadversiones apud nos institutæ sint, felicem tamen inoculationis eventum evenisse observavi, quod inoculatorum sententiam magnopere sustinuit, & fautores sui circumstantiarum utilitates non neglexerunt; at spes eorum cito evanuit infortunii ergo, quod ab inoculatione processerunt, quare modo rei novitas suffragiis omnibus non fulciatur, verum sententiam sedulo magis perpendamus hujus praxis consuetudo adhuc incerta, & nocua apparet.

JACOBUS PRIMEROSUS origine Scotus Burdigalensis.

De Morbis Mulierum & Symptomatis Libri V. in quibus plurimi tum Veterum, tum Recentiorum errores breviter indicantur & explicantur. Roteradami, 1655. in 4.

A. C.
N.
Ann.
1650.

PETRUS MICHAEL DE HEREDIA Medicinæ Professor in Universitate Compluti per 25. an. consecutivos postquam a Philippo IV. Hispaniarum Rege in Archiatrum electus fuit; obiit anno 1663.; Petrus Barca Asturigenensis medicinæ Professor, & discipulus Herediæ ejusdem opera collexit anno 1665. & impressit Lugduni in fol. in unicum volumen in quatuor partes distinctum.

A. C.
N.
Ann.
1660.

In quarta parte tractatus extat per longus de muliebribus morbis, quem tamen parvi puto ut vix perlegi mereatur; Auctor Arabes prosequitur, ut vix fructus sit utilitatibus quibus medicina post Græcorum medicorum fcho-

(a) D. Kirkpatrick, *The analysis of inoculation*, impressa Londini anno 1754. ipse assuit sex exempla inoculatorum qui variolis jam antea correpti fuerant, tres refutat, ceteros damnat. Vide *Recueil* citatum pag. 255.

(b) D. Jurin assuit D. Isacci Massei Pharmacopolæ exemplam qui idem testatur pag. 84. du *Recueil*, & plura alia afferre posset.

(c) Sufficit pervolvere ipsam descriptionem variolarum quam inoculatores ipsi afferunt.

scholam scatebat, quod ostendit eo tempore nondum nova medicina inventa Hispaniam invasisse.

A. C. ANTONIUS MENIOTUS Parisiensis Medicinæ incubuit Monspeli, ibique gradum Doctoris sumpsit; verum Lutetiæ medicinam exercuit ubi Regis medicus creatus fuit; obiit ante annum 1697. ætatis 80.

Plures fasciculos composuit pathologicos in quatuor partes distributos, quos Parisiis in 4. ediderunt pluries annis, nempe 1665. 1674. 1677.

Inter eos nonnulli reperiuntur qui de morbis mulierum agunt ut *De furore uterino* in prima parte, *De Pica* in secunda, & *De sterilitate* in tertia, at nisi animadversiones nonnullæ pathologicæ reperiuntur absque Diagnosti, Prognosi, aut Curatione.

A. C. FRANCISCUS DE LA BOE SYLVIVS Hannoveriensis natus anno 1614. Basileæ anno 1637. gradum Doctoris adeptus est, verum medicinam partim apud Hannoverienses, partim Amstelredamenses exercuit; deinde apud Lugduno-Battavos advocatus Cathedram replevit obiti Alberti Kyper ibique secundam vitam iniit anno 1672.

Hujusmodi Medicus vivens plurimi existimabatur, quem tamen ejusdem opera post mortem non sustinuerunt.

Ediderunt post obitum ejusdem quatuor volumina in 12. de omnibus Morbis, quorum tertium apparuit sub titulo.

Praxeos Medicæ Liber tertius. De affectionibus generationi hominis dicatas functiones lasas vel constituentibus, vel producentibus, vel consequentibus. Amstelodami, in 12. 1674.

In hoc Tractatu decem Capita extant, de Morbis Mulierum, quæ conceptionem præsertim, gestationem, & partum respiciunt; ejusdem theoria involuta maxima apparet, praxis vero fane comburit, quia aromatis scatet innumeris, quæ convenirent in iis regionibus potius, ubi Sylvius praxim exercebat.

Hujusmodi opuscula in collectione inserta fuerunt operum suorum in fol. editorum, quorum præcipuam partem constituent.

A. C. THOMAS VVILLIS Medicus Anglus natus anno 1620. gradum Doctoris Medici sumpsit in Universitate Oxoniensi, ubi paullo post naturalis Philosophiæ Professor creatus fuit, verum Londini advocatus anno 1667. ibi fama maxime increbuit, obiitque anno 1677.

Villis Oxoniæ impressit anno 1667. Tractatum in 4. cujus titulum *Pathologiæ cerebri, & nervosi generis Specimen*, in quo agitur de Morbis Convulsivis, & de Scorbuto, in eo fancivit convulsiones omnes ab eterogeneis, & explosivis moleculis oriri animalibus spiritibus remixtis, quæ inæquales explosiones inducunt in iis partibus, in quibus influunt, & convulsiones, aut convulsivos motus hinc excitare potis sunt.

Highmorus, qui jam antea de hac re diseruit huic theoriæ minus quiescebat; dissertatione enim anno 1670. impressa, de qua sequenti articulo locuturi erimus, sententiam oppugnare tentavit; huic tamen dissertationi Villis ipse respondit eodem anno subsequenti labore.

*Affectuum hystericarum & hypochondriacarum Pathologia
spasmodica vindicata contra Responſionem epistolarem
Nathanaelis Highmori. M. D. Lodini, 1670. in 8.*

Sequenti articulo discrepantiæ eventus innotabit.

NATHANAEL HIGHMORUS Oxoniensis eddidit Oxonii anno 1660. opusculum in 12. sub titulo.

A C.
N.
Ann.
1670.

*Exercitationes duæ, quarum prior de Passione Hysterica,
altera de Affectione Hypochondriaca.*

Quæ ipsum excitarunt ut Villisii sententias refutaret, circa hujusmodi morbum, & sequentem laborem anno 1667. exararet.

*De Passione Hysterica & Affectione Hypochondriaca, Re-
sponſio epistolaris ad D. Villisium. Londini, 1670.
in 4.*

In hac dissertatione Highmorus Villisio adversatur quia, in sua Pathologia circa causas affectionis hystericæ, & hypochondriacæ multa erronea dixisse autumavit; juxta Villisii enim sententiam horum morborum causa in cerebro erat, qui suppeditat, & in nervis qui deferunt animales spiritus eterogeneis particulis imbutos, ut convulsivas commotiones morbis iis obvias valeant excitare: contra hanc hypothesim Highmorus epistolam super allatam publici juris fecit, in qua ostendit, hujusmodi morbos a subtiliori elastico, & facile dilatabili sanguine oriri, qui pulmones & cordis ventriculos infarciendo suffocationes, & oppressiones excitet; eorum morborum potissima symptomata; quæstionem parvi puto, cum a causa procul diversa has ægritudines originem ducere autumem.

MARIA MEURDRAC.

A C.
N.
Ann.
1676.

*Mitleidende und leichte Chimie vor das Fräuleinweibens,
aus dem Franztæsischen ins Teutsche uherſetzt von I.
L. M. C. Franckfurt, 1676. in 12.*

Videlicet, Chimix Synopsis loculenta pro matronis, earumque morbis; ex Gallic. Latine versa, par I. L. M. C. Francofurt, 1676. in 12.

Titulum hujus libelli tantum novi, ut etiam cæterorum librorum Alemanno idiomate conscriptorum, de quibus infra mentionem faciam, quare de iis pauca dicere potero.

HENRICUS CELLARIUS

A C.
N.
Ann.
1678.

Vermeinte Mutter-Beschreibung. Halberſtad. 1677. in 12.

Videlicet, Putatum uteri ulcus. Halberſtad. 1677. in 12.

PAULUS DE SORBAIT Hanoviensis Medicinæ incubuit Vindebonæ Austriæ per 24. annorum curriculum; Archiater fuit Imperatricis Eleonoræ Gon-

A C.
N.
Ann.
1678.

Gonzagæ Viduæ Imperatoris Ferdinandi III. ; novam (a) vitam iniit anno 1691.

Praxis Medica septem Tractatibus comprehensa . Viennæ Austriæ, 1680. in fol.

In priori Tractatu capita 86, reperiuntur inter quæ XIII. posteriora de Morbis Mulierum agunt.

A. C. PHILIPPUS GEORGIUS GRULINGIUS.

N.
Ann.
1680.

*Vou Weibera Kranrkeiten , Franckf. 1680. in 4.
Videlicet, De Morbis Mulierum. Francfort, 1680. in 4.*

A. C. MICHAEL ETTMULERUS Lypsiensis in patrio Liceo Doctor, & Professor Medicus, vixit annos 39. natus 1644., obitusque anno 1683.

1682. Georgius Francus ejusdem universitatis Professor, opera ejusdem confect, & edidit Francofurti in duplici volumine in fol. anno 1638. Petrus Chauvin Medicus Londinensis, eadem impressit Lugduni anno 1690. In ea collectione opusculum reperitur sub titulo

Collegium practicum speciale de Morbis Virorum, Mulierum & Infantum.

quod Mulierum morbos respicit, X. Capita complectitur, quæ potissimum ad conceptionem, gestationem, & partum attinent.

A. C. THOMAS SYNDENHAMIUS Comitatus Dorseti in Anglia, natus anno 1642. Candabrigæ Doctor; moram gessit Londini anno 1661. ibique medicinam summo cum decore exercuit; æternam vitam sumpsit anno 1686.

Inter ejusdem opera pluries impressa dissertatio quædam reperitur epistolæ more conscripta, & Gulielmo Colæ medicinæ Doctori dicata.

De Observationibus nuperis circa curationem variolarum confluentium, necnon de Affectione Hysterica.

In posteriori parte hujus dissertationis 1. miscet Villis more affectionem hystericam mulierum, cum hyppocondriaca virorum, 2. autumat vero, hyppothese Villis amplectendo, ambo hos morbos a spirituum animalium defectu oriri, quem *Ataxiam* vocat, cujus vocabuli neque indolem, neque causam explanat, ut *Ataxia* Paripateticorum qualitas occulta videatur 3. pro hystericæ passionis curatione valde commendat Martialia, aquas minerales ferrugineas, quinquinam, opium, vinum Hispanicum, aut vinosum infusum radice gentianæ, angelicæ, corticum aurentiarum, & equitationem potissimum, spernit magnopere purgantium usum, de cetero vulgaria anthysterica commendat.

Quod mirum est putat tumorem, hydropem, & steatomata ovariorum, aut hydatides, quæ in iis partibus efformantur & a morte, observantur consecutiones potius esse humoris cujusdam, qui illa organa infarciat, quam causas eorum morborum.

Quam-

(a) In Catalogo Curiosorum Germania, præfixo Volumen, I. Ephemerid. Anni 1727.

Quamvis hujusmodi opus solidam theoriam minime præferat, tamen Auctoris fama ipsum pervolvere cogit.

JOANNES GARMER Medicus Hamburgensis.

Diatriba seu controversia cum Beckio de uteri procidentia, curis secundis auctior. Hamburgi. 1684. in 4.

A. C.
N.
Ann.
1684.

JOANNES DOLEUS natus Geismann in Hassia Medicus Landgravi Hassiæ-Cassel, & Academiæ Curiosorum socius obiit anno 1722. juxta Catalogum ejusdem societatis, quem reperies initio primi Voluminis anno 1627., etiam si Kalendæ desint.

A. C.
N.
Ann.
1684.

Encyclopædia Medicinæ Theoretico-practicæ, qua tam veterum, quam recentiorum, Paracelsistarum nempe, Helmontianorum, Villisianorum, Sylvianorum, Cartesianorum, de causis & curationibus Morborum sententiæ exhibentur. Addita simul Authoris de his opinione. Una cum medicamentis Galenico-chymicis, ut plurimum ab ipso Authore experientia comprobatis, Francofurti, 1684. in 4.

Hujus encyclopædiæ liber V. decem capita præfert, quæ de Morbis Mulierum agunt, synopsis præstant plurimorum auctorum, & quod mirum est eorum qui invicem contrarias sententias tenebant, videlicet Paracelsistarum, Helmontianorum, Villisianorum, Cartesianorum, & sectatorum Sylvii de la Boe.

Demum hujusmodi tractatus id singularis habet quod undique scateat Hebraicis, & Græcis vocabulis, idcirco cerebrum *Microcosmetor* appellarunt, cor *Cardimelec*, stomachum *Gasteranax*, orificium matricis, *Spiritus plasticus*, aut *janitor uteri*, quæ sunt futilia eruditionis jactationes.

Tandem admirationis dignum est opus latinis versibus adornari in laudem Dolei partim a Michaeli, & Ettmullero; partim a Michaeli, & Sydenhamio exaratis.

NATHANAEL SPRYE.

Tractatus de Fluxu menstruo. Patavii, in 8. 1685.

A. C.
N.
Ann.
1685.

Hic conatus est explicare periodicum mensium regressum solo augmento copiæ, & motus sanguinis, tamen ostendit, uteri structuram spongiosam esse, quod fovet stasim sanguinis in matricis anfractus ex quibus tandem plures sibi pandit vias, autumat simul ab hac hypotesi omnes deduci posse catameniorum aberrationes.

GUALTIERUS CHARLETONUS, Medicus Londinensis.

Inquisitiones Medico-physicæ de causis Catameniorum, sive fluxus menstrui; & uteri rheumatismo sive fluore albo. Londini, 1684. in 8.

A. C.
N.
Ann.
1686.

A. C.
N.
Ann.
1691.

JOANNES NICOLAUS PHISER

Von oler VVeiber Nature, wie auch deren Gebrechen und Kranckheiten. Altdorf. 1691. in 8.

Videlicet, De natura, mulierum earumque infirmitatibus atque morbis. Altdorf, 1691. in 8.

A. C.
N.
Ann.
1691.

JOANNES GEORGIUS SOMMERS

VVeiberg Pfleg-Buchlein, annectirt deren hebammen Schule. Rudelstadt, 1691. in 12.

Videlicet, Synopsis Morborum Mulierum cui additur praxis artis obstetriciae. Rudelstad, 1691. in 12.

A. C.
N.
Ann.
1694.

FRANCISCUS MAURICEUS Parisiensis Chirurgus, & obstetricans magni nominis, qui obiit anno 1709.; de arte Obstetricia nonnulla opera exaravit.

Traité des maladies des femmes grosses & de celles qui sont accouchées. A Paris, 1694. in 4.

Postea duplicem Tractatum composuit sub titulo *Observations sur la grossesse & l'accouchement des femmes*, ambo Parisiis in 4. alter anno 1694., alter anno 1708.

Ipse nullum ordinem nullamque methodum in iis conscribendis observavit, & dum rationes reddere satagit infidelis experitur magister; at cum experientia non deficeret inter legendum nonnullas præstat utiles notiones.

A. C.
N.
Ann.
1695.

BERNARDUS CONNOR Anglus, sive Irlandus (a) Monspefsuli medicinæ incubuit circa annum 1690. ubi fortassis Doctoris gradum sumperit, verum Parisios se transtulit ubi Regiæ societati ipsum addiderunt, quare specioso titulo nuncupari consueverat *e Regia Camaræ Parisiensi societati*; tunc fortuito animadvertendum (b) sibi præbuit Sceleton humanum ex vertebriis, costis, ossi sacro, innominatis &c. in unicum corpus coalitum; observavit pariter maximum (c) Sarcoma qui omnem pene uteri cavitationem replebat, quod expulsiit mulier quædam post receptum in hypogastrio pedis ictum. Verum In Italiam proficiscens criptam *del Cane*, & Vesuvii eruptionem anni 1694. observavit; in patriam tandem redux dissertationes congerit, quæ circas ea composuerat, quas unico volumine edidit sub titulo sequenti.

Dissertationes Medico-Physicæ,

De Antris lethiferis.

De montis Vesuvii incendio.

De stupendo ossium coalitu.

De immani Uteri Sarcomate. Oxonii, 1695.

Alte-

(a) De antris lethiferis pag. 19.

(b) Dissert. de stupendo coalitu pag. 4.

(c) Dissert. De immani uteri sarcomate pag. 38. 39.

Alterum opus ejusdem Auctoris superest sub titulo *Evangelium Medici, sive Medicina Mystica, De suspensis naturæ legibus, sive de miraculis, reliquisque in totis Bibliis, memoratis, quæ medicæ indagine subjici possunt* Londini 1697. in 8.

PHILIPPUS FRAVENDORFFER natus (a) in Austria superiori Medicus provincialis Moraviæ, Brini residebat, & Academiae Curioforum socius creatus, obiit (b) anno 1697. A. C. N. Ann. 1696.

De morbis mulierum. Noribergæ 1696. in 12.

CHRISTOPHORUS HELLVIGS

Fravensimmer Apothecogen. Lipsig. 1700. in 12.

Videlicet, exigua Pharmacia muliebris. Lypsiæ, 1700. in 4.

A. C. N. Ann. 1700.

CHRISTIANUS-JOANNES LANGIUS Pegavenfis Saxonus natus anno 1655. Doctor & Professor medicinæ in facultate Lypsiensi; interiit anno 1701.; ejusdem opera collegerunt, & publicarunt Lypsiæ anno 1704. in duplici volumine in fol. cura Augusti Quirini, Professoris Pathologiæ, & Botanicæ in eadem facultate; A. C. N. Ann. 1700.

Hujusmodi collectio extat sub titulo sequenti

Christianni Johannis Langi Opera omnia medica theorethico-practica.

In ea Tractatus invenitur sub titulo *Praxis medica Langiana* in quo Auctor in XXIV. Capitulo pertractat de morbis sequiori sexui tantum familiaribus; quindecim in eo exiguos Paragraphos affert qui brevitatis ergo inutiles evadunt.

Huic collectioni theses academias addiderunt ejusdem auctoris, quæ tertiam partem operis constituunt; nonnullæ de sterilitate, mensium suppressione; virginum morbis, & gestatione fusius agunt.

JOANNES FREIND Medicus Londinensis & Regiæ scientiarum academiae socius qui obiit an. 1729. plures libros composuit quibus fama inclaudit, hic tamen de sequenti tantum verba faciemus. A. C. N. Ann. 1703.

Emmenologia, in qua fluxus muliebris, menstrui phænomena, periodi, vitia cum medendi methodo ad rationes mechanicas exiguntur. Oxoniæ, 1703. in 4.

Ipse pro catameniorum causa plethoram sanguinis agnovit, qui singulis mensibus in utero cumulatur, & specialis magnitudo arteriarum per utero reptantium, eaque sufficere autumat, ut catamenia periodice eveniant.

JOANNES DOMINICUS SANTORINUS Professor medicinæ & Anatomiae Venetiis. A. C. N. Ann. 1705.

Opu-

Opuscula Medica de structura & motu fibræ, De nutritione animali, De hæmorrhidibus. De Catameniiis. Venetiis, 1705. in 8.

De postrema tantum earum dissertationum hic verba faciemus; Auctor postquam animadvertit §. I. haud facilem esse catamenia explicare, ostendit a triplici causa §. VII. illa oriri, a plethora vera aut apparenti, a speciali uteri, & vaginæ distributione vasorum, a spermatis actione in omne spirituum systemate *per totam spirituum systasim*, quam postremam causam minus laudat auctor Gallus.

Hujusmodi opus Rotterodami recussum fuit anno 1719. *in 8.*

A C. HERMANUS BOERRHAVIUS Vianensis Batavus medicinæ Professor
N. in Universitate Lugduni, & socius Academiarum scientiarum, & Londinen-
Ann. sis, magni nominis vir, & scriptis major obiit anno 1438.
1708.

Aphorismi de cognoscendis & curandis morbis. Lugduni Batavorum, 1708. in 8.

Hujusmodi opus brevis est medicinæ synopsis quæ nonnullas tantum ægritudines ostendit, at Boerhaaviana synopsis semper maxima fuerit; IV. capita de Morbis Mulierum agunt sub titulo sequenti, *Morbi Virginum, morbi gravidarum, Partus difficilis, morbi Puerperii*, quæ Boerhaavius aphoristice indicat, fusius tamen discipulis suis explicabat.

A C. JOANNES GABRIEL RUDOLPHUS.

N. *De iis, quæ sunt observanda in mulieribus largiter men-*
Ann. *struatis. Lugduni Batavorum, in 8. 1708.*
1708.

A C. PETRUS FRESART Leodiensis Auctor sequentis Tractatus.

N. *Emmenologia, in qua fluxus muliebris menstrui phænomena,*
Ann. *periodi, vitia, cum medendi methode ad rationes Medico-Physicas exiguntur. Leodii, in 12. 1712.*
1712.

Auctor causam perpendit menstruationis, verum mensium aberrationem explicat, & quasi totidem morbos constituit, adversus quos remedia magis idonea suppeditat.

Juxta ejusdem sententiam menses gignit, fermentum quoddam uteri in matrice collectum, quod singulis mensibus rarefciendo eruptionem provocat, credo auctorem hyppothesim didicisse Monspelii, ubi medicinæ incubuit sub D. Chirac disciplina, quid idem docebat, quemque summis laudis extollit. (a)

A C. ANONYMUS.

N. *Nouveaux secretes . . . pour guérir plusieurs sortes de Ma-*
Ann. *ladies des Dames, tirez des Mémoires de M. Digby.*
1715. *1715. in 8.*

Titu-

Titulus satis indicat opus parvi faciendum esse

JOANNES ANTONIUS TERENCEZONI Professor medicinæ Pisanus.

De Morbis Uteri. Lucæ, 1715. in 4.

A. C.
N.
Ann.
1715.

JOANNES GOLDHAMMERS

*Compendioser VVeiber und Kinder Arzt. Muhlhausen, 1717.
in 12.*

*Videlicet, Medicina contracta Mulierum, & infantum.
Muhlhausen, 1717. in 12.*

A. C.
N.
Ann.
1717.

GASPAR SCHROTTERS

*Junyfern. VVeiberg und Kinder Apothekgen. Franckf. 1721.
in 8.*

*Videlicet, Exigua Pharmacopea filiarum, mulierum, &
infantum. Francofurt, 1721. in 8.*

A. C.
N.
Ann.
1721.

HENRICUS VAN SANDEN

*Observatio de prolapsu uteri universi. Regiomonti. in 4.
1722.*

A. C.
N.
Ann.
1722.

GEORGIUS-ERNESTUS STAHL de Halla natus an. 1660. Consiliarius
Aulicus, & Medicus primarius Friderici Regis Borussiae, Accademiae Cu-
rioform socius, & Professor medicinae in universitate quæ Hallæ est, obiit
anno 1734. 75. ætatis suæ. (a)

A. C.
N.
Ann.
1724.

Theses nonnullas ejusdem auctoris reperi quæ de Morbis Mulierum per-
tractant, quas auctoris nomen me indicare cogito, etiamsi nullam refer-
re putarem.

*Dissertatio inauguralis Medica, De mensium Mulierum fluxu secundum
naturam, & suppressione præter naturam.*

*Respondente Joh. Georgio Brebiss, Curi-Varisco. Hallæ Mag-
deburgicæ, 1694. in 4.*

Stalius pariter Germanico idiomate sequentem tractatum edidit.

*Propempticum inaugurale, De fluxus muliebris, quatenus menstrui,
causa. Hallæ Magdeburgicæ, in 4. 1702.*

*Disputatio inauguralis Medica, De mensium insolitis viis.
Respondente Georg. Frideric. Jasehctke, Stroppa Silesio.
Hallæ, 1702. in 4.*

Dissertatio Medica inauguralis, de Puerperarum affectibus.

Astruch de Morbis Mulierum.

Z

Re-

(a) In Catalogo Accademicor. defunctor. præfixo Volumen IV. Ephemerid. Germanicar.

Respondente Joachim Cober, Pritzvalcens-Marchico. Hallæ 1704. in 4.

Dissertatio Medica inauguralis, De affectibus gravidarum. Resp. David Dittman, Vilna-Lithuanico. Hallæ, in 4. 1708.

Dissertatio inauguralis Medica, De sterilitate feminarum. Resp. Gottfried VVilbelmi, Huvelb-Marchio. Hallæ, 1711. in 4.

Stalius pariter Germanico idiomate sequentem tractatum edidit.

Von den Zuffalen und Kranckheiten des Fravenzimmers. Lypsiæ, 1724. in 8.

Videlicet, De fœnomenis, & morbis mulierum, Lypsiæ, 1724. in 8.

... LE TELLIER filius.

Reflexions critiques sur l'Emmenologie de M. Freind. Paris, 1730. in 8.

Ecce vobis quot extant emmenologiæ tractatus; at animadvertendum est menstruorum explicationem includere explanationem morborum omnium ad mulieres pertinentium, ut incassum conemur iis mederi modo causa catameniorum non elucescat, quæ in omni mensium aberratione uteri statum potissimum manifestaret solet.

A C.
N.
Ann.
1732.

ANTONIUS CELESTINUS COCCHIUS in Urbe Botanice Professor.

De immani hysterico affectu, inter Epistolas Physico-Medicas, Parisiis, 1732. in 4.

A C.
N.
Ann.
1734.

JOANNES AUGUSTUS OEHEMENS.

Efronete Geheimnisse der natur und iur eines Malad es Fravenzimmers. Leipzig, 1734. in 4.

Videlicet, Naturæ arcanum ægram pertractando detectum. Lypsiæ, 1734. in 4.

A C.
N.
Ann.
1735.

GEORGIUS PHILIPPUS NENTER Medicus Argentinus.

Fundamenta Medicinæ theoretico-practica, secundum celeberrimi D. D. Stahlii potissimum, aliorumque celebriorum Medicorum placita conscripta, & propria experientia confirmata, in forma Tabularum. Venetiis, in fol. 1735.

In ea parte hujus operis, quæ sub titulo extat *Praxis specialis* in VIII. libros distincta, duplex locus reperitur ubi auctor de Morbis Mulierum agit. 1. In priori libro ad Caput VIII., IX., X., & XI. verba fiunt menstruorum, lochiorum, eorumque aberrationum, 2. In libro VII. vero quinque sectiones habentur, quæ pertractant *De Morbis imprægnandarum. De affectibus imprægnatarum, De affectibus parturientium. De affectibus puerperarum*

rarum. De *laetantium affectibus*. At huiusmodi methodus per classes sive tabulas morbos pertractandi laborem valde superficialem reddit, qui vix necessarias notiones lambit.

FRIDERICUS HOFFMANUS natus Hallæ circa Magdurgum anno 1666. medecinæ studuit in Universitate Jenæ ubi gradu Doctoris sumpto anno 1681. Professor inde Medicinæ creatus fuit anno 1691. in ea Universitate, quam Hallæ instituit eodem anno Fridericus III. Elector Brandenburgi, & I. Rex Borussiae, quod onus summo cum decore implevit ad mortem usque quæ anno 1742. evenit. A. C.
N.
Ann.
1740.

Frater de *Tournes* Typografi Genevenses complectam Hoffmani operum editionem confici curarunt, cum partim Francofurti, Venetiis, & alio impressa fuerint: ad Hoffmannum enim litteras miserunt, qui sumptum laudavit, pluresque Tractatus ipsis subministravit, quos in hac prima collectione ab Hoffmanno ipso comprobata an. 1640. inseruerunt, tria grandiora volumina in fol. ipsa collectio constituebat in VI. Tomos divisa, quam ipsi *Tournes* recusserunt anno 1748.

Ea codicem quam maximum constituit institutionum medicarum, attamen incompletum, qui post auctoris mortem valde increbuit, tria enim volumina anno 1754. addiderunt ex Thesibus accademicis consultationibus, & miscellaneis congesta, quas verosimiliter sua prima juventute Hoffmannus collegerit, at ineunte ætate ipse respueret, sed editores in iis peragendis magis Typografi utilitati, quam auctoris nomini consuluerunt.

Certum enim est utilissimas in Hoffmanni scriptis notiones reperiri; secus enim ad summum nominis columnen non attigisset, at fateri oportet, ejusdem stylum laxum, perlongum nimis experiri, & obvia sæpe narrare, crambe etiam recoquere in ipsis operibus, quæ ipsius auctoritate fulciuntur; nam ejusdem postumi labores magis defectivi evadunt.

Nihilo tamen minus Hoffmannus inter præstantiores medicinæ auctores recenseretur meretur, verum si cum Græcis Auctoribus ipsum comparemus, non Hippocratem, sed Galenum potius æmulatur.

Ipse hinc inde de morbis mulierum in sua ampla congestione differuit at cum morborum distributio specialis auctoris sit, idcirco hic illuc de hac re notiones piscare necessum erit.

Etenim I. in Tom. IV. tres centuriæ consultationum inveniuntur, inter quas plures de mulieribus, & remediis in iis circumstantiis idoneis agunt, specialibus tamen hypothesibus referuntur non generaliori thesi, quæ casus omnes complectatur.

II. In Tom. III. Hoffmannus locutus est pag. 50. De *Malo Hysterico*. Pag. 176. De *convulsione uteri, sive abortu*. Pag. 311. De *cachexia, & chlorosi*. Pag. 348. De *cachexia uterina sive fluore albo*, quæ dogmatice ostendit.

III. Tandem in secundo supplemento Part. II. pag. 389. Thesis academica reperitur, De *Genuina chlorosis indole, origine, & curatione*.

Minime fatagerem ea exponere, quæ in plerisque articulis Hoffmannus circa hanc rem ostendit, cum nihil novi aut singularis præferat, sat erit animadvertere ipsum respuere opiniones Highmorri, Sylvii, & Sydenhami, qui morbi sedem in stomacho, pancreate, mesenterio, aut vena portarum constituebant, verum Pisoni sententiam, qui in cerebro, aut nervorum origine ipsam ponebat. Hoffmannus enim cum veteribus in utero morbi causam adesse putat eamque triplici ratione oriri, a mensibus retardatis, lochiis suppressis, aut spermatis acrimonia; at pro muliebri femine nisi ovula recognovit, quibus cogitur corruptionem explicare eorum ovulorum

in hysterico morbo ; tandem autumat deleteriæ indolis vapores ab utero elevari, qui per omnem corporis ambitum distribuuntur , & omnia terribissima fœnomena produciunt.

A. C.
N.
Ann.
1555.

J. R. ---n Londinensis, Medicinæ Doctor.

A Treatise on all the Diseases incident to Women, by John Astruch, Physician to his present Majesty, &c. and Author of a Treatise on the Venereal Diseases, translated from manuscript copy of the Author's Lectures read at Paris. London. in 8. 1743.

De hoc Tractatu in Præfatione hujus operis jam mentionem fecimus.

A. C.
N.
Ann.
1555.

RICARDUS MEADIUS natus an. 1673. Stephey prope Londinum, postquam Ultrajecti, & Lugduni Batavorum medicinæ consuluit, in Italiam professus est, ubi Patavii Doctoris gradum sumpsit ; in Patriam vero rediit summa cum laude medicinam exercuit ; tandem obiit anno 1754.

Meadius varia opuscula exaravit a medica republica lubenter accepta, quæ tamen etiam si plurimi facienda videantur, minime tamen rem nostram respiciunt, idcirco postremum ejusdem opus tantum indicabimus videlicet.

Monita & Præcepta Medica. Londini, 1751. in 8.

Hujusmodi tractatus magnopere instruit, & XXI. Capita tantum completitur, eorum tamen XIX. de nonnullis Mulierum Morbis agit in quinque Sectiones distinctum.

- I. De menstruorum suppressione,
- II. De immodico mensium fluxu,
- III. De floribus albis mulierum,
- IV. De morbo hysterico,
- V. De partu difficili.

De singulis nonnulla monita practica suppeditat citra theorias, breviterque remedia magistuta indicat, idcirco testatur eleborum nigrum validissimum evasisse ad menstrua provocanda, verum bis in die proponit coclear tincturæ *Melampodii* juxta pharmacopeam Londinensem paratæ, & in citho aquæ propinatæ.

A. C.
N.
Ann.
1558.

JACOBUS LAZERME Doctor, & Professor Facultatis medicæ Monspeliensis, qui paullo antea occubuit, edidit Monspeli anno 1751. specimen medicinæ sub titulo

Curationes Morborum ex scriptis Jacobi Lazermis, Regis Consiliariis & Professoris Medici Monspeliensis excerptæ. Monspeli, 1750. in 12. Tom. I. pagin. 357. Tom. II. pag. 303.

Opus hujusmodi tradiderunt paullo post, & excusserunt Parisiis in duplici volumine sub titulo sequenti.

*Methode pour guérir les Maladies, traduit du Latin de M.
Lazermé. Paris, 1753. in 12.*

Ægritudines arctissimo ordine in hoc tractatu pertractantur, nam ipse omnes morbos complecti maluit præter celticam luem, & podagram; in eo futilis tantum invenitur formularum vulgarium congeries, absque ulla theoria, quæ morborum sedem, aut causam indicet, vel differentia, quæ species designet, aut symptomatum concomitantium discreptione, aut signis denique, quæ prognosim recte doceant, atque indicationes statuunt.

Hujusmodi defectus præsertim animadvertuntur in tractatu de Morbis Mulierum in quo deest tum menstruationis, cum periodorum explicatio, verum de mensibus nimis, ac suppressis in illo verba fiunt absque quo patefcat causa fluxus methodici; deinde formulas auctor ostendit adversus chlorosim difficillimum morbum, silet tamen causam, quæ illum producat: ipse autumat uteri descensum a laxitudine ligamentorum procedere, quod falsum esse super demonstravimus, tandem rationem reddere satagit qua pertractari debeant hujusmodi morbi, tamen nullam vel uteri, vel ejusdem functionum descriptionem exhibet.

Si hac ratione tyrones instruerentur medicina cito ad empiricam reverteret, ut in secunda Epocha evenisse ostenditur; igitur tali pacto Gordonus, Valescus de Tarenta, Gerardus de Solo medicinam Monspeli docebant.

Uno verbo medicinæ Elenchos respuere debemus qui doctis inutiles tyronibus nocui evadunt; hujusmodi enim pervolvendo libellos aliquid adfuisse sibi suadent, etiamsi revera nihilum prorsus adepti sint; excipiantur ab hac censura excerpta concinno ordine elaborata, quæ una celebriores quæstiones congerunt, & totidem summa capita constituunt fusius a præceptoribus explananda; hujus indolis sunt Aphorismi Boheravii *de cognoscendis & curandis Morbis*, tum ejusdem Physiologia.

Damnando Elenchos tamen non laudo ea medicinæ farcimina in quibus pauca utilia, & necessaria inter multa exotica, & futilia natant; hujusmodi errores alio satis pluries contempsi, at qui medium tenent eruditi nempe medici summa laude digni videntur. *Est modus in rebus &c.*

GERARDUS TITZ-GERALD origine Irlandus, Doctor, & Professor A C.
N.
Medicus in facultate Monspessulana, qui interiit anno 1748. Ann.
1678.

Ejusdem post obitum pertractationem de Morbis Mulierum sequenti titulo insignitam ediderunt.

*Traité des malades des femmes, traduit du latin de M.
Fitz-Gerald, Professeur de Médecine en l'Université de
Montpellier, a Paris (a Avignon) in 12. 1758.*

Me latet indolem hujus operis, neve revera versus sit ut titulo designat; in duas sectiones tractatus dividitur, altera *des Maladies chroniques des Femmes*, quæ VIII. Capita complectitur, altera *des maladies aiguës des Femmes*, quæ totidem exhibet.

In hoc opere fusius nonnihil quam in præcedenti de his morbis agitur, at eadem principia, eandemque praxim Auctor profecutus est; faterer enim medicinam centum ab hinc annis parum profecisse cum hujusmodi opuscula Monspeli anno 1750. perlecta sint, quæ nihil iis præcellunt quæ Rivierius in eadem Facultate anno 1640. præcepit.

Astruch de Morbis Mulierum.

Z 3

CON-

C O N C L U S I O .

Satis ostendit adhuc exposita brevis Medicinæ hystoria, hujus scientiæ fulcimenta continenter similia fuisse, videlicet cognoscere, & distinguere morborum species, certas aut verisimiles causas eorum sancire, indicationes proponere quibus mederi oportuerit, tandem mitiora, & magis idonea seligere remedia, quæ objectum medicinæ constanter constituunt.

Nemo tamen negabit nostris temporibus partium structuram melius detexisse anatomicos, sedem & causam singulorum morborum melius determinasse, imo plerasque immediatas invenisse, ut hac de causa novis inventis adornata magis physica eluceret; theoria vero certior, tutiorque fieret; rationes innotescerent plurimorum scænomenorum prius latitantium; attamen quoad praxim spectat parum ipsa progressa est, una constanter persistit.

Nonnulli contenderint nova remedia inventa fuisse, atque nova in diem innotescere, verum novas proprietates in obviis detectas fuisse, ut vires sunt antinecrotica & antispasmodica in quinquina. At hujusmodi quæstio etiam si praxim respiciat, parvi pendet.

Eorum enim pleraque quorum ad astra virtutes extollunt, a vanitate haud infrequenter, aut mercimonio medici cujusdam originem recognoscunt, vel argitarum audaciæ, aut inopinatae proceris personæ valetudini, vel Messalinæ patrocinio, aut solæ novitati tantum tribuuntur; primum sane jactantur hujusmodi remedia, at illusione abeunte inventoris dedecus tantum superest.

Si nonnulla tamen valida reperiantur auxilia qualia sunt quinquina, & Ipecacuanha pluribus experimentis fulcita, libenter illa amplectimur, & inter salubriores pharmacos reponimus; hujusmodi pariter sunt novæ medendi rationes, vel novi quos sternimus stramites, ut tutius sancitas jam, & vulgares impleamus indicationes; neque ex eo medicinam pervagam esse censebimus, sed dum sua servat veterrima præcepta novis frui non respue-
re auxiliis.

Mihi itaque, cogitatum explicare liceat exemplum ab aliqua physica parte desumendo; arborum enim fructiferarum cultura, non exiguam rei agrariæ partem constituit; olim jam innotebat circa plantas, terram scindere necessum esse, eamque emollire atque idoneo impinguare sedimento, a no-
cuis ipsas tueri infectis, tum ab aeris intemperie defendere, ramos steriles secare, ut fructicosi magis ingrandescerent.

Quid proinde utilitatis attulerunt circa rem rusticam nuperrima inventa? indagarunt structuram fibrarum lignearum, tracheas ipsis remixtas, humorum circulationem, medullæ, atque corticis usus, verum insectorum naturam, quæ arbores rodunt; fructusque corrumpunt ea sane vegetationem plantarum declararunt, at nihil culturam, quod maxime interest, immutare valuerunt.

At longius procedamus, pinguedines, aut fimi reperti sunt idonei magis, & utiles; insectorum venena detexerunt; spurios ramos a fructicosis facilius distinguere docuerunt; hæc omnia cultorem dirigunt, ut propositas indicationes facilius impleat, at nihil hujusmodi notiones veteres culturæ leges pervertunt.

Idem de arte nostra solet evenire, nam modo quæstiones scindamus, quæ cum medicinæ essentia nullam rationem habent, apparebit hujusmodi artis fundamenta eadem constanter fuisse.

Plinius enim si melius perscrutatus esset minime judicavisset medicinam ceteris artibus inconstantiorum esse: ait ille, *nullam artium inconstantiorum esse* (a). Tunc temporis enim Medicorum variationes quarum teterrima ipse affert exempla a voluptate procedebant qua corripiebantur Medici, ut novis rebus famam potius abriperent, quam ægris nocuis remediis sanitatem ledere abstinere, (b) *nec dubium*, asserit, *omnes istos famam novitate aliqua occupantes, animas statim nostras negotiari*, at id medicis potius, quam medicinæ erat tribuendum; nam, (c) *non esse artis ista, sed hominum* Plinius testatur.

Plinii enim redargutiones agyrtae potius respiciebant, qui turpi ratione subdolis auspiciis, aut mercimonio Romæ ægris illudere tentabant, simili ratione, ut Parisiis nova remedia sed futilia, & nocua plerumque defendere conati sunt; hujus sensus enim Medicos Plinius merito aspernitur, qui nostras vitas prostrant, (e) *animas nostras negotiari*.

(a) Histor. Natural. Libr. XXIX. §. I. edit. II. Harduin.

(b) Ibid. §. VII. pag. 497.

(c) Ibid. §. V. pag. 495.

(d) Ibid. §. VII. pag. 497.

FINIS TOTIUS OPERIS.

I N D E X

ALPHABETICUS AUCTORUM

Qui speciales Tractatus de Morbis Mulierum ediderunt, vel de iis Morbis in institutionibus mentionem fecerunt.

A

- A** *Etius* quando inter vivos erat. pag. 304.; Ejusdem Tractatus de Morbis Mulierum primus est qui pervolvi mereatur. *ibid.*
- Akasia* (Martinus) Professor Collegii Regis anno 1574. composuit opusculum de Morbis Mulierum post ejusdem obitum in collectione Spachii impressum. 327.
- Albucasis* Medicus Mahumetanus (Aboulcasem). 312.; agebat de Morbis mulierum qui chirurgiam postulant. *ibid.*
- Alexander Benedictus* Veronensis Medicus seculi XVI. Græcorum doctrina valde instructus. 316.; egit de omnibus Mulierum Morbis, excepto furore uterino. 317.
- Anonymus*. 352.
- Areteus* Cappadocus; cum vixerit ejus stylus. 302.; primus observationem ostendit hydropis cum hydatidibus. 303.; quales perscrutatus sit Mulierum Morbos. *ibid.*
- Asclepiades* Medicus, & amicus Ciceronis de ulceribus uteri mentionem fecit. 300.
- Avenzoar* Medicus Arabus religione Judæus, quid de Morbis Mulierum scripserit. 312.
- Averroes* Medicus Arabus seculi XII. arte locutus est de Mulierum Morbis. 313.
- Avicenna* Medicus Mahumetanus seculi X. ejusdem opera. 310.; ipsum difficillime perscrutamur. *ibid.*

B

- B** *Allonius* Gulielmus Doctor Parisiensis auctor Tractatus de Morbis Virginum, & Mulierum juxta doctrinam Hippocratis. 331.; valde prolixus, & inconcinne digestus. 332.
- Bayro* (Petrus de) Pedemontanus nonnulla de Morbis Mulierum affert. 324.
- Bertrucius* (Nicolaus) Medicus Italus seculi XII., de nonnullis Mulierum Morbis egit. 313.
- Boerrhavius* (Hermanus) Professor Lugdono-Battavus, ejusdem Aphorismorum judicium circa Morbos Mulierum. 352.
- Bon* (Joannes le) Medicus Regius, & Cardinalis de Guisa Auctor Tractatus specialis de Morbis Mulierum, cujus plures editiones exstant. 326.
- Bonacciolus* (Ludovicus) Medicus Florentinus seculi XVI. duplicem tractatum digessit de Morbis Mulierum. 321.
- Bottonus* (Albertinus) Professor Patavinus Auctor specialis Tractatus circa Mulierum Morbos. 328.

C

- C** *Ampolungus* (Emilius) Professor Patavinus egit de Morbis uteri. 332.
- Capivaccius* (Hieronymus) Professor Patavinus seculi XVI. 329. Auctor de Morbis Mulierum. *ibid.*
- Cellarius* (Henricus) scripsit de supposita exulceratione matricis. 347.
- Celsus* Medicus Romanus sub Imperio Tiberii. 301.; censura ejusdem operis de Morbis Mulierum pertractantibus. *ib.*

Cermesonus (Antonius) Professor Patavinus sæculi XV. 316.; ejusdem consilia circa Morbos Mulierum. 316.

Cesalpinus (Andreas) exacte descripsit circulationem sanguinis ante Harveyum. ibid.

Charleton (Gualtierus) Medicus Londinensis scripsit de uteri effluviis. 349.

Cleopatra Ægyptii Regina tribuit Tractatum de Mulierum Morbis. 305.

Cocchi (Antonius Celestinus) Romæ Botanica Professor de hysterico morbo locutus est. ibid.

Columbus (Realdus) Anatomia Professor Patavinus, verum Pisanus, Romæ medicinam exercuit, docuitque sanguinis circulationem ante Harveyum. ibid.

Connor (Bernardus) Medicus Anglus, aut Irlandus Parisi moram gessit. 350.; in suis operibus descripsit Sarcoma uteri, quod consecutus est hypogastri ictum. ibid.

Constantinus Medicus Christianus sæculi XI. libellum scripsit de Morbis Mulierum, & matricis qui tres paginas æquat. 311

Corbeus (Hermanus) ejusdem Tractatus de Morbis Mulierum. 333.

Cordæus (Mauritius) Doctor, & Medicus facultatis Parisiensis primus interpres Libri de Morbis Mulierum Hippocratis. 328.; ostendit observationem hydropis hydatidicæ uteri. ib.

D

D*E la Boe* (Franciscus) *Sylvius* Medicus Lugduno Batavus de Morbis Mulierum egit. 346.; ejusdem opera post obitum obsoluerunt. ibid.

De la Boe (Jacopus) *Sylvius* composuit opus de Catameniiis, & generatione. 323.

Deodatus (Claudius) observationem præstitit valde utilem circa uteri sarcoma. 335.

Digby arcana remedia adversus plures Mulierum Morbos, futilia tamen exhibuit. 352.

Doleus (Joannes) Medicus Landegra-
xi Hassiæ. 349.; Auctor Encyclope-

diæ Medicæ; ubi pertractat de Morbis Mulierum, opus tamen parvum duco. ibid.

Doringius (Michael) Medicus Uratislaviensis; ejusdem epistola de uteri hernia, & operatione Cæsariana, quam perperam tentavit in relato casu. 335.

Dunus (Thaddæus) Locarnensis collectionem publicavit remediorum contra Mulierum Morbos, quæ a veteribus deprompsit. 325.

E

E*Ttmullerus* (Michael) Professor Ly-
psien-
sis. 348.; egit de conceptione, gestatione, & partu; obiit an. 1683. ætatis suæ 39. ibid.

F

F*abricius* (Gulielmus) *Hildanus* Chirurgiæ celeberrimus Professor sex centurias observationum digessit, quarum nonnullæ utiliter respiciunt partum, abortum, foetum mortuum, ceterosque præcipuos uteri morbos. 335.

Fabricius (Hieronymus) *ab-aqua-pendente*, Professor Anatomie in Patavino lyceo, invenit an. 1574. valvulas venarum. ibid.

Fernelius (Joannes) Primus Medicus Henrici II. 323.; tria capita ejusdem operis morbos muliebres respiciunt. ib. ipse deceptus est, cum bulla hysterica, quam per anum ventrem natum ægre persentiunt, pro utero habuisset. 324.

Fitz-Gerald. (Gerardus) Professor Monspessulanus obiit an. 1748. postquam inconcinne de Morbis Mulierum scripsit. 357.

Fontanus (Nicolaus) Medicus Amstelodamensis auctor tractatus Mulierum. 336.

Fontanonus (Dyonisius) Professor Monspelliensis locutus est de Morbis Mulierum. 322.

Forestus (Petrus) in Lugduno-Batava universitate primus Professor circa recensitos morbos utiles observationes exhibuit. 330.

Fra

Fravendorffius (Philippus) Medicus Alemannus tractatus edidit de Morbis Mulierum. 351.

Freinl (Joannes) celebris Medicus Anglicus. 351.; ejusdem systhema circa causam menstruationis. ibid.

Fresart (Petrus) Medicus Leodiensis auctor emmenologiae: hujus operis judicium. 352.

Fuchsius (Leonardus) Medicus Bavarus, Ingolstadi Professor, quid scripserit circa Mulierum Morbos. 322.

G

Galleatius de S. Sophia Medicus Patavinus saeculi XV. celebris interpres operum Rhazis. 316.

Galenus doctus Medicus, qua aetate floruit. 301.; ejusdem stylus, character, & operum judicium. 302.; ex Professo de Morbis Mulierum minime egit. ibid.

Garmer (Joannes) Diatriba de uteri pro-cidentia. 349.

Gatinaria (Marcus) Medicus Italus saeculi XV. locutus est de Morbis Mulierum. 315.

Gordonus (Bernardus) Professor Monspessulanus saeculi XIV. 314. Morbos Mulierum pertractavit juxta Arabum sententiam, quam propriis observationibus confirmavit. ibid.

Grulingius (Philippus Georgius) Germanico idiomate de Morbis Mulierum scripsit. 348.

Guainerius (Antonius) Medicus Mediolanensis. 315.; auctor tractatus conceptionis, qui eo collineat, ut optatus partus Ducissae Mediolanensis optularetur. ibid.

Goldhammers (Joannes) Auctor Synopsis Medicæ de Mulierum, & infantum Morbis germanice conscriptæ. 353.

Guntherius (Joannes) Andernacus Medicus saeculi XVI. auctor specialis tractatus de Morbis gravidarum, parturientium, & infantum. 326.

H

Hally Abbatis opera de Morbis Mulierum. 311.

Hellwigs (Christophorus) Auctor brevis pharmacopæe Mulierum germanice scriptæ. 351.

Henricus de Saxonia Auctor saeculi XIII. discipulus Alberti Magni; ejusdem opera vix pervolvi merentur. 314.

Hercules Saxonia Professor Patavinus; ejusdem tractatus de Morbis Mulierum. 332.

Heredia (Petrus Michael de) Medicus Hispanus suum tractatum de Morbis Mulierum ab Arabis excerptit. 345.

Hernius (Joannes) Medicus Batavus Auctor exigui libelli de Morbis Mulierum. 333.

Highmorus (Nathanael) Medicus Oxoniensis, ejusdem opera de hysterico morbo, & hyppocondriaco. 347.

Hippocrates vetustissimus Medicus; quanti pendeant ejusdem opera inquiritur quæ Mulierum Morbos respiciunt. 300.

Hoffmanus (Fridericus) Auctor nuperimus, Hallæ Professor, cum primum universitatem instituisset 355 hujus celeberrimi Medici amplicodici censura ibid. ejusdem stylus Asiaticus, & infirmus ib. nihil specialis habet circa Mulierum Morbos. 356

Horstius (Gregorius) Medicus Ulmen-sis observationes perraras circa Mulierum Morbos exaravit. 334

Hucher (Joannes) Professor Monspessulanus, Auctor tractatus de sterilitate, qui magni pendet. 332.

I

Iason Pratenfis Zelandus magni nominis vir, Medicus saeculi XVI., ejusdem opera de Morbis Mulierum ad sterilitatem arcendam, & conceptionem fovendam pertinent. 321.

L

Langius (Christianus-Joannes) Professor Lypsiensis. 351., ejusdem opera

pera de Morbis Mulierum parvi pendent. *ibid.*

Lazerte (Jacobus) Professor Monspessullanus; brevem vitam duxit; censura ejusdem operis quod medendi rationem complectitur 356 errores nonnulli hujus medici circa Mulierum Morbos. 357 redarguuntur ii qui Lazermi methodo tyrones instruunt. *ibid.*

Leonellus Faventinus Medicus Bononien-
sis sæculi XVI. 321.; ejusdem opera
de Morbis Mulierum. *ibid.*

Liebaud (Joannes) Medicus Facultatis
Parisiensis. 327.; quod edidit opus
circa Mulierum Morbos, ab eo Ma-
rinelli depromptum est. *ibid.*

M

Marinello (Joannes) Auctor tra-
ctatus Italici *delle Malattie delle*
donne. 326.

Massarias (Alexandri) sectiones circa
Mulierum Morbos in Patavino liceo
habitæ. 330.

Mauriceus (Franciscus) Chirurgus Pa-
risiensis & in obstetricia arte peritissi-
mus; in suo tractatu de Mulierum
Morbis utilissimas observationes præ-
bet quæ sunt maximæ praxis fru-
ctus. 350.

Meadius (Richardus) Medicus Anglus
cujus opera valde docent. 356 ejus-
dem remedium ad catamenia revo-
canda. *ibid.*

Meniotus (Antonius) Medicus Regius,
Auctor nonnullarum dissertationum
circa Mulieres. 346.

Mercatus (Ludovicus) Medicus Hispa-
nus. 327.; Auctor aurei libelli circa
illos Morbos. *ibid.*

Mercurialis (Hieronymus) Foroliviensis
subsecutive Professor Patavinus, Bo-
nien- & Pisanus, auctor Eximii
tractatus de Morbis Mulierum. *ibid.*

Meurdrac (Maria) Auctor tractatus Che-
miæ germanice conscripti pro Mu-
lieribus, earumque Morbis. 347.

Montanus (Joannis Baptista) Celebris
Professor Veronensis; specialem tra-
ctatum scripsit de Morbis Mulie-
rum. 324.

Moschionus Medicus Græcus, sæculi VI.
peculiarem de Morbis Mulierum Li-
bellum scripsit. 304.

N

Nenter (Georg-Philippus) Medicus
Argentinus, ejusdem opera de
Morbis Mulierum. 356

Nonus Medicus Græcus X.ævi sub im-
perio Constantini Porphyrogenetæ;
explanavit Mulierum Morbos juxta
sententias Æginetæ, & Aetii. 305.

O

Oehemens (Joannes-Augustus) Au-
ctor tractatus Germanici qui sub
eo titulo extat, *Naturæ Arcanum,*
agram Mulierem pertractando dete-
ctum. 356

Oribasius Imperatoris Juliani amicus.
303.; ejusdem opera in quibus de
Morbis Mulierum locutus est. 304.

P

Pareus (Ambrosius) celebris Chirur-
gus XVI. ævi; in suo Tractatu de
generatione de partu agit, & nonnul-
lis Mulierum Morbis. 326.; ejusdem
opera latine versa a *Guillemeau.* *ibid.*

Paulus Egineta quando inter vivos e-
rat; 304.; editiones, & versiones e-
jusdem operum; *ibid.* ubi locutus sit
de Morbis Mulierum. *ibid.*

Pè (Lazarus) Joannis Marinello opu-
sculum de Morbis Mulierum latine
vertit. 333.

Pfiser (Joannis Nicolaus) Auctor tra-
ctatus quem de Morbis Mulierum ger-
manice conscripsit. 350.

Platearius (Joannes) Medicus Salerni-
tanus sæculi VIV. 314; opus in quo
de Mulierum Morbis diseruit. 315.

Platerus (Felix) Icones delineavit quæ
ad structuram pertinent genitalium
Muliebrium, & earum partium Mor-
bos. 327.

Prævoftus (Joannes) Professor Patavi-
nus de Morbis Mulierum egit. 335.

Primerosus (Jacobus) Medicus XVII.

eyi, Auctor tractatus de Morbis Mulierum. 345.

R

- R** *Anchinus* (Franciscus) Professor, & Cancellarius Facultatis Monspessulanæ; Auctor tractatus de Morbis filiarum. 334.
- Rhazes* Medicus Arabus sæculi XI. parvifaciendus circa ea quæ scripsit de Morbis Mulierum. 311.
- Riverius* (Lazarus) celeberrimus Professor Monspessulanus; ejusdem opera. 336. explicant nitide Mulierum Morbos. 337. fuit Sennerti Assecla. ibid.
- Rodericus a Castro* Medicus Lusitanus religione Judæus Hamburgum profugus opusculum edidit anno 1604. de Muliebribus Morbis. 332.
- Rocheus* (Nicolaus) Auctor specialis tractatus de Morbis Mulierum Avicennæ doctrina & propria experientia suffulti. 322.
- Rondeletius* (Gulielmus) Cancellarius Facultatis Monspelliensis magis naturæ Historia quam medicina instructus. 325.; Auctor tractatus nondum impressi de Morbis Mulierum. ibid.
- Ronsæus* (Balduinus) Medicus Battavus ejusdem opera de Morbis Mulierum. 319.
- Rudolphus* (Joannis Gabriel) dissertationem composuit in qua nonnullas observationes ostendit quæ ad mulieres pertinent mensibus nimis laborantes. 352.
- Rueff* (Jacobus) Chirurgus Tigurinus Auctor latini opusculi circa generationem, conceptum, & partum. 323.

S

- S** *Anden* (Henricus Van) observavit uterum in descensu obversum. 353
- Santorini* (Joannis Dominicus) Venetiis Anatomix professor, quid sentieret de Catameniorum origine. 351.
- Savanarola* (Joannes Michael) Professor Patavinus de gestatione, & partu egit. 316.
- Schenkius* (J. G.) Medicus Allema-

nus, Editor Catalogi tractatum de de Morbis Mulierum. 330.

- Schrotters* (Caspar) brevem Pharmacopeam impressit circa virgines, mulieres, & infantes Germanico idiomate conscriptam. 353.
- Sebizius* (Melchior) professor Argentinus, Auctor observationis circa Molam carneam uteri. 334.; Suspicatur tamen hujusmodi molam Steatoma matricis fuisse. ibid.
- Sennertus* (Daniel) Professor VVitembergensis. 335.; egit de omnibus Mulierum Morbis solidissima, & admiranda methodo. ibid.
- Serapionus* (Joannes) Medicus Arabus XI. ævi. 311.; ipsius opera. ibid.
- Servetus* (Michael) cognovit sanguinis circulationem. 338.
- Sommers* (Joannes-Georgius) Auctor opusculi Germanice exarati sub titulo . . . *Usuel des Femmes, avec l'ecole des accouchement*. 350.
- Soranus* in suo tractatu de Morbis Mulierum loculentissimam exhibuit uteri descriptionem. 302.
- Sorbait* (Paulus de) Austriacus Medicinæ professor, egit de morbis mulierum. 347.
- Spachius* (Israel) professor Argentinus Auctores collegit, qui de recensitis morbis scripserunt. 331.
- Sprye* (Nathanael) Auctor tractatus fluxus menstrui; ejusdem doctrina exponitur. 349.
- Sthallius* (Georg - Ernestus) primus Medicus Regis Borussiae, Auctor plurimum dissertationum de mulierum morbis. ibid.
- Sydenhamius* (Thomas) Medicus Anglus, magni nominis vir. 348.; scripsit de Affectione Hysterica; opus quanti pendeat. 348.

T

- T** *Erenzoni* (Joan-Antonius) professor Pisanus; Auctor libelli de morbis uteri. 353.
- Teillier* (Le) filius; Animadversiones criticæ circa Emmenalogiam Freyndi. 353.

Theo-

Theodorus Priscianus Medicus Latinus VIII. aut IX. sæculi. 305.; Auctor opusculi de Morbis Mulierum cujus plures Editiones existunt. ibid.

Trincavellus (Victor) Venetus professor Patavinus sæculi XVI.; Auctor consultationum medicarum circa morbos Muliebres. 324.

Trotula Obstetrix XIII. ævi. Quæstio est de ejusdem opere. 313.

V

Valescus de Taranta Lusitanus Monspeffulii Medicinam exercuit sæculo XIV.; 315. de iis morbis præcessoribus suis melius egit. ibid.

Varandæus (Joan) professor Monspeffulanus, clare, & loculenter de Mor-

bis Mulierum pertractavit. 333.

Vvier Medicus Ducis Cliviæ Auctor observationum de Morbis genitalium Muliebrum. 325.

Villis (Thomas) Medicus Anglus qui plurimi existimabatur. 346.; ejusdem Apologia adversus Highmorum circa Affectiones Hystericam, & Hypochondriacam. 347.

Volphius (Caspar) Medicus Tigurinus alteram collectionem edidit auctorum qui de iis morbis scripserunt. 328.

Z

Zacutus Lusitanus, ejusdem operum censura. 336.; ipsius observationes quæ Morbos Mulierum respiciunt; caute tamen perlegi debent. ibid.



I N D E X

RERUM LOCUPLETISSIMUS.

A

A *Abcessus uteri*, innotescit per signa indicata. Pag. 192

distinguitur in phlegmonosum, & tuberculosum. *ibid.* Differentiæ. *ib.* & seq. Causæ. 193. Inflammatorii. *ibidem* Tuberculosi (*Vid. tubercul.*) Theoria generalior. 194. Symptoma. 196. Pus diversas sibi pandit vias. *ib.* Diagnos. generalior. 197. specierum. *ibid.* causarum phlegmonosi & tuberculosi. *ibid.* Curatio dum ipse gignitur. 198. jam suppuratione perfecta. *ibid.* quomodo scalpello aperiat pro diverso ejusdem positi: 199. anomalus. 225

Absinthii planta stomachica est, eaque in decoctionibus usu venit. 83. infusum vinosum. *ibid.* quinta-essentia. *ibid.* Syrupus. *ibid.*

Acetosæ radix refrigerans. 104. Syrupi usus. 105

Acetum in uteri supphumigiis utile quomodo adhibeatur. *ibid.*

Acta eruditorum Lypsiens. ostendunt rubram sanguinis partem exigua esse. 74

Adstringentia remedia potissima evadunt adversus Menorrhagiam. 97. quomodo adhibeantur. *ibid.* in uteri hæmorrhagiis extrinsecus applicantur. 99. nonnulla ex vegetabilibus desumuntur: 101. videlicet ex radicibus foliis. *ib.* floribus. *ib.* fructibus. *ibid.* succis. 102. lignis. *ib.* resinis. *ibid.* nonnulla ex animalibus. 102. nonnulla ex mineralibus. *ibid.* vulneraria vasorum elaterium restitunt, impediuntque albos fluores, quos eorum laxitudo producerat. 126. sunt radices. 127. folia. *ibid.* succi. *ibid.* ligna, *ibid.* & resina. *ibid.* simpliciora ex vegetabilium tantum radicibus. 128. foliis. *ibid.* floribus, fructibus, succis. *ibid.* lignis, & corticibus de-

sumuntur. *ibid.* simpliciora nonnulla ex animalibus. 129. alia ex mineralibus sumuntur. *ibid.* intrant præparationes Galenicæ adstringentes. 103. & ceteras officinales, syrupos nempe, & aquas destillatas. 129. crebro adhibita nimis uterum lædunt. 107. externe suspecta sunt in uteri morbis. *ibid.* quibus cautelis tute exhibeantur. *ibid.* commendantur adversus vaginæ descensum. 267

Aeris magnus æstus causa fluxus immobili, aut menorrhagiæ. 89

Affinitas humorum uteri cum iis mammarum, eorum sympathicæ relationis explicatio. 4

Agnus castus in furore uterino commendatur. 164

Agrestæ (syrupi) usus. 105

Alberti (D.) dissertatio de *Bella donna* cancrum adversus. 237

Alcis ungula specifica sua virtute, hysterico vaporibus adversatur. 294

Alchimilla planta vulneraria. 104

Aloes Medicus usus in catameniis suppressis. 46

Alimenta potissimam præstant sanguinis materiam: 74. qua de causa respuant agræ chlorosi affectæ. 76

Altheæ radix remedium præstat dulcificans, ejusdemque usus. 104

Alumen valde adstringens. 102. credunt specificum remedium adversus menorrhagiam. 109

Amputatio uteri, quando institui possit. 190. 263. qualia damna in gangranoso prolapsu afferat. 259

Amuleta veteres magnificiebant. 260

Anasarca (*vid. Oedema.*)

Anastomoses sive communicationes arteriarum, & venarum uteri. 3. appendices suppeditant, quæ intimam uteri tunicam perfodiendo ibi patulæ se ostendunt. *ibid.*

Anatomiam Græci ignorarunt. 298. Arabes neglexerunt. 308. Monspeffulani primum excoluerunt anno 1376. & cada-

cadavera dissecuerunt de licentia Ludovici Andegavorum Ducis, & Occidentis Præsidis. 309. cum scientiarum restauratione floruisse constat, ac proinde magni nominis Anatomici insurrexisse. 319. utilem evadere ad investigandam sedem, & causam plerorumque morborum. *ibid.* magno cum fructu excolebant postquam circulationem sanguinis invenerunt. 340 (circa) notiones necessariae, ut rite instituantur observationes, quæ morborum indolem patefaciunt. *ibid.*

Aneurismatica, uteri vasa Menorrhagiam inducunt. 89

Angelica radix specifica sua virtute chlorosim compescit. 84

Animi affectus interdum fluentes sistunt menses. 28. *deliquium* in menorrhagia quale auxilium postulet. 98

Anodyna in hysterico morbo usitata. 292

Anthracis origo. 299

Anthysterica qualia sint. 292. diluentibus, & humectantibus copulantur, ut calor imminuatur, quem ipsa excitant. 293

Antiphlogistica remedia eorumque virtutes, atque usus in uteri inflammatione. 178

Aperientia mitiora stomachicis debent copulari in chlorosis curatione. 83. idonea sunt in ea Chlorosis specie quæ ab obstructione procedit. 292. martialia eorumque præparationes, & doses. *ib.* mercurialia dulcia. *ib.*

Apium prodest in albo fluore. 126.

Apoplexiam interdum gignit mensium suppressio. 34. æmulatur vapor hystericus. 287. qua ratione ipsam distinguant medici ab hysterico morbo. *ibid.*

Appendices venosæ uteri, ex arteriarum cum venis connubio prodeunt, & interna facie matricis perfosa patulæ ibi fiunt. 3. placentam cum utero necant. *ibid.* & 16. citra gestationem oculos effugiunt. 3. menstruum sanguinem effundunt. *ib.* & 10. vitiata catameniorum suppressionem faciunt. 28. dilatata nimis menorrhagiam inducunt. 88. concisæ, vel ex-

coriatae dulcificantia, atque agglutinantia postulant. 103

Appetitus in chlorosi prostratur. 76. paloris curationem implicat. 80. amissus, aut depravatus, qua de causa in menorrhagiis reperiatur. 91

Aqua castitatis (Senerti) commendatur in furore uterino. 165. camellitarum. 83. clavorum potum aperientem suppeditat in virginum palore. 84. aut essentia Rhabeli in menorrhagiis utilissima. 100. valde adstringit. 103. ejusdem compositio. 109 quomodo exhibeatur. *ibid.*

Aque anihystericae. 290

Aque minerales menses provocant, 24 ferrugineæ quando convenient in mensium suppressione. 37. in palore profunt cum cautelis in earum exhibitione necessariis. 84. elaterium restitunt appendicum venosarum. 106 thermales adversus chlorosim utiles evadunt. 84. tum intrinsecus cum extrinsecus conveniunt in albo laticinoso fluore a vasorum laxitudine procedente. 126. pro injectionibus usveniunt, quæ uteri elaterium restituere valent. 220. roborant matricis fundum in ejusdem descensum labefactatum. 261

Aquarum (de Barege) utilitates generales, & speciales ad solvendo uteri syrrhos. 221

Arabes medicinæ incubuerunt Sæculo IX. 307

Aristolochiæ usus in menstruorum suppressione. 45

Artemisiæ similis usus. *ibid.*

Arteriæ spermaticæ partem supremam uteri aggrediuntur. 2. hypogastriæ medium tenent. *ibid.* hæmorrhoidales per infernam reptant. *ibid.* quomodo distribuuntur intra uteri tunicas. *ibid.*

Asari usus adversus album fluorem. 126.

Asinini fimmi succus expressus contra menorrhagiam valde commendatur. 109. syrappus album fluorem compingit. 134

Astrologia a Medicis Arabis exulta. 298. ab ipsis pluribus tentaminibus investigata. 309. judiciaria post scientia-

tiarum restaurationem parvi existimabatur. 319

Asthma consequens est haud infrequenter suppressæ menstruationis. 34

Aurantia acris & viridia, eorumque preparationes quas *Septalius* patrabat adversus Menorrhagiam. 110. corticem habent adstringentem. 102

Atheroma species est tumoris cystici. 222

B

B *Aglivius plagiarius* fuit, ejusdemque sententiam circa distinctionem albi fluoris, a gonorrhea virulenta erroneam esse ostendimus. 122

Balausta remedium adstringens. 128

Balnea, & *semibalnea* utilia evadunt, adversus uteri densitatem, quæ primam mensium eruptionem retardat. 24. eorum usus in mensium suppressione. 37. ex decoctionibus parantur plantarum emmenagogarum. 43. *calida* nimis Menorrhagiam inducunt. 89. *frigida* maxime in furore uterino commendantur. 163. utilia evadunt in uteri ulceribus. 211. *syrrho* 218. cancro. 234. quales animadversiones postulent in uteri inflammatione. 180

Balsamica remedia adversus ulcera matricis commendantur. 208

Balsamum Canadense remedium adstringens quomodo adhibeatur. 102. de *Coppay* eandem indicationem implet. *ibid.* utrumque appendices venosas constringit. 106.

Belladonna specificè laudant ad subiigendum cancrum. 237. circa id perscrutata a D. Lambergem. 238

Betonica planta adstringens, ejusdemque exhibendi ratio. 101

Bezoardicum orientale laudes quas a nonnullis promeritum est adversus chlorosim. 84

Bilis usus in economia animali, in digestionis præsertim negotio. 74

Bistorta planta adstringens. 101

Boli anthysterici, eorumque compositio & usus. 291

Bolus armena remedium adstringens. 102

Botanica progressus post scientiarum re-

staurationem. 318. incubuerunt recentiores magnopere. 341

Bovile carnis fumo indurata pulvis albos fluores sistit. 134

Buchnerus (D.) theses defendit de mercurialium usu adversus cancrum, huiusmodi sententiam perscrutamur. 236

Bugula planta vulneraria. 104

Bursa-Pastoris planta adstringens. 101 (ex) distillata aqua quomodo usuveniat. 103

Brasilienses mulieres pauciora habent catamenia. 17

Bryonia remedium minus tutum in mensium suppressione. 49

Brunella planta adstringens. 101

Brutorum femellæ mensibus gaudent. 17

C

C *Achexia* in filiabus effectus est remedium emmenagogorum, quæ nimium induxerint mensium profluvium. 21. Quid sit; & qua de causa subsequatur Menorrhagiam. 92

Symptoma est fluoris albi. 119

Camphora suspecta est in albo fluore. 135. ejusdem usus in furore uterino. 164. in vapore hysterico. 295

Cancer uteri consequens est albi fluoris in mensium suppressione obvii. 34 ejusdem descriptio. 230. Differentiæ. 231. Causæ. *ib.* Symptomata. 232. Diagnos. 233. Prognosis teterrima est *ibid.* Curatio palliativa quatuor indicationes postulat. 234. ipsum adversus proposita remedia. 236

Cantharides intus sumptæ in albo fluore, lædunt. 139

Capitis gravedo in Chlorosi, qua de causa habitualis fiat. 77. *morbi* in mensium suppressione obvii sunt. 31. *af-fectio* qua de causa in febre appareat, quæ comitatur uteri inflammationem. 172

Carantia usuveniunt in mensium suppressione. 45

Cardamonum remedium stomachicum. 82

Cardiaglia, sive cordis affectus comitatur uteri inflammationem. 173

Caryophyllata planta vulneraria quomodo exhibeatur. 104

Ca-

Caryophilli remedium stomachicum. 82
Carthesii systema philosophicum illud
 Aristotelis a medicina proscripsit. 339
Cascharilla in uteri ulceribus adhibetur. 207
Cassia lignea remedium stomachicum. 82
Castoreum in mensium suppressione proficuum. 48
Cataplasmata adstringentia in Menorrhagiis usum habent. 99. annodyna in uteri inflammatione. 177. adversus matricis gangrænam. 189
Catechu remedium adstringens. 102. ejusdem tinctura. 103
Cauterium utile in palliativa curatione albi fluoris. 133. tum in uteri ulcere. 206
Cerebrum cedematofum fit in Chlorosi, hujus phænomeni effectus. 78
Celtica lues subigitur usu interno sublimati corrosivi. 236
Chalybs in catameniorum suppressione exhibetur. 47
Chamæmeli usus in mensium suppressione. 45. Aperientia usitatoria in Chlorosi suppeditat. 83
Chemicæ origo apud Arabes, 309. progressus post scientiarum restaurationem veram medicinam deturpabant 319. ad æqua principia redacta recentiorum cura. 341
Chinæ radice Decoctio elaterium restituit appendicum uteri venosarum. 106
Chirurgia infusoria quid sit. 242
Chlorosis ethymologia. 72. 73. Vid. *Palor virginum*.
Chylus liquor lacticinofus ab alimentis digestionis ope depromitur. 74. multiplex ratio, qua perficitur antequam sanguinis indolem sumat. ibid. Observationes Microscopiorum, quæ ipsum globulis conflare ostendunt. 75 imperfectus pravum sanguinem gignit. ibid.
Chymus pulmentum refert ex cibis congestum. 74
Cicatrices, quæ jungunt vaginæ parietes. 53. a præcedentibus exulcerationibus aut scissuris originem habent. ibidem superficiales vaginæ quomodo cultro destruantur. 59. profundiores quomodo emolliantur. ibid. operationes Chirurgicæ quomodo in-

stituantur. ibid. ab his operationibus quando abstinere debeat. ibid., & 60
Cicer in mensium suppressione usuvenit. 47
Cicuta commendatur vel sub cataplasmatibus forma, vel infusa, & intrus exigua dosi sumpta adversus uteri furorem. 165. adversus cancerum specificè proponitur. 239
Clysteria stimulantia in mensium suppressione adhibentur. 43. qualia conveniant in laboriosa menstruatione. 66. utilia evadunt in appetitus depravatione. 81. anthysterica pharmaca, quæ hæc intrant. 289
Cinamomi usus stomachicus. 82
Collica uteri a menstruo tempore obvia. 16. filiabus præsertim, quæ mensibus carent. 22. Quid prænunciet. 23
 Quomodo a mensium suppressione originem agnoscat. 30. Morbus erat, cujus nomen sub Tiberiis Imperio latebat. 299
Colon in Chlorosi flatu tumet. 77
Color faciei, a quo procedat, qua de causa abeat. 73. totius corporis vividus a quo procedat, & causæ quæ cutim deturpant in Chloroticis mulieribus. 76
Conatys ventris validiores in diarrheis Menorrhagiam induunt. 90
Conceptio intra ovaria. 269
Confectio Alchermes remedium stomachicum. 83. *hyacinthina* idem præstat. ibid.
Conformatio vitata uteri, & partium vicinarum menses implicat. 50
Consolida major planta vulneraria. 104
 Syrupum præbet adstringentem. 105
Consumptio effectus albi fluoris in mensium suppressione. 34
Convulsio uteri excitatur a grumis sanguinis in ejusdem cavitate detentis. 92
Convulsivi motus quomodo speciali positionis formula compescantur. 36
Contractio convulsiva uteri repentinam suppressionem facit. 28. in laborioso partu uteri obversionem producit. 268
Coralia inter remedia adstringentia locum habent. 102. eorumdem tinctura, & syrupus. 103
Cordialia jure adhibentur in pulsum

languore, obvium symptoma uteri inflammationis, usuveniunt 178. contra uteri gangranam. 105
Coriandria remedium stomachicum. 83
Cornu Cervi remedium adstringens. 104
Cortex, & capsulae quercus valde adstringunt. 101
Cotoneorum flores. 101. syrappus valde adstringunt. ibid.
Creta Brianconia remedium adstringens. 102
Crocus Orientalis in mensium suppressione valde confert. 47. remedium stomachicum 82. Martis aperientis usus, & dosis Martis adstringens. 83
Cruditates primatum viarum confirmant Menorrhagias. 164
Cucumis sylvestris remedium suspectum in mensium suppressione. 49
Cucurbitulae coxis appensae in menstruum retentione inutiles evadunt. 43 pariter frustraneae in uteri haemorrhagiis. 111. scarificatae quandoque in uteri inflammatione, venae sectionibus substituuntur. 176
Culcitae lanae repletæ nocent in sanguine uteri fluxu, straminibus potius, aut crinibus repleri debent. 96

D

D*Eclamatio* elata voce increpata, uteri haemorrhagiam inducit. 90
Decoctiones refrigerantes in mensium suppressione quando convenient. 37. aperientes qua methodo parentur. 42 quomodo adhibeantur in difficili menstruatione. 66. *refrigerantes* emulsionibus remixtae exhibentur in uteri haemorrhagia. 98
Decoctum refrigerans in uteri inflammatione locum habet. ib.
Dejectiones supprimuntur, aut dolorem inducunt modo uterus inflammatione laboret. 172
Delirium symptoma inflammationis matricis. ibid.
Descensus uteri, huiusque morbi descriptio. 256. vel incompletus est: ibid. vel completus. ibid. causæ huius mor-

bi. ibid. ejusdem symptomata. 258
Diagnosis. 259. *Prognosis* incompleti descensus. ibid. completi. ibid. quando amputari debeat. 259. *vid. amputatio* detrimenta completi descensus uteri, qui restitui nequeat. ib. *Curatio* completi descensus. 260 injectiones adstringentes in descensu incipienti. ibid. methodus restituendi uterum in descensu incompleto. 261. quid faveat restitutioni completi descensus. 262. medendi ratio modo restitutio non obtineatur. 263. amputationis methodus in præcipiti casu. ibid. *Descensus vaginae*, *vid. vagina*. ibid.
Desidia in filiabus obvia chlorosi laborantibus. 78
Deobstruentia quæ conveniunt in obstructionibus uteri. 130
Diaeta in uteri inflammatione strictissima esse debet. ib.
Diapedesis, seu cruoris trans porros vasorum uteri diaphoresis minime locum habet in menstruo fluxu. 11
Diaphoretica remedia quando adhibeantur in uteri inflammatione. 178
Diaphragma dum sympathiae lege contrahitur, hyppocondriorum intumescencia gignitur. 77
Digestio depravata qualia remedia poscat. 25. alimenta in chylum convertit. 74. cum optima fiat bonæ crasis sanguinem gignit. 75. difficillime, & imperfecte in chlorosi perficitur. 76 incompleta obvium est albi fluoris symptoma. 77
Diluentia, & refrigerantia in ulcere matricis usuveniunt. 206. qualia validiora sint ad lympham cruoremque abluendum. ibid. in hysterico morbo usitatiora. 293
Diminutio mensium triplici ratione oriri potest. 27. 28. vel quia catamenia minus uberrima sint. 28. vel minus perdurent. ibidem vel serius revertantur. 29
Dissimulatio ex parte ægotantium circa causas circumstantiarum uteri ante primam mensium eruptionem inutilis evadit. 22
Dissolutio sanguinis, pthifanam postulat

lat a nobis descriptam quę valde prodest. 98

Diuretica quotidie , vel crebro hauriri debent in menstruorum cessatione. 46. qualia convenient in uteri inflammatione. 178. in hydrope matricis. 245. series eorum medicamentorum, & exhibendi ratio. 246

Dolores capitis qua de causa ægras infestent prope menses. 16. uteri valde nocui sunt post mensium suppressionem. 34

Dysuria seu *urinę ardor* qua de causa producatur in uteri inflammatione. 172

E

E*Bur* combustum adstringit. 122. raspatum sæpissime adhibetur. 104
Efluvium lymphaticum præcedit, & subsequitur menstruationem. 6

Elixir proprietatis simplex, remedium est stomachicum. 83. destillatum, seu *Garrus*. ibid.

Embrocatio in uteri inflammatione proficua. 177

Emetica in suppressione mensium exhibentur. 43. quando convenient in Menorrhagiis. 108. qualia usitatoria sint, & qua dosi propinentur. 109

Emmenagoga remedia menstruum fluxum provocant, sunt vel aperientia vel solventia. 24. in eorum administratione necessariae cautelę. 25. quando convenient. 38. eorum diversę species, & doses vulgatiores. 39., & seq. eorum abusus qualia detrimenta afferat. 21. 90. suspecta sunt in mensium suppressione. 147

Emplastra adstringentia inefficacia in uteri hæmorrhagia. 99. anthysterica umbilico apponuntur. 290

Epidermis subtilissima & diaphana est vividumque idcirco cutis colorem ostendit. 73

Epilepsia hysterica quomodo distinguitur a morbo herculeo. 287

Equisetum planta adstringens. 101. usus aquę distillatę ex eadem planta. 103

Erpes oris sive *Mentagra* quando invexerat. 299

Escharotica in uteri gangræna utilia evadunt 189. ab iis tamen interdum desistitur ibid. fovent casum escharę uteri gangrenę. ibid.

Ethiops martiale remedium aperiens ejusque dosis. 83

Excrescentiæ vaginę 53. neque escharoticis consummi, neque cultro abradiderent, sed forbice secari. 58. ib. in iis operationibus cautelę necessaria. 59

Exercitia corporis varia in mensium suppressione idonea. 44. augent in chloroticis respirandi difficultatem. 77. augentque capitis gravedines in illo morbo obvias. 78. violentiora hæmorrhagiam uteri inducunt. 89

Exsiccantia in uteri ulceribus usum habent. 209

F

F*Ebris lenta* effectus albi fluoris in mensium suppressione occurrentis.

34., 39. *amatoria* interdum appellatur chlorosis. 72. *alba* interdum. ib. vespere revertens in chlorosi valde nocua. 84. remittens nimios menses inducit. 89. *Lypria* symptoma plerumque grandioris viscerum inflammationis. 173. lenta evadit in uteri abscessu. 196. character in ulcus matricis occurrentis. 202. *milliaria* origo, & progressus. 343. *purpurea*, seu petechialis minime novus morbus putatur. 320

Ferrum usu venit in mensium suppressione, usitatoria præstat aperientia in albo fluore idonea. 83

Fillipendula planta adstringens. 101. ejusdem pulvis in albo fluore commendatur. 135

Fimi asinini succus expressus laudatur ad injectiones conficiendas contra uteri hæmorrhagias. 100

Fluores albi in filiabus occurrunt menstruis orbatis. 21. conditio earum quę iis sunt obnoxia. ibid. mensium suppressione inducunt. 28. vel a suppressis mensibus procedunt. 29. qualia scœnomena tunc superveniant. 34. fluores albi in difficili, aut laborio-

sa menstruatione facile occurrunt .
 63. quare menses nimios faciant . 87
Flores albi describuntur . 113. eorum-
 dem differentia a laticis natura de-
 sumptæ . 114. a colore . ibid. a qua-
 litate . ibid. ipsi vel *latei* apparent ,
 vel *lymphatici* . ibid. causæ fluoris
 albi laticinosi explanantur . ib. cau-
 sæ lymphatici 116. omnium differen-
 tiarum hujus morbi descriptio . 177
 ipsi vel suppressionem comitem ha-
 bent vel non . ibid. vel continentes
 sunt , vel intermittentes . ibid. in-
 continenti albi fluoris fluxu mate-
 ries , vel una est vel variabilis quan-
 titatis respectu . ibidem augmentum
 hujus morbi vel periodum servat vel
 nullam . ibid. regressus albi fluoris in-
 termittentis , vel periodicus est vel
 non . ibid. flores albi diversos co-
 lores præferunt . 118. modo acri-
 moniosi sunt , modo graveolentes . ib.
 eorum symptomata describuntur . ib.
 albi fluoris acris in solida effectus enu-
 merantur . 119. albi fluoris Diagnofis
 generalior . 120. quomodo distinguan-
 tur a purulento uteri fluxu . ibid. a
 gonorrhæico effluvio . ibid. error il-
 lorum qui albos flores gonorrhææ
 methodo pertractant . 122. Diagnofis
 specierum . ibid. Diagnofis causa-
 rum . 123. morbi prognofis . 124. fluo-
 res albi lactei lymphaticis qua de
 causa mitiores . ibid. quando incur-
 biles utrique fiant . 125. curatio albi
 fluoris ab ubertate lactis uterini pro-
 cedentis . ibid. curatio diætetica . ibi-
 dem incedendi ratio venæ sectionum
 ope , clysterium , catharsis diuretico-
 rum , diaforeticorum solventium , aut
 aperientium auxilio . 126. curatio al-
 bi fluoris laticinosi qui a maxima
 procedit fluiditate lactis uterini in-
 crassantibus instituta . ibid. de lactis ,
 pthifanarum incrassantium , narcocti-
 corum , & absorbentium usu verba
 fiunt . ibid. indicationes curativæ al-
 bi fluoris quem gignit vasorum ato-
 nia . ibid. usus balneorum , injectio-
 num , & potus aquarum thermalium .
 ibid. adstringentia vulneraria in hoc
 statu conveniunt . ibid. flores lym-

phatici, eorum curatio . 129. triplicis
 causæ respectu . 130. vel quando ab
 uteri prolapsu procedunt . ibid. vel ab
 obstructione , aut tuberculis uteri . ib.
 remedia idonea in hoc postremo ca-
 su . 130 flores albi lymphatici a
 scissuris matricis procedentes reme-
 dia postulant agglutinantia nutrientia
 farinacea , & incrassantia . 131. cu-
 ratio palliativa hujus speciei , regi-
 minis ope quod morbi violentiam
 compescit & effectus retardat . 132
 læviori catharsi . 133. vel diluenti-
 bus , humectantibus , & dulcificantibus
 remediis . ib. cautelæ necessariæ in albi
 fluoris curatione . ib. remedia speci-
 fica adversus hunc morbum commen-
 data quibus uti potest citra detrimenti
 metum . 134. remedia proposita nocua
 tamen vel suspecta . 136

Fluores albi subsequuntur uteri syr-
 rhum . 215. vapores hystericos exci-
 tant , quibus medetur remediis indi-
 catis . 292

Fluxus menstruus . 5. ejusdem periodicus
 regressus , & perduratio . ibid. tria
 stadia menstrui fluxus . ibid. copia e-
 jusdem . 6. indoles menstruati san-
 guinis . ibid. signa quæ mensium eru-
 ptionem prænunciant . ibid. gestatio-
 nis tempore plerumque deest . ibid.
 quamdiu hujusmodi fluxus perduret .
 ibid. ex quo loco stillet sanguis .
 ibid. rationes , quæ confirmant ipsum
 ab uteri cavitate procedere . 7. inter-
 dum ex vaginæ parietibus erumpit .
 ibid. in quibus circumstantiis id po-
 stremum eveniat . ibid. quandoque hu-
 jusmodi sanguinis effusio per totum
 gestationis tempus persistit . ib. men-
 struus sanguis ab arteriis procedit aut
 venis . 8. ipse ab universali vaso-
 rum , aut locali uteri plethora de-
 pendet . 9. rationes , quæ localem va-
 sorum matricis repletionem defen-
 dunt . ibid. quomodo menstrua eve-
 niant ratione plenitudinis vasorum
 lacteorum matricis . 11. menstruus flu-
 xus quomodo periodice desinat . ib.
 causæ prioris eruptionis . 12. causæ
 periodici regressus qui mense brevior
 sit . ibid. copia ejusdem fluxus ab

Hippocrate, & a nobis dimetita. 13
 quare defistat ingravescente etate. 14.
 idem fluxus partum fovet. 17
 generationi juvat. ibid. quo in casu
 pedum venæ sectio ipsum evocet. 25
 quando hæc noceat ib. *vid. Menses.*
Fomenta emollientia in mensium sup-
 pressionem adhibentur. 38. dulcifican-
 tia in uteri inflammatione locum ha-
 bent. 117
Forestus arcanum remedium adversus u-
 teri hæmorrhagias prædicabat. 110
Fragrariæ radix refrigerans Menorrh-
 giam sistit. 101. 104
Frictiones circa coxas caldis linteis in-
 stitutæ utiles evadunt in repentina
 mensium suppressione. 35. inutiles
 experiuntur in sanguinis jactura. 96
Mercuriales quando convenient in u-
 teri ulceribus. 210. quamdiu produ-
 ci debeant. ibid. regimen in hoc sta-
 tu necessarium. ib. juvant in quibus-
 dam uteri cancris, modo caute ad-
 hibeantur. 235. in cancro profunt a
 lue celtica nato. 236. earum usus ad-
 versus ejusdem partis syrrhos. 221
Frigus repentinum qua ratione menses
 interceptat. 28. modo repente agat,
 uteri hæmorrhagias inducit. 89
Fungus uteri idem producit. ibid.
Furor uterinus describitur. 148. nobiles
 filias infestat ib. hujus morbi causæ.
 150. Differentiæ. 154. Symptomata.
 ibid. Diagnos. 156. Prognosis. 157
 Curatio primi gradus. 158. remedia
 generaliora. ibid. venæ sectiones de-
 cocta, & apozemata refrigerantia.
 159. serum lactis, lac asininum, &
 emulsiones. ibid. Curatio aquarum
 mineralium ope. 160. vel regimine
 humectante, temperante, diluente, re-
 frigerante. ibid. verum balneis, aut
 semilbaneis. 161. aut clysteribus, &
 injectionibus refrigerantibus. ibid. u-
 sus pessariorum in hujus morbi cu-
 ratione. ibid. quando hirudines con-
 veniant. ibid. adversus uterinum fu-
 rorem turpe auxilium. 162. hujus
 morbi curatio in secundo stadio. ib.
 in tertio stadio quando ægræ mania-
 cæ fiunt. 163. remedia in hoc mor-
 bo commendata. ibid. aqua quæ spon-
 s

Astruch de Morbis Mulierum.

te stillat ex tenellis falicis ramis ma-
 gnopere laudatur. 164. decoctio tamen
 liorum ejusdem plantæ incassum pro-
 pinatur, ib. titilamenta quibus cre-
 dunt exuberantis humoris effluvium
 provocare, qui furorem uterinum
 inducerat potius intendit, quam
 compescat morbum. 166

G

G *Alenus* putabat chlorosim tantum
 symptoma esse menstrui suppressi
 aut imminuti. 2

Gangræna consequens teterrimum in-
 flammationis matricis quando adho-
 riatur. 175. uteri gangræna describi-
 tur. 181. distinguitur in humidam,
 & siccam. ibid. quando occurrat.
 182. inflammationem subsequitur.
 ibid. aut grandiore descensum vel
 ulcus phagedenicum matricis. ibid.
 ipsa vel universalis est, vel partialis.
 ib. gangrænæ theoria generalior pan-
 ditur. ibid. ejusdem theoria peculia-
 ris. 183. differentiarum explicatio.
 ibid. ipsa vel incipiens est, vel con-
 firmata. ibid. omnem uteri ambitum
 infestat, vel partem aliquam. ibid.
 sicca est vel humida. 184. symptomata
 hujus morbi, & caloris imminutio. ib.
 sensus abolitio. ib. hujus partis tensio.
 ibid. ejusdem aucta molities. ibid.
 livor. ib. pulsum parvitas, frequen-
 tia, & durities. 185. Lypothimiæ,
 & rigores spasmodici. ibid. hujus po-
 stremi phenomeni explicatio. ib. ef-
 fectus est acrioris serositatis, & cor-
 rodentis, quæ sanguinem inquinat.
 ib. morbi diagnos. 186. signa illius
 gangrænæ quæ inflammationem uteri
 subsequitur. ib. quæ ulcus. ib. quæ uteri
 descensus. ib. diagnos. vaginæ, aut
 vulvæ gangræna affectæ. ibid. signa
 diagnostica differentiarum hujusmodi
 speciei. ibid. Diagnos. causarum.
 187. Prognosis generalior gangrænæ.
 ibid. periculum in hoc morbo ma-
 ximum. ibid. periculum gangrænæ
 vaginæ. ib. gangræna uteri prolapsi
 nullam spem valetudinis relinquit.
 ibid. curatio uteri gangrænæ. ibid.

Aa 3

prior

prior indicatio postulat vim compe-
scere causarum morbi. 188. quod ob-
tinetur vulnerariis, & spirituosus re-
mediis in confirmata uteri gangrana.
ibid. cataplasmatibus magis idoneis.
189. & escharoticis. ibid. quando
Quinquina in hoc morbo locum ha-
beat. 190
Geranium sanguineum planta est vulnera-
ria. 104
Gestationem qualia signa prænunciant,
quæ perscrutari oportet ne mensium
suppressionem quam comitem habet
cum suppressione præternaturali con-
fundamus. 32. ipsam suspicamur in
omni mensium retentione. 56
Gestatio tubarum. 273. 274. causæ hujus
morbi. 274. plerumque lethalis est.
275. operationem cæsarianam postu-
lat. 276
Glandes earumque calices valde adstrin-
gunt. 102
Glandulæ & glandulosæ partes syrrhis
magis sunt obnoxie. 212
Globulus martis aperiens quomodo ex-
hibeatur. 84
Glutinantia vulneraria in appendicum
venosarum laceratione conveniunt.
103. qualia ex vegetabilibus desuman-
tur 104. qualia ex animalibus. 105
Gmelin (D) medicinæ professor; ejus-
dem cancerum curandi methodus exa-
minatur. 213
Gnaphalium montanum planta adstrin-
gens. 104
Gonorea quomodo distinguatur ab albo
fluore. 120
Granata inter remedia adstringentia. 102
Granatorum cortex exsiccatus valde ad-
stringit. 101. eorundem syrappus. 102
Groelandiæ mulieres paucioribus donan-
tur catameniiis. 17
Gummi Tragacantha, vel *Arabicum*, e-
dulcorantia remedia præstant. 104.
quomodo usuveniant in uteri hæmor-
rhagia. 110. uteri obstructions pa-
riter solvunt. 131
Gummi aperiencia in uteri syrrhis ad-
hibentur. 219
Gustus depravatio chloroticas infestat. 78
Guttæ (Ducis La mot) quid sint atque
præstent. 190

Helleborus niger remedium adversus
suppressionem minus tutum. 49
Hæmorrhagia periodica in mensium sup-
pressionem. 31. uteri valde infensa. 86.
in uteri ulcere superveniens quomodo
stringentibus internis aut injectioni-
bus compescatur. 211. maxima eva-
dit in uteri syrrho. 215. ratio me-
dendi eam quæ uteri syrrhum conse-
quitur. 235
Hæmorrhoides internæ & externæ menses
prænunciant. 6. ipsas interdum gignit
uteri plenitudo. 15
Hæmorrhæ observatio anatomica circa
hujusmodi fluxum. 11
Hippocrates ex professo de chlorosi mi-
nime locutus est. 72
Hircinus sanguis induratus in suppres-
sione usuvenit. 46
Hirudines in furore uterino adhiben-
tur. 161
Humor uteri lactiginosus ab illo mam-
marum haud absimilis. 4
Hydatides ovariorum. 269. tubarum. 273
Hydrops albi fluoris in suppressione oc-
currentis consequens est. 34. uteri de-
scribitur. 240. causæ hydropis asciti-
cæ matricis. ibid. causæ hydropis
hydatidicæ. 242. hujusmodi hydro-
pis symptomata. 244. Diagnofis.
ibidem Prognofis. 245. Curatio.
ibid. methodus aquas excernendi per
uteri orificium. 248. tum uteri cum
imi ventri hydrops consequi possunt
syrrhum uteri. 215. ovariorum. 269
tubarum. 273. morbus est pertinax
quomodo definat. 275. quando pa-
recentesis conveniat. 276
Hymenis existentiam quales auctores de-
fendant. 51. quales contendunt. ib.
hujus membranæ anatomica descri-
ptio. 52. ejusdem structuræ varie-
tates. ibid.
Hyppocondria qua de causa in chloro-
si tendantur. 77

I

Imporforatio vaginae quomodo chirurgiae auxilio, & quando scindatur. 58. cautela necessaria in membranis profundioribus incidendis. ibid. observationes necessariae in iis operationibus peragendis. 60

Indigestiones quibus filiae sunt obnoxiae ante primam mensium eruptionem. 19

Infarctus diversarum partium ante primam eruptionem. 19

Inflammatiō uteri mensium suppressionem inducit. 27

Inflammatiō uteri Ved. matricis inflammationis; causae generales omnium inflammationum tria stadia respiciunt. 168 in primo stadio *phlogosis* appellatur. ibid. in postremo inflammatiō *syctrophica* dicitur. ibid. in medio casu inflammatiō tantum nuncupatur. ib. ovariorum inflammatiō. 269. tubarum. 273. hujus postremae aegritudinis diagnosi. 275

Injectiones uteri in mensium suppressione. 38. adstringentes. 99. in hujus partis inflammatione quales. 176. peritia necessaria ne damnum inferant. 177

Vesicae in uteri inflammatione proponuntur. 180. efficaciores in uteri gangraena. 188. in uteri ulcere. 208. injectionum formulae. ibid. injectiones deterisivae. ibid. dulcificantes. 221

226. in cancerosa matrice conveniunt. 235. in vagina ad laxandum uteri orificium hydrope affectum. 250 ad uterum roborandum. 249. adstringentes ad firmandum vaginae fundum in uteri descensu incipienti. 260. infirmiores tamen evadunt spongia applicata. 261

Inoculatio variolarum synopsis historica originis, & progressus hujusmodi praxis. 343. circa ejusdem utilitates ambagines exponuntur. 344

Jonstonus remedium quod proposuit adversus uteri inflammationem quando profit. 181

Pecacuanha verum remedium antidesentericum, ejusdem inventi historia. 341

Iteritia quare cutis superficies in hoc morbo foedetur. 73

Juniperi baccæ stomachicum præstant remedium. 80. ex iis compositus extractus, ejusdemque usus. 83

K

K *Arabe* seu ambra lutea remedium est adstringens ex quo trochisci præparantur. 102. 103

L

L *Abestatatio virium* in albo fluore ægras adoritur. 119

Lac æmulatur humor specialis indolis quem peculiaria uteri vasa fecerunt: 4. quid præstet. ibid. quomodo hujusmodi latex sensum in mammis, & utero a conceptione gignatur. 5. *brutorum* hæmorrhagias impedit. 106. in albo fluore usuvenit. 116. succo nasturci copulatum in eodem morbo prodest. 135. caprinum, & asininum in uteri ulcere adhibetur. 206. 207. *asininum* præfertim sanguinis acrimoniam otundit. 218. in uteri cancro propinatur. 235

Lactuca planta dulcificans. 104. ejusdem semina emulsionem intrant. ibid.

Ladanum remedium vulnerarium. ib.

Lapis Hematites remedium adstringens. 102

Lavendula in mensium suppressione præscribitur. 45

Laxitudo quare chloroticas mulieres vexet. 72

Lectio elata voce instituta menorrhagias producit. 89

Lentico (lignum de) remedium adstringens. 102. & vulnerarium. 104

Lepræ origo. Illam Arabes europeis communicarunt dum Galli eas regiones religionis causa sæculo XI. & XII. armis aggressi sunt. 310. abiit tandem 500. post annos. ibid.

Lethargia effectus est mensium suppressionis. 34

Leucophlegmatia effectus est albi floris in suppressionis aggressu occurrentis. ibid. chlorosis symptoma: 78

Leuwenhoeckius plures microscopiorum

- ope circa sanguinis globulos observationes instituit. 74
- Ligamenta lata & terretia uteri.* 2
- Limatura chalybis modice aperit, ejusdem usus, atque dosis.* 83
- Limoni* syrupus quid præstet, & quomodo adhibeatur. 105
- Linguae* ariditas in inflammatione uteri observatur. 172. a quo procedat linguae sabura qua obtegatur. ibid.
- Litrii* (D.) opinio circa catameniorum scaturigines. 7. ejusdem circa id observationes. 7. 8
- Lochia* qualia vasa suppeditent. 7
suppressa inflammationem uteri gignunt. 168
- Lumbrici terrestres* in mensium suppressione exhibentur. 49
- Lunæ Phases* nihil influunt in catameniorum regressum. 12
- Lympha* mammaria, & uterina similes sunt. 4. *Lactea* secernitur ab uteri glandulis pubertatis tempore: 41. hujusmodi secretio periodicam evacuationem gignit. ibid. modo deficiat defunt menses. 27. ejusdem in utero inopiæ causa. ibid. ea sanguinis distinguitur in gelatinosam crassionem, in lympham spissiore, ea in gelatinosam subtiliorem, aut lympham tenuiorem. 74. proprietates quæ indicant duplicem hanc lymphæ speciem. ibid. qua de causa inspissetur in uteri tuberculis. 194

M

- M** *Acies* effectus est hæmorrhagiæ. 91
- Macis* remedium stomachicum. 82
- Malacia* seu gustus depravatio ante primam menstruationem supervenit. 19
a mensium suppressione producitur. 30. aut eorum retentione. 55. appetitum delit. 72. hujus phænomeni explicatio. 76
- Mammarum inflatio*, atque tensio prope menses in juvenibus mulieribus præsertim apparent. 16. vel in mensium suppressione. 30
- Martialia remedia* syrrios uteri solvunt

- post diluentes & emollientes adhibitos. 219
- Marubium album* in mensium suppressione locum habent. 47
- Matrix* remedium stomachicum. 83. adstringens. 102
- Matrimonii usus* pene certissimum est remedium filiabus catameniiis deficientibus. 26. exercitium vaginæ vitia impedit. 54. menstruum fluxum tute revocat. 70
- Matricis* descriptio generalior. 1. positus intra rectum, & vesicam. ibid. ejusdem figura diversa in filiabus, & mulieribus. ibid. partes & ligamenta. 2. orificium. ibid. vasa arteriosa, venosa, & lymphatica, nervi, tunica triplex. ibid. ejus crassitudo a tunica carnea præsertim procedit. ib. vasa lactea & vermicularia uteri. 3. morbos quos vasorum eorum intumescencia inducit. 15. nimix uteri substantiæ densitati quæ primam eruptionem retardat, quomodo medeatur. 23. repentina uteri convulsiva contractio statim menses intercipit: 28 quibus morbis in mensium suppressione uterus sit obnoxius: 34. matricis status diversos phenomenorum varietates in suppressione ostendunt. 77 ejusdem exulceratio menses nimios facit. 87. ulcera & scissuræ, quæ in laborioso partu eveniunt menorrhagiam inducunt. 89. doloris in utero positus sedem ostendit morbi. 91. matrix fistalticis contractionibus sit obnoxia in transitu grummosi sanguinis. 92. dolet in albo fluore. 119
- matricis inflammatio.* 167. diversæ inflammationis gradus. ibid. signa, quæ illam prænunciant. ibid. ea vel universalis est vel partialis. 168. causæ generaliores inflammationis matricis. ib. causæ peculiare primæ classis. 169. secundæ classis. ibid. tertiæ classis. 170. explicatio differentiarum hujusmodi inflammationis. ibid. morbi symptomata. 171. sympatiæ relaxationes uteri cum ceteris partibus. 172. hujus inflammationis diagnosi. 173 signa specialia, quæ singulas species inflammationis designant, ibid. quomodo

modo a positu atque dolore amplitudo, & sedes inflammationis cognoscantur. ib. morbi prognosis. 174. quatuor definentiæ inflammationis. 175 per resolutionem. ibid. gangrænam. ibid. suppurationem. ibid. & indurationem. ibid. inflammationis uterici curatio juxta tres præcipuas indicationes. 176. venæ sectio priorem potissimamque implet. ibid. falsæ sunt contra-indicationes hujus auxilii. ib. cautele generaliores in uteri inflammationis curatione necessariæ. 177 quietis respectu, & positus ægræ. ibid. regiminis respectu. 178. diureticorum, aut cordialium usus. ibid. praxis hærronea, aut suspecta in uteri inflammatione a nonnullis proposita. 179. matricis gangræna. 181 *vid. gangræna*: uteri descensus hujus visceris gangrænam inducit. 182. usus venæ sectionum in gangrænosâ dispositione. 188. topica spirituosâ & irritantia in uteri gangræna. ib. quando conveniat gangræne abrasio. 190. *vid. amputatio*: uteri ulcus. 199. *vid. ulcus*: syrrhus matricis. 212. *vid. syrrhus*: cancer matricis. 230. *vid. cancer* uterus tumens crassitudinis parietum ergo partum plerumque consequitur. 255. descensus matricis. 256 *vid. descensus*: hydrops uteri. 240 *vid. hydrops*: quando fas sit conatibus operationem uteri hydropici promovere. 248. uterus in tympanitide a sole haud absimilis est. 254. *vid. tympanitis*: amputatio corporis uteri. 259 *vid. amputatio*: descipiuntur ii qui negant uteri descensum. 263. signa pathognomonica hujus morbi. ib. amputatio interdum citra noxam patrata fuit. ibid. uteri obversio morbus est a descensu valde absimilis. 268 quando hujusmodi ægritudo occurrat. ibid. placenta violenter abrafa uterum obvertit. ibid.

Medicinæ historia in quatuor Epochas distinguitur. 297. *prima Epochâ* abortis origine ad annum circiter 800 a C. N. ibid. pathologiæ conditio in hac Epochâ. ibid. pharmacia valde exulta fuit. 298. anatomia negle-

cta: ibid. *secunda Epochâ* medicinæ conditio post Imperii Occidentis destructionem. 307. decretum Ducis Monspessulani anni 1196. qui permittit indiscriminatim omnibus nationibus in ea Civitate medicinam docere. 308. origo facultatis Monspessulane. 309. *tertia Epochâ* medicinæ conditio post scientiarum restaurationem captumque Byfantium. 318 *quarta Epochâ* medicinæ conditio post inventam sanguinis circulationem. 338. & seq. hujusmodi artem perperam inconstantiam accusarunt. 359. ejusdem fundamenta præcipua eadem constanter fuerunt. ibid.

Meliceris species tumoris est cystici. 222
Meliloti florum decoctio in albo fluore usu venit. 135

Melissæ aqua destillata præstantissimum est stomachicum remedium. 83

Membrana, quæ vaginam intercludit menses intercipit. 56

Menses quare perdurationis respectu variant. 12. tria stadia præferunt, augmentum, statum, & decrementum. 13. quando alternatim plus, minusve uberrimi appareant: ibid. brutorum femellæ catameniis donantur suis indigentis accomodatis. 17 ubertas mensium obvia minime a primitiva naturæ institutione fortasse dependet. ibid. descriptio filiarum primæ mensium eruptioni obnoxiarum. 18. causæ, & symptomata mensium nimiorum, & crebrorum in juvenibus filiabus. 20. quando stomachi elaterium tantum restituere conveniat, dum mensium restitutio desideratur: 25. remedia usitatiora, quæ primam eruptionem promovent: 26 *difficiles*, & *laboriosi* menses qualia phenomena inducant. 61. causæ difficilis menstruationis. ibid. sunt vitium sanguinis. 62. vitium appendicum venosarum. ibid. vel utraque causa una agens. ibid. differentiæ indicantur. ibid. menses difficiles filias magis quam mulieres infestat. 63. signa diversarum causarum mensium laboriosorum. 64. eorum prognosis. ibid. quomodo iis medeatur.

65. cau-

65. cautellæ necessariæ . ibid. *mensēs alio devoluti* describuntur . 66. devolutionis causæ explicantur . 67. mensēs devoluti irregulares sunt , & nisi vasorum ruptura eveniunt . 68. eorum symptomata . ib. Diagnōsis . 69. Prognōsis . ibid. difficillime pertractantur ratione habita mensium suppressioni per loca conferentia . 70. damna quæ afferunt partibus , quæ sanguinis transitum morbose sinunt . ibidem Curatio mensium devolutorum . ibidem prior indicatio postulat restitutionem naturalis fluxus . ibid. altera est imminuere eorum effusionem , quomodo id obtineatur . ibid. tertia indicatio ad acrimoniam sanguinis corrigendam attinet . 71. postrema indicatio respicit imminutionem mensium nimiorum alio devolutorum . ibid. *vid. fluxus menstruus , & menstruatō* : mensēs retinentur vitio conformationis . 50. *vide imminutio mensium* : mensēs suppressi , vide *suppressio* : mensium vitia chlorosim potissimum inducunt . 72. *mensēs nimii* quid sint . 86. differentia hujus status ab uteri menorrhagia : ibid. mensēs nimii evadunt vel crebrium regressum ergo , vel fluxus diutini , vel fluxus copię ratione . ibidem vel dum eæ circumstantiæ invicem copulantur . ib. quando morbum referant difficillime determinatur . ib. eorum causæ generales . 87. causæ eorum qui crebre revertunt . ib. eorum qui diu perdurant , atque eorum , qui nimis uberrimi effluunt . ibid. explicatio differentiarum inter mensēs immodicos , & sanguinis jacturam . 90. prognōsis mensium nimiorum : 95. illorum curatio . ibid. *mensēs tandem cessant* , & phenomena nonnulla inducunt . 139. qua de causa abeant . 140. symptomata diversa quæ mensium cessationem subsequuntur . ibid. hujus morbis Diagnōsis . 143. quomodo distinguatur mensium cessatio a morbofa suppressione . ib. quomodo a suppressione gravidarum . 144. Diagnōsis differentiarum conditionis uteri , ejusdemque vasorum in menstru-

rum cessatione . ibid. Prognōsis . 145 eo collineat ut phenomena cuique speciei suppressionis propria rite distinguamus . ibid. Curatio in mensium cessatione . 146. cautellæ necessariæ in hujusmodi morbi pertractatione . 147. mensēs in quibus circumstantiis persistant , aut desistant utero syrrho affecto . 215. in tympanitide supprimuntur . 251
Menorrhagia sive uteri hæmorrhagia futurum abortum prænunciat . 7. menorrhagia quid sit . 86. effectus est aborti . ibid. modo abundans sit , hæmorrhagia uteri vocatur . ibid. si modica , uteri *stillicidium* , aut *ploratus* . ibid. hujus morbi causæ . 88. quomodo distinguatur hæmorrhagia a nimio mensium profluvio . 90. hæmorrhagiæ symptomata . 91. Diagnōsis generalior , quæ naturam morbi respicit . 93. quæ species . ibid. quæ causæ . ibid. atque diversum positum . 94. Prognōsis . 95. in vetustiori affectione magis teterrima . ibid. anibus magis infesta . ibid. indicationes curativæ quæ ad varios casus attinent . ib. Curatio efficacior uberioris sanguinis jacturæ . 96. hæc postulat remedia adstringentia . 97. quomodo exhibeantur . ibid. narcotica usuveniunt . 98. quomodo agant in iis circumstantiis . ibid. vitæ regimen in hoc morbo magis idoneum . ibid. potus quotidianus . ibid. ptisana quæ magis convenit , in solutione , aut rarefcentia sanguinis . 98. 100. modica sanguinis jactura , aut uteri *stillicidium* 100. ex se morbum constituit aut symptoma . ib. in hoc morbo venæ sectionis , aut catharsis usus . ib. *vid. stillicidium* , methodus præcavendi menorrhagiæ regressum . 106 cautellæ in hoc morbo magis necessaria . 107. detrimenta quæ inducunt citā nimis hæmorrhagiæ sistentia . ib. Saturni præparationes tum pro injectionibus cum usu interno valde suspecta sunt in uteri hæmorrhagia . ib. circa hoc remedium Boerravi judicium . 108. quando emetica sint purgantibus anteponenda , & contra ibid. compositio cataplasma-

plasmatis cujusdam adversus sanguinis jacturam a nonnullis auctoribus commendata: 110. remedia minus tuta a nonnullis proposita. 111. in uteri inflammatione minime fisci debet. 179. *vid. hemorrhagia.*
Menstrua Freindi sententia circa ea redarguitur. 10
Menstruationis leges. 9. symptomata: 15. usus: 16. hic impeditur vaginæ adhesionem: 54. *vid. fluxus menstruus, & menses.*
Menstruus sanguis a venosis uteri appendicibus procedit. 3. hujusmodi appendices describuntur. *ibid.*
Mentha planta stomachica. 83
Mercurialis in mensium suppressione adhibetur. 47
Mercurialia remedia syrrhos uteri solvunt præmissis præmittendis. 219
Mercurium nocet in ulceribus internis: 210. quomodo exhibeatur ut in uteri ulcere hujusmodi detrimentum caveamus. *ibid.*
Metromania seu furor uterinus. 148
Millefolium Planta adstringens. 101. ejusdem syrussi. 103. aut aquæ distillatæ usus. 124
Millii decoctio in albo fluore commendatur. 135
Millepedes remedium solvens & aperiens. 130
Minorativa in uteri inflammatione usum habent. 178
Moscus in vapore hysterico utiliter exhibetur. 294
Mosgagnus nonnulla observavit circa originem catameniorum. 7. 8
Mors in quo consistat, seu partium maceratio. 182. *vid. gangrena adparens* in tertio gradu hysterici vaporis frequens. 273. 283. qualia signa distinguant mortem certam ab adparenti. 287
Mulieres & filie suspectæ sunt circa ea quæ de mensium suppressione narrant. 79. desides fiunt immodicis mensibus obnoxia. 87. ætate consistentes secundum naturæ leges mensibus deficiunt: 26. quam patiuntur suppressionem mulieres gestantes non naturalis est. *ib.* quæ nunquam conceperunt magis laborio-

sis corripuntur mensibus, quam eæ, quæ pepererunt: 64. *sylvestres* paucis vel nullis mensibus gaudent. 17
rusticæ, & defatigatæ quare minus menstruo fluxui obnoxia sint: 14. quomodo menstruentur. 17
Muscatanux remedium stomachicum. 83
Myrrha in suppressione adhibetur. 47
 remedium stomachicum. 83. & vulnerarium: 104. tinctura myrrhæ commendatur in albo fluore. 135
Myrthi folia adeo adstringunt. 101. baccæ idem præstant. 102. ex iis syrappus conficitur. 103

N

N *Aboth* Medicus Lypsienfis vesiculas sphericas tunicarum uteri pro ovulis habuit. 2

Narcotica quando in mensium suppressione specificè agant: 38. eorum in mensibus laboriosis usus: 66. quid præstent in uteri hæmorrhagia: 98 quid in albo fluore laticinoso tenuiori humore donato. 126. quid in palliativa curatione albi floris. 133 ipsa exhibentur in uteri inflammatione. 177. in syrrho dolente. 221. in palliativa canceri curatione. 235. in Hysterico morbo. 293

Narium hæmorrhagia periodica symptomata est mensio devolutorum. 67

Nationes cultæ mulieres habent uberimis, & laboriosis magis mensibus donatas, quam sylvestres. 17

Naturæ Historici errarunt deleteriæ indolis qualitates menstruo sanguini tribuendo. 14

Nuces cupressi adstringunt. 102. *gallarum* idem. *ibid.*

Nucum flores in pulverem redacti adversus sanguinis jacturam exhibentur. 110

Nucum juglandium decoctio proponitur ad abluenda ulcera matricis. 211

Numularia planta adstringens. 101

Nutrices mensibus carent: 6. quare: 14 mensium suppressionem patiuntur, quæ non naturalis vocatur, ut a morbosa suppressione distinguatur: 26. quæ ab opere lactationis desistunt mensibus nimis fiunt obnoxia. 87

Nym-

Nutrientia farinacea, & incrassantia valde profunt. 132

Nymphæa remedium dulcificans: 104

O

Obstitutio uteri syrrhosa ejusdem in filiabus dispositio. 20. menses intercipit: 27. vel suppressionem consequitur. 34. *viscerum* qua de causa producat: 77. qua ratione abdominis viscera menorrhagiæ causa obstruantur. 92. consequitur albos fluores. 119. in uteri obstruptionibus remedia magis idonea. 130

Odores graveolentes in menstruorum suppressione utiles evadunt. 35

Oedema crurum in uteri hæmorrhagia quomodo producat. 92. in chlorosi a quo procedat. 78. faciei noctu præsertim adurit, crura vero in die deturpat, harum differentiarum explicatio: ibid. remedium præstans adversus anasarcam in albo fluore supervenientem. 85. vultus oedema albos fluore comitatur. 119. pedum, & crurum *Oedema* pallorem comitatur. 72. vultus intumescencia noctu apparet. 92

Oleum amigdalæ dulcium in uteri inflammatione potissimum evadit. 176

Operatio Cæsarea in tubarum gestatione usuenit. 276

Opiata hemmenagoga qua ratione conficiantur. 42

Opiatum Salomonis remedium stomachicum. 83

Ossa humana calcinata proponuntur in uteri hæmorrhagiis, sed frustranea evadunt. 111

Os sepiæ remedium adstringens. 102

Ostiakes Siberiæ populi qui adversus luem Veneream sublimatum commendunt. 236

Ovorum testa calcinata remedium adstringens. 102. *luteum* in uteri hæmorrhagiis valde prodest. 109

Ovariorum structura. 268. *morbi*. ibid. ovaria inflammatione, abscessu, & gangræna corripui possunt. 269. syrrho, & cancro. ibid. vel hydatidibus. ibid. aut hydropi sacatæ fiunt

obnoxia. ib. concepto interdum embrioni locum præstant. ib. tumores cystici efformant. ib. causæ explicantur inflammationis eorum: 270. syrrhi. ib. hydatidum, hydropis sacatæ, & præter naturalis conceptionis. 271. qualem morbum inducat in hac parte foetus corruptio. ibid. difficillime morbus dignoscitur. 272. Prognosis. ibidem Curatio. ibid. remedia in hoc casu indicata. ibid. remedia interna: ibid. potio in ovariorum hydropo utilissima. ibid.

Ovum in utero foecundatum naturaliter menstrum fluxum intercipit. 28

P

Pallidi colores primam mensium eruptionem precedunt. 22. hujus status Prognosis. 23. iis stomachicis medetur: 25. consequuntur mensium suppressionem. 34

Pallidi colores consequuntur uteri tympanitidem. 251

Pallidi colores alias *chlorosis*. 71. hujus morbi descriptio: 72.; 200. ab hinc annis inter speciales mulierum morbos recensentur. ibid. eorundem causæ. 73. ab amisso sanguinis colore procedunt. ibid. causæ quæ produciunt vultus pallorem in suppressione, segnitie, aut imminutione catameniorum. 75. symptomata. 76. diagnosis. 79. pleraque eorum symptomata æmulantur passionem hysteriicam ibidem; ii gestationem comitantur, sedulo enim distinguere oportet hujusmodi morbum a præternaturali suppressione. ibid. eorum Prognosis. ib. recentes plerumque detrimento expertes sunt. 80. ægrarum innobedientia plerumque difficiliorem reddit valetudinem. ibid. quando pallores maximum damnum inferant. ib. Curatio. ib. ii pallidi colores qui gestationem subsequuntur, nullum remedium postulant. ibid. cautelæ in hoc casu necessariæ. ibid. Curatio palliativa. 82. quando morbus catharsim exigit. ibid. in eo aperiendum usus. 83. ma-

- trimonium efficacissimum remedium. 85. quare opus sit interdum in hoc morbo remedia mutare. ib.
- Palor faciei* a quo dependeat. 73. macies simul & palor sunt symptomata albi fluoris. 118
- Palpitatio* in chlorosi occurrit. 72
- Pancreaticus succus* quid præstet in chyli formatione. 74
- Pareus* Ambrosius celebris Chirurgus sæculi XVI. in suo Tractatu de hominis generatione de partu; & nonnullis mulierum morbis egit. 326. ejusdem observationes circa uteri amputationem. 263
- Partus* laboriosus fit vaginæ constrictionis ergo. 55. primus partus in mulieribus omnia uteri vasa reseat. 26 quando id proficit. ibid.
- Partus*, & *abortus* quomodo menorrhagiam inducant. 90. crebri partus vaginæ descensum faciunt. 264
- Passio hysterica* a mensium suppressione originem ducit. 31
- Passio hysterica* perbelle describitur. 276 irregulariter revertitur. ibid. phenomena quæ ipsa producit. ibid. quatuor potissima phenomena. 277. causæ passionis hystericae. ibid. tripliciter consideratur. ibid. modo convulsiva est. 278. modo ab animalibus spiritibus dependet. ibid. modo uterus morbi sedes est. ibid. hujusmodi principia demonstrantur. ibid. verum ostenditur diversas partes sympathiae uteri legibus agitari. 279. causæ constantes hujus morbi. ib. quomodo variabiles commotiones producat. 280. præ ceteris mulieres hysterico morbo sunt obnoxie. ibid. causæ quæ inducunt, & quæ sistunt hystericos vapores. ib. symptomata passionis hystericae magis obvia. 281 dependent a sympathica uteri affinitate. ibid. quatuor symptomata pathognomonica describuntur. ibid. ea enunciantur quæ abdomen respiciunt. 282. quæ stomachum. ibid. quæ caput. 283. & quæ totum corpus respiciunt. 285. diagnosi hystericae passionis 286. difficillima cum morbus tertium gradum attigerit. ib. prognosis. 288.
- distinguitur in illam quæ citra damnum curationem amittit. ibid. in alteram speciem valde interdum periculosa. ibid. curatio generalior. ibid. intra paroxysmum. 289. extra paroxysmum. 292. auxilia externa ex parte uteri adversus vapores hystericos. 290. praxis obvia muliercularum aspernitur. 292
- Pediluvia* in suppressione utilia. 35 vix profunt in cronica mensium suppressione. 43. in chlorosi quomodo agant. 82. frigida in uteri hæmorrhagiis adhibentur. 100
- Pedum oedema* uteri syrrho laborantes infestat. 215
- Peritoneum* externam uteri tunicam supeditat. 2
- Perle* inter media adstringentia recensentur. 102
- Pervigilium* inflammationis uteri effectus. 172
- Pervinca planta adstringens.* 101
- Pessaria* medicamentosa a genuina praxi adversus mensium suppressionem proscribuntur. 38. peculiaris generis filiarum vulvæ apposita, cur nascalia dicantur. 44
- Pessaria* adstringentia in uteri hæmorrhagia conveniunt, qualia damna interdum inferant. 99. quomodo fabrefiant. ibid.
- Pessaria* seu uterina orbicula quid sint, & quomodo patrentur. 261. quomodo applicentur. ibid. qualia detrimenta afferant modo incomplete construuntur. 262. ex pulpa plantarum emollientium confecta in uteri inflammatione adhibentur. 177
- Peyerus* quid cogitaret circa mensium scaturigines. 6
- Pharmacica* a recentioribus valde exculta. 341
- Phlogosis* primus gradus inflammationis est. 168
- Phthisis* teterrimum est paloris phenomenon. 84. signa quæ illam prænunciant. ibid. curandi methodus. ibid. venerea mercurialibus frictionibus compescitur. *Vid. frictiones.*
- Phytolaca* specificè proponunt adversus cancrum. 238

Pica, seu gustus depravatio prima eruptionem præcedit. 19. vel mensium suppressionem, aut deficientiam menstrui fluxus consequitur. 30. 55. appetitus depravatus idem sonat. 72. quid hoc phenomenon inducat. 76
Pilosella planta adstringens. 101
Pillulæ anthystericæ. 36. Elvetii adversus hæmorrhagiam quomodo præparentur. 109. Hoffmanni utiliter usuveniunt in hydrope affectis. 248
Pimpinella planta adstringens. 101
Pineola decocta in albo fluore conveniunt. 134
Plantago planta adstringens. 101. ex ea aqua destillata. 103. syrappus. *ibid.*
Plenitudo uteri localis potissima est fluxus menstrui causa. 9. quomodo autumassent hujusmodi plethoram gigni. *ibid.* rationes, quæ vulgarem vasorum sanguineorum uteri descriptionem oppugnant. *ibid.*
Plethora localis quæ in utero fit ab universali plenitudine non dependet. 10. teterrima phenomena quæ consequi possunt universalem plethoram a mensium suppressione natum. 34. maxima plethora mensium devolutionem interdum inducit. 68. vera, & spuria produciunt menses nimios. 87
Plumbi præparationes intus sumptæ suspectæ evadunt. 112
Polypharmaciae abusus. 308
Polygonum planta adstringens. 101. ex ea aqua destillata. 103
Portulaca planta dulcificans. 104. ejusdem semina emulciones intrant. *ib.*
Porrum planta quæ adversus mensium suppressionem commendatur. 47
Potiones emenagogæ qua ratione conficiantur 42. anthystericæ 290. cathartice conveniunt in hysterico morbo. 293
Potus in sanguinis hæmorrhagiis magis idoneus. 98
Praxis superstitiosa ad sanguinis jacturam sistendam. 113
Præparationes martiales deobstruentes sunt mercuriales, non cathartice; idem præstant in uteri syrro. *ibid.*
Prolapsus uteri est albi floris symptoma. 124
Pthifana sudorifera, & cathartica in

albo fluore magnopere commendata. 134
Pubertas quid tunc temporis natura agat intra uteri, & mammarum vasa in filiabus. 4
Pulmones in chlorosi infarciuntur. 77
Pulmonaria planta adstringens. 93
Pulmonia vide *phthisis*.
Pulsus quare exigui, & frequentes in chlorosi appareant. 77
Pulveres emenagogæ qua methodo exhibeantur. 42
Pulvis aperiens in chlorosi laudatus. 84. cornachinus hydragogus putatur. *ibid.*
Purgantia stimulantia quando in suppressione convenient. 43. in depravato appetitu exhibentur. 81. horum remediorum in chlorosi delectus. 82. usus in quibusdam menorrhagiis. 108. in hoc necessaria cautela. *ibid.* qualia vero in menorrhagiis selignantur. 108. *hydragoga* in uteri hydrope. 248
Purgare frustraneum est plerumque in uteri hæmorrhagiis. 97. quando id conveniat. *ibid.* necessum erit in uteri ulcere. 206. vel dum solventia exhibentur remedia. 220
Pyrola planta adstringens, quomodo exhibeatur. 101

Q

Q *Uercus* folia tenella adstringentia sunt. 101. 103
Quies necessaria evadit in uteri hæmorrhagia; quare ægræ continenter lectulo detineri debent. 96. 106
Quinquefolium planta adstringens radix. 101. & folia usuveniunt. *ibid.*
Quinquina, animadversiones circa ejusdem usum gangrænam adversus. 203 exhibendi ratio. 191. novum remedium, ejus brevis hystoria. 341

R

R *Adices aperientes* quando adhibeantur. 130
Ranæ exsiccatae, & combustæ pro suffumigiis in uteri stillicidio proponuntur. 105
Remedia usitata quæ primam menstruum

fiam eruptionem promovent. 26
Renum dolores quomodo inducat uteri
 plethora. 15
Regimen vitæ chloroticis idoneum. 82
 quale conveniat in uteri hæmorrhagia. 98. quale in mensium cessatione. 122
Repercutientia frigida in uteri inflammatione valde nocua evadunt. 180
Resinæ quid præstent ad solvendas uteri obstructions. 131
Respiratio difficilis in plethoricis mulieribus prope menses qua de re causa appareat. 16. crebra ante primam sanguinem eruptionem. 19
Respiratio difficilis in chlorosi. 72. qua de causa. 77. exercitio corporis nimio augetur. ibid.
Resolventia remedia in inflammatione adhibentur. 178. hujus generis cataplasmata in uteri syrrho præscribuntur. 220
Resolutionem (in) definit fortuna secunda uteri inflammatio, quando id contingat: 175. quid fieri oporteat in uteri inflammatione incipiente, vel confirmata. 178. quomodo in tumoribus resolutio obtineatur. 217
Reticularis membrana diaphanis scatet vasis. 73
Ribesiorum syrupperi usus. 105
Riverius quando ipsæ præscribat venæ sectionem ex brachio potius quam ex pede mensium revocandorum causa. 26
Rosæ rubræ adstringentes sunt. 101. ex iis aqua destillata. 103. tinctura & syrupus. ibid.
Rosmarinus in mensium suppressione commendatur. 45
Retentio menstruorum morbus est a suppressione prorsus diversus. 56. ejusdem symptomata describuntur. 55
Rotulæ cordiales & aperientes primam eruptionem promovent. 26. aperientes & cathartica idem præstant. ib. qua ratione conficiantur. 42
Ruschvort (D) Chirurgus in Northampton primus qui adversus gangranam quinquinam exhibuit. 190

S

Sabina remedium suspectum adversus mensium suppressionem. 48
Sagou pulpa incrassans arboris cujusdam exoticæ. 132
Sanchez (D) Medicus Lusitanus ejusdem observationes ad luem veneream compescendam sublimati corrosivi ope. 236
Sanguificatio, aut chyli in sanguinem methamorphosis, quomodo fiat. 75
Sanguis in chlorosi decolor fit. 73. quomodo ejusdem naturalis color deturpetur. ibid. cruoris analysis. ibid. ex quatuor substantiis conflato. 74 qua de causa rubrus appareat: ibid. pars ejusdem colorata decima aut duodecima est totius massæ. ibidem cruoris globuli quomodo efformentur. ibidem eorum numerus atque tenuitas a quo dependeant. 75. perfecta sanguinis circulatio chyli, aut novi sanguinis completam reproductionem fovet. ibid. cruoris densitas, & phenomena hic superventura. 77. ejusdem rarefcentia, quæ compescitur speciali indicata decoctione. 98. remedia magis idonea, quæ sanguinem solvunt. ib.
Sanguinis historia sive ejusdem circulationis inventum. 338
Sanguis Draconis remedium adstringens. 102
Sanguis menstruus qua natura polleat. 6. ab arteriis prodit, aut a venis? 8. lymphæ lactea remiscetur. 11. ex vasis sanguineis in lymphatica minime irrupit. ibidem neque illum scissuræ vasorum effundunt. ibid. copia variat. ibid. plerumque inter octo, & sexdecim uncias consistit. 13. erronea eorum sententia, qui credunt deleteriæ indolis qualitatibus ipsum pollere. 14. eruptionem præcedit, & subsequitur lymphaticum effluvium. ibid. hujusmodi sanguis foetum alit. 16. idem ex menstruata muliere desumptus adversus mensium suppressionem remedium præstare autumant. 50

Sanicula planta vulneraria. 104
Santala idem præstant. 102
Salsæ perillæ decoctio appendicum venosarum elaterium restituit. 106
Saponaria remedium in albo fluore commendatum. 135
Sal de duobus remedium diureticum in albo fluore. 126. *Gualberi* idem. ib.
Martis Riverii remedium aperiens. 83
Salia solventia in uteri syrrho præscribuntur. 219
Sarcoma vaginae caustico abraditur. 230
Scabiosa planta vulneraria. 104
Scarificationes quando convenient in uteri gangræna. 188
Schurygii opinio circa mensium scaturigines. 7
Scilla remedium diureticum. 126
Scorbutus minime novus est morbus. Germanici acies trans Rhenum missa eo correpta fuit. 320. ad littora Baltici Endemius est, interdum comitatus paupertatem, & sordiciem. ib.
Scorzonera decoctio in palido colore commendatur. 84
Semina frigida qua dosi emulsiones intrent. 104
Serpentaria virginiana in mensium suppressione remedium suspectum. 26
Singultus uteri inflammationis symptoma. 173
Simarouba novum remedium, ejus inventi historia, & utilitates. 342
Syrrhus uteri suppressionem gignit. 27
 menorragiam inducit. 89
Syrrhus matricis cum suis differentiis describitur. 212. syrrhus in genere quatuor characteres potissimum ostendit. ibid. causæ. 213. rationes, quæ demonstrant ipsum a sanguinis congestionem minime ori posse. ibid. lymphæ congeries, aut humoris laticinosi duplicem syrrhi speciem producit, modo lymphaticum, modo laticinosum. ibid. causæ generales syrrhi efficientes. ibid. causæ occasionales, seu locales: ibid. sunt vitium venereum. ibid. usus nimius injectionum adstringentium. ibid. frigus nimium fluente menstruo, aut lochio de repente superveniens. ibid. uteri obstructio. ibid. explicatio differentia-

rum. 214. inter eas differentias sunt syrrhus lymphatico laticinosus. ibid. totalis, vel partialis. ibid. perfectus, & legitimus. ibid. spurius, seu imperfectus: ib. œdematosus, & fleugmonosus, ib. hujus morbi symptomata. 215. Diagnos. 216. rite distinguere debet ab hydrope, gestatione, aut mola. ibid. signa diagnostica diversarum specierum. ibid. Prognosis generalior. ibid. specialior vaginae, atque vulvæ. 217. curatio generalior. ibid. quatuor potissime indicationes. ibid. duplex indicatio quam implere debemus in palliativa syrrhi curatione. 220. methodum quam prosequi fas erit, ne syrrhus in cancerum degeneret. 221. remedia specifica ad uteri syrrhum resolvendum specificè prescripta. ibid.
Syrrhus ovariorum. 269
Smaragdia remedium in uteri hæmorrhagiis valde incertum. 113
Solventia externa. 220. interna quid præstent, & quando convenient. 219
Somno quare chlorotica valde obnoxia fiant. 78
Sopor quare prope menses aggrediatur. 16. a suppressione lethargum æmulatur ipsum adversus remedia magis idonea. 36. in palore obvium est phenomenon: 72. effectus est febris symptomatice in uteri inflammatione supervenientis. 172
Souci quid præstet in mensium suppressione. 95
Sperma ranarum & ejusdem aqua destillata remedium præstat adstringenti facultate donatum. 103
Specillum quando intromitti debeat ad inquirendum uteri statum. 249
Sphacellum uteri. 181. vide *gangræna*.
Spica Nardus remedium cujus virtus in uteri hæmorrhagia admodum suspecta est. 111
Spigellii observationes circa catameniorum scaturigines. 7. 8
Splen Bovis in mensium suppressione juvenit. 47
Splen in ægrotantibus mulieribus chlorosi affectis tumet. 77
Spongia adstringenti decoctione imbuta

ta vaginam roborat in incipientede-
scensu. 61
Stannum calcinatum adhibetur in sa-
guinis amissione. 111
Sterilitas effectus mensium suppressio-
nis. 35. effectus veterrime chlorosis
80. albi floris symptoma. 19. ob-
structionem tubarum consequitur. 177
Sternutatoria in suppressione conveni-
unt. 43. in uteri abscessu rupturam
fovet. 199
Steatoma species est tumoris cisticis. 222
Stillicidium uteri ab atonia aut laxitu-
dine appendicum venosarum depen-
det. 100. remedia adstringentia tunc
magis idonea. 101. in hoc casu vi-
tæ regimen. 106
Stomachica dulcia digestionem foveant;
simpliciora, & composita magis ex-
ponuntur, eorumque doses. 82
Stomachus qualia remedia ipsum robo-
rent. 25. symptomata quibus fit ob-
noxius in chlorosi. 76. Qua de cau-
sa in hoc morbo tumeat. ibid.
Stoerck (D.) Opus circa cicutæ exhibi-
tionem cancrum adversus. 230
Stranguria, aut mingendi difficultas in
inflammatione uteri obvia. 269
Sublimatum corosivum limatura ferri pp.
adversus albos fluores specificè com-
mendant. 137. Qualia damna infe-
rat. ibid. Mercurio vivo, & Scamo-
nio copulatum in albo fluore susce-
ptum evadit. ib. Idem pro injectio-
nibus præstat. 138
Succi depurati plantarum apozematis an-
teponuntur. 97
Sudores nocturni in chlorosi, & in o-
mni morbo malum prænunciant. 84
Sudorifera in curatione floris albi la-
ticinosi conveniunt. 126
Suffocatio hysterica. 276
Vide Passio hysterica.
Suffumigia humida in mensium suppressio-
ne conveniunt. 38. 43. Formulæ
decoctionum pro hoc scopo. 43. qualia
eorum in uteri stillicidio conveniant.
106. sicca adversus uteri morbos quo-
modo parentur. ibid. Ad uteri ela-
terium restituendum qualia parentur.
107. humida in uteri ulceribus. 208
 resolventia in uteri syrrho. 220. 221
Astruch de Morbis Mulierum.

in uterum intromittuntur. 226. intra
vaginam. 248. sicca commendantur
adversus incipientem uteri descen-
sum. 260
Sumach planta coriaria, remedium ad-
stringens. 102
Suppositoria. 199
Suppressio mensium distinguitur in na-
turalem, non naturalem, & præ-
ternaturalem. 26. tres diversas cau-
sas respicit. 27. videlicet uteri
morbos. ibidem vitium lymphæ la-
cticinosæ. ibid. quia huiusmodi lym-
pha ex vasis vermicularibus effugit,
fluoresque albos producit. 28. vel de-
fectum appendicum venosarum. ibid.
aut convulsivam uteri contractionem.
ibid. denique suppressiones animi pa-
themata pro causa recognoscunt. ib.
lentum sanguinis circulum, aut va-
forum laxitudinem. ibid. suppressio
vel de repente. 29. vel paullatim ag-
greditur. ibid. interdum in mensium
suppressionem albi fluores naturæ offi-
cium implent. ibid. suppressio huius-
modi fluore orbata. ibid. quæ dolo-
re, & tensione uteri expers est, quæ-
que utrumque comitem habet. 30
 differentiarum explicatio. ib. sym-
ptomata diversa, quæ huiusmodi sup-
pressionis speciem comitantur. ibid.
symptomata repentinæ suppressionis.
31. signa quæ indicant gestationis sup-
pressionem. 32. cautellæ necessariæ in
iis suppressionibus pertractandis, quæ
suspectas mulieres adoriuntur. ibid.
quam methodum medicus prosequi
debet dum mulieres pertractat ætate
constitutas. 33. diversæ suppressionis
species, & peculiare causæ. ibidem
utriusque speciei prognosis. 34. teter-
rima phenomena in repentina sup-
pressionem occurrentia: ib. ratio me-
dendi hanc suppressionis speciem dum
fluente sanguine occurrit. 35. men-
sium suppressio, quæ extra tempus su-
pervenit, quæque quatuor casus com-
plectitur. 36. tres potissimas indica-
tiones, quas medicus in mensium sup-
pressionem implere debet. 37. reme-
dia quæ densum uteri contextum re-
laxat. ib. cautellæ in hoc morbo ne-
cessariæ.

cessariæ . 44. remedia minus tuta in hoc morbo commendata . 48. mensium suppressio interdum sanguinis jacturas inducit. 89

Suppuratio uteri in quibus circumstantiis appareat . 175. mechanicæ in utero suppuratiōis leges. 193

Sympathia leges inter mammas & uterum conferentes . 4. illa uteri cum diversis corporis partibus in matricis præsertim inflammatione locum habet. 172

Syncope frequentes sunt in uteri hæmorrhagia . 84. hysterica signa. 276

T

T*Abula* cronologica auctorum qui de morbis mulierum scripserunt. 297

Talismana superstitionis ergo usuvenerat. 298

Tartarum martiale solubile remedium aperiens. 84

Tenesmus hæmorrhagiam uteri inducit. 90

Terebinthina remedium adstringens. 102
in albo fluore quomodo adhibeatur. 134

Terra sigillata remedium adstringens. 102

Theriaca remedium stomachicum. 83

Tinctura Martis remedium aperiens. 84

Topinambous mulieres nullis, vel paucis mensibus laborant. 17

Tormentilla planta adstringens. 101

Transfusionis sanguinis historia, origo, & proscriptio. 343

Trillerii disertatio adversus inveterati canceri amputationem. 238

Trochisci Catechu remedium adstringens. 103. Gordoni idem . ibid. de Carabe idem. ibid.

Tube Faloppiane ovaria attingunt . 2 describuntur. 273. ovariorum morbis sunt obnoxia . ibid. similibus de causis . 274. diagnosi nisi incerta præbent indicia. 275. tubarum ægritudinum curatio. ibid.

Tubercula seu abscessus tuberculosi uteri. 194. eorum natura . ibid. diversus positus . ibid. triplex species tuberculorum uteri. ib. quomodo lymphæ, & lac uterinum id producant .

ibid. quomodo suppuratio in iis circumstantiis producantur. 195

Tumores cystici uteri, & vaginæ. 222
causæ. 223. symptomata. 224. diagnosi. ibid. quomodo distinguantur ab hydrope, aut gestatione. ibidem
prognosis. 225. curatio. 226

Turtur qua ratione in pulverem redigatur, & adversus menorrhagiam adhibeatur. 110

Tussis frequens molestum chlorosis symptoma. 84. quomodo compescatur. 85

Tympanitis uteri describitur. 249. causæ tympanitidis veræ, aut permanentis. 250. symptomata. 251. ea vel sicca est. ib. vel humida. ibid. hujus morbi diagnosi. 252. prognosis. ib. curatio eo collineat, ut aer per uteri orificium exeat. 253. specilli intromissio valde prodest. ibid. cautellæ necessariæ. 254. tympanitis pervagant in mulieribus, quos pudet morbum fateri, communis est ægritudo. ibid. prognosis, & curatio ejusmodi morbi. ibid.

V

U*Lcera uteri* albos fluores consequuntur post mensium suppressionem occurrentes. 34. menses sistunt. 27
menorrhagiam inducunt. 89. quæ signa illa prænuncient in albo fluore. 124

Ulcus uteri describitur. 199. hujus morbi causæ. 200. Differentiæ causæ immediata ergo. 201. causæ antecedentis respectu. ibid. positus causa. ib. qualitatis ratione. ib. extensionis respectu. ibid. propinquitatis partium vicinarum ergo. ib. ulceris symptomata. ib. causæ doloris levioris, aut intensioris in uteri ulcere. 202. quando ulcus fyrrhofum fiat. ib. quomodo innotescat ulceri sedes. ib. phenomena quæ rationem habent diverso positi ulcerum matricis. ibidem morbi diagnosi. 203. signa pathognomonica. ibid. indicia causæ proximæ ulceris. ib. diagnosi causæ remotæ. ib. signa diversarum qualitatum ulcerum. ib. prognosis. ib. curatio. 205
reme-

remedia generaliora quæ in omni ulcere specie conveniunt. ib. methodus curativa in ulcere incipiente. 207 methodus tutior, & efficacior in ulcere confirmato sed simpliciore. 208 ratio medendi ulcera venerea. 209 methodus curativa ulcerum incurabiliū. 210. usus narcoticorum in iis circumstantiis. ib. remedia specifica adversus uteri ulcera a nonnullis proposita. 211

Ululatus vehementiores uteri hæmorrhagias inducunt. 89

Urinæ ardor qua de causa ægras infestet prope menses. 15. turbidæ, & spissiores fiunt in hoc casu. ib. exitus implicatur a morbis qui vaginam deturpant. 55. vitia in iis mulieribus quæ albo fluore corripuntur. 214

Urtica alba planta adstringens. 101. emortuæ syrappus adstringens. 103. ejusdem conserva & infusum commendantur in albo fluore. 229. hujus plantæ succus infantum urina admixtum injectionum ope adversus uteri ulcus commendatur. 211

Usnea in uteri menorrhagia specifica proponitur. 112

Vagina membranis, exscrescentiis, aut cicatricibus occlusa menses impedit. 50. contra naturæ ordinem obducta quinque functiones implicat. 54. *vaginae* sarcoma. 263. *descensus* describitur. 264. nisi productiones sint membranæ internæ vaginæ. ibid. harum productionum differentiæ distinguuntur in sarcomata, fungos, & plicarum transversalium productiones. ibid. indolis eorum respectu moles sunt flaccidæ, spungiosæ, varicosæ, lymphaticæ, calosæ, & syrrhosæ. ibid. differentiæ crassitudinis & longitudinis. ibid. differentiæ adhesionum. ibid. causæ vaginæ descensus. ibid. causæ & sedes sarcomatis. ibid. causæ fungi. ibid. causæ simplicis productionis. ibid. rationes differentiarum diversorum morborum, quæ descensus vaginæ audiunt. ibid. hujus morbi symptomata. 265. diagnosi. ibid. qua ratione ab uteri descensu differat. ib. prognosis. 266. curatio. ib.

methodus curativa pro diversa morbi indole varia. ibid. in excrecentiæ vaginæ curatione amputatio causticis antepositur. ibid. vincula obsolescunt qua ratione. ib. methodus hujus amputationis. ib. chirurgicæ animadversiones, quæ hanc consequuntur operationem. 267. excrecentiæ vaginæ venereæ mercuriales frictiones postulant. ibid.

Vapores emollientes per fellam familiarem occurrente mensium suppressione usuveniunt. 38. 43. *hysterici* ante primam eruptionem apparent. 20. remedia quæ ipsos compescunt. 147. distinguuntur ab hyppocondriacis. 286. remedia specifica adversus hunc morbum commendata. 294. *Vid. Passio hysterica.*

Varices vasorum uteri concisæ sanguinem effundunt. 89

Variolæ sanguinis effusionem induunt. ibid. variolarum origo quas Arabes sæculo VIII. exportarunt. 303

Vasa lymphatica in utero innumera sunt. 2. sanguinea uteri speciali methodo describuntur. ibid. lactea, & vermicularia describuntur. 3. quomodo inspicere queant in utero mulieris postremo gestationis mense disectæ. 4. horum vasorum distributio. ibid. organa quæ lympham lacticiniosam fecernunt. ibid. hyppotheses circa distributionem vasorum sanguineorum uteri. 9. vermicularia uteri, quare singulis mensibus periodice inflentur. 11. quomodo hujusmodi tumescencia menstruum fluxum gignat. ibid. eorum usus ante pubertatem. 12. ipsorum inanitio menses impedit. 27. causæ hujus inanitionis in mensium suppressione. ibid.

Venæ spermaticæ, hyppogastricæ, & hæmorrhoidales internæ ab utero sanguinem recipiunt. 2. earum intra uteri tunicas distributio. 3. per hæmorrhoidales interdum menses alio deflectunt. 67

Venæ sectiones in hysterica passione usuveniunt. 292

Verbascum planta refrigerans emulsionem intrat, quæ in uteri hæmorrhagia exhibetur. 98

<i>Vesalii opinio circa menstruorum originem.</i>	6	<i>Vitia venerea syrrhos producunt.</i>	191
<i>Vesiculæ quæ per internam uteri faciem reptant.</i>	2	<i>Vomitoria remedia interdum profunt in sanguinis amissione . 97. nocua sunt in uteri inflammatione.</i>	180
<i>Vincula brachiorum, & crurum inutiliter adhibentur in uteri hæmorrhagiis, quamquam veterum medicorum auctoritate fulciantur . 97. nocent in uteri inflammatione.</i>	179	<i>Vomitus sanguinis symptoma est effectus mensium suppressionis . 34. non cruentus primo gestationis mente parvi faciendus. 81. remedia quæ illum compescunt . ibid. utilis evadit tartaro emetico excitatus in violento vaporis hysterici aggressu.</i>	292
<i>Vinum album chalybeatum remedium præstat aperiens, quomodo exhibeatur . 84</i>		<i>Vultus præ ceteris partibus quare pallori magis obnoxius . 91. quare noctu intumescat.</i>	92
<i>Virga aurea planta adstringens.</i>	101		
<i>Vitæ conditio, & partium vitalitas in quo consistat.</i>	182		

Ne errores libellum deturparent diligentiam omnem impendimus, aut si paucos inveneris illos B. L. humaniter parcas deprecamur, eosque tantum enuntiare satagemus quos contradictionem parere censuimus.

Pag. 2. Lin. 26. interecantibus, add. contexta. 3. 5. innumeros, innumeras. 3. 21. tabulos, tubulos. 3. 33. uteri, uterum. 4. 27. effundere, exfugere. 4. 51. significationi, sanguificationi. 5. 12. excretiores, excretorios. *ibid.* pendunt, pandunt. 6. 15. tribuitur, tribuuntur. 8. 25. menstruo, ad menstruum fluxum. 11. 5. contringunt, contringit. 5. 18. veritatem, veritas. 16. 3. cetera pleraque, ceteros plerosque. 16. 18. pulsi, pulsus. 17. 38. illuc, illic. 13. 27. omnis, totus. 13. 42. unica, uncia. 24. 1. pulsi, pulsus. 30. 13. conquerebuntur, conquerentur. 30. 26. absimilibus, absimiles. 32. 51. querebuntur, queruntur. 37. 11. constituunt, constituunt. 37. 39. fluviali, fluviali. 46. 23. jugulandis, jugulanda. 47. 45. fine, finem. *ibid.* butyri, butyro. 48. 17. foveat, favent. 51. 12. eum, eam. 52. 18. hymen, hymenem, *ibid.* appellari, appellare. 64. 11. 13. pulsi, pulsus. 64. 41. consecuntur, sequitur. 64. 30. quem, quam. 67. 16. similem, similis. 68. 15. solæ, soli. 68. 48. detinebuntur, detinentur. 68. 49. conquerebuntur, conquerentur. 69. 5. corripiebuntur, corripientur. 79. 18. menti, mentiri. 80. 39. abortum, abortus. 90. 32. nullum, nullam. 91. 48. cavis, causis. 93. 4. perpendemus, perpendamus. 93. 21. aliquem, aliquam. 95. 7. eventum, eventus. 96. 39. horto, hora. 101. 5. ANIMALIA, VEGETABILIA. 106. 23. usum, usus. 109. 24. moderare, moderari. 110. 29. manipulum, manipulus. 113. 2. imitur, immiscetur. 114. 9. nullum, nullam. 115. 2. perscrutabimus, perscrutabimur. 115. 9. desisterunt. 116. 28. sternit, sternunt. 116. 33. continui, continuæ. 129. 21. arridit, arridet. 139. 28. revertunt, revertuntur. 140. 13. uterum, uterus. 143. 28. quam, quæ. 147. 8. guttas, guttæ. 154. 24. parata, paratas. 156. 24. locos, loca. 164. 20. apozematis, apozematibus. 165. 19. veneri natus, veneris causa natus. 168. 13. symptomatis, symptomatibus. 170. 22. vasa, vasa. 172. 18. aris, aeris. 172. 19. calorem, calor. 180. 1. sancire nolui, sancire non posse. 180. 18. vesica, vesicam. *ibid.* utero, uterum. 180. 20. adhiberi, adhibere. 188. scarificationes, scarificationes. 189. 35. poterit, poterunt. 192. 27. deservescunt, deservescunt. 193. 3. pervaget, pervagetur. 195. 40. ex mutationi, ad eam mutationem. 192. 32. Tuberculosum abscessum, tuberculosus abscessus. 200. 30. viri, virus. 202. 10. conquerebuntur, conquerentur. 203. 1. corripiebuntur, corripientur. 204. 24. sanguinis, sanguine. 206. 38. eum, illud. 209. 42. virum, virus. 210. 33. moderare, moderari. 211. 14. illuc, illic. 213. 7. illuc, illic. 214. 21. illoc, illic. 216. 25. conquerebuntur, conquerentur. 218. 44. utero, uterum. 223. 27. fœrum, fœtus. 224. 1. pertinacia, pertinaciam. 230. 41. distingui, distinguere. 131. 46. iis fini, hi sane. 134. 48. fluviali repenti, fluviali repenti. 237. 17. Joannis, Joannes. 238. 7. facultatem, facultas. 238. 8. tributam, tributa. 238. 41. specie, speciem. 240. 16. affectum, effectum. 242. 40. turgent, turgent. 243. 20. variare, variari. 244. 11. impediunt, impediunt. 244. 37. sarcomata, sarcomate. 245. 9. curare, curari. 247. 39. experientiam, experientia. 248. 38. uterum, uterus. 249. 21. rationem, ratio. 253. 15. ostio, ostium. 253. 37. secutionum, succutionum. 254. 7. exitus fuerit, exierit. 255. 10. recessita, recensita. 257. 24. fundum, laxum, emollitum, fundus, laxus, emolitus. 259. 21. restitutio sperari, restitutionem sperare. 160. 1. uterum, uterus. 261. 16. afferat, afferant. 261. 18. ipsæ, add. per. 262. 43. palliativa ratio institui, palliativam rationem instituere. 264. 31. luis, lues. 266. 30. inventi sunt, invenerunt. 267. 43. ulcum, ulcus. 271. 10. detecti sunt, detexerunt. 272. 7. Totidem. Idem. 272. 35. poterit, poterunt. 272. 41. inquireri, inquirere. 275. 13. Ignorantiam nostram, ignorantia nostra. 275. 26. cystici, cysticos. 275. 27. isque, eosque. 275. 30. generationem, generationi. 276. 22. revertit, revertitur. 276. 24. morbis, morbi. 280. 22. quæ, quas. 281. 8. revertat, revertatur. 282. 41. qui, quem. 284. 14. 19. revertunt, revertuntur. 284. 52. motus, motibus. 286. 15. mulieribus, mulierum. 287. 15. distinguitur, distinguuntur. 289. 14. qua, quas. 291. 32. propinatur, propinantur. 299. 20. desistit, destitit. 299. 25. Romæ quam, Romam quem. 299. 27. Romæ transductum, Romam transductus. 311. 25. Stephani, Stephanus.

Fig:^a I.




Fig:^a III.




Fig:^a IV.




Fig:^a II.

